

УДК 519.21+(517.9+518.61):532+519.6

## ЛОКАЛИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ СПЕКТРА ДЛЯ ОПЕРАТОРА СТОКСА В СЛУЧАЙНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

В. В. Юринский

**Аннотация:** Исследуется асимптотика главного собственного числа оператора Стокса для течения в случайной пористой среде, заполняющей большой куб в  $\mathbb{R}^d$ . Анализируется зависимость главного собственного числа от размера куба в предположении, что пористая микроструктура случайна и пространственно однородна. В двумерном случае удается доказать, что при надлежащей нормировке главное собственное число сходится по вероятности к детерминированному пределу. Для более высоких размерностей указан неслучайный интервал, который содержит нормализованное главное собственное число с вероятностью, произвольно близкой к единице. Библиогр. 12.

### 1. Введение

Основными результатами статьи являются теоремы 1.1, 1.2, сформулированные в п. 1.2. Эти теоремы показывают, что с вероятностью, произвольно близкой к единице, главное собственное число системы Стокса

$$\Delta U - \nabla p + f = 0, \quad \nabla \cdot U = 0 \quad (1.1)$$

в случайной подобласти большого куба с ребром  $r$  имеет порядок  $O(\ln^{-2/d} r)$ . Они указывают также детерминированный интервал, который с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, содержит эту случайную величину. Для удобства в вычислениях статьи используется величина, обратная к главному собственному числу — максимальное рэлеевское отношение (1.7). Основные обозначения введены в п. 1.1.

**1.1. Предварительные сведения.** Точка  $x \in \mathbb{R}^d$  отождествляется ниже со столбцом ее координат  $x^{(j)}$ ,  $j = 1, \dots, d$ , в фиксированном ортонормированном базисе в  $\mathbb{R}^d$ . Скалярное произведение и евклидова норма в  $\mathbb{R}^d$  обозначаются через  $x \cdot y = \sum_{j=1}^d x^{(j)} y^{(j)}$  и  $|x| = \sqrt{x \cdot x}$ .

Как обычно, характеристическая функция множества  $A$  обозначается через  $1_A(x)$ , множества, полученные сдвигами, изменением масштаба и т. д., — через

$$y + \alpha A = \{x : x = y + \alpha x', x' \in A\}, \quad y \in \mathbb{R}^d, \alpha \in \mathbb{R},$$

$$A + B = \{x : x = y' + y'', y' \in A, y'' \in B\}.$$

Например,  $B = \{x : |x| < 1\}$  и  $a + rB$  суть соответственно открытый единичный шар с центром в начале координат и открытый шар радиуса  $r$  с центром в  $a$ . Используются обозначения  $\bar{A}$  для замыкания  $A$  и  $A^0$  — для внутренности этого

множества. Обозначение  $Q = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^d$  неизменно подразумевает единичный полуинтервал  $\mathbb{R}^d$ , а  $Q^0 = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^d$ ,  $\bar{Q} = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^d$  — его внутренность и замыкание. Чтобы не загромождать формулы, обычно мы не будем делать различий в обозначениях между множеством  $A$  и его внутренностью  $A^0$  в тех случаях, когда речь идет о множествах вида

$$A = \bigcup_{z \in I} H(z + Q).$$

Евклидово расстояние между множествами и точками или двумя множествами обозначается через

$$\text{dist}(x, B) = \inf_{y \in B} |x - y|, \quad \text{dist}(A, B) = \inf_{x \in A, y \in B} |x - y|.$$

Диаметр множества обозначим через  $\text{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} |x - y|$ , лебегову меру измеримого множества  $A \subseteq \mathbb{R}^d$  — через  $\text{mes}(A)$ . В некоторых выкладках будет удобно использовать в  $\mathbb{R}^d$  также норму и расстояние

$$|x - y|_+ = \max_i |x^{(i)} - y^{(i)}|, \quad \text{dist}_+(x, A) = \inf_{y \in A} |x - y|_+.$$

Обозначение  $\{u_{k'}\} \prec \{u_k\}$  указывает, что первая последовательность является подпоследовательностью второй.

Частные производные по пространственным переменным  $x^{(j)}$  обозначаются через  $\nabla_j \phi = \partial \phi / \partial x^{(j)}$ , а градиент скалярной функции — через  $\nabla \phi(x) = (\nabla_j \phi(x))$ . Для векторнозначных функций  $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  дивергенция обозначается через

$$\nabla \cdot u = \sum_{j=1}^d \nabla_j u^{(j)},$$

а  $d \times d$ -мерная матрица Якоби — через  $\nabla \otimes u = (\nabla_j u^{(k)})$ . Как обычно,

$$|\nabla \phi(x)|^2 = \sum_{j=1}^d (\nabla_j \phi(x))^2, \quad |\nabla \otimes u(x)|^2 = \sum_{j,k=1}^d (\nabla_j u^{(k)}(x))^2. \quad (1.2)$$

Если это не влечет неясности, обозначения интегралов сокращаются:

$$\int_G \phi = \int_G \phi(x) dx, \quad \int \phi = \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x) dx \quad \text{и т. п.}$$

Обозначения функциональных пространств ниже обычно одни и те же для скалярных и векторнозначных функций. Так,  $C_0^\infty(G)$  — пространство бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем в открытом множестве  $G$ , а пространства суммируемых функций обозначаются через  $L^p(G)$ . Для открытого множества  $G \subseteq \mathbb{R}^d$  пространство Соболева  $\overset{\circ}{W}{}^{1,2}(G)$  получается замыканием  $C_0^\infty(G)$  в норме

$$|\phi|_{1,2} = (|\nabla \phi|_{L^2(G)}^2 + |\phi|_{L^2(G)}^2)^{1/2}$$

(в случае векторнозначных функций  $|u|_{1,2} = (|\nabla \otimes u|_{L^2(G)}^2 + |u|_{L^2(G)}^2)^{1/2}$ ). Пространства соленоидальных функций обозначаются через

$$\mathbf{V}(G) = W^{1,2}\text{-замыкание множества } \{v \in C_0^\infty(G) : \nabla \cdot v = 0\}. \quad (1.3)$$

(Эти обозначения ближе к [1, гл. I], чем к [2].)

**1.2. Локализация главного собственного числа.** В дальнейшем всегда предполагается, что  $M$  имеет достаточно регулярную (например, липшицеву) границу. Объем, занятый «скелетом»  $M$  в ячейке  $z + Q$ ,  $z \in \mathbb{Z}^d$ , характеризуется «меткой» — случайной величиной  $\xi_z$ , принимающей значения 0 и 1:

$$\text{mes}(M \cap (z + Q)) \geq \omega > 0, \quad \text{если } \xi_z = 1. \quad (1.4)$$

Случайные величины  $\xi_z$ ,  $z \in \mathbb{Z}^d$ , предполагаются независимыми и одинаково распределенными; их распределение зависит от положительного параметра  $\nu > 0$ :

$$\mathbf{P}\{\xi_z = 0\} = e^{-\nu}, \quad \mathbf{P}\{\xi_z = 1\} = 1 - e^{-\nu}, \quad \nu > 0. \quad (1.5)$$

Удобно обозначать конфигурацию меток во всем пространстве символом  $\Xi = (\xi_z) = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}^d}$ .

В описанную выше схему укладывается модель пуассоновского «облака твердых сфер» или других регулярных «препятствий» стандартной формы (см. [3]).

Более специальная модель пористой среды, удовлетворяющая условию (1.4), представляет собой рандомизированный вариант модели, принятой в [4] (в приложении, основанном на записках Л. Тартара). Эта модель предполагает, что имеется замкнутое множество с гладкой границей  $W \subset Q^0$  такое, что

$$\omega = \text{mes}(W) > 0, \quad \text{mes}(Q \setminus W) = 1 - \omega > 0,$$

а конфигурация «жесткого скелета»  $M$  в ячейке  $z + Q$ ,  $z \in \mathbb{Z}^d$ , задается формулой

$$(z + Q) \cap M = \begin{cases} z + W, & \xi_z = 1, \\ \emptyset, & \xi_z = 0. \end{cases} \quad (1.6)$$

Ниже *максимальное рэлеевское отношение*  $\mathfrak{S}(G)$  для соленоидальных функций на открытом множестве  $G$  определяется как

$$\mathfrak{S}(G) = \inf \left\{ \sigma : \forall u \in \mathbf{V}(G) \int_G |u(x)|^2 dx \leq \sigma \int_G |\nabla \otimes u(x)|^2 \right\}, \quad (1.7)$$

где пространство  $\mathbf{V}(G)$  определено в (1.3). Влияние переносов и изменений пространственного масштаба на эту характеристику выражается формулой

$$\mathfrak{S}(a + \alpha G) = \alpha^2 \mathfrak{S}(G), \quad a \in \mathbb{R}^d, \alpha > 0. \quad (1.8)$$

Непосредственно из определения следует, что

$$\mathfrak{S}(G') \geq \mathfrak{S}(G''), \quad \text{если } G' \supseteq G''. \quad (1.9)$$

Из (1.8) вытекает, что рэлеевские отношения соленоидальных функций, обращающихся в нуль вне произвольного множества  $G$ , не превосходят величины  $\mathcal{S} \text{mes}^{2/d}(G)$ , где

$$\mathcal{S} = \sup \left\{ \frac{\int_{\mathbb{R}^d} |u(x)|^2 dx}{\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u(x)|^2 dx} : \nabla \cdot u = 0, \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1 \right\}. \quad (1.10)$$

В этом определении верхняя грань берется по множеству функций из  $W_2^1(\mathbb{R}^d)$ , удовлетворяющих указанным дополнительным ограничениям.

**Теорема 1.1.** *Рассмотрим максимальное рэлеевское отношение (1.7) для области  $rQ \setminus M$ . Если выполнены условия (1.4), (1.5), то асимптотика этого отношения описывается формулой*

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left\{ \frac{\mathfrak{S}(rQ \setminus M)}{\left(\frac{d}{\nu} \ln r\right)^{2/d}} > \mathcal{S} + \varepsilon \right\} = 0.$$

Рассуждения, которыми доказывается теорема 1.1, представляют собой модификацию доказательства из [5] для случая соленоидальных функций. Следует, однако, отметить, что локализация нижней границы спектра, которую дает теорема 1.1, значительно грубее, чем в [5] (где рассматривался эллиптический оператор, действующий на векторнозначные функции), и много грубее доверительных интервалов [6, 7] для главного собственного числа оператора Лапласа.

Источником дополнительной погрешности является затруднительность приближения соленоидальной пробной функции на  $rQ \setminus M$  другой пробной функцией, обращающейся в нуль вне «свободного пространства» в  $rQ$  и имеющей почти такие же рэлеевское отношение и объем носителя. Чтобы обойти эту трудность, при доказательстве теоремы 1.1 мы оцениваем  $\mathfrak{S}(rQ \setminus M)$  с помощью аналогичной характеристики для течения со слабой сжимаемостью в упомянутом свободном пространстве. Зазор, разделяющий эти две характеристики для течений с нулевой и малой положительной сжимаемостью, оказывается включенным в окончательную оценку.

Связи между различными вариантами рэлеевского отношения посвящено приложение А.

Нижняя оценка для  $\mathfrak{S}(rQ \setminus M)$  выводится с использованием еще одного варианта рэлеевского отношения:

$$\underline{\mathcal{S}} = \inf \left\{ \sigma > 0 : \forall u \in V_{bd} \int |u|^2 \leq \sigma \int |\nabla \otimes u|^2 \right\}, \quad (1.11)$$

где соленоидальные пробные функции имеют компактный носитель:

$$V_{bd} = \mathbf{V}(\mathbb{R}^d) \cap \{u : \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1, \text{diam}(\text{supp}(u)) < \infty\}. \quad (1.12)$$

Дополнительное ограничение в определении (1.11) исключает пробные функции, у которых носитель имеет бесконечно сужающиеся «щупальца», уходящие на бесконечность. Можно показать, что по крайней мере в плоском случае  $d = 2$  есть совпадение  $\mathcal{S} = \underline{\mathcal{S}}$  (см. лемму А.4 ниже). Вопрос о наличии положительного зазора  $\mathcal{S} - \underline{\mathcal{S}}$  при  $d \geq 3$  не связан со специальными свойствами модели случайной пористой среды.

**Теорема 1.2.** *Для модели пористой среды, удовлетворяющей условиям (1.6), (1.5), максимальное рэлеевское отношение  $\mathfrak{S}(rQ \setminus M)$  подчиняется соотношению*

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left\{ \frac{\mathfrak{S}(rQ \setminus M)}{\left(\frac{d}{\nu} \ln r\right)^{2/d}} < \underline{\mathcal{S}} - \varepsilon \right\} = 0.$$

Вывод нижней границы существенно использует особенности модели пористой среды, описанной в (1.6). Отметим, что для этой модели «область течения»  $rQ \setminus M$  связна при любой конфигурации жесткого скелета  $M$ . Остается открытым вопрос: можно ли модифицировать доказательства данной работы таким образом, чтобы получить возможность анализировать (в более высоких размерностях) модели пористой среды со связным скелетом?

## 2. Свободные кластеры

Цель данного раздела — дать упрощенное описание области  $rQ \setminus M$  отходясь от концентрации «жесткого скелета»  $M$  в кубических подобластях разных размеров. Раздел содержит также доверительные границы для максимального объема «пустот» в скелете — характеристики среды, которая определяет в конечном итоге значение  $\mathfrak{S}(rQ \setminus M)$ .

Оценки для вероятностей, которые используются ниже, взяты (с некоторыми упрощениями) из [1, 7, 8]. Точность этих оценок ниже, чем в цитированных работах.

**2.1. Кластеры, их оболочки и окрестности.** Положение нижней границы спектра определяется по преимуществу размером и формой больших «пустот», т. е. связанных подобластей  $rQ$ , в которых «жесткий скелет» пористой среды  $M$  занимает пренебрежимо малую часть объема. Эти подобласти ниже приближаются объединениями кубов нескольких стандартных размеров, входящих в следующие разбиения пространства:

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}^d} H(z + Q). \tag{2.1}$$

Для описания «пустот» заданной конфигурации  $\Xi = (\xi_z, z \in \mathbb{Z}^d)$  «скелета»  $M$  потребуются некоторые обозначения и терминология.

Размер  $H$  кубических «блоков» в разбиении (2.1) выбирается из последовательности  $(H_k, k = -1, 0, \dots)$ , которая определяется с помощью двух нечетных натуральных параметров  $H_0$  и  $T > 1$ . В самом мелком разбиении размер блока есть  $H_{-1} = 1$ , а в более крупных этот размер выбирается равным  $H_0$  или

$$H_k = H_0 T^k, \quad k = 1, 2, \dots \tag{2.2}$$

Ниже термин *k-блок* или *блок уровня k* относится к множествам

$$C_z^{(k)} = H_k(z + Q).$$

Самые мелкие  $(-1)$ -блоки  $C_z^{(-1)} = z + Q$  называют также *ячейками*. Чтобы указать, что меньший блок является подмножеством блока следующего уровня, используется обозначение

$$z' \prec_k z \iff C_{z'}^{(k-1)} \subset C_z^{(k)}. \tag{2.3}$$

Очевидно, каждый 0-блок является объединением  $H_0^d$  ячеек, а каждый  $k$ -блок — объединение  $T^d$  блоков уровня  $k - 1$ :

$$C_z^{(k)} = \bigcup_{z' \prec_k z} C_{z'}^{(k-1)}. \tag{2.4}$$

Блоки каждого уровня делятся на *свободные* и *занятые* в зависимости от конфигурации «жесткого скелета» пористой среды — свободными оказываются те блоки, где  $M$  занимает меньшую часть объема. Удобно обозначить через  $\mathbb{F}_k$  множество целочисленных векторов, которое нумерует свободные блоки уровня  $k$ :

$$\mathbb{F}_k = \{z \in \mathbb{Z}^d : \text{блок } C_z^{(k)} \text{ свободен}\}. \tag{2.5}$$

Правила классификации будут точно сформулированы ниже. В вычислениях, где все блоки имеют один и тот же размер  $H$ , обозначения обычно сокращаются:

$$C_z = H(z + Q), \quad \mathbb{F} = \{z \in \mathbb{Z}^d : \text{блок } C_z \text{ свободен}\}.$$

Формула  $z_1 \sim z_2$  указывает, что точки  $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}^d$  являются  $j$ -смежными в следующем смысле:

$$z_1 \sim z_2 \iff \max_i |z_1^{(i)} - z_2^{(i)}| \leq 5j. \quad (2.6)$$

Свободный путь длины  $n$ , соединяющий  $z', z'' \in \mathbb{F}$ , — это последовательность  $\mathbf{p} = (z(i), i = 0, \dots, n)$ , состоящая из точек  $z(i) \in \mathbb{F}$ , такая, что  $z(0) = z'$ ,  $z(n) = z''$  и

$$z(l) \sim z(l+1) \quad \text{при } l = 0, \dots, n-1.$$

Множество  $J \subseteq \mathbb{F}$  называют  $j$ -связным, если всякую пару его точек  $z', z'' \in J$  связывает свободный путь конечной длины. Удобно связывать с описанным типом близости расстояние

$$\text{dist}^*(z', z'') = \min\{n : n = \text{длина пути от } z' \text{ до } z''\}, \quad (2.7)$$

полагая  $\text{dist}^*(z', z'') = \infty$ , если  $z'$  и  $z''$  не соединены свободным путем.

Свободным кластером  $F[z]$ , начинающимся из  $z$ , называют максимальное связанное подмножество  $\mathbb{F}$ , которое содержит  $z$ : если  $z \in \mathbb{F}$ , то

$$F[z] = F[z; j, \Xi] = \{z' \in \mathbb{F} : \text{dist}^*(z, z') < \infty\}. \quad (2.8)$$

Ниже считаем  $F[z] = \emptyset$ , если  $z \notin \mathbb{F}$ . Соответствие между точками  $\mathbb{F}$  и кластерами не является однозначным — два кластера  $F[z'], F[z'']$  совпадают, если обе точки  $z', z''$  принадлежат одному кластеру.

Каждый свободный кластер порождает свою оболочку  $\widehat{F}[z]$  — объединение свободных блоков соответствующего размера:

$$\widehat{F}[z] = \widehat{F}[z; j, \Xi] = H(F[z] + Q) = \bigcup_{z \in F[z]} C_z. \quad (2.9)$$

Еще одно «массивное» множество, которое ниже связывается со свободным кластером, — это окрестность кластера  $\widetilde{F}[z]$ , представляющая собой открытое множество

$$\widetilde{F}[z] = \widetilde{F}[z; j, \Xi] = (\widehat{F}[z] + 2jHQ)^0, \quad z \in \mathbb{Z}^d. \quad (2.10)$$

Легко видеть, что множество  $\widehat{F}[z] + 2jHQ$  является объединением блоков  $C_z = H(z + Q)$  размера  $H$ . Цель, которую преследует определение кластеров с использованием путей, составленных из точек решетки  $\mathbb{Z}^d$ , не являющихся непосредственно соседними, а из  $5j$ -смежных точек, — добиться того, чтобы окрестности любых двух различных кластеров были разделены полосой ширины  $jH$ , полностью состоящей из занятых блоков.

**2.2. Свободные блоки и эффективный размер блока.** Рассматриваемые ниже свободные кластеры составлены из блоков уровня 0, имеющих размер  $H_0$  (начальный в последовательности (2.2)). Их построение основано на следующей классификации блоков уровней  $-1$  и  $0$  с использованием нового параметра  $\delta \in (0, 1)$  — он определяет концентрацию «скелета»  $M$  в блоке.

Кубическая ячейка  $z + Q$  свободна, если  $\xi_z = 0$ , и занята, если  $\xi_z = 1$ ; таким образом,  $\mathbb{F}_{-1} = \{z : \xi_z = 0\}$ .

Блок  $C_z^{(0)}$  уровня 0 свободен (в обозначениях  $z \in \mathbb{F}$ ), если

$$z \in \mathbb{F}_0 \iff \frac{\text{card}\{z' : z' \prec z, z' \in \mathbb{F}_{-1}\}}{\text{card}\{z' : z' \prec z\}} > 1 - \delta, \quad (2.11)$$

и занят (в обозначениях  $z \notin \mathbb{F}$ ), если среди его  $H_0^d$  подблоков уровня  $-1$  занятых не менее  $\delta H_0^d$ .

В последующих вычислениях основную роль играет специфическая характеристика конфигурации  $M$  в пределах кубического блока  $C = a + HQ$ , содержащегося в  $rQ$ . Эта характеристика называется ниже *эффективным размером блока* (ЭРБ) и обозначается через  $L(C)$ . Ее определяет формула

$$L^2(C) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{H^2} \sup \left\{ \frac{\int_C |f|^2}{\int_C |\nabla f|^2} : f \in \overset{\circ}{W}^{1,2}(rQ \setminus M), f \neq 0 \right\}. \quad (2.12)$$

Использование ЭРБ основано на неравенстве из следующего утверждения (оно является непосредственным следствием определения (2.12)).

**Предложение 2.1.** *Рассмотрим открытое множество  $A = (\bigcup_{z \in J} C_z^{(k)})^0$ . Если эффективный размер каждого блока, имеющего с  $A$  пересечение положительной меры, допускает оценку*

$$L(C_z^{(k)}) \leq \mathbf{L}_k, \quad z \in J,$$

то для всякой функции  $u \in \overset{\circ}{W}^{1,2}(rQ \setminus M)$  выполняется неравенство

$$\int_A |u|^2 \leq c \mathbf{L}_k^2 H_k^2 \int_A |\nabla u|^2,$$

где константа  $c$  зависит только от размерности  $d$ .

Отметим, что ни определение (2.12), ни приведенное выше предложение не оговаривают каких-либо ограничений на функцию  $f$ , кроме того, что она обращается в нуль на «скелете» пористой среды  $M$ . Впоследствии оценки ЭРБ основываются на следующей форме неравенства Пуанкаре — Фридрикса.

**Предложение 2.2** [8, предложение 3.1]. *Рассмотрим выпуклое открытое множество  $Q^+$ , которое содержит подмножества  $Q^0$  и  $Q^1$  положительной лебеговой меры. Если  $f \in W^{1,2}(Q^+)$  и  $\sqrt[d]{\text{mes}(Q^1)/\text{mes}(Q^0)} \leq \alpha$ , то*

$$\int_{Q^1} f^2(x) dx \leq 2\alpha^d \int_{Q^0} f^2(x) dx + \mathcal{C}(\alpha, d) \rho^2 \int_{Q^+} |\nabla f(x)|^2 dx,$$

где  $\rho = \rho(Q^+)$  — диаметр  $Q^+$ , а константа может быть выбрана равной

$$\mathcal{C}(\alpha, d) = \frac{2}{d-1} [(1+\alpha)^d - 1 - \alpha^d].$$

Это предложение приведено с доказательством также в [7, предложение 2].

Легко видеть, что  $\mathcal{C}(\alpha, d) \leq c\alpha^{d-1}$ , если  $\alpha \geq 1$ . Если  $f$  обращается в нуль на  $Q^0$ , то

$$\int_{Q^+} f^2(x) dx \leq \mathcal{C}(\alpha) \rho^2 \int_{Q^+} |\nabla f(x)|^2 dx. \quad (2.13)$$

Классификация (2.11) позволяет получить нетривиальные оценки для эффективных размеров занятых блоков. Непосредственно из предложения 2.2 следует, что эффективные размеры занятых блоков уровня  $-1$  равномерно ограничены константой, зависящей только от  $d$  и  $\omega$  из (1.4):

$$L(z + Q) \leq C, \quad z \notin \mathbb{F}_{-1}. \quad (2.14)$$

Оценка эффективных размеров занятых блоков уровня 0, которая вытекает из (2.14) и (2.11) с  $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ , имеет вид

$$L^2(C_z^{(0)}) \leq \frac{c}{\delta}, \quad z \notin \mathbb{F}_0. \quad (2.15)$$

Для оценки эффективных размеров более крупных блоков используется неравенство следующего предложения.

**Предложение 2.3** [5, лемма 2.2]. Пусть эффективный размер каждого занятого  $k$ -блока допускает оценку

$$L^2(C_z^{(k)}) \leq \mathbf{L}_k^2, \quad z \notin \mathbb{F}_k,$$

а  $Q^+ = a + H_+Q$  — куб размера  $H_+ > H_k$ . Если

$$\frac{\text{mes}(Q_+ \setminus \bigcup_{z \in \mathbb{F}_k} C_z^{(k)})}{\text{mes}(Q_+)} \geq \delta,$$

то ЭРБ  $Q_+$  удовлетворяет неравенству

$$L^2(C_z^{(K)}) \leq \frac{c'}{\delta} \left( 1 + \frac{H_k^2}{H_+^2} \mathbf{L}_k^2 \right).$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $Q^0$  — объединение всех занятых  $k$ -подблоков более крупного куба  $Q^+$ . Отношение  $\text{mes}(Q^+)/\text{mes}(Q^0)$  не превосходит  $\alpha^d = 1/\delta > 1$ , поэтому из предложения 2.2 следует, что

$$\int_{Q^+} |f|^2 \leq c \left( \frac{1}{\delta} \int_{Q^0} |f|^2 + \frac{H_+^2}{\delta} \int_{Q^+} |\nabla f|^2 \right),$$

где константа  $c > 0$  может зависеть только от размерности  $d$ . По предположению

$$\int_{C_{z'}^{(k)}} |f|^2 \leq \mathbf{L}_k^2 H_k^2 \int_{C_{z'}^{(k)}} |\nabla f|^2$$

для каждого занятого подблока  $C_{z'}^{(k)} \subset Q^0$ . Поэтому

$$\frac{1}{H_+^2} \int_{Q^+} |f|^2 \leq \frac{c'}{\delta H_+^2} \left( \mathbf{L}_k^2 H_k^2 \int_{Q^+} |\nabla f|^2 + H_+^2 \int_{Q^+} |\nabla f|^2 \right),$$

что и приводит к требуемому неравенству. Стоит отметить, что получающееся при этом значение константы  $c'$  не зависит от  $k$  или  $\delta$ .  $\square$

**2.3. Вероятный размер свободного кластера.** В вычислениях, связанных со свободными кластерами, удобно выбрать в качестве основного параметра нечетное натуральное число  $T$ , а затем малый положительный показатель  $\gamma \in (0, \frac{1}{d+1})$  и определить остальные параметры формулами

$$j = m \sim T^{2\gamma}, \quad H_0 = T, \quad \alpha = \delta = \kappa = T^{-\gamma}, \quad K^* = T. \quad (2.16)$$

Впоследствии параметр  $T$  будет, как правило, большим.

В ситуации, рассматриваемой в данной статье, вероятность того, что ячейка  $z + Q$  свободна, равна  $p = e^{-\nu}$  (см. (1.5)).



Блок следующего уровня  $C_z^{(0)}$  свободен в смысле (2.11), если среди его  $H_0^d$  ячеек не менее  $H_0^d(1 - \delta)$  свободных. Вероятность того, что данный 0-блок свободен, допускает оценку

$$\mathbf{P}\{C_z^{(0)} \text{ свободен}\} \leq \exp\left\{-\left(1 - c\frac{\ln T}{T^\gamma}\right)\nu \text{mes}(C_z^{(0)})\right\} \quad (2.17)$$

(стоит напомнить, что параметры в этой формуле определены соотношениями (2.16)).

Рассуждение, которое приводит к оценке (2.17), элементарно. Блок  $C_z^{(0)}$  свободен, если

$$\sum_{z' \prec_{-1} z} \xi_{z'} < \delta H_0^d.$$

Число свободных ячеек в левой части неравенства распределено так же, как число успехов в серии из  $N = H_0^d = T^d$  независимых испытаний с вероятностью успеха  $p$ . Легко видеть [8], что

$$\mathbf{P}\{\nu_N \geq M\} \leq N^{N-M} p^M = \exp\{(N - M) \ln N - M \ln(1/p)\},$$

поэтому для  $M \geq (1 - \delta)N = (1 - \frac{1}{T^\gamma})T^d$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\{C_z^{(0)} \text{ свободен}\} &= \mathbf{P}\{\nu_N \geq M\} \\ &\leq \exp\{\delta H_0^d \ln H_0^d - (1 - \delta)H_0^d \ln(1/p)\} = \exp\left\{-\left(1 - \frac{1 + d \ln T}{T^\gamma}\right)\nu T^d\right\}. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Чтобы оценить вероятный размер свободного кластера, нужна оценка для числа различных форм  $j$ -связного подмножества  $\mathbb{Z}^d$  с заданным числом элементов. Используемая ниже оценка такого рода заимствована из теории просачивания (см. [9], а также [5, 7]). Доказательства следующих двух предложений можно найти в [5].

Обозначим семейство  $j$ -связных подмножеств решетки  $\mathbb{Z}^d$ , содержащих  $z$ , символом

$$\mathcal{P}(z; j) \stackrel{\text{def}}{=} \{I \subset \mathbb{Z}^d : I \ni z, \forall z' \in I \text{ dist}^*(z, z') < \infty\}.$$

**Предложение 2.4.** Число  $j$ -связных множеств из  $n$  точек, которые включают точку  $z$ , допускает оценку

$$\text{card}(\{I \in \mathcal{P}(z; j) : \text{card}(I) = n\}) \leq K^n,$$

где  $K = \exp\{cj^d\}$ , а константа  $c > 0$  не зависит от  $j$  и  $n$ .

**Предложение 2.5.** Если вероятность  $p = \mathbf{P}\{z \in \mathbf{A}\}$  и константа в предложении 2.4 удовлетворяют неравенству  $Kp < 1$ , то для всякого конечного множества  $U \subset \mathbb{Z}^d$  распределение размера наибольшего кластера, начинающегося в некоторой точке этого множества, удовлетворяет неравенству

$$\mathbf{P}\{\max_{z \in U} \text{card}(F[z]) \geq n\} \leq \text{card}(U) \frac{(Kp)^n}{1 - Kp}.$$

Каков бы ни был выбор  $T$ , число точек  $Tz \in rQ$ , которые могут послужить началом свободного кластера, не превосходит  $\exp\{\ln \text{mes}(rQ) - d \ln T\}$ . С помощью этой оценки можно заключить, что в ситуации, анализируемой в данной статье, приведенные выше предложения доставляют следующую оценку наибольшего объема оболочки свободного кластера, составленного из блоков

размера  $H_0$  и имеющего общие точки с  $rQ$ : существуют константы  $c, c' > 0$ , такие, что для всякого  $u > 0$

$$\mathbf{P} \left\{ \max_{z \in \mathbb{F}_0} \text{mes } \widehat{F}[z] \geq \frac{\frac{d}{\nu} \ln r + \frac{1}{\nu} u}{1 - c(\delta \ln T + j^d / (\nu H_0^d))} \right\} \leq c' \exp\{-u\}. \quad (2.19)$$

(См. детали доказательства в [5, предложение 3.1] или [7].) Когда  $T$  велико, а остальные параметры, использованные при построении кластеров, выбираются в соответствии с (2.16), приведенное выше неравенство показывает, что для каждого  $\varepsilon > 0$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left\{ \max_{z \in \mathbb{F}_0} \text{mes } \widehat{F}[z] \geq \frac{d}{\nu} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \ln r \right\} = 0. \quad (2.20)$$

### 3. Верхняя оценка рэлеевского отношения

Доказательства теорем 1.1 и 1.2 существенно используют оценки эффективных размеров занятых блоков и оценки максимального объема оболочки свободного кластера, приведенные в разд. 2. Эти оценки преобразуются в доверительные границы для максимального рэлеевского отношения  $\mathfrak{S}(rQ \setminus M)$  с помощью развитой ниже техники срезов.

Метод этого раздела является адаптацией метода из [5, 7, 8] к соленоидальным полям.

**3.1. Разделение свободных кластеров.** Предложения 2.3 и 2.1 делают возможным оценить максимальное рэлеевское отношение для соленоидальных функций из  $\mathring{W}^{2,1}(rQ^0 \setminus M)$ , применяя индивидуальные характеристики оболочек свободных кластеров. Вычисления используют приближение соленоидальных векторных полей течениями слабо сжимаемых жидкостей, а также еще один вариант максимального рэлеевского отношения для функций  $u \in \mathring{W}^{2,1}(G)$ , а именно

$$\mathfrak{S}^\alpha(G) = \sup_{u \neq 0} \frac{|u|_{L^2(G)}^2}{|\nabla \otimes u|_{L^2(G)}^2 + \frac{1}{\alpha} |\nabla \cdot u|_{L^2(G)}^2}, \quad \alpha > 0.$$

Оно используется в оценке

$$\int_G |u|^2 \leq \mathfrak{S}^\alpha(G) \int_G \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right), \quad u \in \mathring{W}_1^2(G). \quad (3.1)$$

Свободные кластеры ниже строятся на основе разбиения  $\mathbb{R}^d$  на 0-блоки размера  $H = H_0$  с помощью классификации (2.11). Впоследствии параметры  $\delta \in (0, \frac{1}{2})$  и  $H_0, T, j \in \mathbb{N}$  выбираются, как в (2.16), но пока удобно не накладывать этих дополнительных ограничений. Следующая лемма представляет собой модификацию леммы 4.1 из [5] (см. также [7, лемма 3.1]).

**Лемма 3.1.** Пусть эффективный размер каждого занятого 0-блока подчинен условию (2.15). Существуют положительные константы  $C_1, C_2$  такие, что максимальное рэлеевское отношение (1.7) удовлетворяет неравенству

$$\mathfrak{S}(rQ \setminus M) \leq \left( 1 + C_1 \max \left\{ \kappa, \frac{1}{\delta \kappa j^2}, \frac{1}{\alpha \delta \kappa j^2} \right\} \right) \max_z \left\{ \mathfrak{S}^\alpha(\tilde{F}[z] \setminus M), \frac{C_2 H_0^2}{\delta} \right\},$$

где  $\alpha, \kappa \in (0, 1)$  — положительные параметры,  $j$  — нечетное натуральное число из (2.6), а число  $\mathfrak{S}^\alpha$  определено в (3.1).

Лемма 3.1 представляет собой частный случай следующей леммы.

**Лемма 3.2.** Рассмотрим множества

$$\Phi = \bigcup_{z \in F} C_z^{(k)}, \quad \Psi = \bigcup_{z \in G} C_z^{(k)}, \quad F \subset G \subset \mathbb{Z}^d,$$

такие, что

$$\Psi \supseteq \{x : \text{dist}(x, \Phi) < jH_k\}.$$

Если для каждого  $k$ -блока  $C_z^{(k)} \subset \Psi \setminus \Phi$  ЭРБ удовлетворяет неравенству

$$L(C_z^{(k)}) \leq \mathbf{L},$$

то для всякой функции  $u \in \mathring{W}^{1,2}(rQ \setminus M)$  и пары чисел  $\alpha, \kappa$  такой, что  $0 < \alpha, \kappa < 1$ , справедливо неравенство

$$\begin{aligned} \int |u|^2 \leq & \left( 1 + C_1 \max \left\{ \kappa, \frac{\mathbf{L}^2}{\alpha \kappa j^2} \right\} \right) \\ & \times \max \{ \mathfrak{S}^\alpha(\Psi \setminus M), C_2 \mathbf{L}^2 H_k^2 \} \int \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right), \end{aligned}$$

где  $C_1, C_2$  — положительные константы, не зависящие от формы  $\Phi$  и  $\Psi$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Множество  $\Psi$  содержит  $jH_k$ -окрестность  $\Phi$ , поэтому легко видеть, что существует гладкая функция  $\zeta : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$  такая, что

$$\zeta(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Phi, \\ 0, & x \notin \Psi, \end{cases} \quad |\nabla \zeta(x)| \leq \frac{c}{jH_k}, \quad (3.2)$$

и константа  $c$  в оценке градиента не зависит от формы  $\Phi$  и  $\Psi$ . Производные этой функции обращаются в нуль вне  $\Psi \setminus \Phi$ .

Рассмотрим произвольную функцию  $u \in \mathring{W}^{1,2}(rQ \setminus M)$ . Ее можно представить в виде

$$u = \zeta u + (1 - \zeta)u. \quad (3.3)$$

Градиент  $\zeta u$  имеет вид  $\nabla \otimes (\zeta u) = \zeta \nabla \otimes u + \nabla \zeta \otimes u$ . Он отличается от  $\nabla \otimes u$  только на тех блоках, у которых ЭРБ ограничен величиной  $\mathbf{L}$ . Можно воспользоваться неравенством Коши, чтобы получить следующую оценку для его  $L^2(\Psi)$  нормы: для любого  $\kappa \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} \int_{\Psi} |\nabla \otimes (\zeta u)|^2 & \leq \int_{\Psi} (|\nabla \otimes u| + |\nabla \zeta \cdot u|)^2 \\ & \leq (1 + \kappa) \int_{\Psi} |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1 + \kappa}{\kappa} \frac{c}{j^2 H^2} \int_{\Psi \setminus \Phi} |u|^2 \leq (1 + \kappa) \left( 1 + \frac{c' \mathbf{L}^2}{\kappa j^2} \right) \int_{\Psi} |\nabla \otimes u|^2. \end{aligned}$$

Дивергенция  $\nabla \cdot \zeta u = \zeta \cdot \nabla u + \nabla \zeta \cdot u$  отличается от дивергенции  $u$  относительно малым членом  $\nabla \zeta \cdot u$ , обращающимся в нуль вне множества  $\{\nabla \zeta \neq 0\}$ . Неравенство Коши и предложение 2.1 доставляют оценку

$$\begin{aligned} \int_{\Psi} (\nabla \cdot (\zeta u))^2 & = (1 + \kappa) \int_{\Psi} \zeta^2 (\nabla \cdot u)^2 + \frac{1 + \kappa}{\kappa} \int_{\Psi \setminus \Phi} (\nabla \zeta \cdot u)^2 \\ & \leq (1 + \kappa) \left( \int_{\Psi} (\nabla \cdot u)^2 + \frac{c \mathbf{L}^2}{\kappa j^2} \int_{\Psi \setminus \Phi} |\nabla \otimes u|^2 \right). \end{aligned}$$

Это позволяет оценить  $L^2$ -норму  $\zeta u$  с помощью приближения  $\mathfrak{S}^\alpha$  к максимальному рэлеевскому отношению для соленоидальных полей, полученного допущением слабой сжимаемости. Используя (3.1), имеем

$$\begin{aligned} \int_{\Psi} |\zeta u|^2 &\leq \mathfrak{S}^\alpha(\Psi \setminus M) \int_{\Psi} \left( |\nabla \otimes (\zeta u)|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot (\zeta u))^2 \right) \\ &\leq (1 + \kappa) \left( 1 + \left( 1 + \frac{1}{\alpha} \right) \frac{c\mathbf{L}^2}{\kappa j^2} \right) \mathfrak{S}^\alpha(\Psi \setminus M) \int_{\Psi} \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right). \end{aligned}$$

Стоит отметить, что по построению множества  $\Phi$ ,  $\Psi$  и  $\Psi \setminus \Phi$  представляют собой объединения непересекающихся блоков разбиения (2.1) с размером блока  $H = H_k$ .

Множество, где  $1 - \zeta$  не обращается в нуль, покрывается блоками с ограниченным ЭРБ, поэтому

$$\int_{rQ \setminus \Phi} |(1 - \zeta)u|^2 \leq \int_{rQ \setminus \Phi} |u|^2 \leq c\mathbf{L}^2 H_k^2 \int_{rQ \setminus \Phi} |\nabla \otimes u|^2.$$

Наконец, неравенство Коши, разложение (3.3) и указанные выше оценки приводят к неравенству

$$\begin{aligned} \int |u|^2 &\leq (1 + \kappa) \int |\zeta u|^2 + \frac{1 + \kappa}{\kappa} \int |(1 - \zeta)u|^2 \leq \left( 1 + C_1 \max \left\{ \kappa, \frac{\mathbf{L}^2}{\kappa j^2}, \frac{\mathbf{L}^2}{\alpha \kappa j^2} \right\} \right) \\ &\quad \times \max \{ \mathfrak{S}^\alpha(\Psi \setminus M), C_2 \mathbf{L}^2 H_k^2 \} \int \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right). \quad \square \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 3.1. В условиях леммы можно применить оценку леммы 3.2 к множествам

$$\Phi = \bigcup_{z \in \mathbb{F} \cap \frac{r}{H} Q} \widehat{F}[z], \quad \Psi = \bigcup_{z \in \mathbb{F} \cap \frac{r}{H} Q} \widetilde{F}[z],$$

где  $\Phi$  — объединение оболочек всех кластеров, содержащих точки  $rQ$ , а  $\Psi$  — соответствующее объединение окрестностей кластеров. Окрестности  $\widetilde{F}[z]$  различных кластеров разделяет расстояние не менее  $jH$ . Вследствие этого для функции из  $\mathring{W}^{1,2}(\Psi \setminus M)$  имеем

$$\begin{aligned} \int_{\Psi \setminus M} |u|^2 &= \sum_{z \in \frac{r}{H_0} Q \cap \mathbb{F}} \frac{1}{\text{card}(F[z])} \int_{\widetilde{F}[z]} |u|^2 \leq \max_z \mathfrak{S}^\alpha(\widetilde{F}[z] \setminus M) \\ &\quad \times \sum_{z \in \frac{r}{H_0} Q \cap \mathbb{F}} \frac{1}{\text{card}(F[z])} \int_{\widetilde{F}[z]} \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right) \\ &= \max_z \mathfrak{S}^\alpha(\widetilde{F}[z] \setminus M) \int_{\Psi \setminus M} \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right), \end{aligned}$$

и потому  $\mathfrak{S}^\alpha(\Psi) \leq \max_z \mathfrak{S}^\alpha(\widetilde{F}[z] \setminus M)$ .  $\square$

**3.2. «Выравнивание» свободного кластера.** Последующие вычисления имеют дело с отдельным свободным кластером  $F[z]$ , построенным с использованием соглашений предшествующего подраздела из блоков размера  $H = H_0$ . Обозначения ниже сокращены следующим образом:

$$F = F[z, \delta, j, \Xi], \quad \widehat{F} = \widehat{F}[z, \delta, j, \Xi], \quad \widetilde{F} = \widetilde{F}[z, \delta, j, \Xi].$$

Целью вычислений является получение для максимального рэлеевского отношения  $\mathfrak{S}^\alpha(\widetilde{F} \setminus M)$  (см. (3.1)) оценки через лебегову меру оболочки кластера  $\widehat{F}$  и величины  $\mathcal{S}_\alpha$ , определенной в (1.11). Форма кластера может быть сложной, и объем его окрестности может существенно превосходить объем оболочки кластера, которую она окружает. Процедура, используемая для исключения лишнего объема, заимствована из [5]. Ее цель — заменить  $\widehat{F}$  множеством более простой формы без заметного увеличения лебеговой меры и существенного изменения максимального рэлеевского отношения.

Пробные функции, используемые в определении максимального рэлеевского отношения, обращаются в нуль вне окрестности кластера  $\widetilde{F}$ . Поэтому строение  $M$  вне этого множества несущественно. При анализе единичного кластера  $F$  принимается соглашение о том, что заняты все блоки размера  $H$  из разбиения (2.1), которые не входят в окрестность кластера  $\widetilde{F}$ . Таким образом, оценка (2.15) применима ко всем блокам, лежащим вне  $\widehat{F}$ :

$$L^2(C_z^{(k)}) \leq \frac{C}{\delta}, \quad \text{если } C_z^{(k)} \not\subseteq \widehat{F}, \quad k \geq 0. \quad (3.4)$$

Кроме блоков основного размера  $H = H_0$ , составляющих оболочку свободного кластера  $\widehat{F}$ , его окрестность  $\widetilde{F}$  и их дополнения в  $\mathbb{R}^d$ , в выкладках участвуют разбиения пространства (2.1) на большие блоки  $C_z^{(k)} = H_k(z + Q)$ ,  $1 \leq k \leq K^*$ , других размеров, определенных в (2.2).

Уровень  $K^*$ , определяющий наибольший размер рассматриваемых ниже блоков, является еще одним параметром, выбор которого будет сделан позже. Классификация новых крупных блоков вводится следующим образом:  $k$ -блок  $C_z^{(k)}$ ,  $k \geq 1$ , *свободен*, т. е.  $z \in \mathbb{F}_k$ , если большую часть его объема покрывает оболочка кластера  $\widehat{F}$ :

$$z \in \mathbb{F}_k \iff \text{mes}(C_z^{(k)} \setminus \widehat{F}) \leq \delta \text{mes}(C_z^{(k)}). \quad (3.5)$$

Все *занятые* (т. е. несвободные) блоки имеют ограниченный ЭРБ: по соглашению (3.4) и предложению 2.3 их эффективный размер допускает оценку

$$L(C_z^{(k)}) \leq \frac{c}{\delta}, \quad \text{если } z \notin \mathbb{F}_k, \quad k \geq 0. \quad (3.6)$$

Ниже предполагается, что имеется некоторое количество свободных блоков высшего уровня  $K^*$ :

$$\mathbb{F}_{K^*} = \{z \in \mathbb{Z}^d : \text{mes}(C_z^{(k)} \setminus \widehat{F}) \leq \delta \text{mes}(C_z^{(k)})\} \neq \emptyset. \quad (3.7)$$

Часть пространства, которую покрывают свободные  $K^*$ -блоки, обозначается через

$$\Phi_{K^*} = \bigcup_{z \in \mathbb{I}_{K^*}} C_z^{(K^*)}, \quad \mathbb{I}_{K^*} = \mathbb{F}_{K^*}. \quad (3.8)$$

Большую часть этого множества покрывают свободные блоки основного размера  $H_0$ : по (3.5)

$$|\Phi_{K^*}| \leq \frac{1}{1-\delta} |\Phi_{K^*} \cap \widehat{F}|. \quad (3.9)$$

Не имеющие общих точек множества

$$\Phi_k = \bigcup_{z \in \mathbb{I}_k} C_z^{(k)} \quad (3.10)$$

составляем из свободных блоков низших уровней последовательно, переходя от уровня  $k+1$  к следующему уровню  $k \geq 0$ . После того как множества  $\Phi_{K^*}, \dots, \Phi_{k+1}$  найдены, множество  $\Phi_k$  определяется как объединение свободных  $k$ -блоков, лежащих вне множеств  $\Phi_{k'}, k' > k$ . Именно, «номера»  $z$  этих блоков принадлежат множеству

$$\mathbb{I}_k = \mathbb{F}_k \cap \left\{ z \in \mathbb{Z}^d : C_z^{(k)} \subseteq \mathbb{R}^d \setminus \bigcup_{k'=k+1}^{K^*} \Phi_{k'} \right\}. \quad (3.11)$$

**Лемма 3.3.** (а) Если выполнено условие (3.7) и  $K_* \leq K^*$  — некоторое целое число, то существует целое число  $k$  такое, что  $K_* \leq k \leq K^*$  и

$$\text{mes}(\Phi_k) \leq \frac{1}{K^* - K_* + 1} \cdot \frac{\text{mes}(\widehat{F})}{1-\delta}. \quad (3.12)$$

(б) Пусть  $m$  — натуральное число. Если  $k$  таково, что выполнено неравенство (3.12), то лебегова мера множества

$$\Psi_+ = \left( \bigcup_{k'=k}^{K^*} \Phi_{k'} + 2mH_k \right)^0 = \left\{ x : \text{dist}_+ \left( \bigcup_{k'=k}^{K^*} \Phi_{k'} \right) < mH_k \right\}$$

допускает оценку

$$\text{mes}(\Psi_+) \leq \left( 1 + c_1 \left( \frac{m}{T} + \frac{m^d}{K^* - K_* + 1} \right) \right) \frac{\text{mes}(\widehat{F})}{1-\delta},$$

где  $c_1$  — положительная константа, не зависящая от  $\delta, k, T$ .

Представляется уместным предпослать доказательству леммы 3.3 оценку для максимального рэлеевского отношения  $\mathfrak{S}^\alpha(\widehat{F} \setminus M)$ , которую она позволяет получить.

**Лемма 3.4.** Если  $K^* \geq 1$  и  $\alpha, \delta, \kappa \in (0, 1)$  достаточно малы, то

$$\mathfrak{S}^\alpha(\widehat{F} \setminus M) \leq \left( 1 + C_1 \max \left\{ \kappa, \frac{1}{\alpha \delta \kappa j^2}, \delta, \frac{m}{T}, \frac{m^d}{K^*} \right\} \right) \max \left\{ \mathcal{C}_\alpha \{ \text{mes}(\widehat{F}) \}, \frac{C_2 H_{K^*}^2}{\delta} \right\}.$$

**Доказательство леммы 3.4.** Если рассматриваемая оболочка кластера  $\widehat{F}$  не порождает свободных блоков уровня  $K^*$ , то оценка леммы очевидным образом вытекает из (3.6).

Предположим теперь, что имеются свободные блоки уровня  $K^*$ . В этом случае лемма 3.3 с  $K_* \geq 1$  показывает, что для некоторого  $k \leq K^*$  оболочку кластера  $\widehat{F}$  практически полностью покрывает множество

$$\Phi_+ = \bigcup_{k'=k}^{K^*} \Phi_{k'}.$$

Множество  $\Phi_+$  является объединением блоков того же размера  $H_k$ . Все  $k$ -блоки, принадлежащие дополнению  $\Phi_+$ , заняты и потому имеют ограниченный ЭРБ. Кроме того, лебегова мера  $mH_k$ -окрестности  $\Psi_+$  сравнима с мерой  $\widehat{F}$ . В этой ситуации можно воспользоваться леммой 3.2 с  $H = H_k$ , чтобы заключить, что

$$\mathfrak{S}^\alpha(\widetilde{F}[z] \setminus M) \leq \left(1 + C_1 \max\left\{\kappa, \frac{\mathbf{L}^2}{\alpha \kappa m^2}\right\}\right) \max\{\mathfrak{S}^\alpha(\Psi_+ \setminus M), C_2 \mathbf{L}^2 H_k^2\}.$$

По построению  $H_k \leq H_{K^*}$ . Определение А.1 позволяет оценить максимальное рэлеевское отношение в правой части через объем  $\Psi_+$ . Из леммы 3.3 с  $K_* = 1$  следует, что

$$\mathfrak{S}^\alpha(\Psi \setminus M) \leq \mathcal{S}_\alpha \text{mes}(\Psi_+) \leq \mathcal{S}_\alpha \left(1 + c_1 \left(\frac{m}{T} + \frac{m^d}{K^*}\right)\right) \frac{\text{mes}(\widehat{F}[z])}{1 - \delta}.$$

Результатом является неравенство леммы.  $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 3.1. Неравенство леммы 3.4 используется ниже в ситуации, где  $\alpha, \delta, \kappa$  малы,  $j, m$  велики, а наибольшая лебегова мера оболочки свободно-го кластера много больше, чем  $H_{K^*}^d$ . При выборе параметров в определении кластера в соответствии с (2.16) неравенство леммы 3.4 принимает вид

$$\mathfrak{S}(rQ \setminus M) \leq \left(1 + \frac{C_1}{T^\gamma}\right) \mathcal{C}_{T^{-\gamma}} \max_z \text{mes}(\widehat{F}[z]), \quad (3.13)$$

если  $\max_z \text{mes}(\widehat{F}[z]) \geq C_2 T^{T+1}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 3.3. (а) По построению множества  $\Phi_k$ ,  $k = 0, \dots, K^*$ , в (3.11) не имеют общих точек. Они покрывают всю оболочку кластера  $\widehat{F}$ , и процедура выбора (3.11) гарантирует, что для любого  $k \geq 1$

$$\sum_{k'=k}^{K^*} \text{mes}(\Phi_{k'}) = \text{mes}\left(\bigcup_{k'=k}^{K^*} \Phi_{k'}\right) \leq \frac{\text{mes}\left(\widehat{F} \cap \bigcup_{k'=k}^{K^*} \Phi_{k'}\right)}{1 - \delta} \leq \frac{\text{mes}(\widehat{F})}{1 - \delta}. \quad (3.14)$$

Первое неравенство леммы немедленно следует из этой оценки.

(б) Чтобы доказать второе неравенство, нужно заметить, что множество  $\Phi_+$  включает блоки уровней  $k' \geq k$ , которые составляют  $\Phi_k, \dots, \Phi_{K^*}$ , а также некоторые  $k$ -блоки из  $mH_k$ -окрестностей этих множеств (определенных с помощью расстояния  $\text{dist}_+$ ). На каждом уровне число блоков, составляющих  $\Phi_k$ , не превосходит  $\text{mes}(\Phi_k)/H_k^d$ .

Для каждого блока  $C_z^{(l)}$  уровня  $l > k$  его  $mH_k$ -окрестность является кубом размера  $H_l + 2mH_k$ , поэтому ее мера допускает оценку

$$\text{mes}(C_z^{(l)} + 2mkH_k) \leq \left(1 + c' \frac{mH_k}{H_l}\right) \text{mes}(C_z^{(l)}).$$

Следовательно, общий объем  $mH_k$ -окрестности объединения крупных блоков в  $\Phi_+$  допускает оценку

$$\begin{aligned} \text{mes}\left\{x : \text{dist}\left(x, \bigcup_{l=k+1}^{K^*} \Phi_l\right) < mH_k\right\} \\ \leq \left(1 + \frac{c'm}{T}\right) \text{mes}\left(\bigcup_{l=k+1}^{K^*} \Phi_l\right) \leq \left(1 + \frac{c'm}{T}\right) \frac{\text{mes}(\widehat{F})}{1 - \delta}. \end{aligned}$$

На низшем уровне  $k$  каждый  $k$ -блок  $C_z^{(k)} \subset \Phi_k$  имеет не более  $(2m+1)^d - 1$  соседей  $H_k(z_* + Q)$  таких, что  $|x - z_*|_+ \leq m$ ; их общий объем составляет

$$((2m+1)^d - 1) \text{mes } C_z^{(k)}.$$

По этой причине общий объем  $k$ -блоков, включенных в  $\Psi_+$ , из-за их близости к  $k$ -блокам из  $\Phi_k$  оценивается следующим образом:

$$\text{mes}\{x : \text{dist}(x, \Phi_k) < mH_k\} \leq (2m+1)^d \text{mes}(\Phi_k) \leq \frac{c''m^d}{K^* - K_* + 1} \frac{\text{mes}(\widehat{F})}{1 - \delta}.$$

Оценка леммы представляет собой соединение двух приведенных неравенств.  $\square$

**3.3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.1.** Прделанные вычисления позволяют доказать теорему 1.1. В большей части промежуточных выкладок можно указать и грубые оценки погрешности, вызванной использованием срезов для того, чтобы локализовать пробную функцию на требуемом множестве. Однако использование в качестве приближения к  $\mathcal{S}$  аналога этой характеристики для течений слабосжимаемых жидкостей  $\mathcal{S}_\alpha$  не позволяет включить такого рода уточнения в окончательный результат.

По (3.13)

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}(rQ \setminus M) &\leq \left(1 + \frac{C_1}{T^\gamma}\right) \mathcal{C}_{T^{-\gamma}} \max_z \text{mes}(\widehat{F}[z]) \\ &= \left(1 + \frac{C_1}{T^\gamma}\right) (\mathcal{S} + (\mathcal{C}_{T^{-\gamma}} - \mathcal{S})) \max_z \text{mes}(\widehat{F}[z]), \end{aligned}$$

поэтому за счет увеличения  $T$  можно подавить разницу между  $\mathcal{S}$  и  $\mathcal{C}_{T^{-\gamma}}$  (см. лемму А.1) и заключить, что

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left\{ \frac{\mathfrak{S}(rQ \setminus M)}{(\ln r)^{2/d}} > \frac{d}{\nu} \mathcal{S} + \varepsilon \right\} = 0. \quad \square$$

#### 4. Нижняя граница для рэлеевского отношения

**4.1. «Оптимальные» пустоты.** Конечная цель последующих вычислений — показать, что типичная конфигурация «скелета» пористой среды  $M$  включает большие пустоты, которые могут служить носителями функций с рэлеевскими отношениями, произвольно близкими к  $\underline{\mathcal{L}}(\frac{d}{\nu} \ln r)^{2/d}$ . Рассматриваемые ниже пустоты строим, отправляясь от конечных множеств  $I, J \subset \mathbb{Z}^d$  в форме объединений занятых и свободных «ячеек»  $E_I \cup D_J$ , где в обозначениях (1.6)

$$E_I = \bigcup_{z \in I} (z + Q), \quad D_J = \bigcup_{z \in J} (z + (Q \setminus W)). \quad (4.1)$$

Стоит отметить, что на этой начальной стадии построения рассматриваемые множества не случайны.

**Лемма 4.1.** Для каждого  $\varepsilon > 0$  и  $\rho \geq \rho(\varepsilon) > 0$  можно указать конечные множества  $I, J \subset \mathbb{Z}^d$  такие, что

$$\frac{\text{mes}(E_J)}{\rho^d} < 1 + \phi(\varepsilon), \quad \mathfrak{S}(E_I \cup D_J) > (\underline{\mathcal{L}} - \phi(\varepsilon))\rho^2$$

и

$$E_I \cup D_J \subseteq K\rho Q,$$



где  $K = K(\varepsilon)$  не зависит от  $\rho$  и  $\lim_{\varepsilon \searrow 0} \phi(\varepsilon) = 0$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем соленоидальную функцию с ограниченным носителем  $u \in V_{bd}$  так, что

$$\int |u|^2 > \underline{\mathcal{L}}(1 - \varepsilon^2)\rho^2 \int |\nabla \otimes u|^2, \quad \text{mes}\{u \neq 0\} = \rho^d, \quad \{u \neq 0\} \subseteq K_u \rho.$$

Возможность выбора очевидна ввиду определения (1.11) и (A.3).

Зафиксируем нечетное целое число  $T$  и выберем  $H_0 = H_0(T)$ ,  $\delta = \delta(T)$ ,  $j = j(T)$  и т. д., как в (2.16). Заметим, что выбор  $T$  пока не зависит от  $\varepsilon$ . Ниже для фиксированного  $\varepsilon$  параметр  $T$  будет выбираться достаточно большим,  $T > t_\varepsilon$ .

Параметр  $\delta$  используется для того, чтобы классифицировать единичные кубические блоки  $C_z^{(-1)} = z + Q$  как свободные ( $z \in \mathbb{F}_{-1}$ ) или занятые ( $z \notin \mathbb{F}_{-1}$ ) в зависимости от объема их пересечений с множеством  $\{u \neq 0\}$ :

$$z \in \mathbb{F}_{-1} \iff \text{mes}(\{u \neq 0\} \cap (z + Q)) \geq 1 - \delta.$$

Более крупные блоки  $C_z^{(k)}$  определяются, как в (2.2)–(2.4). Блок уровня 0 и размера  $H_0$  свободен, если

$$\frac{\text{mes}(C_z^{(0)} \cap (\mathbb{F}_{-1} + Q))}{\text{mes}(C_z^{(0)})} \geq 1 - \delta.$$

Легко видеть, что множество  $\{u \neq 0\}$  порождает один или несколько свободных кластеров  $F[z]$ , состоящих из блоков размера  $H_0$ . Общий объем оболочек этих кластеров допускает оценку

$$\text{mes}(\mathbb{F}_{-1} + Q) = \sum \text{mes} \hat{F}[z] \leq \frac{1}{1 - \delta},$$

а их окрестности содержатся в кубе  $K_u(\rho + cT^T)Q$ , который покрывает, в свою очередь, куб  $(2K_u\rho)Q$ , если  $\rho > cT^T$ .

Используя леммы 3.1, 3.4 и формулы преобразования  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{S}^\alpha$  при изменении масштаба, можно заключить, что

$$\frac{\int |u|^2}{\int |\nabla \otimes u|^2} \leq \mathfrak{S}(\{u \neq 0\}) \leq (1 + cT^{-\gamma})\mathcal{E}_\alpha^{(2K_u)}(\max_z \text{mes} \hat{F}[z])^{2/d},$$

где  $\mathcal{E}_\alpha^{(2K_u)}$  определено так же, как в (A.8). Поскольку  $\lim_{\alpha \searrow 0} \mathcal{E}_\alpha^{(2K_u)} = \mathcal{S}^{(2K_u)} \leq \underline{\mathcal{L}}$  (см. замечание A.1), выбор  $u$  гарантирует, что при достаточно большом  $T$ ,  $T \geq t_\varepsilon$  (и, следовательно, при достаточно малых  $\alpha = \alpha(T)$  и  $\delta = \delta(T)$ ), выполняется соотношение

$$\max_z \text{mes} \hat{F}[z] \geq \left( \frac{(1 - \varepsilon^2)\underline{\mathcal{L}}\rho^2}{(1 + cT^{-\gamma})\mathcal{E}_\alpha^{(2K_u)}} \right)^{d/2} \geq (1 - 2\varepsilon^2)^{d/2} \rho^d.$$

Таким образом, объем, покрытый всеми свободными 0-блоками  $H_0(z + Q)$ , составляет по меньшей мере  $(1 - 2\varepsilon^2)^{d/2} \rho^d$ . Кроме того, по выбору свободных блоков размеров  $H_{-1} = 1$  и  $H_0$  можно заключить, что

$$\text{mes}((\mathbb{F}_{-1} + Q) \cap \{u \neq 0\}) \geq (1 - \delta)^2 \sum \text{mes}(\hat{F}[z]) \geq (1 - 3\varepsilon^2)^{d/2} \rho^d.$$

Следовательно, бóльшую часть носителя  $u$  покрывают свободные блоки уровня  $-1$ :

$$\text{mes}(\{u \neq 0\} \setminus ((\mathbb{F}_{-1} + Q))) \leq \rho^d - (1 - 3\varepsilon^2)^{d/2} \rho^d \leq \frac{3d}{2} \varepsilon^2 \rho^d. \quad (4.2)$$

Положим

$$I = \mathbb{F}_{-1} \cup \left\{ z : z \notin \mathbb{F}_{-1}, \frac{\text{mes}((z + Q) \cap \{u \notin 0\})}{\text{mes}(z + Q)} \geq \varepsilon \right\},$$

$$J = \left\{ z : z \notin \mathbb{F}_{-1}, 0 < \frac{\text{mes}((z + Q) \cap \{u \notin 0\})}{\text{mes}(z + Q)} < \varepsilon \right\}.$$

По построению все блоки, которые составляют  $E_I \cup D_J$ , содержатся в  $K_u \rho Q$ . Также по построению (при условии, что  $T \geq t_\varepsilon$ )

$$\text{mes}(E_I) \leq \frac{\text{mes}\{u \neq 0\}}{1 - \delta} + \frac{\text{mes}(\{u \neq 0\} \setminus ((\mathbb{F}_{-1} + Q)))}{\varepsilon} \leq (1 + C\varepsilon) \rho^d.$$

Остается показать, что максимальное рэлеевское отношение для соленоидальных функций на  $E_I \cup D_J$  может быть близко к  $\mathcal{L}$ . Чтобы построить функцию с большим рэлеевским отношением, можно модифицировать исходную функцию  $u$ , обращающуюся в нуль вне  $E_I \cup D_J$ . Изменения проводятся на  $D_J$  отдельно на каждом подблоке  $z + Q$ ,  $z \in J$ .

Пусть  $\zeta_z^W : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$  — гладкая функция такая, что

$$\zeta_z^W(x) = \begin{cases} 1, & x \notin z + Q, \\ 0, & x \in z + W, \end{cases} \quad |\nabla \zeta_z^W(x)| \leq c.$$

Дивергенция функции  $\zeta_z^W u$  равна  $\nabla \cdot (\zeta_z^W u) = \nabla \zeta_z^W \cdot u$ , и из соленоидальности  $u$  следует, что

$$\int_{z+Q \setminus W} \nabla \zeta_z^W \cdot u \, dV = \int_{\partial(z+Q)} (u \cdot \mathbf{n}) \, dS = \int_{z+Q} \nabla \cdot u \, dV = 0.$$

Значит, существует функция  $w_z \in \overset{\circ}{W}^{1,2}(z + Q \setminus W)$  (см. например, [6, гл. III, лемма 3.1]) такая, что

$$\nabla \cdot w_z = -\nabla \cdot (\zeta_z^W u)$$

и

$$\int_{z+Q \setminus W} (|w_z|^2 + |\nabla \otimes w_z|^2) \leq C \int_{z+Q \setminus W} (\nabla \zeta_z^W \cdot u)^2.$$

По предложению 2.2

$$\int_{z+Q \setminus W} (|w_z|^2 + |\nabla \otimes w_z|^2) \leq C \int_{z+Q \setminus W} (\nabla \zeta_z^W \cdot u)^2 \leq C' \varepsilon^{1/d} \int_{z+Q} |\nabla \otimes u|^2.$$

Функция

$$U(x) = \begin{cases} \zeta_z^W(x)u(x) + w_z(x), & x \in z + Q \setminus W, \, z \in J, \\ u(x), & x \notin D_J, \end{cases}$$

соленоидальна и удовлетворяет следующему неравенству (где  $D_J^+ = \bigcup_{z \in J} (z+Q)$ ):

$$\begin{aligned} \frac{\int |U|^2}{\rho^2 \int |\nabla \otimes U|^2} &\geq \frac{\int |u|^2 - C\varepsilon^{1/d} \int_{D_J^+} |\nabla \otimes u|^2}{\rho^2 (\int |\nabla \otimes u|^2 + C\varepsilon^{1/d} \int_{D_J^+} |\nabla \otimes u|^2)} \\ &\geq \frac{\mathcal{L}(1 - \varepsilon^2)}{1 + C\varepsilon^{1/d}} - \frac{C\varepsilon^{1/d}}{\rho^2} \geq (1 - C'\varepsilon^{1/d})\underline{\mathcal{L}}. \end{aligned}$$

Это доказывает лемму.  $\square$

**4.2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.2.**

Выберем малое положительное число  $\varepsilon$ . Лемма 4.1 гарантирует существование множеств  $I = I(\varepsilon, \rho) \subset \mathbb{Z}^d$ ,  $J = J(\varepsilon, \rho) \subset \mathbb{Z}^d$  и функции  $\rho = \rho(\varepsilon)$  таких, что

$$E_I \cup D_J \subseteq K^*(\varepsilon)\rho, \quad \frac{\text{mes } E_I}{\rho^d} \leq (1 + \varepsilon^2)$$

и

$$\frac{\mathfrak{S}(rQ \setminus M)}{\rho^2} \geq (1 - \varepsilon)\underline{\mathcal{L}}, \tag{4.3}$$

если только  $\rho \geq \rho(\varepsilon)$  и свободное пространство  $rQ \setminus M$  содержит хотя бы одно подмножество, полученное сдвигом  $E_I \cup D_J$  на целочисленный вектор  $z \in \mathbb{Z}^d$ .

Выберем еще

$$\hat{\rho} = \frac{1 - 3\varepsilon}{1 + \varepsilon^2} \sqrt{\frac{d}{\nu} \ln r}$$

и разбиение  $rQ$  на кубы  $\tilde{C}(z) = N(z + Q)$  нечетного целого размера  $N = N(r)$  так, что

$$2 < \frac{N(r)}{K^*(\varepsilon)\hat{\rho}} < 10.$$

Рассмотрим события  $A_z = \{\text{все ячейки в } Nz + E_I \text{ свободны}\}$ ,  $C(z) \subseteq rQ$ . По независимости «меток»  $\xi_z$  в (1.6) события  $A_z$  независимы. Они все имеют вероятность

$$p_r = \mathbf{P}(A_z) = \prod_{z \in I} \mathbf{P}\{\xi_z = 0\} = \exp\{-\nu \text{mes } E_I\} \geq \exp\{-d(1 - 3\varepsilon) \ln r\}.$$

Число  $L$  кубов  $\tilde{C}(z)$  без общих точек, которые содержит  $rQ$ , допускает оценку

$$L \geq \left( \frac{r}{10K^*(\varepsilon)\hat{\rho}} \right)^d = \exp\left\{ d \ln r \left( 1 - \frac{\ln(10K^*(\varepsilon)) + \ln \hat{\rho}}{\ln r} \right) \right\}.$$

Для того чтобы удовлетворить неравенство (4.3), достаточно, чтобы произошло хотя бы одно из событий  $A_z$ . Поэтому

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\left\{ \frac{\mathfrak{S}(rQ \setminus M)}{\left(\frac{1-3\varepsilon}{1+\varepsilon^2} \sqrt{\frac{d}{\nu} \ln r}\right)^2} \geq (1 - \varepsilon)\underline{\mathcal{L}} \right\} \\ \geq \mathbf{P}\left( \bigcup_{z: \tilde{C}(z) \subset rQ} A_z \right) \geq 1 - (1 - p_r)^L \geq 1 - \exp\{-Lp_r\}. \end{aligned}$$

Если  $r$  достаточно велико, то

$$Lp_r \geq \exp \left\{ d \ln r \left( 1 - \frac{\ln(10K^*(\varepsilon)) + \ln \hat{\rho}}{\ln r} \right) - d(1 - 3\varepsilon) \ln r \right\} \geq \exp \{-C\varepsilon \ln r\}.$$

Следовательно, для любого сколь угодно малого числа  $\varepsilon > 0$

$$\liminf_{r \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left\{ \frac{\mathfrak{S}(rQ \setminus M)}{\left(\frac{d}{\nu} \ln r\right)^{2/d}} \geq \left(\frac{1 - 3\varepsilon}{1 + \varepsilon^2}\right)^2 (1 - \varepsilon) \underline{\mathcal{L}} \right\} = 1,$$

что дает нижнюю границу теоремы.  $\square$

### А. Приложение.

#### Приближение слабой сжимаемости

Содержание этого раздела составляет сравнение нескольких вариантов максимального рэлеевского отношения для функций из пространства Соболева  $W^{1,2}(\mathbb{R}^d)$ , обращающихся в нуль вне множества единичной лебеговой меры.

#### А.1. Верхняя граница для максимального рэлеевского отношения.

Аналогом (1.10) для уравнений, описывающих течения сжимаемой жидкости со сжимаемостью  $\alpha > 0$ , является величина

$$\mathcal{C}_\alpha = \sup \left\{ \frac{\int_{\mathbb{R}^d} |u(x)|^2 dx}{\int_{\mathbb{R}^d} (|\nabla u(x)|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u(x))^2) dx} : \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1 \right\}. \quad (\text{A.1})$$

Непосредственно из определения следует, что  $\mathcal{C}_\alpha$  — неубывающая функция от  $\alpha$  и

$$\forall \alpha \quad \mathcal{S} \leq \mathcal{C}_\alpha \leq \Lambda, \quad (\text{A.2})$$

где  $1/\Lambda$  — наименьшее собственное число оператора Лапласа, действующего на функции  $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ , которые обращаются в нуль вне регулярного множества единичной лебеговой меры,

$$\Lambda = \sup \left\{ \frac{\int_{\mathbb{R}^d} \phi(x)^2 dx}{\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \phi(x)|^2 dx} : \phi \in W_2^1(\mathbb{R}^d), \text{mes}\{\phi \neq 0\} \leq 1 \right\}.$$

Все три величины в (A.2) определяются одной размерностью  $d$ .

Меня пространственный масштаб, легко видеть, что для функции, обращающейся в нуль вне множества лебеговой меры  $V$ , определения (1.10) и (A.1) доставляют оценки

$$\int |u|^2 \leq V^{2/d} \mathcal{S} \int |\nabla u|^2, \quad \text{если} \quad \nabla \cdot u = 0, \quad (\text{A.3})$$

и

$$\int |u|^2 \leq V^{2/d} \mathcal{C}_\alpha \int \left( |\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2 \right) \quad (\text{A.4})$$

без предположения соленоидальности.

Поскольку величина  $\mathcal{C}_\alpha$  равномерно по  $\alpha$  ограничена, существует предел

$$\mathcal{C} = \lim_{\alpha \searrow 0} \mathcal{C}_\alpha \geq \mathcal{S},$$

и, таким образом,

$$\mathcal{C}_\alpha = \mathcal{C} + G(\alpha), \quad \lim_{\alpha \searrow 0} G(\alpha) = 0. \quad (\text{A.5})$$

Определения  $\mathcal{C}$  и  $\mathcal{S}$  не исключают существования положительного «зазора»  $\mathcal{C} - \mathcal{S}$ . Этого зазора, однако, не существует.

**Лемма А.1.** Верхние грани в (1.10) и (А.5) совпадают:  $\mathcal{C} = \mathcal{S}$ .

Главным в доказательстве леммы является проверка того, что существует соленоидальная функция из  $W^{1,2}(\mathbb{R}^d)$ , которая обращается в нуль вне множества единичной меры и имеет достаточно большую в сравнении с  $L^2$ -нормой градиента норму в  $L^2$ . Ее построение составляет содержание лемм А.2 и А.3 ниже.

**Лемма А.2.** Существуют сходящаяся к нулю последовательность  $\alpha_k \searrow 0$  и последовательность функций  $u_k \in W^{1,2}(\mathbb{R}^d)$ , которые удовлетворяют следующим условиям:

(а) при каждом  $k$

$$\text{mes}\{u_k \neq 0\} = 1, \quad \int_{\mathbb{R}^d} |u_k|^2 = 1,$$

и

$$(\mathcal{C} - \alpha_k) \int_{\mathbb{R}^d} \left( |\nabla \otimes u_k|^2 + \frac{1}{\alpha_k} (\nabla \cdot u_k)^2 \right) \leq \int_{\mathbb{R}^d} |u_k|^2; \quad (\text{А.6})$$

(б) для каждого  $\gamma > 0$  существует шар  $r_\gamma B \subseteq \mathbb{R}^d$  такой, что

$$\limsup \int_{\mathbb{R}^d \setminus r_\gamma B} (1 + |u_k|^2) \leq \gamma.$$

**Лемма А.3.** Пусть  $(u_k)$  — последовательность функций, удовлетворяющая условиям (а), (б) леммы А.2. Эта последовательность содержит подпоследовательность, сходящуюся к функции  $u_\infty \in \overset{\circ}{W}^{1,2}(\mathbb{R}^d)$  сильно в  $L^2(\mathbb{R}^d)$  и слабо в каждом из пространств  $W^{1,2}(rB)$ ,  $r > 0$ . Предельная функция удовлетворяет неравенству  $\text{mes}\{u_\infty \neq 0\} \leq 1$ . Кроме того,

$$\mathcal{C} \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \otimes u_\infty|^2 \leq \int_{\mathbb{R}^d} |u_\infty|^2 = 1, \quad \nabla \cdot u_\infty = 0.$$

Доказательство леммы А.1 ведется методом от противного. Предположим, что

$$\mathcal{C} = \mathcal{S} + \beta, \quad \beta > 0. \quad (\text{А.7})$$

Леммы А.2 и А.3 показывают, что существует ненулевая соленоидальная функция такая, что

$$(\mathcal{S} + \beta) \int |\nabla \otimes u_\infty|^2 \leq \int |u_\infty|^2 = 1.$$

Однако по (А.3)

$$\int |u_\infty|^2 \leq \mathcal{S} \int |\nabla \otimes u_\infty|^2.$$

Следовательно, предположение (А.7) ошибочно.  $\square$

Доказательство леммы А.3. Для рассматриваемой последовательности обе величины  $|u_k|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$  и  $|\nabla \otimes u_k|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$  равномерно ограничены. Значит, последовательность допускает равномерную оценку интегрального модуля непрерывности:

$$\int_{\mathbb{R}^d} |u_k(x+h) - u_k(x)|^2 \leq c|h|.$$

Кроме того, для каждого  $\gamma > 0$  все функции  $u_k$ , за исключением конечного числа, удовлетворяют неравенству

$$\int_{\mathbb{R}^d \setminus r_\gamma B} (1 + |u_k|^2) \leq \gamma.$$

Известные критерии компактности в  $L^2(\mathbb{R}^d)$  (см., например, [10, гл. X, п. 1] или [11, гл. V, п. 5.1]) гарантируют существование сходящейся подпоследовательности  $(u_{k'}) \prec (u_k)$ , которая сходится сильно в  $L^2(\mathbb{R}^d)$  к функции  $u_\infty$ . По построению  $|u_\infty|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = 1$ . Кроме того, для любого  $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \text{mes}\{|u_\infty| \geq \varepsilon\} &\leq \limsup(\text{mes}\{|u_\infty - u_{k'}| \geq \varepsilon/2\} + \text{mes}\{|u_{k'}| \geq \varepsilon/2\}) \\ &\leq \limsup\left(\left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^2 |u_\infty - u_{k'}|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2 + 1\right) = 1. \end{aligned}$$

Для каждого шара  $B_l = \{|x| < l\}$ ,  $l = 1, 2, \dots$ , гильбертово пространство  $W^{1,2}(B_l)$  сепарабельно и рефлексивно (см., например, [11, гл. V, теорема 3.1]), а  $W_2^1(B_l)$ -нормы  $u_{k'}$  равномерно ограничены. Поэтому можно перейти к меньшей подпоследовательности  $u_{k''} \in W^{1,2}(\mathbb{R}^d)$ , для которой сужения на каждый из шаров  $B_l$  слабо сходятся в пространстве  $W^{1,2}(B_l)$ .  $W^{1,2}(B_l)$ -слабые пределы сужений  $u_{k''}|_{B_l}$  могут быть отождествлены с  $u_\infty|_{B_l}$ . Сказанное подразумевает слабую в  $L^2(B_l)$  сходимости градиентов,  $\nabla \otimes u_{k''} \rightarrow \nabla \otimes u_\infty$ , поэтому по выбору исходной последовательности (A.6)

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla \otimes u_\infty|^2 = \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{B_l} |\nabla \otimes u_\infty|^2 \leq \lim_{l \rightarrow \infty} \limsup \int_{B_l} |\nabla \otimes u_{k''}|^2 \leq \frac{1}{\mathcal{C}}$$

(см. [10, гл. V, теорема 1.1]). Предельная функция также соленоидальна: для любой скалярной пробной функции  $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$

$$\int u_\infty \cdot \nabla \phi = \lim \int u_{k''} \cdot \nabla \phi = \lim \int (\nabla \cdot u_{k''}) \phi,$$

а по (A.6)

$$\limsup \left| \int (\nabla \cdot u_{k''}) \phi \right| \leq \lim \sqrt{\alpha_{k''}} |\phi|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = 0. \quad \square$$

ЗАМЕЧАНИЕ А.1. Пусть  $\mathcal{C}^{(R)} = \lim_{\alpha \searrow 0} \mathcal{C}_\alpha^{(R)}$ , где

$$\mathcal{C}_\alpha^{(R)} = \sup \left\{ \frac{\int |u|^2}{\int (|\nabla \otimes u|^2 + \frac{1}{\alpha} (\nabla \cdot u)^2)} : u \in \mathring{W}^{1,2}(RQ), \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1 \right\}$$

и

$$\mathcal{S}^{(R)} = \sup \left\{ \frac{\int |u|^2}{\int |\nabla \otimes u|^2} : u \in \mathbf{V}(RQ), \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1 \right\}. \quad (\text{A.8})$$

Можно выбрать числовую последовательность  $\alpha_k \searrow 0$  и последовательность функций  $u_k$  с носителями в  $RQ$ , которые удовлетворяют условиям (а) леммы А.2. Поскольку шары в  $L^2(RQ)$  слабо предкомпактны, можно выбрать подпоследовательность, слабо сходящуюся в  $\mathring{W}^{1,2}(RQ)$  к функции из  $\mathring{W}^{1,2}(RQ)$ . Рассуждая так же, как в доказательстве леммы А.3, можно заключить, что

$$\mathcal{S}^{(R)} = \mathcal{C}^{(R)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ А.2. (i) Выберем сначала произвольную строго положительную последовательность, сходящуюся к нулю  $\alpha_k \searrow 0$ , и последовательность функций  $U_k(x)$ , удовлетворяющую условию (а) леммы. Существование такой последовательности вытекает непосредственно из определения  $\mathcal{C}_\alpha$  и (А.5). Выбор ее не единствен — можно было бы, например, изменить аргумент  $x$  на  $x - \xi_k$ ,  $\xi_k \in \mathbb{R}^d$ , не меняя интегралов в (А.6).

Зафиксируем произвольное (в дальнейшем малое положительное) число  $\delta \in (0, \frac{1}{3})$  и показатель  $A > 10d$ . Эти два параметра будут использованы для классификации единичных кубов-ячеек  $z + Q$  в соответствии с частью объема, которую занимают в них множества  $\{U_k \neq 0\}$ . Каждая из функций  $U = U_k$  исходной последовательности, удовлетворяющей (А.6), порождает собственную классификацию такого рода.

Фиксируем пока номер функции  $k$  и определяем множество  $\mathbb{F} = \mathbb{F}_{\delta,k}$  целочисленных векторов  $z \in \mathbb{Z}^d$ , нумерующее «свободные» ячейки (где  $U_k$  отлична от нуля на заметной части объема) соотношением

$$z \in \mathbb{F}_{\delta,k} \iff |\{U_k \neq 0\} \cap (z + Q)| > \delta^A.$$

Множество  $\mathbb{F}_{\delta,k}$  конечно, и выбор функций из (А.6) доставляет очевидную оценку

$$\text{card}(\mathbb{F}_{\delta,k}) \leq \delta^{-A}. \tag{А.9}$$

Очевидно, что зависимость  $\mathbb{F}_{\delta,k}$  от  $\delta$  монотонна для каждого фиксированного номера функции  $k$ : если  $\delta'' < \delta'$ , то

$$\mathbb{F}_{\delta',k} \subseteq \mathbb{F}_{\delta'',k}. \tag{А.10}$$

В дальнейшем будет удобно говорить, что две точки  $z', z'' \in \mathbb{F}_{\delta,k}$  принадлежат одной компоненте свободного множества  $\mathbb{F}_{\delta,k}$ , если их можно соединить цепочкой смежных точек целочисленной решетки, принадлежащих множеству  $\mathbb{F}_{\delta,k}$ . Иначе говоря, или  $|z' - z''| = 1$ , или пару  $z', z''$  можно дополнить  $L \geq 1$  точками  $z_j$  с тем, чтобы получить последовательность  $z_0 = z', z_1, \dots, z_{L+1} = z''$ , удовлетворяющую условию

$$z_j \in \mathbb{F}_{\delta,k} \quad |z_j - z_{j+1}| = 1, \quad j = 0, \dots, L. \tag{А.11}$$

Для каждой пары параметров  $\delta, k$  множество  $\mathbb{F}_{\delta,k}$  состоит из конечного числа  $M = M(k, \delta)$  компонент,

$$\mathbb{F}_{\delta,k} = \bigcup_{m=1}^M \mathbb{C}_{\delta,k,m}. \tag{А.12}$$

«Свободное» подмножество  $\mathbb{Z}^d$  порождает массивное «свободное» множество

$$F_{\delta,k} = \bigcup_{z \in \mathbb{F}_{\delta,k}} (z + \overline{Q}), \tag{А.13}$$

а каждая его компонента  $\mathbb{C}_{\delta,k,m}$  — собственное массивное множество

$$C_{\delta,k,m}^0 = \bigcup_{z \in \mathbb{C}_{\delta,k,m}} (z + Q).$$

Множества  $C_{\delta,k,m}^0$  не имеют общих точек. Для малых  $\delta$   $\delta$ -окрестность  $F_{\delta,k}^\delta$  свободного множества  $F_{\delta,k}$  представляет собой объединение не имеющих общих точек множеств  $C_m = C_{\delta,k,m}$ , являющихся  $\delta$ -окрестностями  $C_{\delta,k,m}^0$ :

$$F_{\delta,k}^\delta = \bigcup_{m=1}^M C_{\delta,k,m}, \quad C_{\delta,k,m'} \cap C_{\delta,k,m''} = \emptyset, \text{ если } m' \neq m. \tag{А.14}$$

Удобно ввести массивные множества еще одного типа:

$$C_{\delta,k,m}^+ = \bigcup_{z: \text{dist}(z, C_{\delta,k,m}) \leq 1} (z + Q),$$

соответствующие 1-окрестностям компонент  $C_{\delta,k,m}$  на решетке  $\mathbb{Z}^d$ . Заметим, что при  $\delta \leq \frac{1}{3}$

$$C_{\delta,k,m}^+ \supseteq C_{\delta,k,m} \supseteq C_{\delta,k,m}^0.$$

По построению каждая пара вершин  $z', z'' \in C_{\delta,k,m}^+ \cap \mathbb{Z}^d$  может быть соединена цепочкой смежных вершин из  $C_{\delta,k,m}$ . Поэтому диаметр каждого множества  $C_{\delta,k,m}^+$  допускает оценку

$$\text{diam}(C_{\delta,k,m}^+) \leq c\delta^{-A}, \quad m = 1, \dots, M. \quad (\text{A.15})$$

(ii) Следующая цель — показать, что для малых  $\delta$  большая часть объема  $F_{\delta,k}^\delta$  сосредоточена в одной из компонент  $C_m = C_{\delta,k,m}$  «свободного» множества  $F_{\delta,k}$ . Непосредственно из предложения 2.2 следует, что

$$\int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |U_k|^2 \leq c\delta^{A/d} \int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |\nabla \otimes U_k|^2. \quad (\text{A.16})$$

Поэтому для малых  $\delta$  «свободное» множество не может быть пустым — в этом случае приведенная выше оценка противоречила бы (A.6).

При более детальном анализе строения множества  $F_{\delta,k}$  будет удобно использовать гладкие (класса  $C^\infty$ ) срезающие функции  $\zeta = \zeta_{\delta,k}(x) : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$  такие, что

$$\zeta(x) = \begin{cases} 1, & x \in F_{\delta,k}, \\ 0, & \text{dist}(x, F_{\delta,k}) \geq \delta, \end{cases} \quad |\nabla \zeta(x)| \leq C/\delta \quad (\text{A.17})$$

(см. детали построения в [7, примечание к (3.7)]).

Поскольку  $U_k = \zeta U_k + (1 - \zeta)U_k$ , неравенство Коши и (A.16) доставляют следующую оценку для интеграла в правой части (A.6): при  $\kappa = \sqrt{\delta^{A/d}}$

$$\begin{aligned} \int |U_k|^2 &\leq (1 + \kappa) \int |\zeta U_k|^2 + \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right) \int |(1 - \zeta)U_k|^2 \\ &\leq (1 + \kappa) \int |\zeta U_k|^2 + \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right) \int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |U_k|^2 \\ &\leq (1 + \sqrt{\delta^{A/d}}) \int |\zeta U_k|^2 + c\sqrt{\delta^{A/d}} \int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |\nabla \otimes U_k|^2. \end{aligned} \quad (\text{A.18})$$

По выбору срезающей функции произведение  $\zeta U_k$  может быть представлено суммой функций, у которых носители содержатся в отдельных компонентах (A.14):

$$\zeta(x)U_k(x) = \sum_{m=1}^M \zeta(x)U_k(x)1_{C_m}(x), \quad \int_{\mathbb{R}^d} |\zeta U_k|^2 = \sum_{m=1}^M \int_{B_m} |\zeta U_k|^2, \quad (\text{A.19})$$



где  $B_m = C_m \cap \{U_k \neq 0\}$ . Положим  $V_m = \text{mes}(B_m)$  и выберем пару положительных параметров  $\alpha' > 0, \kappa' > 0$ . Тогда из (A.4), формулы дифференцирования  $\zeta U_k$  и формулы Коши следует, что

$$\begin{aligned} \int_{B_m} |\zeta U_k|^2 &\leq V_m^{2/d} \mathcal{C}_{\alpha'} \int_{B_m} \left( |\nabla \otimes (\zeta U_k)|^2 + \frac{1}{\alpha'} (\nabla \cdot (\zeta U_k))^2 \right) \leq V_m^{2/d} \left\{ (1 + \kappa') \mathcal{C}_{\alpha'} \right. \\ &\times \left. \int_{B_m} \left( |\nabla \otimes U_k| + \frac{1}{\alpha'} (\nabla \cdot U_k)^2 \right) c \left( 1 + \frac{1}{\kappa'} \right) \left( 1 + \frac{1}{\alpha'} \right) \int_{B_m \cap \{\nabla \zeta \neq 0\}} |\nabla \zeta \otimes U_k|^2 \right\}. \end{aligned} \tag{A.20}$$

При оценке интеграла, содержащего производные срезающей функции  $\zeta$ , заметим, что каждый из блоков  $z + Q$ , не содержащийся в множестве  $F_{\delta,k}$ , может иметь общие точки не более чем с  $3^d$  компонентами  $C_m$ . Поэтому неравенства (A.16) и (A.17) показывают, что

$$\sum_{m=1}^M \int_{B_m \cap \{\nabla \zeta \neq 0\}} |\nabla \zeta \otimes U_k|^2 \leq c\delta^{-2} \int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |U_k|^2 \leq c\delta^{A/d-2} \int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |\nabla \otimes U_k|^2.$$

Выберем теперь параметры (A.20) равными  $\alpha' = \delta$  и  $\kappa = \delta$ . В этом случае  $\mathcal{C}_{\alpha'} = \mathcal{C} + G(\delta)$ , и после суммирования неравенств, относящихся к отдельным компонентам  $B_m$ , указанные выше неравенства приводят к оценке

$$\begin{aligned} \int |U_k|^2 &\leq (\max_m V_m)^{2/d} \mathcal{C}_{\alpha'} (1 + \kappa') (1 + \sqrt{\delta^{A/d}}) \int_{F_{\delta,k}^\delta} \left( |\nabla \otimes U_k|^2 + \frac{1}{\alpha'} (\nabla \cdot U_k)^2 \right) \\ &+ c \left( \left( 1 + \frac{1}{\kappa} \right) \left( 1 + \frac{1}{\alpha'} \right) \delta^{A/d-2} + \sqrt{\delta^{A/d}} \right) \int_{\mathbb{R}^d \setminus F_{\delta,k}} |\nabla \otimes U_k|^2 \\ &\leq (\mathcal{C} + G(\delta)) (1 + c\delta) (\max_m V_m^{2/d} + c\delta^{A+}) \\ &\times \int \left( |\nabla \otimes U_k|^2 + \frac{1}{\delta} (\nabla \cdot U_k)^2 \right), \quad A_* = \min \left\{ \frac{A}{d} - 4, \frac{A}{2d} \right\} > 1. \end{aligned} \tag{A.21}$$

В сочетании с (A.6) это неравенство показывает, что в случае  $\alpha_k \leq \delta$  с необходимостью

$$\frac{\mathcal{C} - \delta}{\mathcal{C} + G(\delta)} \frac{1}{1 + \delta} - c\delta^{A_*} \leq \max_m V_m^{2/d},$$

что при малых  $\delta$  сводится к

$$\max_m V_m \geq 1 - c(G(\delta) + \delta). \tag{A.22}$$

(iii) Удобно на этой стадии «подправить» функции  $U_k$ , отвечающие достаточно малым значениям  $\alpha_k$ , так, чтобы удовлетворить условию (b) леммы.

С этой целью выберем число  $\delta_0$  настолько малым, чтобы правая часть (A.22) превосходила  $\frac{3}{4}$ . Поскольку суммарная мера множества  $\{U_k \neq 0\}$  равна единице,  $\mathbb{F}_{\delta_0,k}$  содержит всего одну компоненту  $C_{\delta_0,k,m^*}$  такую, что  $V_{m^*} \geq \frac{3}{4}$ . Уже отмечалось, что перенос — замена  $U_k(x)$  на  $U_k(x - \xi_k)$  — не изменяет интегралов в условии (a). Поэтому можно выбрать сдвиг так, чтобы удовлетворить условию  $-\xi_k \in C_{\delta_0,k,m^*}$ , т. е. добиться, чтобы начало координат содержалось

внутри наибольшей компоненты  $\xi_k + C_{\delta_0, k, m^*}$  свободного множества функции  $u_k(x) = U_k(x + \xi_k)$ , «подправленной» переносом:

$$0 \in \xi_k + C_{\delta_0, k, m^*} = \{x : x - \xi_k \in C_{\delta_0, k, m^*}\}.$$

Как бы причудлива ни была точная форма множества  $\{u_k \neq 0\}$ , указанные выше условия гарантируют, что начало координат накрывается по крайней мере множеством  $C_{\delta_0, k, m^*}^+$ , соответствующим компоненте множества  $\mathbb{F}_{\delta_0, k}$ , у которой  $\delta_0$ -окрестность имеет наибольшую меру.

Для того же номера функции  $k$  и меньших значений параметра  $\delta < \delta_0$  наибольшая компонента  $\mathbb{C}_{\delta, k, m^+} \subset \mathbb{Z}^d$  множества, нумерующего свободные ячейки, необходимо включает  $\mathbb{C}_{\delta_0, k, m^*}$ . По (A.22) лебегова мера множества  $\{u_k \neq 0\}$  составляет не менее  $\frac{3}{4}$  в каждом из двух «главных» массивных множеств  $C_{\delta_0, k, m^*}$ ,  $C_{\delta, k, m^+}$ , соответствующих значениям  $\delta_0$  и  $\delta$  параметра, определяющего концентрацию свободных ячеек. Суммарный свободный объем постоянен,  $\text{mes}\{u_k \neq 0\} = 1$ , что делает невозможным отсутствие общих точек в  $C_{\delta_0, k, m^*}$  и  $C_{\delta, k, m^+}$ . Но эти множества имеют непустое пересечение только в том случае, когда их «каркасы»  $\mathbb{C}_{\delta_0, k, m^*}, \mathbb{C}_{\delta, k, m^+} \subset \mathbb{Z}^d$  содержат общие или хотя бы смежные точки:

$$\exists z^* \in \mathbb{C}_{\delta_0, k, m^*}, z^+ \in \mathbb{C}_{\delta, k, m^+} \quad |z^* - z^+| \leq 1.$$

Поскольку все точки  $\mathbb{C}_{\delta_0, k, m^*}$  необходимо принадлежат одной и той же компоненте  $\mathbb{F}_{\delta, k}$  и являются к тому же  $(\delta, k)$ -свободными и смежными, приведенные соображения позволяют заключить, что в действительности  $\mathbb{C}_{\delta_0, k, m^*} \subseteq \mathbb{C}_{\delta, k, m^+}$  и  $C_{\delta_0, k, m^*}^+ \subseteq C_{\delta, k, m^+}^+$ ; таким образом, начало координат содержится внутри  $C_{\delta, k, m^+}^+$ , а также в большем шаре

$$\tilde{K}_\delta = (2c\delta^{-A})B = \{x : |x| \leq 2c\delta^{-A}\} \supseteq C_{\delta, k, m^+}^+, \quad (\text{A.23})$$

потому что

$$\text{diam}(C_{\delta, k, m^+}^+) \leq c\delta^{-A}.$$

Тем самым (A.22) показывает, что

$$\text{mes}(\{u_k \neq 0\} \cap (\mathbb{R}^d \setminus \tilde{K}_\delta)) \leq c(G(\delta) + \delta). \quad (\text{A.24})$$

(iv) Теперь можно получить оценку интеграла  $|u_k|^2$  по дополнению множества  $\tilde{K}_\delta$ . Заметим, что этот интеграл равен интегралу исходной «неперенесенной» функции  $U_k$  по части пространства, занятой или плотными кубами, или «неглавными» компонентами массивного свободного множества, чья суммарная мера не превосходит

$$1 - V_{m^+} \leq c(G(\delta) + \delta).$$

Поскольку наибольшая компонента свободного пространства теперь исключена, можно применить то же рассуждение, что при выводе (A.21), с использованием более грубых оценок через максимальное рэлеевское отношение для лапласиана  $\Lambda$  (см. (A.2)), чтобы получить из (A.18), (A.19) и (A.22) неравенство

$$\int_{\mathbb{R}^d \setminus \tilde{K}_\delta} |u_k|^2 \leq c\Lambda \left( \max_{m \neq m^+} V_m^{2/d} + c\delta^{A^*} \right) \int |\nabla \otimes U_k|^2 \leq c'(G(\delta) + \delta)^{2/d}. \quad (\text{A.25})$$

(v) Для завершения доказательства остается выбрать, отправляясь от малого положительного числа  $\gamma > 0$ , значение  $\delta = \delta(\gamma)$ , при котором правые части

(A.24) и (A.25) обе не превосходят  $\gamma/2$ . Шар  $r_\gamma B$  леммы — это шар из (A.23) с соответствующим диаметром  $2r_\gamma$ , который определяет  $\delta = \delta(\gamma)$ .  $\square$

**А.2. Максимальное рэлеевское отношение: случай компактного носителя.**

ЗАМЕЧАНИЕ А.2. Лемма А.1 используется для оценки сверху максимального рэлеевского отношения  $\mathfrak{S}_r$ , определенного в (1.7). Нижнюю оценку этой величины можно получить с помощью еще одного варианта рэлеевского отношения, введенного в (1.11).

Легко видеть, что

$$\underline{\mathcal{L}} = \sup_{R>0} \mathcal{S}^{(R)}, \tag{A.26}$$

где  $\mathcal{S}^{(R)}$  задается равенством (A.8). Действительно, по определению  $\underline{\mathcal{L}} \geq \sup_{R>0} \mathcal{S}^{(R)}$ . Всякая функция  $u \in V_{bd}$  имеет компактный носитель, поэтому ее рэлеевское отношение не превосходит  $\mathcal{S}^{(R)}$  при некотором  $R > 0$ . Следовательно,  $\underline{\mathcal{L}} \leq \sup_{R>0} \mathcal{S}^{(R)}$ .

Оценки  $\mathfrak{S}_r$  сверху и снизу может разделять положительный зазор — если (1.10) не совпадает с (1.11).

**Лемма А.4.** В двумерном случае ( $d = 2$ ) справедливо равенство

$$\mathcal{S} = \underline{\mathcal{L}}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим произвольную функцию  $u \in \mathbf{V}(\mathbb{R}^d)$  такую, что  $\text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1$  и  $|u|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = 1$ . Цель последующих рассуждений — показать, что для любого  $\varepsilon > 0$  найдется соленоидальная функция  $U$  с компактным носителем, которая приближает функцию  $u$  так, что

$$|u - U|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq \varepsilon, \quad |\nabla \otimes u - \nabla \otimes U|_{L^2} \leq \varepsilon |\nabla \otimes u|_{L^2}, \quad \text{mes}\{U \neq 0\} \leq 1 + \varepsilon.$$

(а) ИСКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЕКИХ ТОЧЕК. Выберем малое положительное число  $\delta > 0$ , большой положительный показатель  $K > 0$  (ограничения, которым он должен удовлетворять, будут обсуждены ниже) и еще одно положительное число  $R_0 > \delta$ , достаточно большое, чтобы множество

$$A_0 = \{x : |x| > R_0, u(x) \neq 0\}$$

удовлетворяло условиям

$$\text{mes}(A_0) \leq \delta^K, \quad \int_{A_0} |\nabla u|^2 < \delta^K, \quad \int_{A_0} |u|^2 < \delta^K. \tag{A.27}$$

Положим

$$R_n = \sqrt{A + \delta n}, \quad \Delta_n = R_{n+1} - R_n, \quad S_n = \{R_n \leq |x| < R_{n+1}\}.$$

Легко видеть, что для некоторых положительных констант  $c, c_i, N$

$$\frac{\Delta_{n-1} + \Delta_n}{\Delta_n} \leq c, \quad c_1 \frac{\delta}{n} \leq \Delta_n^2 \leq c_2 \frac{\delta}{n} \quad \text{при } n \geq N.$$

Кольца  $S_n, n \geq 0$ , не имеют общих точек. Они покрывают всю ту часть плоскости, которая лежит вне окружности  $\{|x| \leq R_0\}$ :

$$\mathbb{R}^2 = \{|x| \leq R_0\} \cup \left( \bigcup_{n=0}^{\infty} S_n \right).$$

По выбору  $R_n$  площади этих колец равномерно малы:

$$\text{mes}(S_n) \leq 2\pi \Delta_n R_{n+1} \leq c\delta.$$

Поскольку ряд  $\sum \frac{1}{n}$  расходится, существуют произвольно большие значения  $n$ , для которых

$$\int_{S_n} (1 + |u|^2 + |\nabla \otimes u|^2) \leq \frac{\delta^K}{n}. \quad (\text{A.28})$$

Такое значение  $n$  в дальнейшем фиксировано, а  $\zeta : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$  является  $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ -гладкой срезающей функцией такой, что

$$\zeta(x) = \begin{cases} 1, & |x| < R_n + \frac{1}{10}\Delta_n, \\ 0, & |x| > R_n + \frac{7}{10}\Delta_n, \end{cases} \quad |\nabla^{\otimes k} \zeta(x)| \leq \frac{c}{\Delta_n^k}, \quad k \geq 1. \quad (\text{A.29})$$

Функция  $\zeta u$  обращается в нуль при  $|x| > R_n$ , а ее дивергенция  $\nabla \cdot (\zeta u) = \nabla \zeta \cdot u$  удовлетворяет неравенству

$$\int |\nabla \cdot (\zeta u)|^2 \leq \frac{c}{\Delta_n^2} \int_{S_n} |u|^2 \leq c' \delta^{K-1}.$$

Кроме того,

$$\text{mes}(S_n \cap \{u \neq 0\}) \leq \frac{\delta^K}{n} \leq c\delta^{K-1} \Delta_n^2.$$

Функция  $\zeta u$  не соленоидальна, поэтому нужно построить для нее «поправку», т. е. функцию  $w$  из пространства  $\dot{W}^{1,2}(S_n^0)$  такую, чтобы была соленоидальна функция  $U = \zeta u - w \in \mathbf{V}(\mathbb{R}^d)$  (описанная поправка может быть выбрана не единственным образом). Условие, обеспечивающее существование поправки, выполнено (см. [12, § 3.2] или [1]):

$$\int_{S_n} (\nabla \cdot (\zeta u)) dV = - \int_{|x|=R_n+\frac{1}{10}\Delta_n} (\mathbf{n} \cdot u) dS = - \int_{|x|<R_n} (\nabla \cdot u) dV = 0. \quad (\text{A.30})$$

Как бы ни была выбрана поправка  $w$ , функция  $\zeta u - w$  вне множества  $\{u \neq 0\}$  не обращается в нуль только на  $S_n$ , и потому

$$\text{mes}\{U \neq 0\} \leq \text{mes}\{u \neq 0\} + c\delta. \quad (\text{A.31})$$

Остается проверить, что построение можно осуществить так, чтобы  $W^{1,2}$ -норма  $u - U$  была мала. С этой целью задача сводится к построению соленоидальных полей на малых звездных областях стандартной формы.

(b) КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО ПОТОКА. Удобно начать с построения функции на  $S_n$ , компенсирующей поток исходного поля скорости  $u$  через внешнюю границу кольца  $\{|x| = R_{n+1}\}$  — потока, который исчезает при переходе к  $\zeta u$  из-за появления срезающего множителя.

Вычисления используют полярные координаты  $(r, \theta)$ ,  $0 < r < \infty$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$ . Ниже сечение кольца  $S_n$ , которое соответствует полярному углу  $\theta$ , обозначается через  $\Sigma_\theta$ , а  $H_\theta$  обозначает кольцевой сектор  $\mathbb{R}^2$ , ограниченный  $\Sigma_0, \Sigma_\theta$

и окружностями  $C_{n-1} = \{|x| = R_n\}$ ,  $C_n = \{|x| = R_{n+1}\}$ . В исходных прямоугольных координатах единичный вектор внешней нормали к границе  $\partial H_\theta$  имеет вид

$$\mathbf{n} = \begin{cases} \mathbf{e} = \frac{1}{|x|}x = (\cos \theta, \sin \theta), & x \in C_{n+1}, \\ -\mathbf{e}, & x \in C_n, \\ \mathbf{f}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta), & x \in \Sigma_\theta, \\ \mathbf{f}_0 = (0, 1), & x \in \Sigma_0. \end{cases}$$

Поток исходного поля  $u$  через границу  $H_\theta$  равен нулю из-за того, что  $u$  соленоидально, поэтому

$$\int_{\partial H_\theta} (\mathbf{n} \cdot u) dS = \int_{\Sigma_\theta} (\mathbf{f}_\theta \cdot u) dS - \int_{\Sigma_0} (\mathbf{f}_0 \cdot u) dS + \int_{C_n} (\mathbf{e} \cdot u) dS - \int_{C_{n-1}} (\mathbf{e} \cdot u) dS = 0.$$

Для произведения  $\zeta u$  поток может быть ненулевым:

$$\int_{\partial H_\theta} (\mathbf{n} \cdot \zeta u) dS = \int_{\Sigma_\theta} (\mathbf{f}_\theta \cdot \zeta u) dS - \int_{\Sigma_0} (\mathbf{f}_0 \cdot \zeta u) dS - \int_{C_{n-1}} (\mathbf{e} \cdot \zeta u) dS = \int_{H_\theta} (\nabla \zeta \cdot u) dV.$$

Этот поток можно компенсировать функцией  $W(x)\mathbf{f}_{\theta(x)}$ , где

$$W(x) = \frac{1}{\Delta_n} Z\left(\frac{|x| - R_n}{\Delta_n}\right) \int_{H_\theta} (\nabla \zeta \cdot u) dV, \quad (\text{A.32})$$

а  $Z(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  — гладкая ограниченная функция такая, что

$$Z(t) = \begin{cases} 0, & t \notin \left(\frac{2}{10}, \frac{8}{10}\right), \\ \text{const}, & t \in \left(\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\right), \end{cases} \quad \int_0^1 Z(t) dt = 1.$$

Очевидно,  $\zeta u - W\mathbf{f}$  равна  $\zeta u$  на границе  $S_n$ . На сечениях  $\Sigma_\theta$  и  $\Sigma_0$  направление  $W$  совпадает с направлением внешней нормали, и только множитель  $Z\left(\frac{1}{\Delta_n}(|x| - R_{n-1})\right)$  меняется в пределах сечения, поэтому дополнительный поток через сечение  $\Sigma_\theta$  кольца  $S_n$  равен

$$\int_{\Sigma_\theta} (\mathbf{f}_\theta \cdot W) dS = \frac{1}{\Delta_n} \int_{R_n}^{R_n + \Delta_n} Z\left(\frac{r - R_n}{\Delta_n}\right) dr \int_{H_\theta} (\nabla \zeta \cdot u) dV = \int_{H_\theta} (\nabla \zeta \cdot u) dV.$$

Следовательно, для всякой пары полярных углов  $0 \leq \theta' < \theta'' \leq 2\pi$  выполняется соотношение

$$\int_{\Sigma_{\theta''}} (\mathbf{f}_{\theta''} \cdot W\mathbf{f}_{\theta''}) dS - \int_{\Sigma_{\theta'}} (\mathbf{f}_{\theta'} \cdot W\mathbf{f}_{\theta'}) dS = \int_{H_{\theta''} \setminus H_{\theta'}} (\nabla \zeta \cdot u) dV.$$

Таким образом, поток векторного поля  $\zeta u - W\mathbf{f}$  через границу  $\partial(H_{\theta''} \setminus H_{\theta'})$  равен нулю для любого кольцевого сектора:

$$\int_{\partial H_n} \mathbf{n} \cdot (\zeta u - W\mathbf{f}) dS = \int_{H_{\theta''} \setminus H_{\theta'}} \nabla \zeta \cdot u dV - \int_{H_{\theta''} \setminus H_{\theta'}} \nabla \zeta \cdot u dV = 0. \quad (\text{A.33})$$

Зависимость  $W$  от полярного угла  $\theta$   $2\pi$ -периодична по (A.30), поэтому (A.32) определяет гладкую функцию, обращающуюся в нуль вне кольца  $S_n$ .

Удобно записать матрицу Якоби  $W\mathbf{f}$  с использованием частных производных  $W(x(r, \theta))$  по полярным координатам:

$$\nabla \otimes (W\mathbf{f}) = \nabla W \otimes \mathbf{f} + \frac{1}{r} W(\mathcal{P} - \mathbf{e} \otimes \mathbf{f}) = \frac{\partial W}{\partial r} \mathbf{e} \otimes \mathbf{f} + \frac{1}{r} \frac{\partial W}{\partial \theta} \mathbf{f} \otimes \mathbf{f} + \frac{1}{r} W(\mathcal{P} - \mathbf{e} \otimes \mathbf{f}), \quad (\text{A.34})$$

где  $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

(с) Оценки для исходного векторного поля. Последующие вычисления преобразуют неравенства (A.28) в оценки  $L^2$ -норм  $W\mathbf{f}$  и производных этой функции. Существенно, что начальную оценку (A.28) для  $L^2$ -нормы  $|u|$  можно улучшить, воспользовавшись неравенством Пуанкаре — Фридрихса из предложения 2.2.

Определение  $W$  использует только сужение  $u$  на меньшее кольцо

$$S_n^- = \left\{ x : R_n + \frac{1}{10} \Delta_n < |x| < R_n + \frac{8}{10} \Delta_n \right\} \subset S_n.$$

Можно разрезать это последнее на секторы с центральным углом  $\alpha = \frac{2\pi}{n}$ :

$$S_{n,k} = \left\{ x \in S_n^- : \frac{k}{n} 2\pi < \theta(x) \leq \frac{k+1}{n} 2\pi \right\}.$$

Каждый из этих секторов содержится в выпуклой области  $C_{n,k}$ , ограниченной лучами, выделяющими сектор, внешней круговой границей радиуса  $R_n + \frac{8}{10} \Delta_n$  и хордой внутренней круговой границы радиуса  $R_n + \frac{1}{10} \Delta_n$ . Эта выпуклая область лежит внутри кольца  $S_n$ , если  $n$  достаточно велико. Действительно,  $\Delta_n/R_n \geq \frac{1}{n}$ , поэтому

$$\left( R_n + \frac{1}{10} \Delta_n \right) \cos \frac{\pi}{n} - R_n \geq R_n \left( \left( 1 + \frac{\Delta_n}{R_n} \right) \left( 1 - \frac{\pi^2}{2n^2} \right) - 1 \right) > 0.$$

Легко видеть, что

$$\text{diam}(C_{n,k}) \leq c' \Delta_n, \quad \text{mes}(C_{n,k}) \geq c'' \Delta_n^2.$$

Доля площади  $C_{n,k}$ , приходящаяся на множество, где  $u$  не обращается в нуль, допускает оценку

$$\frac{\text{mes}(\{u \neq 0\} \cap C_{n,k})}{\text{mes}(C_{n,k})} \leq \frac{c\delta^K}{n\Delta_n^2} \leq c\delta^{K-1}.$$

Поэтому можно применить предложение 2.2, чтобы убедиться в том, что

$$\int_{C_{n,k}} |u|^2 dV \leq c\delta^{(K-1)/2} \Delta_n^2 \int_{C_{n,k}} |\nabla \otimes u|^2 dV.$$

Отсюда следует неравенство

$$\int_{S_n^-} |u|^2 dV \leq c\delta^{(K-1)/2} \Delta_n^2 \int_{S_n^-} |\nabla \otimes u|^2 dV. \quad (\text{A.35})$$

(d) ГРАДИЕНТ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ПОТОКА. По (A.34)

$$\int_{S_n} |\nabla \otimes W\mathbf{f}|^2 dV \leq C(J_1 + J_2 + J_3), \quad (\text{A.36})$$

где  $C$  — положительная константа,

$$J_1 = \int_{S_n} \left| \frac{\partial W}{\partial r} \right|^2 dV, \quad J_2 = \int_{S_n} \left| \frac{1}{r} \frac{\partial W}{\partial \theta} \right|^2 dV, \quad J_3 = \int_{S_n} \left| \frac{1}{r} W \right|^2 dV.$$

Из оценок для производных  $\zeta$  и  $Z$  в (A.29) и (A.32), неравенства Коши и (A.35) немедленно следует, что всегда, когда  $K > 2$ ,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial W}{\partial r}(r, \theta) \right|^2 &\leq \frac{\sup(Z'(t))^2}{\Delta_n^4} \left( \int_{H_\theta} (\nabla \zeta \cdot u) dV \right)^2 \\ &\leq \frac{C}{\Delta_n^6} \text{mes}(S_n \cap \{u \neq 0\}) \int_{S_n^-} |u|^2 dV \leq \frac{C}{\Delta_n^6} \frac{\delta^K}{n} \Delta_n^2 \delta^{K/2-1} \frac{\delta^K}{n} \leq C\delta^A, \quad A > 0. \end{aligned}$$

Таким образом, в соотношении (A.36)

$$J_1 \leq C\delta^A \Delta_n R_n \leq C\delta^{A+1}. \quad (\text{A.37})$$

Оценка для  $J_3$  выводится аналогично:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{r} W \right|^2 &\leq C \frac{1}{\Delta_n^2 R_n^2} \left( \int_{H_\theta} (\nabla \zeta \cdot u) dV \right)^2 \\ &\leq \frac{C}{\delta^2 \Delta_n^2} \text{mes}(S_n \cap \{u \neq 0\}) \int_{S_n^-} |u|^2 dV \leq C \frac{\delta^K}{n} \delta^{K/2-3}. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что при  $K > 2$

$$J_3 \leq C \Delta_n R_n \frac{\delta^K}{n} \delta^{K/2-3} \leq C\delta^A, \quad A > 0. \quad (\text{A.38})$$

Вывод оценки для  $J_2$  несколько иной. Удобно переписать определение  $J_3$  в полярных координатах. По (A.32) и неравенству Коши

$$\frac{\partial W}{\partial \theta}(r, \theta) = \frac{1}{\Delta_n} Z \left( \frac{r - R_n}{\Delta_n} \right) \frac{\partial}{\partial \theta} \int_0^\theta d\theta' \int_{R_n + \frac{1}{10} \Delta_n}^{R_n + \frac{8}{10} \Delta_n} (\nabla \zeta \cdot u)(x(r', \theta')) r' dr',$$

поэтому

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{r} \frac{\partial W}{\partial \theta}(r, \theta) \right|^2 &\leq \frac{C}{r^2 \Delta_n^2} \int_{R_n + \frac{1}{10} \Delta_n}^{R_n + \frac{8}{10} \Delta_n} 1_{\{u \neq 0\}}(x(r', \theta)) r' dr' \frac{\sup(Z'(t))^2}{\Delta_n^2} \\ &\times \int_{R_n + \frac{1}{10} \Delta_n}^{R_n + \frac{8}{10} \Delta_n} |u(x(r', \theta))|^2 r' dr' \leq \frac{C R_n}{r^2 \Delta_n^3} \int_{R_n + \frac{1}{10} \Delta_n}^{R_n + \frac{8}{10} \Delta_n} |u(x(r', \theta))|^2 r' dr'. \end{aligned}$$

Вследствие этого существует положительный показатель  $A > 0$  такой, что

$$\begin{aligned} J_2 = \int_{S_n} \left| \frac{1}{r} \frac{\partial W}{\partial \theta} \right|^2 dV &\leq \int_0^{2\pi} d\theta \int_{R_n}^{R_n + \Delta_n} \left( \frac{C R_n}{r^2 \Delta_n^3} \int_{R_n + \frac{1}{10} \Delta_n}^{R_n + \frac{8}{10} \Delta_n} |u(x(r', \theta))|^2 r' dr' \right) r dr \\ &\leq C \frac{R_n^2 \Delta_n}{R_n^2 \Delta_n^3} \int_{S_n^-} |u(x)|^2 dV \leq C \delta^{(K-1)/2} \int_{S_n^-} |\nabla \otimes u|^2 dV \leq C\delta^A. \quad (\text{A.39}) \end{aligned}$$

Сходное рассуждение доставляет оценку для  $L^2$ -нормы функции  $W\mathbf{f}$ : по неравенству Коши

$$\begin{aligned} |W(x)|^2 &\leq \frac{C}{\Delta_n^4} \text{mes}(S_n \cap \{u \neq 0\}) \int_{S_n^-} |u|^2 dV \\ &\leq \frac{C}{\Delta_n^2} \text{mes}(S_n \cap \{u \neq 0\}) \int_{S_n} |\nabla \otimes u|^2 dV \leq \frac{Cn}{\delta} \frac{\delta^K}{n} \frac{\delta^K}{n}, \end{aligned}$$

поэтому

$$\int_{S_n} |W(x)|^2 dV \leq C\delta^A, \quad A > 0. \quad (\text{A.40})$$

Следствием (A.37), (A.39), (A.38) и (A.40) является то, что при достаточно большом  $K > 0$  существует положительный показатель  $A > 0$  такой, что с константой, не зависящей от  $\delta > 0$ ,

$$\int_{S_n} |\nabla \otimes W\mathbf{f}|^2 dV \leq C\delta^A. \quad (\text{A.41})$$

(е) УСТРАНЕНИЕ ДИВЕРГЕНЦИИ. Векторное поле  $\zeta u - W\mathbf{f}$  не соленоидально, но по (A.33) его поток через границу любого сектора кольца  $S_n$  равен нулю. Разрежем вновь  $S_n$  на секторы  $S_{n,k}^+$  диаметра  $\mathcal{O}(\Delta_n)$ , содержащие  $S_{n,k}$ . Легко видеть, что при малых  $\delta$  каждый из этих секторов звезден относительно некоторого круга диаметра  $c_0\Delta_n$ , где  $c_0 > 0$  не зависит от  $\delta$ . Известные теоремы о разрешимости уравнения  $\nabla \cdot V = \phi$  (см., например, [2, лемма III.3.1]), показывают, что для каждого сектора  $S_{n,k}^+$  существует функция  $V_{n,k} \in \mathring{W}^{1,2}(C_{n,k}^+)$  такая, что

$$\nabla \cdot V_{n,k} = -\nabla \cdot (\zeta u - W\mathbf{f})$$

и

$$|V_{n,k}|_{W^{1,2}(C_{n,k}^+)} \leq C|\nabla \cdot (\zeta u - W\mathbf{f})|_{L^2(C_{n,k}^+)},$$

где константа  $C$  не зависит от  $\delta$ ,  $n$  или  $k$ . Следовательно, функция  $V \in \mathring{W}^{1,2}(S_n^0)$ , равная  $V_{n,k}$  в каждом секторе  $S_{n,k}^+$ , допускает оценку

$$|V|_{L^2(S_n)}^2 + |\nabla \otimes V|_{L^2(S_n)}^2 \leq C|\nabla \cdot (\zeta u - W\mathbf{f})|_{L^2(C_n)}^2.$$

Векторное поле  $w = \zeta u - W\mathbf{f} - V$  соленоидально, а соотношение (A.27) и оценки, полученные в предыдущих разделах доказательства, показывают, что существуют константы  $C, A$  такие, что

$$|u - w|_{W_2^1(\mathbb{R}^d)} \leq C\delta^A, \quad A > 0. \quad (\text{A.42})$$

По построению носитель  $w$  ограничен и

$$\text{mes}\{w \neq 0\} \leq 1 + \delta, \quad \frac{|w|_{L^2}^2}{|\nabla \otimes w|_{L^2}^2} \leq \frac{|u|_{L^2}^2 + C\delta^A}{|\nabla \otimes u|_{L^2}^2 - C\delta^A}.$$

Поскольку  $\delta > 0$  произвольно, это доказывает равенство

$$\begin{aligned} &\sup \left\{ \frac{|u|_{L^2}^2}{|\nabla \otimes u|_{L^2}^2} : \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1, \nabla \cdot u = 0 \right\} \\ &= \sup \left\{ \frac{|u|_{L^2}^2}{|\nabla \otimes u|_{L^2}^2} : \text{mes}\{u \neq 0\} \leq 1, \nabla \cdot u = 0, \text{supp}(u) \text{ ограничен} \right\}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.  $\square$



## ЛИТЕРАТУРА

1. *Temam R.* Navier — Stokes equations: Theory and numerical analysis. Amsterdam: North-Holland, 1979.
2. *Galdi P.* An introduction to the mathematical theory of the Navier — Stokes equations. New York: Springer-Verl., 1994.
3. *Sznitman, A.-S.* Brownian motion and obstacles // 1st European congr. of mathematics. V. 1. Basel: Birkhäuser, 1994. P. 225–248.
4. *Sanchez-Palencia E.* Non-homogeneous media and vibration theory. Berlin: Springer-Verl., 1980. (Lecture Notes in Phys.; 127).
5. *Yurinsky V. V.* Raising spectrum bottom by random potential // Siberian Adv. Math. 1997. V. 7, N 2. P. 124–150.
6. *Sznitman A.-S.* Fluctuation of principal eigenvalues and random scales // Com. Math. Phys. 1997. V. 189. P. 337–363.
7. *Yurinsky V. V.* Spectrum bottom and largest vacuity // Probab. Theory Related Fields. 1999. V. 114. P. 151–175.
8. *Beliaev A. Yu., Yurinsky V. V.* Bottom of Laplacian's spectrum in Poisson cloud // Siberian Adv. Math. 1995. V. 5, N 4. P. 113–150.
9. *Grimmett J.* Percolation. New York: Springer-Verl., 1989.
10. *Yosida K.* Functional analysis. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verl, 1980.
11. *Edmunds D. E., Evans W. D.* Spectral theory and differential operators. Oxford: Clarendon Press, 1987.
12. *Ладыженская О. А.* Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1970.

*Статья поступила 1 ноября 2000 г.*

*Юринский Вадим Владимирович  
Departamento de Matemática/Informática e Centro de Matemática,  
Universidade da Beira Interior, 6200-001 Covilhã, Portugal,  
yurinsky@ubi.pt*