

УДК 519.3

## К ТЕОРИИ ПОПЕРЕМЕННО–ТРЕУГОЛЬНОГО ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА

**А. Н. Коновалов**

**Аннотация:** Построен новый класс адаптивных попеременно-треугольных методов, оптимизация которого в отличие от известных в настоящее время подходов, не требует априорной спектральной информации. При этом сохраняется та же оценка скорости сходимости, что и при наличии априорной информации. Библиогр. 17.

В конечномерном гильбертовом пространстве  $H$  рассматривается задача об отыскании решения операторного уравнения

$$Ax = f, \quad A : H \rightarrow H, \quad (1)$$

где  $A$  — линейный, самосопряженный ( $A = A^*$ ), положительно определенный оператор ( $A > 0$ ). Для нахождения решения задачи (1) будем использовать неявный итерационный процесс

$$B \frac{x^{m+1} - x^m}{\tau} + Ax^m = f, \quad B : H \rightarrow H. \quad (2)$$

В (2)  $m$  — номер итерации,  $\tau > 0$  — итерационный параметр, а  $B$  — некоторый обратимый оператор. По определению обращение оператора  $B$  в (2) должно быть существенно проще, чем непосредственное обращение исходного оператора  $A$  в (1). При построении  $B$  будем исходить из аддитивного разложения

$$A = A_1 + A_2, \quad A_1^* = A_2. \quad (3)$$

В силу (3)  $(Ay, y) = 2(A_1y, y) = 2(A_2y, y)$ . Поэтому в (3)  $A_1 > 0$ ,  $A_2 > 0$ . Пусть в (2)

$$B = (E + \omega A_1)(E + \omega A_2), \quad \omega > 0, \quad Ey = y, \quad y \in H. \quad (4)$$

Поскольку  $A = A^* > 0$ , то вместе с (3) это дает  $B = B^* > 0$ . Соотношения (2)–(4) задают попеременно-треугольный итерационный метод (ПТМ) [1] решения задачи (1).

### § 1. Оптимизация ПТМ с использованием априорной информации

Если  $x^m - x = z^m$  — вектор погрешности, то из (1), (2) получаем

$$B(\omega)z^{m+1} = B(\omega)z^m - \tau Az^m \quad (1.1)$$

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 99–01–00508) и Межвузовской научно-технической программы «Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и гуманитарных наук». Университеты России (тема 991116).

или

$$v^{m+1} = v^m - \tau C v^m = (E - \tau C)v^m = S(\omega, \tau)v^m.$$

Здесь  $v^m = A^{\frac{1}{2}}z^m$ ,  $C = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}A^{\frac{1}{2}}$  или  $v^m = B^{\frac{1}{2}}z^m$ ,  $C = B^{-\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}}$ . Поскольку

$$\|v^{m+1}\| = \|(E - \tau C)v^m\| \leq \|S(\omega, \tau)\| \|v^m\|, \quad (1.2)$$

то оптимизацию ПТМ (2)–(4) можно связать с минимизацией какой-либо нормы оператора шага  $S(\omega, \tau)$ . В основе такого подхода лежат

**Теорема 1.1** [2, с. 340]. Если  $A = A^* > 0$ ,  $B = B^* > 0$ , а  $C = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}A^{\frac{1}{2}}$  или  $C = B^{-\frac{1}{2}}AB^{-\frac{1}{2}}$ , то операторные неравенства

$$\gamma_1 B \leq A \leq \gamma_2 B, \quad \gamma_1 E \leq C \leq \gamma_2 E, \quad 0 < \gamma_1 < \gamma_2, \quad (1.3)$$

эквивалентны.

**Теорема 1.2** [2, с. 340]. Если  $C = C^* > 0$ ,  $\tau > 0$ , то условия

$$\|S\| = \|E - \tau C\| \leq \rho, \quad \frac{1 - \rho}{\tau} E \leq C \leq \frac{1 + \rho}{\tau} E \quad (1.4)$$

эквивалентны.

В качестве следствий заключаем, что в (1.4) можно положить  $1 - \rho = \tau\gamma_1$ ,  $1 + \rho = \tau\gamma_2$ . Тогда

$$\rho = \frac{1 - \eta}{1 + \eta}, \quad \eta = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}, \quad \tau = \frac{2}{\gamma_1 + \gamma_2}, \quad (1.5)$$

а минимум  $\rho$  достигается при максимальном  $\eta$ . Поэтому если в (2)–(4)

$$\omega_0 : \max_{\omega > 0} \eta(\omega) = \max \frac{\gamma_1(\omega)}{\gamma_2(\omega)}, \quad \tau_0 = \frac{2}{\gamma_1(\omega_0) + \gamma_2(\omega_0)}, \quad (1.6)$$

то для ПТМ (2)–(4) справедлива

**Теорема 1.3.** Для ПТМ (2)–(4), (1.6) имеет место оценка

$$\|z^m\|_D \leq \rho_0^m \|z^0\|_D, \quad \rho_0 = \frac{1 - \eta(\omega_0)}{1 + \eta(\omega_0)}, \quad D = A, B. \quad (1.7)$$

При этом  $\rho_0$  в (1.7) является верхней границей для всех  $\|S(\omega_0, \tau_0)\|$ , согласованных с векторными нормами  $\|\cdot\|_A, \|\cdot\|_B$ .

Собственно в определении  $\gamma_1(\omega)$ ,  $\gamma_2(\omega)$  и заключается одна из основных задач при оптимизации двухслойных итерационных методов (2), когда  $B = B(\omega)$  [2, 3]. Если обратиться к обобщенной спектральной задаче

$$A\varphi_i = \lambda_i B(\omega)\varphi_i, \quad (1.8)$$

то речь должна идти о получении оценок

$$\gamma_1(\omega) \leq \lambda_{\min}(\omega) < \lambda_{\max}(\omega) \leq \gamma_2(\omega). \quad (1.9)$$

Существенным элементом при таком подходе является *дополнительная априорная информация* об исходной задаче (1). Для ПТМ (2)–(4) эту информацию обычно связывают с заданием [1–4] или же с предварительным определением [3, с. 400–402] констант  $\delta, \Delta$ :

$$E \leq \frac{1}{\delta} A, \quad A_1 A_2 \leq \frac{\Delta}{4} A. \quad (1.10)$$

В (1.10) за  $\delta$  можно принять  $\delta \leq \lambda_{\min}(A)$ , где  $\lambda_{\min}(A)$  — наименьшее собственное значение оператора  $A$ , а в качестве  $\Delta$  взять [4, с. 396, 397]  $\Delta \geq \lambda_{\max}(A)$ .

Стандартный способ оптимизации стационарного ПТМ приводится, например, в [4, с. 396, 397] и заключается в следующем. Поскольку

$$B = (E + \omega A_1)(E + \omega A_2) = (E - \omega A_1)(E - \omega A_2) + 2\omega A = \tilde{B} + 2\omega A, \quad (1.11)$$

то

$$(By, y) = (\tilde{B}y, y) + 2\omega(Ay, y) = \|y - \omega A_2 y\|^2 + 2\omega(Ay, y)$$

и поэтому для любого  $y \in H$ ,  $y \neq 0$ , имеем

$$(By, y) \geq 2\omega(Ay, y), \quad (Ay, y) \leq \frac{1}{2\omega}(By, y), \quad \gamma_2(\omega) = \frac{1}{2\omega}. \quad (1.12)$$

Кроме того, в силу (1.10)

$$(By, y) < \left( \frac{1}{\delta} + \omega + \frac{\omega^2 \Delta}{4} \right) (Ay, y). \quad (1.13)$$

Следовательно,

$$(Ay, y) > \left( \frac{1}{\delta} + \omega + \frac{\omega^2 \Delta}{4} \right)^{-1} (By, y), \quad \gamma_1(\omega) = \frac{\delta}{1 + \omega\delta + \omega^2 \frac{\delta\Delta}{4}}. \quad (1.14)$$

Дальнейшее просто. Учитывая (1.12), (1.14), в соответствии с (1.6) находим

$$\omega_* = \frac{2}{\sqrt{\delta\Delta}}, \quad \tau_* = \frac{2}{\gamma_1(\omega_*) + \gamma_2(\omega_*)} = 4\omega_* \frac{1 + \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}}, \quad (1.15)$$

где

$$\gamma_1(\omega_*) = \frac{\delta}{2(1 + \sqrt{\xi})}, \quad \gamma_2(\omega_*) = \frac{\sqrt{\delta\Delta}}{4}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}.$$

Что же касается теоремы 1.3, то она допускает следующую формулировку.

**Теорема 1.4.** *Стационарный ПТМ (2)–(4), (1.15) сходится, и справедлива оценка*

$$\|z^m\|_A < \rho_*^m \|z^0\|_A, \quad \rho_* = \frac{1 - \eta_*}{1 + \eta_*} = \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}}, \quad \eta_* = \frac{\gamma_1(\omega_*)}{\gamma_2(\omega_*)}. \quad (1.16)$$

Если в (2)–(4) число итераций  $m$  задано, то следует положить

$$\tau_k = \frac{\tau_*}{1 + \rho_* t_k}, \quad t_k = \frac{\cos(2k - 1)}{2m}, \quad k = 1, \dots, m. \quad (1.17)$$

Тогда для нестационарного ПТМ (2)–(4) с чебышевскими итерационными параметрами (1.15), (1.17) вместо (1.16) будем иметь

$$\|z^m\|_A \leq q_m \|z^0\|_A, \quad q_m = \frac{2\rho_1^m}{1 + \rho_1^{2m}}, \quad \rho_1 = \frac{1 - \sqrt{\eta_*}}{1 + \sqrt{\eta_*}}. \quad (1.18)$$

При численной реализации чебышевского ПТМ необходимо использовать какое-либо устойчивое упорядочивание итерационных параметров (1.17).

Дадим некоторые комментарии к изложенной выше теории оптимизации ПТМ (2)–(4). Прежде всего следует отметить, что используемая в (1.12) оценка снизу для оператора  $B$  неулучшаема. Действительно, равенство в (1.12) реализуется на векторах  $y \in \ker \tilde{B}$ . Отсюда вытекает

**Следствие 1.1.** Если для стационарного ПТМ (2)–(4), (1.6)  $z^0 \in \ker \tilde{B}$ , то  $z^1 = 0$ .

Доказательство практически очевидно. В самом деле, из (1.11) вытекает, что для  $y \in \ker \tilde{B}$  будем иметь  $By = 2\omega Ay$  и, кроме того,  $\gamma_1(\omega) = \gamma_2(\omega) = 1/2\omega$ . Поэтому (1.6) дает  $\tau = 2\omega$ . Следовательно, в силу (1.1)

$$Bz^1 = Bz^0 - \tau Az^0 = (2\omega - \tau)Az^0 = 0. \tag{1.19}$$

Теперь остается учесть, что  $B > 0$ .

Подобным свойством: зависимостью скорости сходимости от начального приближения, обычно обладают градиентные итерационные методы (итерационные методы вариационного типа). О них речь пойдет ниже, а пока отметим следующее. Априорная информация при оптимизации ПТМ как в стационарном варианте (1.15), так и в нестационарном чебышевском варианте (1.15), (1.17) связана с  $\lambda_{\min}(A)$ ,  $\lambda_{\max}(A)$  и используется в оценке (1.13) оператора  $B$  сверху. Но сама по себе задача определения  $\delta \leq \lambda_{\min}(A)$ ,  $\lambda_{\max}(A) \leq \Delta$  гораздо сложнее исходной задачи (1). Реально речь вообще может идти лишь о приближенном нахождении  $\delta$ ,  $\Delta$ . Не будет преувеличением также сказать, что чем выше (теоретическая) скорость сходимости итерационного процесса, тем более чувствителен этот процесс к точности задания (определения) априорной информации. Только что сказанное в полной мере относится и к точности оценки оператора  $B$  сверху, в которой эта априорная информация используется.

Действительно, при получении (1.15) используется «хорошая» оценка (1.13)

$$(By, y) \leq \left( \frac{1}{\delta} + \omega + \frac{\omega^2 \Delta}{4} \right) (Ay, y) = \frac{1}{\gamma_1(\omega)} (Ay, y),$$

которая вместе с (1.6) приводит к (1.15), (1.16). Однако заметим, что

$$\frac{1}{2}(Ay, y) = (A_2y, y) \leq \|A_2y\| \|y\| \leq \nu \|A_2y\|^2 + \frac{1}{\nu} \|y\|^2,$$

где  $\nu$  — любое положительное число. Поэтому наряду с (1.13) столь же очевидна справедливость и таких «плохих» оценок:

$$(By, y) \leq \left( \frac{1}{\sqrt{\delta}} + \frac{\omega \sqrt{\Delta}}{2} \right)^2 (Ay, y) = \frac{1}{\tilde{\gamma}_1(\omega)} (Ay, y), \tag{1.20}$$

$$(By, y) \leq \left( \frac{1}{\delta} + \omega \frac{1 + 4\nu^2 \delta \Delta}{2\nu \delta} + \frac{\omega^2 \Delta}{4} \right) (Ay, y) = \frac{1}{\hat{\gamma}_1(\omega)} (Ay, y). \tag{1.21}$$

Как было отмечено, оценка для оператора  $B$  снизу (1.12) неуплучшаема. Поэтому при наличии оценок (1.20), (1.21) совершенно естественно определять оптимальные  $\tilde{\omega}$ ,  $\hat{\omega}$  в соответствии с (1.6). Но тогда, как нетрудно убедиться,

$$\begin{aligned} \tilde{\omega} : \max_{\omega > 0} \frac{\tilde{\gamma}_1(\omega)}{\gamma_2(\omega)} &= \max_{\omega > 0} \tilde{\eta}(\omega), & \tilde{\omega} &= \frac{2}{\sqrt{\delta \Delta}} = \omega_*, \\ \hat{\omega} : \max_{\omega > 0} \frac{\hat{\gamma}_1(\omega)}{\gamma_2(\omega)} &= \max_{\omega > 0} \hat{\eta}(\omega), & \hat{\omega} &= \frac{2}{\sqrt{\delta \Delta}} = \omega_*. \end{aligned} \tag{1.22}$$

Однако при этом  $\gamma_1(\omega_*) > \tilde{\gamma}_1(\omega) \geq \hat{\gamma}_1(\omega_*, \nu)$ , следовательно,

$$\eta_* = \eta(\omega_*) > \tilde{\eta}_* = \tilde{\eta}(\omega_*) \geq \hat{\eta}_*(\nu) = \hat{\eta}(\omega_*, \nu).$$

Равенства  $\tilde{\gamma}_1(\omega_*) = \hat{\gamma}_1(\omega_*, \nu)$ ,  $\tilde{\eta}_* = \hat{\eta}_*(\nu)$  достигаются при  $\nu = 1/2\sqrt{\delta\Delta}$ . Поэтому если в (1.1)  $\omega = \omega_*$  и в соответствии с (1.6)

$$\tau_* = \frac{2}{\gamma_1(\omega_*) + \gamma_2(\omega_*)}, \quad \tilde{\tau}_* = \frac{2}{\tilde{\gamma}_1(\omega_*) + \gamma_2(\omega_*)}, \quad \hat{\tau}_* = \frac{2}{\hat{\gamma}_1(\omega_*, \nu) + \gamma_2(\omega_*)}, \quad (1.23)$$

то для  $\rho$  из (1.4) будем иметь

$$\rho_* = \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}} < \tilde{\rho}_* = \frac{1 - \tilde{\eta}_*}{1 + \tilde{\eta}_*} = \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + \sqrt{\xi}} \leq \hat{\rho}_*(\nu) = \frac{1 - \hat{\eta}_*(\nu)}{1 + \hat{\eta}_*(\nu)}. \quad (1.24)$$

Обратимся к (1.1). Пусть  $\varepsilon > 0$ , а  $m(\varepsilon)$  — число итераций в (1.1), достаточное для выполнения неравенства  $\|z^m\|_D \leq \varepsilon\|z^0\|_D$ . Зафиксируем в (1.1)  $\omega_* = 2/\sqrt{\delta\Delta}$ . Тогда в силу (1.7), (1.24)

$$m_1 = m(\omega_*, \varepsilon) < m_2 = \tilde{m}(\omega_*, \varepsilon) \leq m_3 = \hat{m}(\omega_*, \nu, \varepsilon).$$

Если исходная задача (1.1) плохо обусловлена ( $\xi \ll 1$ ), то

$$\rho_* \simeq 1 - 4\sqrt{\xi}, \quad \tilde{\rho}_* \simeq 1 - 2\sqrt{\xi}, \quad \hat{\rho}_*(\nu = 0, 5) \simeq 1 - \frac{8\sqrt{\xi}}{\delta\Delta} \quad (1.25)$$

и ввиду (1.25)  $m_i$  могут очень сильно различаться.

Подведем некоторые итоги. Переходу от исходной задачи (1) к эквивалентной задаче

$$A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\omega)A^{\frac{1}{2}}u = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\omega)f \longleftrightarrow C(\omega)u = \tilde{f}, \quad u = A^{\frac{1}{2}}x \quad (1.26)$$

соответствует переход от (1.1) к эквивалентному итерационному процессу

$$v^{m+1} = v^m - \tau C(\omega)v^m, \quad C(\omega) = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\omega)A^{\frac{1}{2}}, \quad v^m = A^{\frac{1}{2}}z^m. \quad (1.27)$$

Если, как обычно, через  $\nu(A)$  обозначить спектральное число обусловленности исходной задачи (1):

$$\nu(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)} \leq \frac{\Delta}{\delta} = \frac{1}{\xi}, \quad (1.28)$$

то для числа обусловленности эквивалентной задачи (1.26) будем иметь

$$\nu(C(\omega)) = \frac{\lambda_{\max}C(\omega)}{\lambda_{\min}C(\omega)} = \frac{\lambda_{\max}B^{-1}(\omega)A}{\lambda_{\min}B^{-1}(\omega)A}. \quad (1.29)$$

Сделанный в (1.6) выбор  $\omega_0$  минимизирует верхнюю оценку числа обусловленности задачи (1.26), ибо в соответствии с (1.8), (1.9), (1.29)

$$\nu(C(\omega)) \leq \frac{\gamma_2(\omega)}{\gamma_1(\omega)} = \frac{1}{\eta(\omega)}. \quad (1.30)$$

При этом  $\gamma_1(\omega)$ ,  $\gamma_2(\omega)$  в (1.6), (1.30) следует считать заданными. Качество преобуславливателя  $B(\omega)$  из (4) определяется сравнением (1.30) с (1.28). Оценки (1.12), (1.14) вместе с критерием выбора  $\omega$  из (1.6) задают «оптимальную» верхнюю оценку числа обусловленности задачи (1.26):

$$\nu(C(\omega_*)) \leq \frac{\gamma_2(\omega_*)}{\gamma_1(\omega_*)} = \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}. \quad (1.31)$$

Как уже говорилось, оценка  $\lambda_{\max}C(\omega) \leq \gamma_2(\omega) = 1/2\omega$  неулучшаема. Этого нельзя сказать даже о «хорошей» оценке (1.14):  $\gamma_1(\omega) < \lambda_{\min}C(\omega)$ , ибо по определению констант  $\delta$  и  $\Delta$  из (1.10):

$$\|y\|^2 \leq \frac{1}{\delta}(Ay, y), \quad \|A_2\|^2 \leq \frac{\Delta}{4}(Ay, y),$$

равенства в этих соотношениях реализуются на *разных* элементах  $y \in H$ . Как мы убедились, при заданном в (1.12)  $\gamma_2(\omega)$  оптимальное в смысле критерия (1.6)  $\omega_*$  инвариантно по отношению к оценкам (1.14), (1.20), (1.21) сверху оператора  $B$ . Однако сама оценка (1.30) спектрального числа обусловленности задачи (1.26) тем реалистичнее, чем точнее оценка  $\gamma_1(\omega) < \lambda_{\min}C(\omega)$ . Наиболее точной из вышеприведенных является «хорошая» оценка (1.14). Тогда в соответствии с (1.30)

$$\nu(C(\omega)) \leq \frac{\gamma_2(\omega)}{\gamma_1(\omega)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\omega\delta} + \frac{\omega\Delta}{4} \right)$$

и эффективность критерия (1.6) при выборе оптимального  $\omega_*$  для переобуславливателя  $B(\omega)$  из (4) достаточно убедительно демонстрируют неравенства

$$\begin{aligned} \nu(A) < \frac{1}{\xi}, \quad \nu(C(\omega_* = 2/\sqrt{\delta\Delta})) < \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \\ \nu(C(\omega = 2/\Delta)) < \frac{1 + 2\xi}{2\xi}, \quad \nu(C(\omega = 2/\delta)) < \frac{1 + 2\xi}{2\xi}. \end{aligned} \tag{1.32}$$

Сделанный в (1.6) выбор итерационного параметра  $\tau_0$  минимизирует норму оператора шага  $S = E - \tau C(\omega)$ , согласованную с векторной нормой  $\|\cdot\|_D$ . При этом  $\gamma_1(\omega)$ ,  $\gamma_2(\omega)$  либо  $\tilde{\gamma}_1(\omega)$ ,  $\gamma_2(\omega)$ , либо, наконец,  $\hat{\gamma}_1(\omega)$ ,  $\gamma_2(\omega)$  снова следует считать заданными. Как известно, условие  $\tau\lambda_{\max}C(\omega) \leq 2$  является необходимым и достаточным для сходимости стационарного ПТМ (1)–(4). Поскольку  $\gamma_{\max}C(\omega) \leq \gamma_2(\omega)$ , то при  $\gamma_1(\omega) > 0$ ,  $\tilde{\gamma}_1(\omega) > 0$ ,  $\hat{\gamma}_1(\omega) > 0$  выбор  $\tau$  в соответствии с (1.6) приводит к сходящимся итерационным процессам. Однако скорость сходимости последних, как и реалистичность оценки числа обусловленности задачи (1.26), существенно зависит от точности оценки  $0 < \gamma_1(\omega) < \lambda_{\min}C(\omega)$ . Иллюстрацией этого утверждения могут служить соотношения (1.25). Только что сказанное в полной мере относится и к нестационарному ПТМ

$$B(\omega_*) \frac{x^{k+1} - x^k}{\tau_{k+1}} + Ax^k = f \tag{1.33}$$

с устойчивым чебышевским набором итерационных параметров (1.17). И в этом случае точность оценки (1.18) также существенно зависит от точности оценки  $0 < \gamma_1(\omega) < \lambda_{\min}C(\omega)$ .

Итак, оптимальное  $\omega_*$  из (1.6) инвариантно по отношению к оценке  $0 < \gamma_1(\omega) < \lambda_{\min}C(\omega)$ , оптимальное  $\tau$  из (1.6) подобным свойством не обладает. В такой ситуации представляется совершенно естественным использовать итерационные методы, в которых принцип выбора итерационных параметров  $\tau_k$  не зависит от способа предварительного определения оптимального параметра  $\omega$ . Такие методы существуют — это градиентные итерационные методы (итерационные методы вариационного типа) [3–13].

## § 2. Вариационная оптимизация ПТМ

Пусть в ПТМ (2)–(4) каким-либо образом, возможно, и в соответствии с (1.6) выбран оптимальный параметр  $\omega$ . В нестационарном ПТМ вариационного типа

$$B(\omega) \frac{x^{m+1} - x^m}{\tau_{m+1}} + Ax^m = f \quad (2.1)$$

итерационные параметры  $\tau_{m+1}$  определяются следующим образом:

$$\tau_{m+1} : \min_{\tau_{m+1} > 0} \Phi(z^{m+1}) = \min_{\tau_{m+1} > 0} (Dz^{m+1}, z^{m+1}). \quad (2.2)$$

Обычно предполагается, что в (2.2)  $D = D^* > 0$ . В этом случае функционал  $\Phi(z^m)$  из (2.2) задает в  $H$  норму

$$\Phi(z^m) = \|z^m\|_D^2 = (D^{\frac{1}{2}}z^m, D^{\frac{1}{2}}z^m) = (v^m, v^m) = \|v^m\|^2.$$

Критерий (2.2) вместе с

$$z^{m+1} = z^m - \tau_{m+1}B^{-1}Az^m \quad (2.3)$$

дает [3, с. 333, 334]

$$\tau_{m+1} = \frac{(Cv^m, v^m)}{(Cv^m, Cv^m)}, \quad C = D^{-\frac{1}{2}}(DB^{-1}A)D^{-\frac{1}{2}}, \quad v^m = D^{\frac{1}{2}}z^m \quad (2.4)$$

или

$$\tau_{m+1} = \frac{(Dz^m, w^m)}{(Dw^m, w^m)}, \quad Bw^m = r^m = Ax^m - f. \quad (2.5)$$

В связи с (2.5) сделаем одно общее замечание. Условие  $D = D^* > 0$  само по себе не гарантирует реализуемости итерационного метода (2.1), (2.5), поскольку входящий в (2.5) вектор  $Dz^m$  реально может быть вычислен не при любом выборе  $D$ . В рассматриваемом нами случае  $A = A^* > 0$ ,  $B = B^* > 0$ , поэтому условию  $D = D^* > 0$  с реально вычисляемым вектором  $Dz^m$  удовлетворяют, например, итерационные методы вариационного типа (2.1), (2.5), для которых  $D = A$ : ПТМ скорейшего спуска, где

$$\tau_{m+1} = \frac{(r^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)}, \quad m = 0, 1, \dots, \quad (2.6)$$

либо  $D = AB^{-1}A$ : ПТМ минимальных поправок, тогда

$$\tau_{m+1} = \frac{(Aw^m, w^m)}{(B^{-1}Aw^m, Aw^m)}, \quad m = 0, 1, \dots \quad (2.7)$$

**Теорема 2.1** [3, с. 335]. При  $\omega > 0$  ПТМ скорейшего спуска (2.1), (2.6) и ПТМ минимальных поправок (2.1), (2.7) сходятся. При этом

$$\|z^m\|_D \leq \rho^m(\omega)\|z^0\|_D, \quad \rho(\omega) = \frac{1-\eta}{1+\eta}, \quad \eta = \eta(\omega) = \frac{\lambda_{\min}C(\omega)}{\lambda_{\max}C(\omega)} \quad (2.8)$$

и оператор  $C(\omega) = C^*(\omega) > 0$  определен в (2.4).

Как известно [3, 6, 8], оценка скорости сходимости в (2.8) нелучшаема. С другой стороны, нетрудно убедиться в том, что собственные числа оператора  $C(\omega)$  из (2.4) как при  $D = A$ , так и при  $D = AB^{-1}A$  совпадают с собственными

числами обобщенной спектральной задачи (1.8). Поэтому изложенная в § 1 теория, связанная с нахождением  $\gamma_1(\omega) < \lambda_{\min} C(\omega)$ ,  $\lambda_{\max} C(\omega) \leq \gamma_2(\omega)$ , приводит к оценке  $\rho(\omega)$  из (2.8) сверху. Действительно, так как

$$v^{m+1} = v^m - \tau_{m+1} C(\omega) v^m,$$

то при  $\omega = \omega_*$  и  $\tau \neq \tau_{m+1}$  в силу (2.2) будем иметь

$$\begin{aligned} \|z^{m+1}\|_D = \|v^{m+1}\| &= \|(E - \tau_{m+1} C(\omega_*))v^m\| \leq \|(E - \tau C(\omega_*))v^m\| \\ &\leq \|E - \tau C(\omega_*)\| \|v^m\| = \|S(\omega_*, \tau)\| \|v^m\| = \|S(\omega_*, \tau)\| \|z^m\|_D. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Но  $\gamma_1(\omega_*) < \lambda_{\min} C(\omega_*)$ ,  $\lambda_{\max} C(\omega_*) \leq \gamma_2(\omega_*)$ , следовательно,

$$\frac{1}{\nu(C(\omega_*))} = \eta(\omega_*) = \frac{\lambda_{\min} C(\omega_*)}{\lambda_{\max} C(\omega_*)} > \frac{\gamma_1(\omega_*)}{\gamma_2(\omega_*)} = \eta_* = \frac{2\sqrt{\xi}}{1 + \sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (2.10)$$

Если положить в (2.9)  $\tau = \tau_*$ , где  $\tau_*$  определено в (1.15), то в качестве следствия из (2.9) и теорем 1.1, 1.2 будем иметь

$$\|z^m\|_D < \rho_*^m \|z^0\|_D, \quad \rho_* = \frac{1 - \eta_*}{1 + \eta_*} = \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}} \simeq 1 - 4\sqrt{\xi}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (2.11)$$

Достаточно теперь учесть (2.10), чтобы для  $\rho(\omega_*)$  из (2.8) получить  $\rho(\omega_*) < \rho_*$ .

Скорость убывания функционала  $(Az^{m+1}, z^{m+1})$  в ПТМ скорейшего спуска (2.1), (2.6) и функционала  $(AB^{-1}Az^{m+1}, z^{m+1})$  в ПТМ минимальных поправок (2.1), (2.7) одна и та же. Это связано с тем, что как погрешность  $y_1^{m+1} = z^{m+1}$ , так и поправка  $y_2^{m+1} = w^{m+1}$  при стационарном  $\omega$  удовлетворяют одному и тому же уравнению

$$B(\omega)y_\alpha^{m+1} = B(\omega)y_\alpha^m - \tau_{m+1}Ay_\alpha^m.$$

Если считать  $\omega$  заданным, то с точки зрения вычислительных затрат следует отдать предпочтение ПТМ скорейшего спуска, поскольку в ПТМ минимальных поправок при вычислении  $\tau_{m+1}$  в (2.7) следует дополнительно обращать оператор  $B(\omega)$ . Однако в отличие от (2.1), (2.6) при практическом использовании ПТМ минимальных поправок (2.1), (2.7) возможно непосредственное вычисление минимизируемого функционала  $(w^m, r^m)$ . Это дает возможность в полной мере использовать асимптотическое свойство ПТМ (2.1), (2.7) [3, с 338–340], в том числе и для построения ускоряющих процедур.

Итак, при  $\omega = \omega_*$  скорость сходимости ПТМ скорейшего спуска (2.1), (2.6) и ПТМ минимальных поправок (2.1), (2.7) не хуже, чем у стационарного ПТМ (2)–(4) с оптимальными  $\omega_*$ ,  $\tau_*$  (1.15), но хуже, чем у нестационарного ПТМ с чебышевскими параметрами (1.15), (1.17). Последний «недостаток» легко устранить. Для этого достаточно вместо попеременно-треугольных методов вариационного типа (2.1), (2.6) и (2.1), (2.7) использовать попеременно-треугольные методы сопряженных градиентов (сопряженных направлений). Для определенности остановимся на двухслойном варианте [3, 7, 10, 11]:

$$r^0 = Ax^0 - f, \quad Bw^0 = r^0, \quad \psi_0 = w^0, \tau_1 = \frac{(Dz^0, w^0)}{(D\psi_0, \psi_0)}, \quad x^1 = x^0 - \tau_1 w^0. \quad (2.12)$$

Далее, для  $m > 1$

$$\begin{aligned} r^m &= Ax^m - f, \quad Bw^m = r^m, \\ b_m &= \frac{(Dw^m, z^m)}{(Dw^{m-1}, z^{m-1})}, \quad \psi_m = w^m + b_m \psi_{m-1}, \\ \tau_{m+1} &= \frac{(Dw^m, z^m)}{(D\psi_m, \psi_m)}, \quad x^{m+1} = x^m - \tau_{m+1} \psi_m. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Наряду с теоремой 2.1 основной для дальнейшего является также



**Теорема 2.2** [3, с. 349; 7, 10]. Если  $\omega > 0$ , то ПТМ сопряженных градиентов (2.12), (2.13) сходится как при  $D = A$ , так и при  $D = AB^{-1}A$ . При этом для любого  $m$

$$\|z^m\|_D \leq q_m \|z^0\|_D, \quad q_m = \frac{2\rho_1^m}{1 + \rho_1^{2m}}, \quad \rho_1 = \frac{1 - \sqrt{\eta}}{1 + \sqrt{\eta}}, \quad \eta = \eta(\omega) = \frac{\lambda_{\min} C(\omega)}{\lambda_{\max} C(\omega)}. \quad (2.14)$$

Положим в (2.12)–(2.14)  $\omega = \omega_*$ . Так как

$$\rho_1(\omega_*) = \frac{1 - \sqrt{\eta(\omega_*)}}{1 + \sqrt{\eta(\omega_*)}} < \rho_{1*} = \frac{1 - \sqrt{\eta_*}}{1 + \sqrt{\eta_*}},$$

то с учетом (1.18)

$$q_m(\eta(\omega_*)) - q_m(\eta_*) = 2 \frac{(\rho_1^m(\omega_*) - \rho_{1*}^m)(1 - \rho_1^m(\omega_*)\rho_{1*}^m)}{(1 + \rho_{1*}^{2m})(1 + \rho_1^{2m}(\omega_*))} < 0.$$

Поэтому для ПТМ сопряженных градиентов (2.12), (2.13) теория определения оптимального  $\omega_* = 2/\sqrt{\delta\Delta}$  по априорной информации (1.10) также приводит к оценке сверху на этот раз для  $q_m(\omega_*)$  из (2.14) и теперь

$$q_m(\eta(\omega_*)) = q_m(\omega_*) < q_m(\eta_*) \simeq 2(1 - 2\sqrt{2}\sqrt[4]{\xi})^m. \quad (2.15)$$

### § 3. Адаптивная оптимизация ПТМ

Изложенные выше способы оптимизации ПТМ связаны с априорной спектральной информацией (1.10):

$$\delta E \leq A \leq \Delta E, \quad \delta \leq \lambda_{\min} A, \quad \lambda_{\max} A \leq \Delta.$$

Эта информация вместе с заданными в (1.12), (1.14)  $\gamma_1(\omega)$ ,  $\gamma_2(\omega)$  такими, что

$$\gamma_1(\omega)B(\omega) \leq A \leq \gamma_2(\omega)B(\omega),$$

позволяет найти оптимальное  $\omega_* = 2/\sqrt{\delta\Delta}$ , которое минимизирует одну из возможных оценок сверху спектрального числа обусловленности  $\nu(C(\omega))$  оператора  $C(\omega)$  в задаче

$$v^{m+1} = v^m - \tau_{m+1}C(\omega)v^m, \quad v^m = D^{\frac{1}{2}}z^m, \quad C(\omega) = D^{-\frac{1}{2}}(DB^{-1}(\omega)A)D^{-\frac{1}{2}}. \quad (3.1)$$

В дальнейшем, если не оговорено противное, положим  $D = A$ , так что в (3.1)

$$C(\omega) = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\omega)A^{\frac{1}{2}}, \quad \tau_{m+1} = \frac{(r^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)}. \quad (3.2)$$

При этом

$$\nu(C(\omega_*)) = \frac{\lambda_{\max} C(\omega_*)}{\lambda_{\min} C(\omega_*)} < \frac{\gamma_2(\omega_*)}{\gamma_1(\omega_*)} = \frac{1}{\eta_*} = \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (3.3)$$

Изучаемые далее способы определения оптимальных  $\hat{\omega}_m$ , как и в (3.3), свяжем с минимизацией оценки сверху спектрального числа обусловленности оператора  $C(\hat{\omega}_m)$ . Будет показано, что существуют такие  $\hat{\omega}_m$ , для которых

$$\nu(C(\hat{\omega}_m)) < \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad (3.4)$$

однако для фактического вычисления  $\widehat{\omega}_m$  априорной информации (1.10) не требуется.

Пусть

$$C(\omega_m)\psi_{im} = \lambda_{im}\psi_{im}. \quad (3.5)$$

Если это не вызывает недоразумений, то в дальнейшем для упрощения записи часть индексов может быть опущена. Очевидно, что собственные числа спектральной задачи (3.5) совпадают с собственными числами обобщенной спектральной задачи

$$A\varphi_i = \lambda_i B(\omega_m)\varphi_i \quad (3.6)$$

и, кроме того,  $\psi_i = A^{\frac{1}{2}}\varphi_i$ . Известно [3, с. 337], что если в ПТМ скорейшего спуска (2.1), (2.6) при стационарном  $\omega$  выбрать такое начальное приближение  $x^0$ , для которого  $v^0 = A^{\frac{1}{2}}z^0 = \psi_i$ , то  $v^1 = 0$ , т. е.  $x^1 = x$ , где  $Ax = f$ .

Покажем, что аналогичное свойство справедливо и для ПТМ (2.1), (2.6) при нестационарном  $\omega_m > 0$ . Обратимся, как и в (1.19), к тождеству

$$B(\omega_m) = \widetilde{B}(\omega_m) + 2\omega_m A, \quad \widetilde{B}(\omega_m) = (E - \omega_m A_1)(E - \omega_m A_2) = \widetilde{B}^*(\omega_m),$$

из которого вытекает, что

$$B(\omega_m)z^{m+1} = \widetilde{B}(\omega_m)z^m + (2\omega_m - \tau_{m+1})Az^m. \quad (3.7)$$

Если в (3.7)  $z^0 \in \ker \widetilde{B}(\omega_0)$ , то выбор  $\tau_1 = 2\omega_0$  приводит к  $B(\omega_0)z^1 = 0$ , что равносильно  $z^1 = 0$ ,  $x^1 = x$ .

Сходимость за одну итерацию:  $x^1 = x$  в ПТМ (2.1), (2.6) при стационарном  $\omega = \omega_m$  и нестационарном  $\omega_m$ , с формальной точки зрения реализуется в двух различных случаях: либо  $v^0 = \psi_i$ , либо  $z^0 \in \ker \widetilde{B}(\omega_0)$  и  $\tau_1 = 2\omega_0$ . На самом деле эти случаи совпадают. Действительно, если  $v^0 = \psi_i$ , то в силу (2.6)  $\tau_1 = 1/\lambda_i$ , где  $\lambda_i$  — собственное число обобщенной спектральной задачи (3.6) при  $\omega = \omega_0$ . Если в этой задаче воспользоваться тождеством (1.11), то

$$A\varphi_i = \lambda_i B(\omega_0)\varphi_i = \lambda_i \widetilde{B}(\omega_0)\varphi_i + 2\omega_0 \lambda_i A\varphi_i.$$

Значит, если  $2\omega_0 \lambda_i = 1$ , то  $\varphi_i \in \ker \widetilde{B}(\frac{1}{2\lambda_i})$ , а условие  $2\omega_0 = \tau_1$  приводится к виду  $\tau_1 = 1/\lambda_i$ . И, наконец, следует принять во внимание, что  $v^0 = A^{\frac{1}{2}}z^0$ ,  $\psi_i = A^{\frac{1}{2}}\varphi_i$ .

Итак, для попеременно-треугольного метода скорейшего спуска при нестационарном  $\omega$  имеем

$$B(\omega_m)\frac{x^{m+1} - x^m}{\tau_{m+1}} + Ax^m = f. \quad (3.8)$$

Соотношение (3.8), как и в случае стационарного  $\omega$ , можно переписать следующим образом:

$$v^{m+1} = (E - \tau_{m+1}C(\omega_m))v^m, \quad C(\omega_m) = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\omega_m)A^{\frac{1}{2}}, \quad v^m = A^{\frac{1}{2}}z^m.$$

В соответствии с (2.8) скорость сходимости ПТМ (3.8) при  $\tau_{m+1}$  из (3.2) определяется спектральным числом обусловленности

$$\nu(C(\omega_m)) = \frac{\lambda_{\max}C(\omega_m)}{\lambda_{\min}C(\omega_m)} = \frac{\lambda_{\max}(B^{-1}(\omega_m)A)}{\lambda_{\min}B^{-1}(\omega_m)A}.$$

Теперь опять заметим, что оценка (1.12)  $B(\omega_m) \geq 2\omega_m A$  неуплучшаема, ибо на элементах ядра оператора  $\widetilde{B}(\omega_m)$  имеем  $B(\omega_m) = 2\omega_m A$ . Поэтому  $\lambda_{\max}C(\omega_m) \leq 1/2\omega_m$ , как и в случае стационарного  $\omega$ . Кроме того, по определению

$$\lambda_{\min}C(\omega_m) = \lambda_{\min}(B^{-1}(\omega_m)A) = \min_{y^m \neq 0} \frac{(Ay^m, y^m)}{(B(\omega_m)y^m, y^m)}.$$

Здесь и далее  $y^m \in H_m \subset H$ . О принципах выбора  $H_m$  речь пойдет ниже, а пока можно считать, что  $y^m \in H$ . Итак, мы приходим к основной оценке для  $\nu(C(\omega_m))$ :

$$\nu(C(\omega_m)) \leq \max_{y^m \neq 0} N(\omega_m, y^m) = \max_{y^m \neq 0} \frac{(B(\omega_m)y^m, y^m)}{2\omega_m(Ay^m, y^m)}. \quad (3.9)$$

**Лемма 1.** Если  $y \in H$ ,  $y \neq 0$  и  $\hat{\omega}: \min_{\omega > 0} N(\omega, y)$ , то

$$\hat{\omega} = \frac{\|y\|}{\|A_2y\|}. \quad (3.10)$$

Доказательство практически очевидно. Пусть  $a = \|y\|^2$ ,  $b = (Ay, y)$ ,  $c = \|A_2y\|^2$ . Тогда

$$\begin{aligned} N(\omega, y) &= \frac{a + b\omega + c\omega^2}{2\omega b} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2b} \left( \frac{a}{\omega} + c\omega \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{ac}}{2b} \left( \frac{a}{\omega\sqrt{ac}} + \frac{c\omega}{\sqrt{ac}} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4\beta} \left( \frac{\alpha}{\omega} + \frac{\omega}{\alpha} \right), \end{aligned} \quad (3.11)$$

где положено

$$\beta(y) = \frac{b}{2\sqrt{ac}} = \frac{(Ay, y)}{2\|y\| \|A_2y\|}, \quad \alpha(y) = \sqrt{\frac{a}{c}} = \frac{\|y\|}{\|A_2y\|}. \quad (3.12)$$

Теперь остается учесть, что  $(\alpha/\omega + \omega/\alpha) \geq 2$ .

**Лемма 2.** Если  $y \in H$  и  $y \neq 0$ , то

$$\min_{\omega > 0} N(\omega, y) = N(\hat{\omega}, y) = \frac{1 + \beta}{2\beta} = g(\beta). \quad (3.13)$$

**Лемма 3.** Если  $y \in H$  и  $y \neq 0$ , то для  $\beta(y)$  из (3.12) справедливы неравенства

$$\sqrt{\xi} \leq \beta(y) \leq 1, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (3.14)$$

Действительно, достаточно учесть определение констант  $\delta$  и  $\Delta$  в (1.10), чтобы получить

$$\beta(y) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(Ay, y)}{(y, y)}} \cdot \sqrt{\frac{(Ay, y)}{(A_1A_2y, y)}} \geq \frac{1}{2} \sqrt{\delta} \frac{2}{\sqrt{\Delta}} = \sqrt{\xi}.$$

С другой стороны, поскольку  $(Ay, y) = 2(A_2y, y)$ , то применение неравенства Коши — Буняковского дает

$$\beta(y) = \frac{(Ay, y)}{2\|y\| \|A_2y\|} = \frac{2(A_2y, y)}{2\|y\| \|A_2y\|} \leq \frac{\|y\| \|A_2y\|}{\|y\| \|A_2y\|} = 1.$$

**Лемма 4.** Если  $y^m \in H$  и  $y^m \neq 0$ , то

$$\max_{y^m \neq 0} \min_{\omega_m > 0} N(\omega_m, y^m) = \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (3.15)$$

В самом деле, из (3.14) заключаем, что областью определения функции  $g(\beta)$  из (3.13) является интервал:  $\beta \in [\sqrt{\xi}, 1]$ . Поэтому (3.15) вытекает из  $g'_\beta < 0$  и леммы 2.

Из (3.9) и (3.15) следует, что справедлива

**Лемма 5.** Если  $y^m \in H$ ,  $y^m \neq 0$ , то

$$\nu \left( C \left( \hat{\omega}_m = \frac{\|y^m\|}{\|A_2 y^m\|} \right) \right) \leq \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (3.16)$$

При получении оценки сверху (3.16) спектрального числа обусловленности  $\nu(C(\hat{\omega}_m))$  не требуется априорной информации (1.10). Однако нужно указать способ определения (вычисления) последовательности  $y^m$ . Конкретный выбор  $y^m$  означает, что оценка функционала  $N(\omega_m, y^m)$  проводится на элементах  $y^m$ . Тем самым задание  $y^m$  при  $D = A$  порождает ПТМ скорейшего спуска:

$$\begin{aligned} r^m &= Ax^m - f, \quad y^m \text{ заданы,} \quad \hat{\omega}_m = \frac{\|y^m\|}{\|A_2 y^m\|}, \quad B(\hat{\omega}_m)w^m = r^m, \\ \tau_{m+1} &= \frac{(r^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)}, \quad x^{m+1} = x^m - \tau_{m+1}w^m. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Прежде чем говорить о скорости сходимости ПТМ (3.17) и других подобных методов, еще раз отметим следующее. Если известна априорная информация (1.10):  $\delta a \leq b$  и  $4c \leq \Delta b$ , то вместо (3.15) будем иметь

$$\min_{\omega > 0} \max_{y \neq 0} N(\omega, y) = \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}, \quad \omega_* = \frac{2}{\sqrt{\delta\Delta}}. \quad (3.18)$$

Действительно (сравни с (3.11)),

$$N(\omega, y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2b} \left( \frac{a}{\omega} + c\omega \right) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{\xi}} \left( \frac{\omega_*}{\omega} + \frac{\omega}{\omega_*} \right), \quad \omega_* = \frac{2}{\sqrt{\delta\Delta}}, \quad (3.19)$$

и остается заметить, что  $(\omega_*/\omega + \omega/\omega_*) \geq 2$ . Из (3.19) вытекает, что

$$\nu(C(\omega = \omega_* = 2/\sqrt{\delta\Delta})) \leq \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (3.20)$$

Оценка (3.20) остается справедливой и в тех случаях, когда априори известна лишь часть информации (1.10). Пусть, например, задана константа  $\delta$  из операторного неравенства  $\delta E \leq A$ . Тогда

$$N(\omega, y) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{\xi}} \left( \frac{\omega_1}{\omega} + \frac{\omega}{\omega_1} \right), \quad \omega_1 = \frac{\|y\|_A}{\sqrt{\delta\|A_2 y\|}}. \quad (3.21)$$

Если же известна лишь константа  $\Delta$  из операторного неравенства  $4A_1 A_2 \leq \Delta A$ , то

$$N(\omega, y) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4\sqrt{\xi}} \left( \frac{\omega_2}{\omega} + \frac{\omega}{\omega_2} \right), \quad \omega_2 = \frac{2\|y\|}{\sqrt{\Delta\|y\|_A}}. \quad (3.22)$$

В обоих случаях оценка (3.20) сохраняется:

$$\nu(C(\hat{\omega}_m = \omega_{1m})) \leq \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}, \quad \nu(C(\hat{\omega}_m = \omega_{2m})) \leq \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}}. \quad (3.23)$$

Тем самым мы приходим к адаптивному ПТМ скорейшего спуска (2.4), (2.6), в котором определение  $\omega_m$  происходит в соответствии с имеющейся априорной информацией:

$$r^m = Ax^m - f, \quad y^m \text{ заданы,}$$

$$\omega_m = \begin{cases} 2/\sqrt{\delta\Delta}, & \text{если известны } \delta \text{ и } \Delta; \\ \|y^m\|_A/\sqrt{\delta}\|A_2y^m\|, & \text{если известно } \delta; \\ 2\|y^m\|/\sqrt{\Delta}\|y^m\|_A, & \text{если известно } \Delta; \\ \|y^m\|/\|A_2y^m\|, & \text{если априорной информации нет.} \end{cases} \quad (3.24)$$

$$B(\omega_m)w^m = r^m, \quad \tau_{m+1} = \frac{(r^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)}, \quad x^{m+1} = x^m - \tau_{m+1}w^m.$$

Отметим, что при  $D = A$  и  $\omega_m$  из (3.24) задание  $y^m$  вместе с (2.12), (2.13) определяет один из вариантов адаптивного ПТМ сопряженных градиентов.

#### § 4. Сходимость адаптивного ПТМ скорейшего спуска

Предварительно дадим некоторые комментарии относительно сделанного в (3.10) выбора  $\hat{\omega}(y)$ . Как нетрудно убедиться, справедливо тождество

$$\begin{aligned} (By, y) &= \|y\|^2 + \omega(Ay, y) + \omega^2\|A_2y\|^2 = a + \omega b + \omega^2 c \\ &= (\sqrt{a} - \omega\sqrt{c})^2 + \omega b + 2\omega\sqrt{ac} = (\sqrt{a} - \omega\sqrt{c})^2 + \omega b \frac{1 + \beta(y)}{\beta(y)}. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Здесь  $\beta(y)$  определено в (3.12) и в соответствии с леммой 3 из (4.1) вытекает, что

$$\begin{aligned} (By, y) &\geq (\|y\| - \omega\|A_2y\|)^2 + 2\omega(Ay, y), \\ (By, y) &\leq (\|y\| - \omega\|A_2y\|)^2 + \omega(Ay, y) \frac{1 + \sqrt{\xi}}{\sqrt{\xi}}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Поэтому при  $\omega(y) = \hat{\omega}(y) = \|y\|/\|A_2y\|$  из (4.2) получаем

$$\begin{aligned} \gamma_1(y)(B(\hat{\omega})y, y) &\leq (Ay, y) \leq \gamma_2(y)(B(\hat{\omega})y, y), \\ \gamma_1(y) &= \frac{\sqrt{\xi}}{(1 + \sqrt{\xi})\hat{\omega}(y)}, \quad \gamma_2(y) = \frac{1}{2\hat{\omega}(y)}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

С другой стороны, при заданной априорной информации (1.10) теория оптимизации ПТМ из § 1, связанная с нахождением  $\min \max N(\omega, y)$ , приводит к (1.15):

$$\gamma_1(\omega_*)(B(\omega_*)y, y) \leq (Ay, y) \leq \gamma_2(\omega_*)(B(\omega_*)y, y). \quad (4.4)$$

Как легко проверить, (4.4) можно представить и в виде

$$\frac{\sqrt{\xi}}{(1 + \sqrt{\xi})\omega_*}(B(\omega_*)y, y) \leq (Ay, y) \leq \frac{1}{2\omega_*}(B(\omega_*)y, y). \quad (4.5)$$

Из (4.3)–(4.5) следует, что

$$\gamma_1(y)\hat{\omega}(y) = \gamma_1(\omega_*)\omega_*, \quad \gamma_2(y)\hat{\omega}(y) = \gamma_2(\omega_*)\omega_*.$$

Поэтому для  $C(\omega_*)$  из (3.2)

$$\lambda_{\min}(C(\omega_*)) \geq \gamma_1(\omega_*) = \gamma_1(y) \frac{\hat{\omega}(y)}{\omega_*}, \quad \lambda_{\max}(C(\omega_*)) \leq \gamma_2(\omega_*) = \gamma_2(y) \frac{\hat{\omega}(y)}{\omega_*} \quad (4.6)$$

и, кроме того,

$$\nu(C(\omega_*)) = \frac{\lambda_{\max}(C(\omega_*))}{\lambda_{\min}(C(\omega_*))} \leq \frac{\gamma_2(\omega_*)}{\gamma_1(\omega_*)} = \frac{1 + \sqrt{\xi}}{2\sqrt{\xi}} = \frac{\gamma_2(y)}{\gamma_1(y)}. \quad (4.7)$$

Оценки (4.3) и (4.4) имеют принципиально различный характер. Так как  $\gamma_\alpha(\omega_*)$  не зависят от  $y$ , оценка (4.4) справедлива для всех элементов  $y \in H$ ,  $y \neq 0$ . В то же время оценка (4.3) имеет место для конкретного элемента  $y \in H$ ,  $y \neq 0$ , поскольку в (4.3)  $\gamma_\alpha = \gamma_\alpha(y)$ . Тем не менее для оценки  $\nu(C(\omega_*))$  можно использовать не  $\gamma_\alpha(\omega_*)$ , а  $\gamma_\alpha(y)$ . Именно этот факт и послужил основным наводящим соображением при получении оценок сверху (3.16), (3.21), (3.22) для  $\nu(C(\hat{\omega}))$ .

**Лемма 6.** Если  $\widehat{\omega}(y)$  определено в (3.10), а константы  $\delta, \Delta$  в (1.10), то для любого  $y \in H, y \neq 0$

$$\frac{2}{\Delta} \leq \widehat{\omega}(y) \leq \frac{2}{\delta}. \quad (4.8)$$

Действительно, из неравенства Коши — Буняковского, (3) и (1.10) получаем

$$\delta \|y\|^2 \leq (Ay, y) = 2(A_2y, y) \leq 2\|A_2y\| \|y\|.$$

Неравенство  $\widehat{\omega}(y) \leq 2/\delta$  в (4.8) вытекает теперь из (3.10). Неравенство  $2/\Delta \leq \widehat{\omega}(y)$  в (4.8) является следствием (3), (1.10) и (3.10), поскольку

$$\widehat{\omega}^2(y) = \frac{\|y\|^2}{\|A_2y\|^2} = \frac{(Ay, y)}{(A_1A_2y, y)} \cdot \frac{\|y\|^2}{(Ay, y)} \geq \frac{4\|y\|^2}{\Delta(Ay, y)} \geq \frac{4}{\Delta^2}.$$

Оценки (4.8) леммы 6 можно уточнить. Пусть  $\mu_i$  — собственные числа, а  $p_i$  — собственные элементы спектральной задачи

$$Ap_i = \mu_i p_i, \quad \delta = \mu_{\min}(A) = \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_{n-1} < \mu_n = \mu_{\max}(A) = \Delta. \quad (4.9)$$

Если ввести обозначение  $\widehat{\omega}_i = \widehat{\omega}(p_i)$ , то

$$\widehat{\omega}_i^2 = \frac{\|p_i\|^2}{(Ap_i, p_i)} \cdot \frac{(Ap_i, p_i)}{(A_1A_2p_i, p_i)} \geq \frac{4}{\mu_1\mu_n}.$$

Кроме того,  $\mu_i \|p_i\|^2 = 2(A_2p_i, p_i) \leq 2\|A_2p_i\| \|p_i\|$ . Поэтому вместо (4.8) будем иметь

$$\frac{2}{\sqrt{\mu_i\mu_n}} \leq \widehat{\omega}_i \leq \frac{2}{\mu_i}. \quad (4.10)$$

Это означает, что для  $\omega_*$  справедлива

**Лемма 7.** Если  $\nu(A)$  — спектральное число обусловленности оператора  $A$ , а  $\mu_j$  — наименьшее из  $\mu_i$ , для которых выполнено условие  $\sqrt{\nu(A)} < \mu_i/\mu_1$ , то

$$\widehat{\omega}(p_i) = \widehat{\omega}_i < \omega_* < \widehat{\omega}(p_1), \quad i \geq j. \quad (4.11)$$

При доказательстве справедливости (4.11) следует использовать (4.10) и учесть равносильность неравенств

$$\frac{2}{\mu_j} < \frac{2}{\sqrt{\mu_1\mu_n}} = \omega_* \iff \sqrt{\nu(A)} < \sqrt{\mu_j\mu_1}.$$

Дальнейшую локализацию  $\omega_*$  свяжем с функционалами (3.21), (3.22).

**Лемма 8.** Если  $\omega_1(y), \omega_2(y)$  определены соответственно в (3.21), (3.22), то для любого  $y \in H, y \neq 0$ ,

$$\omega_2(y) \leq \omega_* \leq \omega_1(y). \quad (4.12)$$

Действительно, по определению

$$\omega_1(y) = \frac{\|y\|_A}{\sqrt{\delta}\|A_2y\|} = \frac{1}{\sqrt{\delta}} \sqrt{\frac{(Ay, y)}{(A_1A_2y, y)}} \geq \frac{2}{\sqrt{\delta}\Delta} = \omega_*,$$

$$\omega_2(y) = \frac{2\|y\|}{\sqrt{\Delta}\|y\|_A} = \frac{2}{\sqrt{\Delta}} \sqrt{\frac{(y, y)}{(Ay, y)}} \leq \frac{2}{\sqrt{\delta}\Delta} = \omega_*.$$

В качестве следствия из (4.9) и (4.12) имеем

$$\frac{2}{\Delta} = \omega_2(p_n) < \dots < \omega_2(p_2) < \omega_2(p_1) = \frac{2}{\sqrt{\delta}\Delta} = \omega_* \leq \omega_1(p_i). \quad (4.13)$$

В [2, гл. 8; 9, гл. 15] при оценке скорости сходимости итерационных методов вариационного типа применяется следующий прием. Исследуемый метод сравнивается с другим, «эталонным», скорость сходимости которого заведомо известна. Этот же прием использован в §2 при получении оценки (2.11) (см. цепочку преобразований (2.9)). Для ПТМ скорейшего спуска (3.17) естественно было бы использовать в качестве эталонного нестационарный ПТМ

$$B(\widehat{\omega}_m) \frac{x^{m+1} - x^m}{\widehat{\tau}_{m+1}} + Ax^m = f, \quad y^m \text{ заданы,} \quad (4.14)$$

$$\widehat{\omega}_m = \frac{\|y^m\|}{\|A_2 y^m\|}, \quad \widehat{\tau}_{m+1} = \tau_{m+1}(y^m) = \frac{2}{\gamma_1(y^m) + \gamma_2(y^m)}.$$

Если в (4.14) использовать  $\gamma_1(y^m), \gamma_2(y^m)$  из (4.3), то (сравни с (1.15))

$$\widehat{\tau}_{m+1} = 4\widehat{\omega}_m \frac{1 + \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}}. \quad (4.15)$$

Если же в соответствии с леммой 1 определить  $\beta(y^m)$  и положить

$$\widetilde{\gamma}_1(y^m) = \frac{\beta(y^m)}{(1 + \beta(y^m))\widehat{\omega}_m}, \quad \widetilde{\gamma}_2(y^m) = \frac{1}{2\widehat{\omega}_m}, \quad (4.16)$$

то тогда в (4.14)

$$\widehat{\tau}_{m+1} = 4\widehat{\omega}_m \frac{1 + \beta(y^m)}{1 + 3\beta(y^m)}. \quad (4.17)$$

В отличие от (4.14), (4.15) нестационарный эталонный ПТМ (4.14), (4.17) допускает численную реализацию и при отсутствии априорной информации (1.10).

Оба эталонных метода: (4.14), (4.15) и (4.14), (4.17), являются сходящимися. В самом деле, в (4.14)  $A = A^* > 0$ ,  $B(\widehat{\omega}_m) = B^*(\widehat{\omega}_m) > 0$ . Поэтому условие  $B(\widehat{\omega}_m) > 0.5\widehat{\tau}_{m+1}A$  является необходимым и достаточным для сходимости ПТМ (4.14)–(4.17). Заметим, что это условие с помощью тождества (1.11) и формул (4.15), (4.17) для  $\widehat{\tau}_{m+1}$  преобразуется к неравенствам

$$\begin{aligned} (\widetilde{B}(\widehat{\omega}_m)y^m, y^m) + \frac{4\widehat{\omega}_m\beta(y^m)}{1 + 3\beta(y^m)}(Ay^m, y^m) \\ \geq (\widetilde{B}(\widehat{\omega}_m)y^m, y^m) + \frac{4\widehat{\omega}_m\sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}}(Ay^m, y^m) > 0, \end{aligned}$$

справедливость которых очевидна.

Пусть  $\gamma_\alpha(\omega_*)$ ,  $\tau_*$  определены в (1.15), а  $\gamma_\alpha(y^m)$ ,  $\widehat{\tau}_{m+1}$  — в (4.3), (4.15). Отношение  $\gamma_1(y^m)/\gamma_2(y^m)$  является инвариантом и, как отмечено в (4.7), может быть использовано для оценки  $\nu(C(\omega_*))$ . Так как

$$\tau_*\gamma_\alpha(\omega_*) = \widehat{\tau}_{m+1} \frac{\omega_*}{\widehat{\omega}_m} \gamma_\alpha(y^m) \frac{\widehat{\omega}_m}{\omega_*} = \widehat{\tau}_{m+1} \gamma_\alpha(y^m),$$

то инварианты  $\widehat{\tau}_{m+1}\gamma_\alpha(y^m)$  можно использовать для вычисления  $\rho_*$ , указанного в теореме 1.2:

$$1 - \rho_* = \tau_*\gamma_1(\omega_*), \quad 1 + \rho_* = \tau_*\gamma_2(\omega_*), \quad \|S(\omega_*)\| = \|E - \tau_*C(\omega_*)\| \leq \rho_*.$$

Однако на этом формальное сходство между  $\gamma_\alpha(\omega_*)$  и  $\gamma_\alpha(y^m)$  заканчивается. В самом деле,

$$\gamma_1(y) = \gamma_1(\omega_*) \frac{\omega_*}{\widehat{\omega}(y)}, \quad \gamma_2(y) = \gamma_2(\omega_*) \frac{\omega_*}{\widehat{\omega}(y)}. \quad (4.18)$$

Из (4.11), (4.18) вытекает, что равномерные оценки в (4.3):  $\gamma_1(y) \leq \lambda_{\min}(C(\widehat{\omega}))$ ,  $\gamma_2(y) \geq \lambda_{\max}(C(\widehat{\omega}))$ , реализуются, вообще говоря, на разных элементах  $y \in H$ . Именно в этом и заключается основная трудность при использовании теории из §1 для получения реалистичных оценок скорости сходимости эталонного ПТМ (4.14), (4.15). Поясним сказанное. Разумеется, с помощью леммы 6 не составляет труда получить нужные равномерные оценки для функционалов  $\gamma_\alpha(y)$  из (4.3)

$$\gamma_1(y) \geq \frac{\delta(1 + \sqrt{\xi})}{4\sqrt{\xi}}, \quad \gamma_2(y) \leq \frac{\Delta}{4}.$$

Для эталонного ПТМ (4.14), (4.15) теория из §1 в этом случае дает

$$\rho(\widehat{\omega}) > \rho(\omega = 0), \quad \rho(\widehat{\omega}) > \rho(\omega = 2/\Delta), \quad \rho(\widehat{\omega}) > \rho(\omega_*), \quad \rho(\widehat{\omega}) > \rho(\omega = 2/\delta). \quad (4.19)$$

Сравнение (4.19) с (1.16), (1.25) и (1.32) делает дальнейшие комментарии излишними. Аналогичные трудности возникают и для эталонного ПТМ (4.14), (4.17). Поэтому исследование скорости сходимости ПТМ скорейшего спуска (3.17) свяжем с непосредственной оценкой скорости убывания минимизируемого в (3.17) функционала  $\|z^{m+1}\|_A^2$ . Основной при таком подходе является следующая

**Лемма 9** [14, с. 81; 15, с. 57, 213]. *Если  $C = C^* > 0$  и  $\nu = \nu(C)$  — спектральное число обусловленности оператора  $C$ , то для любого  $y \in H$ ,  $y \neq 0$ ,*

$$(Cy, y)(C^{-1}y, y) \leq \frac{1}{4}(\nu^{\frac{1}{2}} + \nu^{-\frac{1}{2}})^2(y, y)^2. \quad (4.20)$$

Начиная с [5] неравенство (4.20) обычно используется при оценках скорости сходимости итерационных методов вариационного типа. В этой связи о (4.20) иногда говорят как о неравенстве Л. В. Канторовича [16, с. 527, 528]. Приводимые в [5, 6] доказательства леммы основаны на следующих разложениях:

$$y = \sum_i a_i \psi_i, \quad C\psi_i = \lambda_i \psi_i, \quad (\psi_i, \psi_j) = \delta_{i,j},$$

$$(y, y) = \sum_i a_i^2, \quad (Cy, y) = \sum_i a_i^2 \lambda_i, \quad (C^{-1}y, y) = \sum_i a_i^2 \frac{1}{\lambda_i}.$$

Далее следует положить  $\alpha = \sqrt{\lambda_{\min}(C)\lambda_{\max}(C)}$ . Тогда

$$(Cy, y)(C^{-1}y, y) = \left(\frac{1}{\alpha} \sum_i a_i^2 \lambda_i\right) \left(\alpha \sum_i a_i^2 \frac{1}{\lambda_i}\right) \leq \frac{1}{4} \left[\sum_i a_i^2 \left(q_i + \frac{1}{q_i}\right)\right]^2.$$

Здесь  $\alpha q_i = \lambda_i$  и поэтому  $\nu^{-\frac{1}{2}} \leq q_i \leq \nu^{\frac{1}{2}}$ . Теперь остается заметить, что если  $f(q) = q + q^{-1}$ , то  $\max f(q) = f(\nu^{\frac{1}{2}}) = f(\nu^{-\frac{1}{2}})$ .

Для полного описания ПТМ (3.17) и (3.24) следует задать последовательность  $y^m$ , которая определяет  $\widehat{\omega}_m, B(\widehat{\omega}_m)$  и на элементах которой справедливы оценки (3.18)–(3.23). Если попытаться построить  $y^m \rightarrow y_*$ ,  $\widehat{\omega}(y_*) = \omega_*$ , то в силу лемм 7, 8 это потребует большей, чем в (1.10), априорной информации. Построение  $\omega_m \rightarrow \omega_*$  [3, с. 400–402] требует дополнительного обоснования асимптотического свойства для нестационарного ПТМ (3.8). Остановимся на следующем варианте.



**Лемма 10.** Если в (3.17)  $y^m = w^m = B^{-1}(\widehat{\omega}_m)r^m$ , то

$$\tau_{m+1} = \widehat{\omega}_m + 2 \frac{\|w^m\|^2}{(Aw^m, w^m)}. \quad (4.21)$$

Доказательство очевидно, поскольку по определению  $\tau_{m+1}$  имеем

$$\tau_{m+1} = \frac{(r^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)} = \frac{(B(\widehat{\omega}_m)w^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)} = \frac{2\|w^m\|^2 + \widehat{\omega}_m(Aw^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)}.$$

Практическое значение леммы 10 для ПТМ скорейшего спуска (3.17) трудно переоценить. Действительно, оптимальные параметры  $\widehat{\omega}_m$  и  $\tau_{m+1}$  в (3.17) выбираются исходя из разных принципов. Параметр  $\widehat{\omega}_m$  минимизирует спектральное число обусловленности оператора  $C(\omega_m)$  или, что то же самое, спектральное число обусловленности задачи  $C(\omega_m)v = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\omega_m)f$ ,  $v = A^{\frac{1}{2}}x$ , которая эквивалентна исходной задаче (1). Параметр  $\tau_{m+1}$  минимизирует функционал погрешности  $J(x^{m+1})$ , так как

$$\|z^{m+1}\|_A^2 = \|x^{m+1}\|_A^2 - 2(x^{m+1}, f) + \|f\|_{A^{-1}}^2 = J(x^{m+1}) + \|f\|_{A^{-1}}^2.$$

Но именно при  $y^m = w^m$  эти формально независимые параметры связаны линейным соотношением (4.21). Другая (эквивалентная) форма записи тождества (4.21)

$$\tau_{m+1}(\widehat{\omega}_m, w^m) = 2\widehat{\omega}_m N(\widehat{\omega}_m, w^m) = \widehat{\omega}_m \frac{1 + \beta(w^m)}{\beta(w^m)}$$

использовалась в §3 при получении оценок (3.16), (3.23). На основе леммы 10 могут быть также построены и различные алгоритмы, реализующие (3.17), (4.21). Зададим  $x^m, \omega_m$ , где  $\omega_0 = \|f\|/\|A_2f\|$ . Тогда

$$\begin{aligned} r^m &= Ax^m - f, & B(\omega_m)w^m &= r^m, \\ \widehat{\omega}_m &= \frac{\|w^m\|}{\|A_2w^m\|}, & \tau_{m+1} &= \widehat{\omega}_m + \frac{\|w^m\|^2}{(A_2w^m, w^m)}, \\ x^{m+1} &= x^m - \tau_{m+1}w^m, & \omega_{m+1} &= \widehat{\omega}_m. \end{aligned} \quad (4.22)$$

Одна из возможных модификаций (4.22) связана с изменением порядка определения параметров  $\widehat{\omega}_m, \tau_{m+1}$ . Например,  $x^m \rightarrow r^m \rightarrow w^m$ . Затем

$$\tau_{m+1} = \frac{(r^m, w^m)}{(Aw^m, w^m)}, \quad \widehat{\omega}_m = \tau_{m+1} - \frac{2\|w^m\|^2}{(Aw^m, w^m)}. \quad (4.23)$$

Далее, как в (4.22). Сразу же отметим, что если на переходе  $x^m \rightarrow x^{m+1}$  используется указанный в (4.22) порядок  $\widehat{\omega}_m \rightarrow \tau_{m+1}$ , то на переходе  $x^{m+1} \rightarrow x^{m+2}$  целесообразно применять предписанный в (4.23) порядок  $\tau_{m+2} \rightarrow \widehat{\omega}_{m+1}$ . Возможна также модификация, связанная с последовательным использованием порядков  $\tau \rightarrow \widehat{\omega}$  из (4.23) и  $\widehat{\omega} \rightarrow \tau$  из (4.22) на переходе  $x^m \rightarrow x^{m+1}$ . В этом случае

$$\begin{aligned} r^m &= Ax^m - f, & B(\omega_m)w_1^m &= r^m, & \tau_{m+1,1} &= \frac{(r^m, w_1^m)}{(Aw_1^m, w_1^m)}, \\ \omega_{m,1} &= \tau_{m+1,1} - \frac{2\|w_1^m\|^2}{(Aw_1^m, w_1^m)}, & B(\omega_{m,1})w^m &= r^m, & \widehat{\omega}_m &= \frac{\|w^m\|^2}{\|A_2w^m\|}, \\ \tau_{m+1} &= \widehat{\omega}_m + \frac{\|w^m\|^2}{(A_2w^m, w^m)}, & x^{m+1} &= x^m - \tau_{m+1}w^m, & \omega_{m+1} &= \widehat{\omega}_m. \end{aligned} \quad (4.24)$$

Вычислительные затраты реализации (4.24) ПТМ скорейшего спуска (3.17), (4.21) существенно превышают соответствующие затраты реализаций (4.22), (4.23). Однако вычислительный процесс (4.24) допускает внутренний контроль, например, с помощью величины  $\delta\omega_j = |\omega_{j,1} - \hat{\omega}_j|$ . Поэтому если  $\delta\omega_j < \varepsilon_j$ , то для  $m > j + 1$  от реализации (4.24) следует перейти к реализациям (4.22), (4.23).

**Теорема 4.1.** ПТМ скорейшего спуска (3.17) в условиях леммы 10 является сходящимся, и

$$\|z^{m+1}\|_A \leq \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}} \|z^m\|_A, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (4.25)$$

Доказательство основано на оценке (3.16) и лемме 9. Действительно, в условиях леммы 10 из (3.17) получаем

$$v^{m+1} = v^m - \tau_{m+1} C(\hat{\omega}_m) v^m, \quad v^m = A^{\frac{1}{2}} z^m, \quad C(\hat{\omega}_m) = A^{\frac{1}{2}} B^{-1}(\hat{\omega}_m) A^{\frac{1}{2}}.$$

Поэтому

$$\|z^{m+1}\|_A^2 = \|v^{m+1}\|^2 = \rho_m^2 \|v^m\|^2 = \rho_m^2 \|z^m\|_A^2,$$

где

$$\rho_m^2 = 1 - \frac{(Cv^m, v^m)^2}{(v^m, v^m)(Cv^m, Cv^m)} = 1 - \frac{(y, y)^2}{(C^{-1}y, y)(Cy, y)}, \quad y = C^{\frac{1}{2}} v^m.$$

Использование леммы 9 дает

$$\rho_m \leq \frac{\lambda_{\max} C(\hat{\omega}_m) - \lambda_{\min} C(\hat{\omega}_m)}{\lambda_{\max} C(\hat{\omega}_m) + \lambda_{\min} C(\hat{\omega}_m)} = \frac{\nu(C(\hat{\omega}_m)) - 1}{\nu(C(\hat{\omega}_m)) + 1},$$

и чтобы получить (4.25), достаточно теперь учесть (3.16).

Для адаптивного метода скорейшего спуска (3.24) следует уточнить формулировку леммы 10 в соответствии с тем, какая часть информации из (1.10) считается заданной. Из (3.24) следует, что

$$\tau_{m+1} = \omega_m + \frac{1}{2\beta_m} \left( \alpha_m + \frac{\omega_m^2}{\alpha_m} \right), \quad \alpha_m = \frac{\|y^m\|}{\|A_2 y^m\|}, \quad \beta_m = \frac{\|y^m\|_A^2}{2\|y^m\| \|A_2 y^m\|}.$$

Поэтому при заданном  $\delta$  в силу (3.21) имеем

$$\hat{\omega}_m = \frac{\|w^m\|_A}{\sqrt{\delta} \|A_2 w^m\|}, \quad \tau_{m+1} = \hat{\omega} + \frac{\|w^m\|_A^2}{\|w^m\|_A^2} + \frac{1}{\delta}, \quad (4.26)$$

а при заданном  $\Delta$  согласно (3.22)

$$\hat{\omega}_m = \frac{2\|w^m\|}{\sqrt{\Delta} \|w^m\|_A}, \quad \tau_{m+1} = \hat{\omega} + \frac{\|w^m\|_A^2}{\|w^m\|_A^2} + \frac{4\|w^m\|_A^2 \|A_2 w^m\|^2}{\Delta (A w^m, w^m)^2}. \quad (4.27)$$

Наконец, нужно привести (4.22)–(4.24) в соответствие с (4.26), (4.27). С учетом этих изменений наряду с теоремой 4.1 справедлива также

**Теорема 4.2.** Адаптивный ПТМ скорейшего спуска (3.24) в условиях леммы 10 сходится, и имеет место оценка (4.25).

### § 5. Параметризация $\tau_{m+1} = 2\omega_m$

При оптимизации итерационного метода переменных направлений (МПН):

$$\begin{aligned} B(\omega) \frac{x^{m+1} - x^m}{\tau} + Ax^m = f, \quad A = A^* > 0, \quad \tau > 0, \quad \omega > 0, \\ A = A_1 + A_2, \quad A_i = A_i^* > 0, \quad B(\omega) = (E + \omega A_1)(E + \omega A_2) \end{aligned} \quad (5.1)$$

с априорной информацией  $\delta_i E \leq A_i \leq \Delta_i E$ , обычно используется параметризация  $\tau = 2\omega$  [2, 3, 10, 12]. Известно также, что при соответствующем преобразовании исходной задачи (1) ПТМ (1)–(4) можно трактовать как МПН для преобразованной задачи [12, 17]. Именно в этой связи рассмотрим вопрос о скорости сходимости ПТМ (3.8) при  $\tau_{m+1} = 2\omega_m$ .

Как уже отмечалось, достаточное условие сходимости нестационарного ПТМ (3.8) можно записать в таком виде:  $4\omega > \tau_{m+1}$ . Поэтому параметризация  $\tau_{m+1} = 2\omega_m$  определяет сходящийся ПТМ (3.8). С другой стороны, параметры  $\hat{\omega}_m, \tau_{m+1}$  в ПТМ скорейшего спуска (3.17) выбираются из разных принципов, поэтому любая параметризация, отличная от (4.21), является неким компромиссом между минимальностью  $\|z^{m+1}\|_A^2$  и минимальностью  $\nu(C(\hat{\omega}_m))$ . Какова цена компромисса  $\tau_{m+1} = 2\hat{\omega}_m$ ?

Если в (3.8)  $\tau_{m+1} = 2\hat{\omega}_m$ , то в силу (1.11)

$$B(\hat{\omega}_m)z^{m+1} = B(\hat{\omega}_m)z^m - \tau_{m+1}Az^m = \tilde{B}(\hat{\omega}_m)z^m + (2\hat{\omega}_m - \tau_{m+1})Az^m = \tilde{B}(\hat{\omega}_m)z^m.$$

Поэтому

$$v^{m+1} = S(\hat{\omega}_m)v^m, \quad v^m = B^{\frac{1}{2}}z^m, \quad S(\hat{\omega}_m) = B^{-\frac{1}{2}}\tilde{B}(\hat{\omega}_m)B^{-\frac{1}{2}}.$$

Поскольку  $S(\hat{\omega}_m) = S^*(\hat{\omega}_m)$ , то

$$\|z^{m+1}\|_{B(\hat{\omega}_m)} = \|v^{m+1}\| \leq \rho(S(\hat{\omega}_m))\|v^m\| = \rho(S(\hat{\omega}_m))\|z^m\|_{B(\hat{\omega}_m)}, \quad (5.2)$$

где  $\rho(S(\hat{\omega}_m))$  — спектральный радиус оператора  $S(\hat{\omega}_m)$ . Собственные числа операторов  $B^{-1}(\hat{\omega}_m)\tilde{B}(\hat{\omega}_m)$ ,  $S(\hat{\omega}_m)$  совпадают, следовательно,

$$\rho(S(\hat{\omega}_m)) = \max_{y^m \neq 0} \frac{(\tilde{B}(\hat{\omega}_m)y^m, y^m)}{(B(\hat{\omega}_m)y^m, y^m)} = \max_{y^m \neq 0} \frac{1 - \beta(y^m)}{1 + \beta(y^m)}, \quad (5.3)$$

где  $\beta(y^m)$  определено в (3.12). Теперь из (5.2), (5.3) и леммы 3 вытекает, что

$$\|z^{m+1}\|_{B_m} \leq \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + \sqrt{\xi}} \|z^m\|_{B_m}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (5.4)$$

Итак, если для нестационарного ПТМ (3.8) использовать реализацию (4.22), в которой (4.21) заменено на  $\tau_{m+1} = 2\hat{\omega}_m$ , то вместо (4.25) будем иметь (5.4). Дополнительное предположение  $\hat{\omega}_{m+1} < \hat{\omega}_m$  позволяет переписать (5.4) следующим образом:

$$\|z^{m+1}\|_{B_{m+1}} \leq \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + \sqrt{\xi}} \|z^m\|_{B_m},$$

а тогда остается заметить, что для малых  $\xi$

$$\frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + \sqrt{\xi}} \simeq 1 - 2\sqrt{\xi}, \quad \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}} \simeq 1 - 4\sqrt{\xi}.$$

Влияние параметризации  $\tau_{m+1} = 2\omega_m$  на скорость сходимости нестационарного ПТМ (3.8) можно оценить и без дополнительного предположения  $\hat{\omega}_{m+1} < \hat{\omega}_m$ . Рассмотрим нестационарный ПТМ (3.8)

$$\begin{aligned} r^m &= Ax^m - f, \quad \hat{\omega}_m \text{ заданы,} \quad B(\hat{\omega}_m)w^m = r^m, \\ \tau_{m+1} &: \min \|z^{m+1}\|_{B_m(\hat{\omega}_m)}^2, \quad x^{m+1} = x^m - \tau_{m+1}w^m. \end{aligned} \quad (5.5)$$

Параметры  $\hat{\omega}$  в (5.5) определим из ПТМ скорейшего спуска (3.17) в реализации (4.22). Тогда из (5.5) имеем

$$\begin{aligned} v^{m+1} &= v^m - \tau_{m+1}\tilde{C}(\hat{\omega}_m)v^m, \quad v^m = B^{\frac{1}{2}}(\hat{\omega}_m)z^m, \quad v^{m+1} = B^{\frac{1}{2}}(\hat{\omega}_m)z^{m+1}, \\ \|z^{m+1}\|_{B(\hat{\omega}_m)}^2 &= \|v^{m+1}\|^2 = \tilde{\rho}_m^2 \|v^m\|^2 = \tilde{\rho}_m^2 \|z^m\|_{B(\hat{\omega}_m)}^2, \\ \tilde{\rho}_m^2 &= 1 - \frac{(\tilde{C}v^m, v^m)^2}{(v^m, v^m)(\tilde{C}v^m, \tilde{C}v^m)}, \quad \tilde{C}(\hat{\omega}_m) = B^{-\frac{1}{2}}(\hat{\omega}_m)AB^{-\frac{1}{2}}(\hat{\omega}_m). \end{aligned} \quad (5.6)$$

Собственные числа операторов  $C(\hat{\omega}_m) = A^{\frac{1}{2}}B^{-1}(\hat{\omega}_m)A^{\frac{1}{2}}$  и  $\tilde{C}(\hat{\omega}_m)$  совпадают, и  $\nu(C(\hat{\omega}_m))$ . Поэтому в качестве следствия из (5.6), леммы 9 и (3.16) получаем

$$\|z^{m+1}\|_{B_m} \leq \frac{1 - \sqrt{\xi}}{1 + 3\sqrt{\xi}} \|z^m\|_{B_m}, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta}. \quad (5.7)$$

Теперь остается сравнить (5.4) и (5.7).

Если же вместо (3.8) обратиться к ПТМ скорейшего спуска (3.17) в реализации (4.23), то одновременное выполнение условий (4.21) и  $2\hat{\omega} = \tau_{m+1}$  возможно только при  $\beta(w^m) = 1$ . Но тогда или  $w^m \in \ker \tilde{B}(\hat{\omega}_m)$ , или  $A = \alpha E$ . Оба случая практического интереса не представляют.

**ЗАМЕЧАНИЕ 1.** При  $D = A$  не составляет труда реализация ПТМ сопряженных градиентов (2.12), (2.13) в любом из вариантов (4.22)–(4.24). Достаточно представительные результаты численных экспериментов подтверждают существенное, практически в точном соответствии с оценками (2.14), (2.15), ускорение сходимости по сравнению с ПТМ скорейшего спуска (3.17), (4.21). Однако в теоретическом плане вопрос о справедливости оценок (2.14), (2.15) для ПТМ сопряженных градиентов (2.12), (2.13), (4.21) пока остается открытым.

**ЗАМЕЧАНИЕ 2.** Представленные в §3–5 результаты с соответствующими изменениями справедливы также и для МПН (5.1). Завершенная часть исследований (коммутативный случай) готовится к печати.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность А. А. Самарскому, а также сотрудникам кафедры вычислительной математики НГУ Ю. М. Лавевскому и А. М. Мацокину за многочисленные конструктивные обсуждения работы на всех этапах ее выполнения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Самарский А. А. Об одном алгоритме численного решения систем дифференциальных и алгебраических уравнений // Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1964. Т. 4, № 3. С. 580–584.
2. Самарский А. А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1989.
3. Самарский А. А., Николаев Е. С. Методы решения сеточных уравнений. М.: Наука, 1978.
4. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы. М.: Наука, 1989.

5. Канторович Л. В. О методе наискорейшего спуска // Докл. АН СССР. 1947. Т. 56, № 3. С. 233–236.
6. Канторович Л. В. Функциональный анализ и прикладная математика // Успехи мат. наук. 1948. Т. 3, № 6. С. 89–185.
7. Марчук Г. И., Кузнецов Ю. А. Итерационные методы и квадратичные функционалы. Новосибирск: Наука, 1972.
8. Бахвалов Н. С. Численные методы. М.: Наука, 1973.
9. Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. М.: Наука, 1977.
10. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980.
11. Кузнецов Ю. А. Метод сопряженных градиентов, его обобщения и применения // Вычисл. процессы и системы. М.: Наука, 1983. С. 267–301.
12. Марчук Г. И. Методы расщепления. М.: Наука, 1988.
13. Коновалов А. Н. Вариационная оптимизация итерационных методов расщепления // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 2. С. 312–325.
14. Харди Г. Г., Литтльвуд Дж. Е., Полиа Г. Неравенства. М.: Изд-во иностр. лит., 1948.
15. Полиа Г., Сеге Г. Задачи и теоремы из анализа. М.; Л.: Изд-во иностр. лит., 1937. Т. 1.
16. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. М.: Мир, 1989.
17. Воеводин В. В., Кузнецов Ю. А. Матрицы и вычисления. М.: Наука, 1984.

*Статья поступила 10 декабря 2001 г.*

*Коновалов Анатолий Николаевич*

*Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН*

*пр. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск 630090*

*kan@sscc.ru*