

О КОМПЛЕКСЕ СОБОЛЕВСКИХ ПРОСТРАНСТВ,
АССОЦИИРОВАННОМ С АБСТРАКТНЫМ
ГИЛЬБЕРТОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

Н. В. Глотко

Аннотация: Рассматриваются комплексы гильбертовых пространств с плотно определенными замкнутыми операторами в качестве дифференциалов. Особенность таких комплексов состоит в том, что с помощью их дифференциалов можно построить в каждой размерности операторы Лапласа.

Оператор Лапласа в совокупности с достаточно «хорошей» измеримой функцией позволяет определить «обобщенное соболевское пространство». Существуют пары измеримых функций, дающие возможность построить «канонические» отображения соответствующих им соболевских пространств. Найдены условия, необходимые и достаточные для того, чтобы эти отображения были компактными.

В ряде случаев по данному гильбертову комплексу можно построить ассоциированный с ним соболевский комплекс. Показано, что дифференциалы исходного комплекса нормально разрешимы одновременно с дифференциалами ассоциированного с ним и редуцированные когомологии этих комплексов совпадают.

Ключевые слова: теоремы вложения, соболевские пространства, гильбертовы пространства, дифференциальные формы на римановых многообразиях.

Гильбертов комплекс — это коцепной комплекс, компоненты которого суть гильбертовы пространства, а дифференциалы — плотно определенные замкнутые линейные операторы. Для любого гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ и произвольного целого числа $k \in \mathbb{Z}$ определены гильбертовы пространства редуцированных когомологий $\overline{H}^k \mathcal{A}$ и топологические векторные пространства когомологий $H^k \mathcal{A}$. Эти пространства совпадают тогда и только тогда, когда оператор d_A^{k-1} нормально разрешим, т. е. имеет замкнутый в A^k образ.

Абстрактные гильбертовы комплексы изучались, например, в работе [1] и в более общей ситуации (банаховы комплексы) в работе [2].

Операторы d_A^k позволяют сконструировать для каждого $k \in \mathbb{Z}$ плотно определенный самосопряженный оператор Лапласа

$$\Delta_{A^k} = (d_A^k)^* d_A^k + d_A^{k-1} (d_A^{k-1})^*.$$

Тогда для достаточно «хороших» функций f функционал $\|f(\text{Id}_{A^k} + \Delta_{A^k}) \cdot\|_{A^k}$ является нормой. Пополнение $\text{Dom } f(\text{Id}_{A^k} + \Delta_{A^k})$ по данной норме называется *соболевским пространством с показателем f* и обозначается через $H^{f,k}(\mathcal{A})$.

Существуют пары функций f, g , позволяющие построить «каноническое» отображение $\varepsilon_g^{f,k} : H^{f,k}(\mathcal{A}) \rightarrow H^{g,k}(\mathcal{A})$, которое иногда является вложением.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ (код проекта НШ-311.-2003.-1).

В данной работе найдены условия, необходимые и достаточные для того, чтобы это отображение было компактно.

Существует класс функций f , позволяющий сформировать для комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ ассоциированный с ним комплекс соболевских пространств $\mathcal{H}_k^f(\mathcal{A})$:

$$\dots \rightarrow H^{f(\lambda)\lambda^{\frac{k}{2}}, 0}(\mathcal{A}) \xrightarrow{d_{H,f}^{k,0}} H^{f(\lambda)\lambda^{\frac{k-1}{2}}, 1}(\mathcal{A}) \rightarrow \dots \rightarrow H^{f(\lambda)\lambda^{\frac{k-N}{2}}, N}(\mathcal{A}) \rightarrow \dots,$$

причем замыкания $d_{H,f}^m$ в соболевских пространствах операторов внешнего дифференцирования d_A^m будут ограниченными операторами. Такой комплекс мы будем называть *соболевским комплексом, ассоциированным с комплексом \mathcal{A}* .

В настоящей работе показано, что ограниченные операторы $d_{H,f}^m$ комплекса $\mathcal{H}_k^f(\mathcal{A})$ нормально разрешимы одновременно с плотно определенными дифференциалами d_A^m комплекса \mathcal{A} и, кроме того, редуцированные когомологии этих комплексов совпадают.

Данные результаты имеют приложение в теории дифференциальных форм на римановых многообразиях. Рассмотрим гладкое риманово многообразие M и гильбертово пространство $L_2^k(M)$ измеримых дифференциальных форм степени k на M , имеющих интегрируемый в квадрате модуль. Оператор внешнего дифференцирования, заданный на гладких формах, можно рассматривать как неограниченный оператор из $L_2^k(M)$ в $L_2^{k+1}(M)$. Этот оператор допускает замыкание, которое мы будем обозначать через $d^k : L_2^k(M) \rightarrow L_2^{k+1}(M)$. В области определения $W^k(M)$ оператора d^k естественно рассмотреть норму

$$\|\omega\|_{W^k(M)} = (\|\omega\|_{L_2^k(M)}^2 + \|d^k\omega\|_{L_2^{k+1}(M)}^2)^{1/2}.$$

Через $V^k(M)$ будем обозначать замыкание в $W^k(M)$ пространства $C_0^\infty(\Lambda^k T^*M)$ гладких дифференциальных форм степени k , имеющих компактные носители, лежащие в $\text{Int } M$.

Пусть задано некоторое замкнутое подпространство Γ^k пространства $W^k(M)$, содержащее $V^k(M)$. Для любой формы $\omega \in d^k(\Gamma^k)$ уравнение $d^k v = \omega$ имеет в Γ^k единственное решение, ортогональное к подпространству $\Gamma^k \cap \text{Ker } d^k$. Обозначим это решение через $(d^k)^{-1}\omega$. Оператор $(d^k)^{-1} : d^k(\Gamma^k) \rightarrow L_2^k(M)$ ограничен тогда и только тогда, когда подпространство $d^k(\Gamma^k)$ замкнуто в $L_2^{k+1}(M)$, т. е. когда оператор внешнего дифференцирования d_Γ^k , действующий из $L_2^k(M)$ в $L_2^{k+1}(M)$, с областью определения Γ^k нормально разрешим.

Для каждого $k \in \mathbb{Z}$ имеется плотно определенный самосопряженный оператор Лапласа $\Delta_{\Gamma^k} = (d_\Gamma^k)^* d_\Gamma^k + d_\Gamma^{k-1} (d_\Gamma^{k-1})^*$. В данном случае соболевские пространства $H_{\Gamma^k}^f(M)$ представляют собой пополнения $\text{Dom } f(\text{Id}_{L_2^k(M)} + \Delta_{\Gamma^k})$ по норме $\|f(\text{Id}_{L_2^k(M)} + \Delta_{\Gamma^k}) \cdot\|_{L_2^k(M)}$.

В случае, когда $f = \lambda^{n/2}$, где $n \in \mathbb{Z}$, многообразие M компактно или полно и имеет ограниченную геометрию (см. [3]), а $\Gamma^k = V^k(M)$, пространства $H_{\Gamma^k}^f(M)$ представляют собой обычные соболевские пространства $\dot{H}^{n,2}(\Lambda^k T^*M)$, которые в работе [3] обозначаются символом $A^{n,k}(M)$. В частности, если M представляет собой искривленный цилиндр, можно найти (пользуясь результатами данной работы и работы [4]) явные условия на искривляющую функцию f , достаточные для того, чтобы вложения соболевских пространств были компактны.

1. Предварительные сведения об операторах в банаховом пространстве. Будем использовать следующие обозначения: X, Y — банаховы

пространства, T — плотно определенный замкнутый линейный оператор с областью определения $\text{Dom}(T)$, действующий из пространства X в пространство Y . В пространстве $\text{Dom}(T)$ зададим норму $\|x\|_{\text{Dom}(T)} = (\|x\|_X^2 + \|Tx\|_Y^2)^{1/2}$. Поскольку оператор T замкнут, пространство $\text{Dom}(T)$ полно в норме $\|\cdot\|_{\text{Dom}(T)}$. Через $\text{Im} T$ и $\text{Ker} T$ будем обозначать соответственно пространства $\{Tx \mid x \in \text{Dom}(T)\}$ и $\{x \in \text{Dom}(T) \mid Tx = 0\}$.

Будем говорить, что последовательность $\{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Im} T$ *накрывается последовательностью* $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom}(T)$, если $Tx_n = y_n$ для любого $n \in \mathbb{Z}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1. Оператор T называется *нормально разрешимым*, если любая ограниченная последовательность из подпространства $\text{Im} T$ накрывается ограниченной последовательностью из пространства $\text{Dom}(T)$, и *компактно разрешимым*, если любая ограниченная последовательность из подпространства $\text{Im} T$ накрывается последовательностью из области определения $\text{Dom}(T)$, содержащей сходящуюся в пространстве X подпоследовательность.

Наряду с оператором T рассмотрим оператор $T^{-1} : Y \rightarrow X/\text{Ker} T$ такой, что $\text{Dom}(T^{-1}) = \text{Im} T$, $T^{-1} \circ T = \pi$, где $\pi : X \rightarrow X/\text{Ker} T$ — каноническая проекция на фактор-пространство.

Лемма 1.1. Пусть оператор T замкнут и плотно определен. Оператор T нормально разрешим тогда и только тогда, когда оператор T^{-1} ограничен. Оператор T компактно разрешим тогда и только тогда, когда оператор T^{-1} компактен.

Предложение 1.1 [5]. Пусть оператор T замкнут и плотно определен. Оператор T компактно разрешим тогда и только тогда, когда компактен оператор вложения

$$i_0 : \text{Dom}(T)/\text{Ker} T \rightarrow X/\text{Ker} T.$$

Предложение 1.2 [5]. Если замкнутый плотно определенный оператор T нормально (компактно) разрешим, то сопряженный оператор T^* также замкнут, плотно определен и нормально (компактно) разрешим.

Лемма 1.2. Пусть в диаграмме

$$\begin{array}{ccc} B_0 & \xrightarrow{\psi_0} & C_0 \\ \beta \downarrow & & \downarrow \gamma \\ B_1 & \xrightarrow{\psi_1} & C_1 \end{array}$$

пространства B_0, B_1, C_0, C_1 банаховы, операторы $\psi_0, \psi_1, \beta, \gamma$ ограничены и всюду определены, $\text{Im} \psi_0 = C_0$, $\text{Im} \psi_1 = C_1$, причем $\gamma\psi_0(x) = \psi_1\beta(x)$ для каждого $x \in B_0$. Тогда если оператор β компактен, то компактен и оператор γ . Обратно, если $\dim \text{Ker} \psi_1 < \infty$, то из компактности оператора γ следует компактность оператора β .

Предложение 1.3. Для замкнутого плотно определенного оператора T следующие свойства эквивалентны:

- 1) оператор T компактно разрешим и $\dim \text{Ker} T < \infty$;
- 2) вложение $i : \text{Dom}(T) \rightarrow X$ компактно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть оператор T компактно разрешим и $\dim \text{Ker} T < \infty$. Тогда по предложению 1.1 вложение $i_0 : \text{Dom}(T)/\text{Ker} T \rightarrow X/\text{Ker} T$ компактно. Поскольку $\|i(x)\|_X = \|x\|_X \leq \|x\|_{\text{Dom}(T)}$, вложение i ограничено. Таким

образом, диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \text{Dom}(T) & \xrightarrow{\pi_0} & \text{Dom}(T)/\text{Ker } T \\ i \downarrow & & \downarrow i_0 \\ X & \xrightarrow{\pi} & X/\text{Ker } T \end{array}$$

удовлетворяет условиям леммы 1.2. Поэтому оператор i компактен. Обрат-
но, пусть вложение i компактно. Тогда по лемме 1.2 вложение i_0 компактно,
откуда по предложению 1.1 следует компактная разрешимость оператора T .
Рассмотрим последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Ker } T$ такую, что $\|x_n\|_X \leq C < \infty$.
Поскольку $\|x_n\|_X = \|x_n\|_{\text{Dom}(T)}$ и оператор i компактен, последовательность
 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ содержит сходящуюся в пространстве X подпоследовательность. Та-
ким образом, пространство $\text{Ker } T$ конечномерно. Предложение доказано.

Каждому линейному подпространству A банахова пространства X можно
сопоставить подпространство A^\perp пространства X^* , состоящее из всех (непре-
рывных линейных) функционалов $f \in X^*$ таких, что $f(x) = 0$ для всех эле-
ментов $x \in A$. Подпространство A^\perp замкнуто в пространстве X^* , каким бы ни
было подпространство $A \subset X$.

Лемма 1.3. *Если линейный оператор T , действующий из банахова про-
странства X в банахово пространство Y , замкнут и плотно определен, то
 $(\text{Im } T)^\perp = \text{Ker } T^*$. Если, кроме того, оператор T нормально разрешим, то
 $(\text{Ker } T)^\perp = \text{Im } T^*$.*

Пусть теперь оператор T , действующий на гильбертовом пространстве X ,
плотно определен и самосопряжен. Рассмотрим измеримую конечную и опреде-
ленную почти всюду по отношению к спектральному семейству $\{E_\lambda\}$ оператора
 T комплекснозначную функцию w . Функция $w(T)$ оператора T определяется
следующим образом:

$$(w(T)f, g)_X = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) d(E_\lambda f, g).$$

Здесь $g \in X$, $f \in \text{Dom}(w(T))$, где $\text{Dom}(w(T))$ — множество всех $f \in X$ таких,
что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |w(\lambda)|^2 d(E_\lambda f, f) < \infty.$$

Приведенное ниже утверждение представляет собой хорошо известный факт
функционального анализа (см. [6]).

Лемма 1.4. *Для любой функции w с указанными выше свойствами спра-
ведливы следующие утверждения.*

1. Если функция w отлична от нуля почти всюду относительно спектраль-
ного семейства $\{E_\lambda\}$ оператора T , то имеет место равенство

$$[w(T)]^{-1} = w^{-1}(T),$$

причем $\text{Dom}([w(T)]^{-1}) = \text{Dom}(w^{-1}(T))$.

2. Оператор $w(T)$ замкнут и плотно определен, причем

$$[w(T)]^* = \bar{w}(T).$$

3. Для того чтобы оператор $w(T)$ был ограничен, необходимо и достаточно, чтобы функция w была ограничена почти всюду относительно спектрального семейства $\{E_\lambda\}$ оператора T ; при этом условии выполнено равенство

$$\|w(T)\| = \text{vrai max } |w(\lambda)|.$$

4. Положительным функциям соответствуют положительные операторы.

5. Пусть функция u измерима, действительна и почти всюду конечна относительно спектрального семейства $\{E_\lambda\}$ самосопряженного оператора T , пусть, далее, функция v (действительная или комплексная) измерима и почти всюду конечна относительно спектрального семейства $\{F_\mu\}$ самосопряженного оператора $S = u(T)$. Тогда сложная функция $w(\lambda) = v(u(\lambda))$ также измерима и почти всюду конечна относительно спектрального семейства $\{E_\lambda\}$ и $w(T) = v(S) = v(u(T))$.

6. Если функции w_1 и w_2 измеримы и почти всюду конечны относительно спектрального семейства $\{E_\lambda\}$ оператора T , то

$$w_1(T) \cdot w_2(T) \subseteq (w_1 \cdot w_2)(T),$$

причем $\text{Dom}(w_1(T) \cdot w_2(T)) = \text{Dom}(w_2(T)) \cap \text{Dom}[(w_1 \cdot w_2)(T)]$.

Замкнутый оператор T , действующий на гильбертовом пространстве X , называется *строго положительным*, если он плотно определен и существует такое $\varepsilon > 0$, что $(Tx, x)_X \geq \varepsilon \|x\|_X^2$ для всех элементов $x \in \text{Dom}(T)$.

Пусть T, S — самосопряженные операторы и $T, S \geq 0$; будем считать, что $T \geq S$, если $\text{Dom}(S) \supset \text{Dom}(T)$ и $(x, Tx)_X \geq (x, Sx)_X$ для всех $x \in \text{Dom}(T)$.

Лемма 1.5.1. Пусть оператор T , действующий на гильбертовом пространстве X , самосопряжен, плотно определен и строго положителен. Пусть f — измеримая конечная определенная почти всюду относительно спектрального семейства оператора T вещественнозначная функция. Тогда

1) $\text{Ker } T = 0, \text{Im } T = X$;

2) если существует такое вещественное число $\gamma > 0$, что $f(\lambda) \geq \gamma$ для п. в. λ , принадлежащих спектру $\sigma(T)$ оператора T , то оператор $f(T)$ строго положителен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Ввиду неравенства $(Tx, x) \geq c(x, x)$, где $c > 0$, имеем $0 \geq c(x, x)$ для $x \in \text{Ker } T$. Отсюда $x = 0$ и $\text{Ker } T = 0$. Поскольку оператор T самосопряжен и плотно определен, то $\text{Ker } T = (\text{Im } T)^\perp$, так что подпространство $\text{Im } T$ плотно в X . Далее, так как $c\|x\|^2 \leq (Tx, x) \leq \|Tx\|\|x\|$, для любого x имеем $\|Tx\| \geq c\|x\|$, т. е. оператор T нормально разрешим и $\text{Im } T = X$.

2. В силу леммы 1.4 оператор $f(T)$ самосопряжен и плотно определен. Так как оператор T строго положителен, для каждого $x \in \text{Dom}(T)$ имеем $(Tx, x) \geq c(x, x)$, где число $c > 0$ является нижней границей спектра оператора T (см. [7]). Поскольку множество $\sigma(T)$ замкнуто и для п. в. $\lambda \in \sigma(T)$ по условию имеем $f(\lambda) \geq \gamma > 0$, то $(f(T)x, x) \geq \gamma(x, x)$ и оператор $f(T)$ строго положителен. Лемма доказана.

Лемма 1.5.2. Пусть оператор T , действующий на гильбертовом пространстве X , самосопряжен, плотно определен, положителен и $\text{Ker } T = 0$. Пусть f — измеримая, конечная и определенная почти всюду относительно спектрального семейства оператора T вещественнозначная функция. Тогда если $f(\lambda) \geq 0$ для п. в. λ , принадлежащих спектру $\sigma(T)$ оператора T (причем если $\lambda \neq 0$, то $f(\lambda) \neq 0$), то билинейный функционал $(f(T)\cdot, f(T)\cdot) : \text{Dom } f(T) \times \text{Dom } f(T) \rightarrow \mathbb{R}$

задает на области определения оператора $f(T)$ скалярное произведение. Если оператор T строго положителен и существует такая константа $\gamma > 0$, что $f(\lambda) \geq \gamma$ для п. в. $\lambda \in \sigma(T)$, то пространство $\text{Dom } f(T)$ полно в норме $\|f(T) \cdot\|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу леммы 1.4 оператор $f(T)$ самосопряжен, плотно определен и положителен. Пусть $x \in \text{Ker } f(T)$ т. е. $f(T)x = 0$. Тогда

$$\|f(T)x\|^2 = \int_0^{+\infty} |f(\lambda)|^2 d(E_\lambda x, x) = 0.$$

Поэтому $f(\lambda) = 0$ п. в. на множестве $\sigma(T)$ относительно спектральной меры $(E_\lambda x, x)$ оператора T . С другой стороны, $f(\lambda) > 0$ для п. в. $\lambda \in \sigma(T)$, $\lambda \neq 0$.

Далее, $\mu((0, b]) = (E_{b+0}x, x) - (E_{+0}x, x) = 0$ для любого $b \in \sigma(T)$, где μ — мера, порожденная спектральным семейством оператора T . Но тогда $(E_\lambda x, x) = \|x\|^2$ при $\lambda \in \sigma(T)$, $\lambda \neq 0$ и $(E_0x, x) = 0$.

Тем самым 0 — изолированное собственное число оператора T , т. е. $Tx = 0$. Но $\text{Ker } T = 0$. Таким образом, $x = 0$ и $\text{Ker } f(T) = 0$. Но тогда билинейный функционал $(f(T)\cdot, f(T)\cdot) : \text{Dom } f(T) \times \text{Dom } f(T) \rightarrow \mathbb{R}$ является скалярным произведением.

Если оператор T строго положителен, то для любого $x \in \text{Dom}(T)$ имеем $(Tx, x) \geq c(x, x)$ для некоторой константы $c > 0$. Поскольку функция f ограничена снизу на спектре $\sigma(T)$ некоторой положительной константой γ , можно применить лемму 1.5.1. Таким образом, оператор $f(T)$ строго положителен. Поэтому $\gamma\|x\| \leq \|f(T)x\|$ для любого $x \in \text{Dom } f(T)$. Но тогда

$$\gamma^2(\|x\|^2 + \|f(T)x\|^2) \leq (1 + \gamma^2)\|f(T)x\|^2 \leq (1 + \gamma^2)(\|x\|^2 + \|f(T)x\|^2)$$

и норма $\|f(T) \cdot\|$ эквивалентна норме графика оператора $f(T)$, откуда в силу замкнутости оператора $f(T)$ делаем вывод о полноте пространства $\text{Dom } f(T)$ в норме $\|f(T) \cdot\|$. Лемма доказана.

2. Соболевские пространства, ассоциированные с замкнутым оператором. Всюду в этом пункте символом T будем обозначать плотно определенный самосопряженный положительный оператор, действующий на гильбертовом пространстве X и такой, что $\text{Ker } T = 0$. Поскольку $\text{Ker } T = (\text{Im } T)^\perp$, подпространство $\text{Im } T$ плотно в пространстве X .

Оператор $\text{Id} + T^2$ самосопряжен, плотно определен и строго положителен, причем $((\text{Id} + T^2)x, x) \geq (x, x)$ для любого $x \in \text{Dom}(\text{Id} + T^2)$. Таким образом, по лемме 1.5.1 $\text{Ker}(\text{Id} + T^2) = 0$, $\text{Im}(\text{Id} + T^2) = X$.

Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, где $\mathbb{R}_+ \doteq \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \geq 0\}$, удовлетворяющую следующим двум условиям:

- (i) f измерима, конечна и определена почти всюду относительно спектрального семейства $\{E_\lambda\}$ оператора $\text{Id} + T^2$;
- (ii) $f(\lambda) > 0$ для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$.

Тогда оператор $f(\text{Id} + T^2)$ самосопряжен, плотно определен, положителен и по лемме 1.5.2 билинейный функционал $(f(\text{Id} + T^2)\cdot, f(\text{Id} + T^2)\cdot)$ представляет собой скалярное произведение в пространстве $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Соболевским пространством $H_T^f(X)$, ассоциированным с парой (T, f) , будем называть пополнение пространства $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ по норме $\|f(\text{Id} + T^2) \cdot\|$.

Пусть функции f, g , действующие из \mathbb{R}_+ в \mathbb{R}_+ , удовлетворяют условиям (i), (ii) и условию:

(iii) существует константа $c > 0$ такая, что для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$ выполнено неравенство $g(\lambda) \leq c \cdot f(\lambda)$.

Тогда

$$\text{Dom } f(\text{Id} + T^2) \subset \text{Dom } g(\text{Id} + T^2).$$

Действительно, пусть $x \in \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$. Имеем

$$\int_{\mathbb{R}_+} |g(\lambda)|^2 d(E_\lambda x, x) \leq c^2 \int_{\mathbb{R}_+} |f(\lambda)|^2 d(E_\lambda x, x) \leq C < \infty. \quad (2.1)$$

Отсюда $x \in \text{Dom } g(\text{Id} + T^2)$.

Продолжая тождественное вложение $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ в $\text{Dom } g(\text{Id} + T^2)$ по непрерывности на пополнения, имеем для любой пары функций f, g , удовлетворяющих условиям (i)–(iii), отображение $\varepsilon_g^f : H_T^f(X) \rightarrow H_T^g(X)$.

В дальнейшем под предгильбертовым пространством мы будем понимать (вообще говоря неполное) нормированное пространство, норма которого порождается скалярным произведением.

Лемма 2.1. Пусть X — предгильбертово пространство со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)_X$, L — его подпространство, являющееся предгильбертовым пространством относительно скалярного произведения $(\cdot, \cdot)_L$, ε — некоторое вложение L в X как векторного подпространства.

1. Если для любого $x \in L$ выполнено $\|\varepsilon(x)\|_X \leq C\|x\|_L$, где константа C не зависит от x , то отображение $\bar{\varepsilon} : \bar{L} \rightarrow \bar{X}$, являющееся продолжением по непрерывности на пополнения вложения ε , ограничено.

Если, кроме того, существует такая константа $C_1 > 0$, что для любого $x \in L$ выполнено $\|\varepsilon(x)\|_X \geq C_1\|x\|_L$, то отображение $\bar{\varepsilon}$ является топологическим изоморфизмом.

2. Для любой ограниченной в норме $\|\cdot\|_L$ последовательности $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset L$ последовательность $\{\varepsilon x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ содержит фундаментальную в норме пространства X подпоследовательность тогда и только тогда, когда отображение $\bar{\varepsilon}$ компактно.

Предложение 2.1. Пусть функции $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяют условиям (i)–(iii). Тогда отображение $\varepsilon_g^f : H_T^f(X) \rightarrow H_T^g(X)$ ограничено.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку

$$\|f(T)x\|^2 = \int_0^{+\infty} |f(\lambda)|^2 d(E_\lambda x, x),$$

доказательство следует из оценки (2.1).

Лемма 2.2. Для любого компактного самосопряженного оператора S , действующего на гильбертовом пространстве X , существует такой ортонормированный базис $\{\varepsilon_n\}$ в X , что

$$Sx = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n(x, \varepsilon_n)\varepsilon_n, \quad (2.2)$$

где λ_n — вещественные числа, $\lambda_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Обратно, любой оператор, представимый в виде (2.2), компактен.

Лемма 2.2'. Пусть S — плотно определенный самосопряженный оператор, действующий на бесконечномерном гильбертовом пространстве X и такой, что $\text{Ker } S = 0$. Оператор S компактно разрешим тогда и только тогда, когда его спектр $\sigma(S)$ — счетное множество такое, что $\lambda_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$ (здесь $\sigma(S) = \{\lambda_n\}_{n=1}^\infty$). Каждое число $\lambda \in \sigma(S)$ является собственным значением оператора S .

В дальнейшем наряду с обозначением $f(\text{Id} + T^2)$ мы будем для удобства использовать обозначение $f(\lambda)(\text{Id} + T^2)$.

Предложение 2.2. Пусть функции $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяют условиям (i)–(iii) и условию

$$(iv) \lim_{\lambda \rightarrow \infty} g(\lambda)/f(\lambda) = 0.$$

Тогда

1. Если оператор T компактно разрешим, то отображение

$$\varepsilon_g^f : H_T^f(X) \rightarrow H_T^g(X)$$

компактно.

2. Если отображение ε_g^f компактно, то оператор T компактно разрешим.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. Пусть оператор T компактно разрешим. Тогда компактно разрешим и оператор $\text{Id} + T^2$. Действительно, если T компактно разрешим, то, поскольку $\text{Ker } T = 0$, оператор $T^{-1} : \text{Im } T \rightarrow X$ компактен. Но тогда компактен и оператор T^{-2} , совпадающий с оператором $(T^2)^{-1}$, т. е. оператор T^2 компактно разрешим. Рассмотрим последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom}(\text{Id} + T^2)$ такую, что $\|x_n\|_{\text{Dom}(\text{Id} + T^2)} \leq C < \infty$. Так как $\text{Dom}(\text{Id} + T^2) = \text{Dom}(T^2)$, на этом подпространстве

$$\begin{aligned} \|x_n\|_{\text{Dom}(\text{Id} + T^2)}^2 &= (x_n, x_n)_X + ((\text{Id} + T^2)x_n, (\text{Id} + T^2)x_n)_X \\ &= 2\|x_n\|_X^2 + 2(T^2x_n, x_n)_X + \|T^2x_n\|_X^2 \geq \|x_n\|_X^2 + \|T^2x_n\|_X^2 = \|x_n\|_{\text{Dom}(T^2)}^2, \end{aligned}$$

поскольку $(T^2x, x)_X \geq 0$ для любого $x \in \text{Dom}(T^2)$. Таким образом, $\|x_n\|_{\text{Dom}(T^2)} \leq C < \infty$. Из компактной разрешимости оператора T^2 и того, что $\text{Ker } T^2 = 0$, по предложению 1.3 следует, что существует сходящаяся в X подпоследовательность $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ последовательности $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, откуда и вытекает компактная разрешимость оператора $\text{Id} + T^2$.

Поэтому по следствию 2.1 его спектр $\sigma(\text{Id} + T^2) = \{\lambda_n\}_{n=1}^\infty$ — счетное множество и $\lambda_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Но тогда спектр оператора $(g/f)(\text{Id} + T^2)$ также представляет собой счетное множество, причем $\sigma((g/f)(\text{Id} + T^2))$ не имеет предельных точек, отличных от нуля в силу условия (iv). Тем самым оператор $(g/f)(\text{Id} + T^2)$ компактен. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ — ограниченная в норме пространства $H_T^f(X)$ последовательность. Поскольку выполнено условие (iii), на подпространстве $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ справедливо равенство

$$g(\text{Id} + T^2) = (g/f)(\text{Id} + T^2) \cdot f(\text{Id} + T^2).$$

Таким образом, последовательность $\{g(\text{Id} + T^2)x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ как образ ограниченной в X последовательности при компактном отображении $(g/f)(\text{Id} + T^2)$ содержит фундаментальную в X подпоследовательность. Теперь компактность отображения ε_g^f следует из леммы 2.1.

2. Пусть отображение ε_g^f компактно. Тогда любая последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$, ограниченная в норме пространства $H_T^f(X)$, содержит подпоследовательность, фундаментальную в норме пространства $H_T^g(X)$.

Пусть $\{z_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom}[f(\text{Id} + T^2)]^{-1}$ — ограниченная в норме пространства X последовательность. Тогда существует такая последовательность $\{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom} f(\text{Id} + T^2)$, что $f(\text{Id} + T^2)y_n = z_n$, или $y_n = [f(\text{Id} + T^2)]^{-1}z_n$. Тем самым $\|f(\text{Id} + T^2)y_n\| \leq C < \infty$. Но тогда последовательность $\{g(\text{Id} + T^2)y_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ содержит фундаментальную в X подпоследовательность. Поскольку выполнено условие (iii), оператор $(g/f)(\text{Id} + T^2)$ всюду определен и, следовательно, ограничен. Таким образом, на подпространстве $\text{Dom}[f(\text{Id} + T^2)]^{-1} = \text{Dom}(1/f)(\text{Id} + T^2)$ имеем

$$(g/f)(\text{Id} + T^2)z_n = g(\text{Id} + T^2) \cdot (1/f)(\text{Id} + T^2)z_n.$$

Итак, для любой ограниченной последовательности $\{z_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \text{Dom}(1/f)(\text{Id} + T^2)$ ее образ при отображении $(g/f)(\text{Id} + T^2)$ содержит сходящуюся в X подпоследовательность. Пользуясь тем, что подпространство $\text{Dom}(1/f)(\text{Id} + T^2)$ плотно в пространстве X , и применяя лемму 2.1, делаем вывод о компактности оператора $(g/f)(\text{Id} + T^2)$. Итак, спектр $\sigma((g/f)(\text{Id} + T^2))$ дискретен и не имеет иных предельных точек, кроме нуля. Из условия (iv)

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} f(\lambda)/g(\lambda) = \infty.$$

Отсюда следует компактная разрешимость оператора $(\text{Id} + T^2)$. Ввиду того, что $(\text{Id} + T^2)^{1/2} = (\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda}})(\text{Id} + T^2)$, компактно разрешим и оператор $(\text{Id} + T^2)^{1/2}$. Но тогда отображение $H_T^{\sqrt{\lambda}}(X)$ в X компактно и в силу того, что $\text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2}$ полно в норме $\|(\text{Id} + T^2)^{1/2} \cdot \|\cdot\|$, является вложением. Заметим также, что функцию $f(\text{Id} + T^2)$ оператора $\text{Id} + T^2$ можно рассматривать и как функцию оператора T в силу п. 5 леммы 1.4. Имеем $x \in \text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2}$ тогда и только тогда, когда

$$\int_0^{+\infty} |(1 + \lambda^2)| d(E_\lambda x, x) < \infty,$$

и $x \in \text{Dom}(T)$ тогда и только тогда, когда $\int_0^{+\infty} |\lambda|^2 d(E_\lambda x, x) < \infty$. Так как эти интегралы сходятся одновременно, то $\text{Dom}(T) = \text{Dom}((\text{Id} + T^2)^{1/2})$. На подпространстве $\text{Dom}(T)$ имеем

$$\|(\text{Id} + T^2)^{1/2}x\|_X^2 = \int_0^{+\infty} |(1 + \lambda^2)^{1/2}|^2 d(E_\lambda x, x) = \|x\|_X^2 + \|Tx\|_X^2 = \|x\|_{\text{Dom}(T)}^2,$$

т. е. пространство $H_T^{\sqrt{\lambda}}(X)$ совпадает с пространством $(\text{Dom}(T), \|\cdot\|_{\text{Dom}(T)})$. Поскольку вложение $\varepsilon_{\lambda_0}^{\lambda^{1/2}}$ компактно и $\text{Ker} T = 0$, по предложению 1.3 оператор T компактно разрешим. Предложение доказано.

Лемма 2.3. Пусть функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяет условиям (i), (ii). Тогда если выполнено условие:

(v) существует константа $\gamma > 0$ такая, что $f(\lambda) \geq \gamma$ для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$, то на подпространстве $\text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$ выполнено равенство

$$T \cdot f(\text{Id} + T^2) = f(\text{Id} + T^2) \cdot T. \quad (2.3)$$

Если же функция f удовлетворяет условию:

(vi) существует константа $\gamma > 0$ такая, что $f(\lambda) \leq \gamma$ для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$,

то равенство (2.3) выполняется на подпространстве $\text{Dom}(T)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\{E_\lambda\}$ — спектральное семейство оператора T .
Имеем

$$D = \text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) = \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} |f(1 + \lambda^2)|^2 (1 + \lambda^2) d(E_\lambda x, x) < \infty \right\}.$$

Область определения правой части равенства (2.3) такова:

$$\begin{aligned} D_R = D \cap \text{Dom}(T) &= D \cap \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} \lambda^2 d(E_\lambda x, x) < \infty \right\} \\ &= D \cap \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2) d(E_\lambda x, x) < \infty \right\}. \end{aligned}$$

Область определения левой части равенства (2.3) такова:

$$D_L = D \cap \text{Dom} f(\text{Id} + T^2) = D \cap \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} |f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x) < \infty \right\}.$$

В силу оценки

$$\int_0^{+\infty} |f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x) \leq \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2) |f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x)$$

имеем $D \subset D_L$.

Если $f(\lambda) \geq \gamma$ для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$, то

$$\gamma^2 \int_0^{+\infty} \lambda^2 d(E_\lambda x, x) \leq \gamma^2 \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2) d(E_\lambda x, x) \leq \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2) |f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x)$$

и $D \subset D_R$, т. е. обе части равенства (2.3) определены на подпространстве $\text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$.

Если же для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$ выполнено $f(\lambda) \leq \gamma$, то правая часть равенства (2.3) определена на $\text{Dom}(T) = \text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2}$, поскольку

$$\int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2) |f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x) \leq \gamma^2 \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2) d(E_\lambda x, x).$$

На этом же подпространстве определена и левая часть равенства. Лемма доказана.

Предложение 2.3. Пусть функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяет условиям (i), (ii) и хотя бы одному из условий (v), (vi). Тогда оператор T продолжается по непрерывности до ограниченного всюду определенного оператора (который тоже будет обозначаться символом T) $T : H_T^{\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda)}(X) \rightarrow H_T^f(X)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть сначала функция f удовлетворяет условиям (i), (ii), (v). Пусть $x \in \text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$. Тогда

$$\|Tx\|_{H_T^f(X)} = \|f(\text{Id} + T^2)Tx\|_X.$$

В силу леммы 2.3 на подпространстве $\text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$ выполнено равенство (2.3). Поэтому

$$\begin{aligned} \|Tx\|_{H_T^f(X)}^2 &= \|Tf(\text{Id} + T^2)x\|_X^2 \leq \|f(\text{Id} + T^2)x\|_X^2 + \|Tf(\text{Id} + T^2)x\|_X^2 \\ &= ((\text{Id} + T^2)^{1/2}f(\text{Id} + T^2)x, (\text{Id} + T^2)^{1/2}f(\text{Id} + T^2)x)_X = \|x\|_{H_T^{f(\lambda), \sqrt{\lambda}}(X)}^2. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Поскольку $H_T^{f(\lambda), \sqrt{\lambda}}(X)$ — пополнение $\text{Dom}(f(\lambda) \cdot \lambda^{1/2})(\text{Id} + T^2)$ в норме $\|(f(\lambda) \cdot \lambda^{1/2})(\text{Id} + T^2) \cdot \|_X$, оператор T продолжается по непрерывности до ограниченного отображения на пополнениях.

Пусть теперь функция f удовлетворяет условиям (i), (ii) и (vi). Тогда равенство (2.3) выполняется на подпространстве $\text{Dom}(T) = \text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2} \subset \text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$ и на $\text{Dom}(T)$ выполнена цепочка неравенств (2.4). Поэтому для того чтобы оператор T мог быть продолжен по непрерывности до ограниченного оператора, действующего из $H_T^{\lambda^{1/2}, f(\lambda)}(X)$ в $H_T^f(X)$, достаточно показать, что подпространство $\text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2}$ плотно в $H_T^{\lambda^{1/2}, f(\lambda)}(X)$. Пусть $u \in \text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$. Тогда

$$(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}u \in \text{Dom}(\text{Id} + n^{-1}T) = \text{Dom}(T) = \text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2}$$

для любого целого числа $n > 0$. Оператор $(\text{Id} + n^{-1}T)$ строго положителен для положительных n . Поэтому $\text{Ker}(\text{Id} + n^{-1}T) = 0$ и $\text{Im}(\text{Id} + n^{-1}T) = X$.

На подпространстве $\text{Dom}(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$ выполнено

$$(\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) \cdot (\text{Id} + n^{-1}T)^{-1} = (\text{Id} + n^{-1}T)^{-1} \cdot (\lambda^{1/2} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2). \quad (2.5)$$

Действительно, пусть

$$D = \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} \frac{(1 + \lambda^2)|f(1 + \lambda^2)|^2}{(1 + \lambda/n)^2} d(E_\lambda x, x) < \infty \right\}.$$

Тогда левая часть равенства (2.5) определена на подпространстве

$$D_L = D \cap \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} \frac{d(E_\lambda x, x)}{(1 + \lambda/n)^2} < \infty \right\} = D,$$

правая — на подпространстве

$$D_R = D \cap \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2)|f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x) < \infty \right\}.$$

Поскольку оператор T положителен и $n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$, имеется оценка

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1 + \lambda^2)|f(1 + \lambda^2)|^2}{(1 + \lambda/n)^2} d(E_\lambda x, x) \leq \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2)|f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x).$$

Поэтому

$$\left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} (1 + \lambda^2)|f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x) < \infty \right\} \subset D.$$

Таким образом, для $u \in \text{Dom}(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$ имеем

$$\begin{aligned} \|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}u - u\|_{H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X)} &= \|(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)((\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}u - u)\|_X \\ &= \|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)u - (\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)u\|_X \\ &= \|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}v - v\|_X, \end{aligned}$$

где $v = (\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)u \in X$. Последовательность $\{(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}\}_{n=1}^\infty$ равномерно ограничена, ибо

$$\|(\text{Id} + n^{-1}T)x\|_X^2 = (x, x)_X + \frac{2}{n}(Tx, x)_X + \frac{1}{n^2}(Tx, Tx)_X \geq (x, x)_X$$

для любого положительного целого числа n , так что $\|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}y\|_X \leq \|y\|_X$ для каждого $y \in X$, т. е. $\|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}\| \leq 1$. Подпространство $\text{Dom}(T) = \text{Dom}(\text{Id} + T^2)^{1/2}$ плотно в пространстве X , и для любого $x \in \text{Dom}(T)$ имеем

$$\|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}x - x\|_X = n^{-1}\|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}Tx\|_X \leq n^{-1}\|Tx\|_X \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$. Поэтому $\|(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}x - x\|_X \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ для любого $x \in X$. Но тогда $(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}u \rightarrow u$ при $n \rightarrow \infty$ в норме $H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X)$, поскольку $(\text{Id} + n^{-1}T)^{-1}v \rightarrow v$ в X , где $v = (\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)u \in X$, т. е. подпространство $\text{Dom}(\text{Id} + T^2)$ плотно в $\text{Dom}(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$ в норме пространства $H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X)$, а значит, и в пространстве $H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X)$. Предложение доказано.

Лемма 2.4. Пусть функции $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяют условиям (i), (ii), а функция (f/g) — условию (v). Тогда если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- 1) функция g удовлетворяет условию (v);
- 2) функция f удовлетворяет условию (vi),

то отображение $(f/g)(\text{Id} + T^2)$ продолжается до изометрического изоморфизма пространства $H_T^f(X)$ на $H_T^g(X)$. Если функция g удовлетворяет условию (v) или функция $\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)$ удовлетворяет условию (vi), то диаграмма

$$\begin{array}{ccc} H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X) & \xrightarrow{T} & H_T^f(X) \\ (f/g)(\text{Id} + T^2) \downarrow & & \downarrow (f/g)(\text{Id} + T^2) \\ H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot g(\lambda)}(X) & \xrightarrow{T} & H_T^g(X) \end{array} \quad (2.6)$$

коммутативна.

Доказательство. Пусть сначала функция g удовлетворяет условию (v). Тогда это условие выполняется также и для функции f , так как $(f/g)(\lambda) \geq c > 0$ для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$. Так как выполнена оценка

$$\int_0^{+\infty} \frac{|f(1 + \lambda^2)|^2}{|g(1 + \lambda^2)|^2} d(E_\lambda x, x) \leq \frac{1}{\gamma^2} \int_0^{+\infty} |f(1 + \lambda^2)|^2 d(E_\lambda x, x),$$

то $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2) \subset \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2)$. Отображение $(f/g)(\text{Id} + T^2)$ всюду определено на подпространстве $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$, и, кроме того, на $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ выполнено

$$g(\text{Id} + T^2) \cdot (f/g)(\text{Id} + T^2) = f(\text{Id} + T^2), \quad (2.7)$$

ибо левая часть этого равенства определена на подпространстве $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2) \cap \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2)$. Из равенства (2.7) также следует, что

$$(f/g)(\text{Id} + T^2)(\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)) \subset \text{Dom } g(\text{Id} + T^2).$$

Докажем, что $(f/g)(\text{Id} + T^2)$ отображает $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ на $\text{Dom } g(\text{Id} + T^2)$. Действительно, пусть $x \in \text{Dom } g(\text{Id} + T^2)$. В силу (v) оператор $(1/g)(\text{Id} + T^2)$ ограничен и всюду определен, причем на X имеем

$$g(\text{Id} + T^2) \cdot (1/g)(\text{Id} + T^2) = \text{Id}_X.$$

Поэтому существует такой элемент $y \in X$, что $(1/g)(\text{Id} + T^2)y = x$. Всюду на X выполнено соотношение

$$(1/g)(\text{Id} + T^2) = (f/g)(\text{Id} + T^2) \cdot (1/f)(\text{Id} + T^2),$$

поскольку обе части этого равенства определены на подпространстве

$$\text{Dom}(1/g)(\text{Id} + T^2) \cap \text{Dom}(1/f)(\text{Id} + T^2),$$

которое совпадает с X в силу ограниченности снизу функций f и g . Тогда

$$x = (1/g)(\text{Id} + T^2)y = (f/g)(\text{Id} + T^2)(1/f)(\text{Id} + T^2)y.$$

Но $(1/f)(\text{Id} + T^2)y \in \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ для любого $y \in X$, т. е. для любого $x \in \text{Dom } g(\text{Id} + T^2)$ существует такой элемент $z \in \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$, что

$$(f/g)(\text{Id} + T^2)z = x.$$

Пусть, далее, $x, y \in \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$. Тогда

$$\begin{aligned} & ((f/g)(\text{Id} + T^2)x, (f/g)(\text{Id} + T^2)y)_{H_T^g(X)} \\ &= (g(\text{Id} + T^2) \cdot (f/g)(\text{Id} + T^2)x, g(\text{Id} + T^2) \cdot (f/g)(\text{Id} + T^2)y)_X \\ &= (f(\text{Id} + T^2)x, f(\text{Id} + T^2)y)_X = (x, y)_{H_T^f(X)} \end{aligned} \quad (2.8)$$

в силу равенства (2.7). Поэтому отображение

$$(f/g)(\text{Id} + T^2) : \text{Dom } f(\text{Id} + T^2) \rightarrow \text{Dom } g(\text{Id} + T^2)$$

продолжается до изометрического изоморфизма пространства $H_T^f(X)$ на пространство $H_T^g(X)$. Рассмотрим теперь случай, когда функция f удовлетворяет условию (vi). Поскольку функция f/g удовлетворяет условию (v), то и для g выполняется (vi). Поэтому $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2) = \text{Dom } g(\text{Id} + T^2) = X$ и $\text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2) \subset \text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$. Равенство (2.7) выполняется теперь на подпространстве $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2) \cap \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2) = \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2)$. В силу того, что $(f/g)(\lambda) \geq c > 0$ для п. в. $\lambda \in \sigma(\text{Id} + T^2)$, образ оператора $(f/g)(\text{Id} + T^2)$ совпадает с пространством X . Далее, поскольку подпространство $\text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2)$ плотно в пространстве X , оно плотно и в пространстве $H_T^f(X)$, так как оператор $f(\text{Id} + T^2)$ ограничен и, следовательно, выполнена оценка $\|f(\text{Id} + T^2)x\|_X \leq \gamma \cdot \|x\|_X$.

Для $x, y \in \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2)$ выполнена цепочка неравенств (2.8). Поэтому отображение $(f/g)(\text{Id} + T^2)$ продолжается до изометрического изоморфизма пространства $H_T^f(X)$ на пространство $H_T^g(X)$.

Обратимся к диаграмме (2.6). Если функция g удовлетворяет условию (v), то таковы же и функции $\sqrt{\lambda} \cdot g(\lambda)$, $\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)$, f . Поэтому отображение $(f/g)(\text{Id} + T^2)$ продолжается до изометрического изоморфизма пространства $H_T^f(X)$ на пространство $H_T^g(X)$ и пространства $H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X)$ на пространство $H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot g(\lambda)}(X)$. Далее,

$$\text{Dom } f(\text{Id} + T^2) \subset \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2),$$

$$\text{Dom}(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) \subset \text{Dom}(f/g)(\text{Id} + T^2),$$

поскольку $(f/g)(\lambda) \leq (1/\gamma)f(\lambda)\lambda^{1/2}$ на множестве $\sigma(\text{Id} + T^2)$. Так как для $\lambda \in [0, +\infty[$ выполнены оценки

$$\begin{aligned} \lambda(f/g)(1 + \lambda^2) &\leq (1/\gamma)\sqrt{1 + \lambda^2}f(1 + \lambda^2), & \lambda\gamma &\leq \sqrt{1 + \lambda^2}f(1 + \lambda^2), \\ \gamma f(1 + \lambda^2)/g(1 + \lambda^2) &\leq \sqrt{1 + \lambda^2}f(1 + \lambda^2), \end{aligned} \quad (2.9)$$

обе части равенства

$$T \cdot (f/g)(\text{Id} + T^2) = (f/g)(\text{Id} + T^2) \cdot T$$

определены на подпространстве $\text{Dom}(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2)$. Поскольку функтор пополнения сохраняет коммутативность диаграмм, диаграмма (2.6) коммутативна. Подобным же образом рассматривается случай, когда функция $\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)$ удовлетворяет условию (vi). Лемма доказана.

Отметим, что коммутативность диаграммы (2.6), вертикальные стрелки которой суть изометрические изоморфизмы, влечет одновременную нормальную разрешимость операторов $T : H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X) \rightarrow H_T^f(X)$ и $T : H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot g(\lambda)}(X) \rightarrow H_T^g(X)$. Более того, справедливо следующее утверждение.

Предложение 2.4. Пусть функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяет условиям (i), (ii). Если, кроме того, выполнено хотя бы одно из следующих условий:

- 1) функция f удовлетворяет условию (v);
- 2) функция $\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)$ удовлетворяет условию (vi),

и оператор T как оператор, действующий на гильбертовом пространстве X , нормально разрешим, то нормально разрешим и оператор $T : H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X) \rightarrow H_T^f(X)$. Обратно, если существует такая функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, что для нее выполнены условия (i), (ii) и хотя бы одно из условий 1 или 2 и продолжение оператора $T : H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X) \rightarrow H_T^f(X)$ на пополнения нормально разрешимо, то нормально разрешим и оператор T , действующий из X в X .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть, например, функция $\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)$ удовлетворяет условию (vi). Тогда в силу леммы 2.4 диаграмма

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T^u} & H_T^{1/\sqrt{\lambda}}(X) \\ \downarrow 1/(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) & & \downarrow 1/(\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) \\ H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X) & \xrightarrow{T^d} & H_T^f(X) \end{array} \quad (2.10)$$

коммутативна и вертикальные стрелки являются изометрическими изоморфизмами. Поэтому нормальная разрешимость T^d эквивалентна нормальной разрешимости T^u . С другой стороны, диаграмма

$$\begin{array}{ccc} H_T^{\sqrt{\lambda}}(X) & \xrightarrow{T^w} & X \\ (\text{Id}+T^2)^{1/2} \downarrow & & \downarrow (\text{Id}+T^2)^{1/2} \\ X & \xrightarrow{T^u} & H_T^{1/\sqrt{\lambda}}(X) \end{array} \quad (2.11)$$

также коммутативна. Действительно, равенство

$$(\text{Id}+T^2)^{1/2}T = T(\text{Id}+T^2)^{1/2}$$

справедливо на подпространстве

$$D = \left\{ x \in X \mid \int_0^{+\infty} \lambda^2(1+\lambda^2) d(E_\lambda x, x) < \infty \right\}.$$

Поскольку для $\lambda \in [0, +\infty[$ будет

$$n\lambda \geq \frac{\lambda\sqrt{1+\lambda^2}}{1+\lambda/n},$$

если $n \in \mathbb{N}$, то для любого $n \in \mathbb{N}$ имеем

$$\text{Dom}(T) \subset \text{Dom}\left(\frac{\sqrt{\lambda(\lambda-1)}}{1+\sqrt{\lambda-1}/n}\right)(\text{Id}+T^2).$$

Так как оператор $(\text{Id}+n^{-1}T)^{-1}$ определен на X , на подпространстве $\text{Dom}(T)$ определена композиция

$$(\sqrt{\lambda(\lambda-1)})(\text{Id}+T^2) \cdot (\text{Id}+n^{-1}T)^{-1}.$$

Поэтому

$$(\text{Id}+n^{-1}T)^{-1}(\text{Dom}(T)) \subset \text{Dom}(\sqrt{\lambda(\lambda-1)})(\text{Id}+T^2) = D.$$

Пусть $u \in \text{Dom}(T)$. Подобно тому, как это делалось при доказательстве предложения 2.3, можно доказать, что последовательность

$$\{u_n\}_{n \in \mathbb{Z}} = \{(\text{Id}+n^{-1}T)^{-1}u\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset D$$

сходится к элементу u в норме пространства $H_T^{\sqrt{\lambda}}(X)$. Для этого достаточно заметить, что равенство

$$(\text{Id}+T^2)^{1/2} \cdot (\text{Id}+n^{-1}T)^{-1} = (\text{Id}+n^{-1}T)^{-1} \cdot (\text{Id}+T^2)^{1/2}$$

справедливо на подпространстве $\text{Dom}(\text{Id}+T^2)^{1/2}$. Кроме того, отображение $(\text{Id}+T^2)^{1/2}$ продолжается до изометрических изоморфизмов пространств $H_T^{\sqrt{\lambda}}(X)$ и X на пространства X и $H_T^{1/\sqrt{\lambda}}(X)$ соответственно. Таким образом, диаграмма (2.11) коммутативна, и операторы T^w и T^u нормально разрешимы одновременно.

Далее, как показано ранее, $\text{Dom}(T) = \text{Dom}(\text{Id}+T^2)^{1/2}$. Кроме того, нормы $\|\cdot\|_{H_T^{\sqrt{\lambda}}(X)}$ и $\|\cdot\|_{\text{Dom}(T)}$ эквивалентны на $\text{Dom}(T)$. Поэтому $\text{Im } T = \text{Im } T^w$ и нормальная разрешимость оператора T^w эквивалентна нормальной разрешимости оператора T . Случай, когда функция f удовлетворяет условию (v), доказывается аналогично. Предложение доказано.

Предложение 2.5. Пусть функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяет условиям (i), (ii), (vi) и, кроме того, для $\sqrt{\lambda}f(\lambda)$ выполнено условие (v). Тогда диаграмма

$$\begin{array}{ccc} H_T^{\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda)}(X) & \xrightarrow{T} & H_T^f(X) \\ (\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) \downarrow & & \downarrow (\sqrt{\lambda} \cdot f(\lambda))(\text{Id} + T^2) \\ X & \xrightarrow{T} & H_T^{1/\sqrt{\lambda}}(X), \end{array} \quad (2.12)$$

вертикальные стрелки которой являются изометрическими изоморфизмами, коммутативна.

Доказательство аналогично доказательству коммутативности диаграмм предыдущего предложения.

Предложение 2.6. Пусть функции $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяют условиям (i)–(iii) и, кроме того, функция f удовлетворяет одному из условий (v), (vi). Тогда отображение $\varepsilon_g^f : H_T^f(X) \rightarrow H_T^g(X)$ является вложением.

Доказательство. Если f удовлетворяет условию (v), то по лемме 1.5.2 пространство $\text{Dom } f(\text{Id} + T^2)$ полно в норме $\|f(\text{Id} + T^2) \cdot\|$ и, следовательно, $\text{Ker } \varepsilon_g^f = 0$. Если f удовлетворяет условию (vi), то диаграмма

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varepsilon_{g/f}^0} & H_T^{g/f}(X) \\ (1/f)(\text{Id} + T^2) \downarrow & & \downarrow (1/f)(\text{Id} + T^2) \\ H_T^f(X) & \xrightarrow{\varepsilon_g^f} & H_T^g(X) \end{array}$$

коммутативна и ее вертикальные стрелки являются изометрическими изоморфизмами. Действительно, по лемме 2.4 отображение $(1/f)(\text{Id} + T^2)$ осуществляет изометрические изоморфизмы X на $H_T^f(X)$ и $H_T^{g/f}(X)$ на $H_T^g(X)$. Коммутативность диаграммы очевидна.

Поэтому отображение $(1/f)(\text{Id} + T^2)$ осуществляет изометрический изоморфизм пространства $\text{Ker } \varepsilon_{g/f}^0$ на $\text{Ker } \varepsilon_g^f$. Пространство X полно в норме $\|\cdot\|_X$, так что $\text{Ker } \varepsilon_{g/f}^0 = 0$. Но тогда $\text{Ker } \varepsilon_g^f = 0$. Предложение доказано.

3. Гильбертовы комплексы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1. Последовательность $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ гильбертовых пространств A^i и их линейных отображений $d_A^i : A^i \rightarrow A^{i+1}$ называется *гильбертовым комплексом*, если для каждого $i \in \mathbb{Z}$ операторы d_A^i замкнуты и плотно определены, причем $\text{Im } d_A^{i-1} \subset \text{Ker } d_A^i$.

Скалярное произведение в пространстве A^i будем обозначать через $(\cdot, \cdot)_{A^i}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2. Пусть $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ — гильбертов комплекс. *Оператором Лапласа* на пространстве A^i называется оператор

$$\Delta_{A^i} = (d_A^i)^* d_A^i + d_A^{i-1} (d_A^{i-1})^*$$

с областью определения

$$\begin{aligned} \text{Dom}(\Delta_{A^i}) = \{ & x \in \text{Dom}(d_A^i) \cap \text{Dom}((d_A^{i-1})^*) \\ & | d_A^i x \in \text{Dom}((d_A^i)^*), (d_A^{i-1})^* x \in \text{Dom}(d_A^{i-1}) \}. \end{aligned}$$

Предложение 3.1 [7]. *Если операторы d_A^i, d_A^{i-1} замкнуты и плотно определены, то оператор Δ_{A^i} замкнут и плотно определен. Если операторы d_A^i, d_A^{i-1} нормально (компактно) разрешимы, то оператор Δ_{A^i} нормально (компактно) разрешим.*

Для гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ введем следующие обозначения:

$$\overline{H}^i \mathcal{A} \equiv \text{Ker } d_A^i / \overline{\text{Im } d_A^{i-1}}, \quad \mathcal{H}^i \mathcal{A} \equiv \text{Ker } d_A^i \cap \text{Ker} (d_A^{i-1})^*.$$

Пространства $\overline{H}^i \mathcal{A}$ каноническим образом изоморфны пространствам $\text{Ker } d_A^i \cap (\text{Im } d_A^{i-1})^\perp = \mathcal{H}^i \mathcal{A}$ и называются *редуцированными когомологиями комплекса \mathcal{A}* .

Лемма 3.1. $\mathcal{H}^i \mathcal{A} = \text{Ker } \Delta_{A^i}$.

Доказательство. Ясно, что $\mathcal{H}^i \mathcal{A} \subset \text{Ker } \Delta_{A^i}$. Обратное, если $x \in \text{Ker } \Delta_{A^i}$, то

$$(\Delta_{A^i} x, x)_{A^i} = \|d_A^i x\|_{A^{i+1}}^2 + \|(d_A^{i-1})^* x\|_{A^{i-1}}^2 = 0.$$

Отсюда $x \in \mathcal{H}^i \mathcal{A}$.

Лемма 3.2 (разложение Ходжа). *Для любого гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ выполнено равенство*

$$A^i = \overline{\text{Im } d_A^{i-1}} \oplus \overline{\text{Im} (d_A^i)^*} \oplus \mathcal{H}^i \mathcal{A}.$$

Для каждого $i \in \mathbb{Z}$ в гильбертовом комплексе \mathcal{A} операторы $\text{Id} + \Delta_{A^i}$ плотно определены, самосопряженны и строго положительны: $((\text{Id} + \Delta_{A^i})x, x)_{A^i} \geq (x, x)_{A^i}$ для любого $x \in \text{Dom}(\text{Id} + \Delta_{A^i})$.

Пусть функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяет условиям 2(i) и 2(ii). Тогда для каждого $i \in \mathbb{Z}$ определены пространства $H^{f,i}(\mathcal{A})$, представляющие собой пополнения $\text{Dom } f(\text{Id} + \Delta_{A^i})$ в норме $\|f(\text{Id} + \Delta_{A^i}) \cdot\|_{A^i}$.

Говорят, что гильбертово пространство X является *ортгональной суммой* семейства своих замкнутых подпространств $(X_\nu | \nu \in \mathbb{N})$, если эти подпространства попарно ортогональны и линейная оболочка множества $\bigcup_{\nu \in \mathbb{N}} X_\nu$ плотна в X .

Для ортогональной суммы семейства $(X_\nu | \nu \in \mathbb{N})$ будем использовать обозначение $\bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} X_\nu$. Будем говорить, что ортогональные разложения $X = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} X_\nu$ и $Y = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} Y_\nu$ *приводят оператор $T : X \rightarrow Y$* , если $P'_\nu \cdot T \subset T \cdot P_\nu$, где $P_\nu : X \rightarrow X$, $P'_\nu : Y \rightarrow Y$ — ортогональные проекторы на X_ν, Y_ν соответственно. Обозначим через $T_\nu : X_\nu \rightarrow Y_\nu$ сужение оператора T с $\text{Dom}(T_\nu) = X_\nu \cap \text{Dom}(T)$. Ясно, что $\text{Dom}(T_\nu) = P_\nu(\text{Dom}(T))$.

Если ортогональные разложения $X = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} X_\nu$ и $Y = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} Y_\nu$ приводят оператор $T : X \rightarrow Y$, то будем писать $T = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} T_\nu$.

Лемма 3.3 [8]. *Если ортогональные разложения $X = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} X_\nu$ и $Y = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} Y_\nu$ приводят замкнутый оператор T , то $\text{Dom}(T) = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} \text{Dom}(T_\nu)$, т. е. $x \in \text{Dom}(T)$ тогда и только тогда, когда $P_\nu x \in \text{Dom}(T_\nu)$ для каждого $\nu \in \mathbb{N}$ и $\sum_{\nu \in \mathbb{N}} \|T_\nu P_\nu x\|_Y < \infty$; кроме того, $Tx = \sum_{\nu \in \mathbb{N}} T_\nu P_\nu x$ для любого $x \in \text{Dom}(T)$.*

Если в гильбертовом комплексе $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ каждый член A^i разложен в ортогональную сумму своих подпространств $A^i = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}} A_\nu^i$, причем эти разложения приводят операторы d_A^i , то будем говорить, что комплекс \mathcal{A} разложен в ортогональную сумму своих подкомплексов $\mathcal{A}_\nu = (A_\nu^i, d_{A_\nu}^i)_{i \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}}$. Обозначим в гильбертовом комплексе \mathcal{A} символом $C^i(\mathcal{A})$ ортогональное дополнение в пространстве A^i подпространства $Z^i(\mathcal{A}) = \text{Ker } d_A^i$, а символом $\overline{B}^i(\mathcal{A})$ — подпространство $\overline{\text{Im } d_A^{i-1}}$.

В силу лемм 3.2 и 1.3 имеется ортогональное разложение

$$A^i = C^i(\mathcal{A}) \oplus \overline{B}^i(\mathcal{A}) \oplus \overline{H}^i \mathcal{A},$$

позволяющее расщепить комплекс \mathcal{A} в ортогональную сумму комплексов вида

$$\mathcal{A}'(i) : 0 \rightarrow \dots \rightarrow C^i(\mathcal{A}) \xrightarrow{\hat{d}_A^i} \overline{B}^{i+1}(\mathcal{A}) \rightarrow 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0$$

и

$$\mathcal{A}''(i) : 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \rightarrow \overline{H}^i \mathcal{A} \rightarrow 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0,$$

причем $\hat{d}_A^i x = d_A^i x$, $x \in C^i(\mathcal{A})$ и оператор \hat{d}_A^i замкнут, инъективен и имеет плотный образ. Таким образом, редуцированные когомологии комплекса $\mathcal{A}'(i)$ равны нулю во всех степенях, редуцированные когомологии комплекса $\mathcal{A}''(i)$ отличны от нуля лишь в размерности i и совпадают с пространствами $\overline{H}^i \mathcal{A}$.

Легко видеть, что данное разложение приводит оператор $\text{Id} + \Delta_{A^i}$:

$$\text{Id} + \Delta_{A^i} = (\text{Id}_{C^i} + \Delta_{A^i}^C) \oplus \text{Id}_{\overline{H}^i \mathcal{A}} \oplus (\text{Id}_{\overline{B}^i} + \Delta_{A^i}^B),$$

где

$$\text{Id}_{C^i} + \Delta_{A^i}^C = \text{Id}_{C^i} + (\hat{d}_A^i)^* \hat{d}_A^i, \quad \text{Id}_{\overline{B}^i} + \Delta_{A^i}^B = \text{Id}_{\overline{B}^i} + \hat{d}_A^{i-1} (\hat{d}_A^{i-1})^*.$$

Но тогда для любой функции $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющей условиям 2(i) и 2(ii), имеем

$$f(\text{Id} + \Delta_{A^i}) = f(\text{Id}_{C^i} + \Delta_{A^i}^C) \oplus \rho \text{Id}_{\overline{H}^i \mathcal{A}} \oplus f(\text{Id}_{\overline{B}^i} + \Delta_{A^i}^B),$$

где $\rho = f(1) > 0$. Поэтому имеется ортогональное разложение

$$H^{f,i}(\mathcal{A}) = H_C^{f,i}(\mathcal{A}) \oplus \overline{H}^i \mathcal{A} \oplus H_B^{f,i}(\mathcal{A}). \tag{3.1}$$

Как показано в предыдущем разделе, для любой пары функций $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющих условиям (i)–(iii), имеется ограниченное отображение $\varepsilon_g^{f,i} : H^{f,i}(\mathcal{A}) \rightarrow H^{g,i}(\mathcal{A})$. Разложение (3.1) приводит оператор $\varepsilon_g^{f,i}$:

$$\varepsilon_g^{f,i} = \varepsilon_{g,C}^{f,i} \oplus \rho \text{Id}_{\overline{H}^i(\mathcal{A})} \oplus \varepsilon_{g,B}^{f,i},$$

где $\varepsilon_{g,C}^{f,i} : H_C^{f,i}(\mathcal{A}) \rightarrow H_C^{g,i}(\mathcal{A})$, $\varepsilon_{g,B}^{f,i} : H_B^{f,i}(\mathcal{A}) \rightarrow H_B^{g,i}(\mathcal{A})$.

Лемма 3.4 (полярное разложение [9, 10]). Пусть T — плотно определенный замкнутый оператор, действующий из одного гильбертова пространства X в другое гильбертово пространство Y . Тогда существуют плотно определенный самосопряженный положительный оператор $G : X \rightarrow X$ и изометрический оператор $V : \overline{\text{Im } G} \rightarrow \overline{\text{Im } T}$ такие, что $T = VG$ и $\text{Dom}(T) = \text{Dom}(G)$.

Оператор V отображает $\overline{\text{Im } G}$ на $\overline{\text{Im } T}$ и может быть продолжен до ограниченного оператора, действующего из пространства X в пространство Y , если

положить $Vx = 0$ при $x \in (\text{Im } G)^\perp = \text{Ker } G$. Для сопряженного к T оператора имеем $T^* = GV^*$ и $T^*T = GV^*VG = G^2$. Если оператор T инъективен и имеет плотный образ, то теми же свойствами обладает и оператор G , а V — изометрия X на Y . Рассмотрим теперь полярные разложения операторов \hat{d}_A^i и $(\hat{d}_A^{i-1})^*$ в гильбертовом комплексе \mathcal{A} :

$$\hat{d}_A^i = V^i Q^i, \quad (\hat{d}_A^{i-1})^* = U^i R^i.$$

Здесь операторы V^i и U^i — изометрии:

$$V^i : C^i(\mathcal{A}) \rightarrow \overline{B^{i+1}}(\mathcal{A}), \quad U^i : \overline{B^i}(\mathcal{A}) \rightarrow C^{i-1}(\mathcal{A}),$$

а операторы $Q^i : C^i(\mathcal{A}) \rightarrow C^i(\mathcal{A})$ и $R^i : \overline{B^i}(\mathcal{A}) \rightarrow \overline{B^i}(\mathcal{A})$ плотно определены, самосопряженны, положительны, инъективны и имеют плотные образы.

Таким образом, пространство $H_C^{f,i}(\mathcal{A})$ — это не что иное, как пополнение $\text{Dom } f(\text{Id}_{C^i} + (Q^i)^2)$ по норме $\|f(\text{Id}_{C^i} + (Q^i)^2) \cdot\|_{C^i}$, а пространство $H_B^{f,i}(\mathcal{A})$ — пополнение $\text{Dom } f(\text{Id}_{\overline{B^i}} + (R^i)^2)$ по норме $\|f(\text{Id}_{\overline{B^i}} + (R^i)^2) \cdot\|_{\overline{B^i}}$.

Предложение 3.2. Для гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ справедливы следующие утверждения:

1) если оператор $d_A^{i_0}$ компактно разрешим, то для любой пары функций $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющих условиям (i)–(iv), операторы $\varepsilon_{g,C}^{f,i_0}$ и $\varepsilon_{g,B}^{f,i_0+1}$ компактны;

2) если существует такая пара функций $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, что f и g удовлетворяют условиям (i)–(iv) и отображение $\varepsilon_{g,C}^{f,i_0}$ или $\varepsilon_{g,B}^{f,i_0+1}$ компактно, то оператор $d_A^{i_0}$ компактно разрешим.

Доказательство. Если оператор $d_A^{i_0}$ компактно разрешим, то таков же и оператор $\hat{d}_A^{i_0}$ и, следовательно, операторы Q^{i_0} и R^{i_0+1} компактно разрешимы. Обратно, компактная разрешимость одного из операторов Q^{i_0} или R^{i_0+1} влечет компактную разрешимость оператора $d_A^{i_0}$. Теперь утверждение теоремы следует из предложения 2.2.

Теорема 3.1. Для гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ справедливы следующие утверждения:

1) если операторы $d_A^{i_0}, d_A^{i_0-1}$ компактно разрешимы, $\dim \overline{H^{i_0}} \mathcal{A} < \infty$, то для любой пары функций $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющих условиям (i)–(iv) оператор ε_g^{f,i_0} компактен;

2) если существует такая пара функций $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, что f и g удовлетворяют условиям (i)–(iv) и отображение ε_g^{f,i_0} компактно, то операторы $d_A^{i_0}, d_A^{i_0-1}$ компактно разрешимы и $\dim \overline{H^{i_0}} \mathcal{A} < \infty$.

Плотно определенный замкнутый оператор $T : X \rightarrow X$ на гильбертовом пространстве X называется *унитарно эквивалентным плотно определенному замкнутому оператору* $S : Y \rightarrow Y$ на гильбертовом пространстве Y , если существует унитарный оператор $U : X \rightarrow Y$ такой, что $\text{Im } U = Y$, $SU = UT$ или $S = UTU^{-1} = UTU^*$. Это означает, что $\text{Dom}(S)$ есть в точности образ $\text{Dom}(T)$ при унитарном отображении U и равенство $SUx = UTx$ справедливо для любого $x \in \text{Dom}(T)$.

Рассмотрим оператор $V^{i_0}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)(V^{i_0})^* : \overline{B^{i_0+1}} \rightarrow \overline{B^{i_0+1}}$. Имеем

$$V^{i_0}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)(V^{i_0})^* = V^{i_0}(V^{i_0})^* + V^{i_0}Q^{i_0}Q^{i_0}(V^{i_0})^* = \text{Id}_{\overline{B^{i_0+1}}} + \hat{d}_A^{i_0}(\hat{d}_A^{i_0})^*.$$

С другой стороны,

$$(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2) = \text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + R^{i_0+1}(U^{i_0+1})^* U^{i_0+1} R^{i_0+1} = \text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + \hat{d}_A^{i_0} (\hat{d}_A^{i_0})^*.$$

Таким образом, операторы $V^{i_0}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)(V^{i_0})^*$ и $(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)$ определены на $\text{Dom}(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)$ и на этом подпространстве совпадают. Иначе говоря, поскольку операторы $V^{i_0} : C^{i_0}(\mathcal{A}) \rightarrow \overline{B}^{i_0+1}(\mathcal{A})$ и $(V^{i_0})^* : \overline{B}^{i_0+1}(\mathcal{A}) \rightarrow C^{i_0}(\mathcal{A})$ представляют собой взаимно обратные унитарные операторы, отображения $(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)$ и $V^{i_0}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)(V^{i_0})^*$ унитарно эквивалентны. Отсюда

$$V^{i_0}(\text{Dom}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)) = \text{Dom}(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)$$

и

$$V^{i_0}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2) = (\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)V^{i_0}$$

на подпространстве $\text{Dom}(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)$. Но тогда в силу унитарной эквивалентности имеем

$$V^{i_0}f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2) = f(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)V^{i_0}$$

на подпространстве $\text{Dom} f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)$ для любой функции $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющей условиям (i) и (ii).

Унитарный оператор $V^{i_0} : C^{i_0}(\mathcal{A}) \rightarrow \overline{B}^{i_0+1}(\mathcal{A})$ осуществляет унитарную изометрию пространства $H_C^{f,i_0}(\mathcal{A})$ на пространство $H_{\overline{B}}^{f,i_0+1}(\mathcal{A})$. Действительно,

$$V^{i_0}(\text{Dom} f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)) = \text{Dom} f(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2),$$

и для любых $x, y \in \text{Dom} f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)$ имеем

$$\begin{aligned} & (V^{i_0}x, V^{i_0}y)_{H_{\overline{B}}^{f,i_0+1}(\mathcal{A})} \\ &= (f(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)V^{i_0}x, f(\text{Id}_{\overline{B}^{i_0+1}} + (R^{i_0+1})^2)V^{i_0}y)_{\overline{B}^{i_0+1}(\mathcal{A})} \\ &= (V^{i_0}f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)x, V^{i_0}f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)y)_{\overline{B}^{i_0+1}(\mathcal{A})} \\ &= (f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)x, f(\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)y)_{C^{i_0}(\mathcal{A})} = (x, y)_{H_C^{f,i_0}(\mathcal{A})}. \end{aligned}$$

Поэтому V^{i_0} индуцирует на пополнениях унитарную изометрию, которую мы будем обозначать символом V^{f,i_0} .

Из предложения 2.3 следует, что если функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяет условиям (i), (ii) и хотя бы одному из условий (v) или (vi), то оператор Q^{i_0} , действующий на $C^{i_0}(\mathcal{A})$, индуцирует ограниченный всюду определенный оператор $Q^{f,i_0} : H_C^{f(\lambda)\sqrt{\lambda},i_0}(\mathcal{A}) \rightarrow H_C^{f,i_0}(\mathcal{A})$.

Пусть гильбертов комплекс $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ удовлетворяет следующему условию:

(F) $A^i = 0$ при $i < 0$, и существует такое целое $N > 0$, что $A^i = 0$ при $i > N$. Такие комплексы мы будем называть *конечными*.

Пусть теперь \mathcal{A} — конечный гильбертов комплекс и функция $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ удовлетворяют условиям (i), (ii) и, кроме того, условию:

(G_k) для любого $l \in \{0, \dots, N\}$ функция $\lambda^{\frac{k-l}{2}} f(\lambda)$ удовлетворяет хотя бы одному из условий (v), (vi) для некоторого $k \in \mathbb{Z}$.

Рассмотрим комплексы

$$\mathcal{H}'(i_0, f, m) : 0 \rightarrow \dots \rightarrow H_C^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m}{2}},i_0}(\mathcal{A}) \xrightarrow{\hat{d}_{H,f}^{m,i_0}} H_{\overline{B}}^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2}},i_0+1}(\mathcal{A}) \rightarrow 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0$$

и

$$\mathcal{H}^m(i_0, f, m) : 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \rightarrow \overline{H}^{i_0} \mathcal{A} \rightarrow 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0.$$

Здесь

$$\hat{d}_{H,f}^{m,i_0} = V^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}} Q^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}},$$

$$\text{Dom}(\hat{d}_{H,f}^{m,i_0}) = \text{Dom}(Q^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}}) = H_C^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m}{2},i_0}}(\mathcal{A}),$$

$$\text{Ker} \hat{d}_{H,f}^{m,i_0} = \text{Ker} Q^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}} = 0,$$

отображение

$$V^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}} : H_C^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}}(\mathcal{A}) \rightarrow H_B^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0+1}}(\mathcal{A})$$

— унитарная изометрия.

Отметим, что образ оператора $\hat{d}_{H,1}^{1,i_0}$ совпадает с образом оператора $\hat{d}_A^{i_0}$, поскольку оператор $\hat{d}_{H,1}^{1,i_0}$ индуцирован оператором $\hat{d}_A^{i_0}$, т. е. $\hat{d}_{H,1}^{1,i_0}x = \hat{d}_A^{i_0}x$ для любого $x \in H_C^{\lambda^{\frac{1}{2},i_0}}(\mathcal{A})$ и, кроме того,

$$\text{Dom}(\hat{d}_{H,1}^{1,i_0}) = H_C^{\lambda^{\frac{1}{2},i_0}}(\mathcal{A}) = \text{Dom}((\text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2)^{1/2}) = \text{Dom}(Q^{i_0}) = \text{Dom}(\hat{d}_A^{i_0}).$$

Точно так же образ оператора $\hat{d}_{H,1}^{-1,i_0}$ совпадает с образом оператора $\hat{d}_A^{i_0}$. Это следует из коммутативности диаграммы (2.11) и диаграммы

$$\begin{array}{ccc} C^{i_0}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{V^{i_0}} & \overline{B}^{i_0+1}(\mathcal{A}) \\ \text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2 \Big\downarrow & & \Big\downarrow \text{Id}_{C^{i_0}} + (Q^{i_0})^2 \\ H_C^{\lambda^{-1/2},i_0}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{V^{\lambda^{-1/2},i_0}} & H_B^{\lambda^{-1/2},i_0+1}(\mathcal{A}) \end{array}$$

Поскольку комплекс \mathcal{A} конечен и удовлетворяет условию (G_k) для некоторого $k \in \mathbb{Z}$, в силу предложений 2.5 и 2.4 операторы $Q^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}}$ имеют плотные в $H_C^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m-1}{2},i_0}}(\mathcal{A})$ образы для любого $m \in \{k, \dots, k - N + 1\}$ и, следовательно, таковы же и операторы $\hat{d}_{H,f}^{m,i_0}$. Кроме того, ввиду предложения 2.4 и коммутативности диаграмм (2.11) и (2.12) оператор $\hat{d}_A^{i_0}$ нормально разрешим тогда и только тогда, когда нормально разрешим оператор $\hat{d}_{H,f}^{m,i_0}$.

Таким образом, редуцированные когомологии комплекса $\mathcal{H}^l(i_0, f, m)$ тривиальны во всех степенях, в то время как редуцированные когомологии комплекса $\mathcal{H}^m(i_0, f, m)$ отличны от нуля только в степени i_0 и совпадают с пространствами $\overline{H}^{i_0} \mathcal{A}$.

Поскольку для любой функции $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, для которой выполнены условия (i), (ii), имеется ортогональное разложение (3.1):

$$H^{g,i}(\mathcal{A}) = H_C^{g,i}(\mathcal{A}) \oplus \overline{H}^i \mathcal{A} \oplus H_B^{g,i}(\mathcal{A}),$$

то любому конечному гильбертову комплексу \mathcal{A} :

$$0 \rightarrow A^0 \xrightarrow{d_A^0} A^1 \rightarrow \dots \rightarrow A^i \xrightarrow{d_A^i} A^{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow A^N \rightarrow 0, \quad (3.2)$$

и функции $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющей условиям (i), (ii) и условию (G_k) , можно поставить в соответствие ассоциированный с (3.2) «соболевский комплекс» \mathcal{H}_k^f с ограниченными всюду определенными операторами в качестве дифференциалов:

$$0 \rightarrow H^{f(\lambda)\lambda^{\frac{k}{2}},0}(\mathcal{A}) \xrightarrow{d_{H,f}^{k,0}} H^{f(\lambda)\lambda^{\frac{k-1}{2}},1}(\mathcal{A}) \rightarrow \dots \rightarrow H^{f(\lambda)\lambda^{\frac{k-N}{2}},N}(\mathcal{A}) \rightarrow 0, \quad (3.3)$$

расщепляющийся в ортогональную сумму подкомплексов вида $\mathcal{H}^l(i_0, f, m)$ и $\mathcal{H}^n(i_0, f, m)$, $m \in \{k, \dots, k - N\}$, причем оператор $d_{H,f}^{m,i_0}$ индуцирует оператор $\hat{d}_{H,f}^{m,i_0}$ на пространстве $H_C^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m}{2}},i_0}(\mathcal{A})$ и нулевой оператор на пространстве $\overline{H}^{i_0} \mathcal{A} \oplus H_B^{f(\lambda)\lambda^{\frac{m}{2}},i_0}(\mathcal{A})$. Итогом изложенного выше служит

Теорема 3.2. Для конечного гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ и функции $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющей условиям (i), (ii) и (G_k) для некоторого $k \in \mathbb{Z}$, справедливы следующие утверждения:

1) оператор $d_A^{i_0}$ нормально разрешим тогда и только тогда, когда нормально разрешим оператор $d_{H,f}^{k-i_0,i_0}$;

2) редуцированные кохомологии $\overline{H}^{i_0} \mathcal{A}$ комплекса \mathcal{A} совпадают с редуцированными кохомологиями комплекса \mathcal{H}_k^f в степени i_0 .

В частности, комплексы \mathcal{A} и \mathcal{H}_k^f фредгольмовы одновременно.

Если комплекс \mathcal{A} не удовлетворяет условию конечности, то условие (G_k) следует заменить условием:

(G_∞) для любого $k \in \mathbb{Z}$ функция $\lambda^{\frac{k}{2}} f(\lambda)$ удовлетворяет хотя бы одному из условий (v), (vi).

В качестве примера рассмотрим бесконечный комплекс $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ и функцию $f(\lambda) = \lambda^{\frac{s}{2}}$, где $s \in \mathbb{R}$. Введем обозначения

$$H^{\sigma,i}(\mathcal{A}) = H^{\lambda^{\frac{\sigma}{2}},i}(\mathcal{A}), \quad d_H^{\sigma,i} = d_{H,\lambda^{\frac{s}{2}}}^{\sigma,i},$$

где $\sigma = s + m$, $m \in \mathbb{Z}$. Комбинируя теорему 3.2 и предложения 3.2 и 2.6, выводим

Следствие 3.1. Для гильбертова комплекса $\mathcal{A} = (A^i, d_A^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ справедливы следующие утверждения.

1. Операторы $\varepsilon_{t,C}^{s,i_0} : H_C^{s,i_0}(\mathcal{A}) \rightarrow H_C^{t,i_0}(\mathcal{A})$, $\varepsilon_{t,B}^{s,i_0+1} : H_B^{s,i_0+1}(\mathcal{A}) \rightarrow H_B^{t,i_0+1}(\mathcal{A})$ ограничены для всех пар $(s, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ таких, что $s \geq t$, и являются вложениями.

2. Если оператор $d_A^{i_0}$ компактно разрешим, то операторы вложения $\varepsilon_{t,C}^{s,i_0}$ и $\varepsilon_{t,B}^{s,i_0+1}$ компактны для всех пар $(s, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ таких, что $s > t$.

3. Если существует такая пара $(s, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $s \geq t$, что вложение $\varepsilon_{t,C}^{s,i_0}$ или вложение $\varepsilon_{t,B}^{s,i_0+1}$ компактно, то оператор $d_A^{i_0}$ компактно разрешим.

В частности, вложение ε_t^{s,i_0} , где $(s, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $s > t$, компактно тогда и только тогда, когда операторы $d_A^{i_0-1}$, $d_A^{i_0}$ компактно разрешимы и $\dim \overline{H}^{i_0} \mathcal{A} < \infty$.

4. Оператор $d_A^{i_0}$ нормально разрешим тогда и только тогда, когда нормально разрешим оператор d_H^{s,i_0} , где $s \in \mathbb{R}$ любое.

5. Пространство $\overline{H}^{i_0} \mathcal{A}$ совпадает с пространством $\text{Ker } d_H^{s,i_0} / \overline{\text{Im } d_H^{s+1,i_0-1}}$ для любого $s \in \mathbb{R}$. Здесь замыкание берется в пространстве $H^{s,i_0}(\mathcal{A})$.

В частности, комплексы \mathcal{A} и $\mathcal{H}^{\lambda^{s/2}}$ фредгольмовы одновременно.

Автор выражает искреннюю благодарность профессору В. И. Кузьминову за постановку задачи и ряд ценных советов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Bruning J., Lesh M.* Hilbert complexes // *J. Funct. Anal.* 1992. V. 108. P. 88–132.
2. *Кузьминов В. И., Шведов И. А.* Гомологические аспекты теории банаховых комплексов // *Сиб. мат. журн.* 1999. Т. 40, № 4. С. 893–904.
3. *Dodziuk J.* Sobolev spaces of differential forms and de Rham–Hodge isomorphism // *J. Differential Geom.* 1981. V. 16. P. 63–73.
4. *Кузьминов В. И., Шведов И. А.* Метод разделения переменных в задачах о нормальной и компактной разрешимости оператора внешнего дифференцирования // *Сиб. мат. журн.* 2000. Т. 41, № 2. С. 385–396.
5. *Гольдштейн В. М., Кузьминов В. И., Шведов И. А.* О нормальной и компактной разрешимости линейных операторов // *Сиб. мат. журн.* 1989. Т. 30, № 5. С. 49–59.
6. *Рисс Ф., Секефальви-Надь Б.* Лекции по функциональному анализу. М.: Мир, 1979.
7. *Гольдштейн В. М., Кузьминов В. И., Шведов И. А.* О нормальной и компактной разрешимости оператора внешнего дифференцирования при однородных краевых условиях // *Сиб. мат. журн.* 1987. Т. 28, № 4. С. 82–96.
8. *Кузьминов В. И., Шведов И. А.* О разложении в ортогональную прямую сумму комплексов де Рама искривленных произведений римановых многообразий // *Сиб. мат. журн.* 1998. Т. 39, № 2. С. 354–368.
9. *Като Т.* Теория возмущений линейных операторов. М.: Мир, 1972.
10. *Рид М., Саймон Б.* Методы современной математической физики. Т. 1. Функциональный анализ. М.: Мир, 1977.

Статья поступила 10 марта 2003 г.

Глотко Николай Владимирович

*Новосибирский гос. университет, механико-математический факультет,
ул. Пирогова, 2, Новосибирск 630090*