

УДК 517.929.4

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ  
И ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ  
В ЛИНЕЙНЫХ ЧЛЕНАХ

Г. В. Демиденко, И. И. Матвеева

**Аннотация:** Рассматриваются системы квазилинейных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом и периодическими коэффициентами в линейных членах. Установлены достаточные условия асимптотической устойчивости нулевого решения, получены оценки решений, характеризующие скорость убывания на бесконечности, указано множество притяжения нулевого решения. Аналогичные результаты получены для систем с параметрами.

**Ключевые слова:** уравнения с запаздывающим аргументом, периодические коэффициенты, асимптотическая устойчивость, функционал Ляпунова — Красовского.

Мы рассматриваем системы дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом следующего вида:

$$y'(t) = A(t)y(t) + B(t)y(t - \tau) + F(t, y(t), y(t - \tau)), \quad t > \tau > 0, \quad (0.1)$$

где  $A(t)$ ,  $B(t)$  — матрицы размера  $n \times n$  с непрерывными  $T$ -периодическими элементами, т. е.

$$A(t + T) \equiv A(t), \quad B(t + T) \equiv B(t), \quad T > \tau,$$

$F(t, u, v)$  — вещественнозначная вектор-функция, удовлетворяющая условию Липшица, и

$$\|F(t, u, v)\| \leq q\|u\|^{1+\omega}, \quad q, \omega \geq 0 — \text{постоянные.}$$

Мы исследуем асимптотическую устойчивость нулевого решения системы (0.1), получаем оценки решений, характеризующие скорость убывания при  $t \rightarrow \infty$ , и указываем множество притяжения нулевого решения. Из полученных результатов вытекает, что асимптотические свойства решений системы (0.1) определяются интегралами вида

$$\int_0^T \frac{\alpha(s)}{\|H(s)\|} ds, \quad \int_0^T \frac{\|H(s)\|}{\beta(s)} ds, \quad \alpha(s) > 0, \beta(s) > 0,$$

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 07-01-00289).

© 2007 Демиденко Г. В., Матвеева И. И.

где  $H(t)$  — эрмитово положительно определенное решение матричного дифференциального неравенства типа Риккати

$$\frac{d}{dt}H(t) + H(t)A(t) + A^*(t)H(t) + H(t)B(t)K^{-1}(\tau)B^*(t)H(t) < -K(0), \quad t \in [0, T],$$

$$K(s) = K^*(s) > 0, \quad \frac{d}{ds}K(s) < 0, \quad s \in [0, \tau].$$

Эти результаты обобщают результаты авторов из работы [1], в которой аналогичные исследования проведены для систем уравнений с запаздывающим аргументом в случае постоянных коэффициентов в линейных членах.

### § 1. Линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом

Как хорошо известно, для систем линейных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом в случае постоянных коэффициентов

$$y'(t) = Ay(t) + By(t - \tau), \quad t > \tau, \quad (1.1)$$

имеет место спектральный критерий асимптотической устойчивости (см., например, [2–5]), который формулируется в терминах принадлежности корней квазимногочлена

$$\det(A + e^{-\lambda\tau}B - \lambda I) = 0 \quad (1.2)$$

левой полуплоскости  $\mathbb{C}_- = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} \lambda < 0\}$ . Однако на практике проверка этого условия является сложной задачей. В случае систем дифференциальных уравнений без запаздывания ( $B = 0$ ) вместо спектрального критерия при исследовании асимптотической устойчивости решений обычно используют критерий, формулируемый в терминах разрешимости матричного уравнения Ляпунова

$$HA + A^*H = -C, \quad C = C^* > 0. \quad (1.3)$$

Для линейных систем (1.1) также имеет место аналог теоремы об асимптотической устойчивости, который формулируется на основе матричного уравнения Ляпунова. Его доказательство проводится с использованием функционала Ляпунова — Красовского

$$v_0(t, y) = \langle Hy(t), y(t) \rangle + \int_{t-\tau}^t \langle Hy(s), y(s) \rangle ds, \quad (1.4)$$

рассматриваемого на решениях системы (1.1), и вытекает из теоремы Красовского об асимптотической устойчивости (см., например, [2]). С использованием функционала вида (1.4) также устанавливается асимптотическая устойчивость нулевого решения для систем квазилинейных уравнений.

Отметим, что функционал Ляпунова — Красовского вида (1.4) для систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом является аналогом функционала Ляпунова  $\langle Hy, y \rangle$  для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Однако использование функционала (1.4) не позволяет получить оценки скорости убывания на бесконечности решений дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, в то время как в случае дифференциальных уравнений без запаздывания

$$\frac{dy}{dt} = Ay$$

это удается сделать с использованием функционала Ляпунова. Действительно, если спектр матрицы  $A$  содержится в левой полуплоскости  $S_-$  и  $H = H^* > 0$  — решение уравнения Ляпунова (1.3) при  $C = I$ , то неравенство [6]

$$\|e^{tA}\| \leq \sqrt{2\|A\|\|H\|} e^{-\frac{t}{2\|H\|}}, \quad t > 0, \quad (1.5)$$

дает оценку для скорости убывания решений при  $t \rightarrow \infty$ . Отметим также, что при численном исследовании асимптотической устойчивости решений дифференциальных уравнений оценки типа (1.5) играют важную роль. Именно наличие таких оценок позволяет разрабатывать алгоритмы с гарантированной точностью [7]. Поэтому получение аналогов оценок такого типа представляет очень важную задачу в теории дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом как с теоретической, так и с прикладной точек зрения.

Следует отметить, что в последние годы в ряде работ получены оценки экспоненциального убывания решений систем линейных уравнений (1.1) (см. обзор [8]). При получении таких оценок используются различные модификации функционала Ляпунова — Красовского.

В работе [1] мы предложили одну модификацию функционала Ляпунова — Красовского, с помощью которой были получены оценки экспоненциального убывания на бесконечности решений линейных (1.1) и квазилинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом (0.1) в случае постоянных коэффициентов в линейных членах, а также указаны множества притяжения нулевого решения. Отметим, что такая модификация функционала в частных случаях совпадает с функционалом из работы [9].

Используя результаты из работ авторов [10, 11], в настоящей статье мы предлагаем модификацию функционала Ляпунова — Красовского, которая позволяет получить аналогичные оценки решений линейных и квазилинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом (0.1) в случае периодических коэффициентов.

Вначале рассмотрим линейную систему уравнений с  $T$ -периодическими коэффициентами

$$y'(t) = A(t)y(t) + B(t)y(t - \tau), \quad t > \tau. \quad (1.6)$$

Отметим, что для систем дифференциальных уравнений без запаздывания

$$y' = A(t)y, \quad t > 0, \quad (1.7)$$

имеет место критерий асимптотической устойчивости, на основе которого выводятся [10] оценки решений системы (1.7), характеризующие их экспоненциальное убывание при  $t \rightarrow \infty$ . Напомним, что критерием асимптотической устойчивости нулевого решения системы (1.7) является существование эрмитова решения следующей краевой задачи для дифференциального уравнения Ляпунова:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}H + HA(t) + A^*(t)H = -L(t), \quad L(t) = L^*(t) > 0, \quad 0 \leq t \leq T, \\ H(0) = H(T) > 0. \end{cases} \quad (1.8)$$

Пусть  $H(t)$  — эрмитово решение краевой задачи (1.8). Тогда  $H(t) > 0$  при  $t \in [0, T]$  (см. [10]). Продолжим периодическим образом  $H(t)$  на всю полуось  $\{t \geq 0\}$ , сохраняя для продолженной матрицы то же обозначение. В [10, 11] в терминах нормы решения краевой задачи (1.8) установлены оценки, характеризующие скорость убывания решений линейных и квазилинейных систем дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами в линейных членах

$$y' = A(t)y + \varphi(t, y).$$

Приведем одно из таких неравенств в линейном случае.

**Теорема 1.** Для решений системы дифференциальных уравнений (1.7) имеет место оценка

$$\|y(t)\|^2 \leq h_1^{-1}(t) \exp\left(-\int_0^t \frac{l_1(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) \|H(0)\| \|y(0)\|^2, \quad t > 0, \quad (1.9)$$

где  $h_1(t) > 0$ ,  $l_1(t) > 0$  — минимальные собственные числа матриц  $H(t)$ ,  $L(t)$  соответственно.

Отметим, что неравенство (1.9) является аналогом оценки (1.5), поскольку в случае линейных систем с постоянными коэффициентами ( $A(t) \equiv A$ ) и  $L(t) \equiv I$  решение краевой задачи (1.8) не зависит от  $t$  и совпадает с решением матричного уравнения Ляпунова  $HA + A^*H = -I$ , при этом  $h_1 \geq \frac{1}{2\|A\|}$ . Следовательно, из (1.9) вытекает неравенство

$$\|e^{tA}y(0)\|^2 \leq 2\|A\| \|H\| e^{-\frac{t}{\|H\|}} \|y(0)\|^2, \quad t > 0,$$

а отсюда следует (1.5).

В следующих двух теоремах мы укажем достаточные условия асимптотической устойчивости нулевого решения линейной системы с запаздывающим аргументом (1.6) и приведем аналог оценки (1.9) для решений этой системы.

**Теорема 2.** Предположим, что существуют матрицы

$$H(t) = H^*(t) \in C^1[0, T] \quad \text{и} \quad K(s) = K^*(s) \in C^1[0, \tau] \quad (1.10)$$

такие, что

$$H(0) = H(T) > 0, \quad K(s) > 0, \quad \frac{d}{ds}K(s) < 0, \quad s \in [0, \tau], \quad (1.11)$$

и составная матрица

$$C(t) = - \begin{pmatrix} \frac{d}{dt}H(t) + H(t)A(t) + A^*(t)H(t) + K(0) & H(t)B(t) \\ B^*(t)H(t) & -K(\tau) \end{pmatrix} \quad (1.12)$$

положительно определена на отрезке  $[0, T]$ . Тогда нулевое решение системы (1.6) асимптотически устойчиво.

**Доказательство.** Из положительной определенности матрицы (1.12) следует, что

$$-\frac{d}{dt}H(t) - H(t)A(t) - A^*(t)H(t) - K(0) = M(t),$$

где  $M(t) = M^*(t) > 0$  на  $[0, T]$ . Поскольку  $H(0) = H(T) > 0$ , то матрица  $H(t)$  является решением краевой задачи (1.8) с матрицей  $L(t) = M(t) + K(0)$ . Поэтому  $H(t) > 0$  на всем отрезке  $[0, T]$  (см. [10]). Продолжим эту матрицу  $T$ -периодическим образом на всю полуось  $\{t \geq 0\}$ , сохраняя то же обозначение.

Пусть  $y(t)$  — решение начальной задачи для системы (1.6)

$$y'(t) = A(t)y(t) + B(t)y(t - \tau), \quad t > \tau, \quad y(t) = \varphi(t), \quad t \in [0, \tau], \quad (1.13)$$

где  $\varphi(t) \in C[0, \tau]$  — заданная вектор-функция. По аналогии с [1], используя матрицы  $H(t)$  и  $K(s)$ , рассмотрим следующую модификацию функционала Ляпунова — Красовского:

$$v(t, y) = \langle H(t)y(t), y(t) \rangle + \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds. \quad (1.14)$$

В силу сказанного выше и условий (1.10), (1.11) этот функционал является положительно определенным. Дифференцируя его, получаем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}v(t, y) \equiv & \left\langle \left[ \frac{d}{dt}H(t) + H(t)A(t) + A^*(t)H(t) + K(0) \right] y(t), y(t) \right\rangle \\ & + \langle H(t)B(t)y(t - \tau), y(t) \rangle + \langle B^*(t)H(t)y(t), y(t - \tau) \rangle \\ & - \langle K(\tau)y(t - \tau), y(t - \tau) \rangle + \int_{t-\tau}^t \left\langle \frac{d}{dt}K(t-s)y(s), y(s) \right\rangle ds. \end{aligned}$$

Матрицу  $C(t)$  в (1.12) можно рассматривать как положительно определенную  $T$ -периодическую матрицу на всей полуоси  $\{t \geq 0\}$ . Используя ее, полученное тождество можно записать в виде

$$\frac{d}{dt}v(t, y) \equiv - \left\langle C(t) \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t - \tau) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t - \tau) \end{pmatrix} \right\rangle + \int_{t-\tau}^t \left\langle \frac{d}{dt}K(t-s)y(s), y(s) \right\rangle ds. \quad (1.15)$$

Отсюда в силу условий теоремы вытекает, что функционал  $v(t, y)$ , определенный в (1.14), удовлетворяет условиям теоремы Красовского [2] об асимптотической устойчивости. Следовательно, нулевое решение системы (1.6) асимптотически устойчиво.

Теорема доказана.

**Теорема 3.** *Предположим, что существуют эрмитовы матрицы  $H(t)$  и  $K(s)$ , удовлетворяющие условиям (1.10), (1.11) и дифференциальному неравенству*

$$\frac{d}{dt}H(t) + H(t)A(t) + A^*(t)H(t) + H(t)B(t)K^{-1}(\tau)B^*(t)H(t) < -K(0), \quad t \in [0, T]. \quad (1.16)$$

Тогда нулевое решение системы (1.6) асимптотически устойчиво.

Доказательство проведем по аналогии с рассуждениями из [12, с. 559]. Очевидно, что матрица

$$C(t) = \begin{pmatrix} -\frac{d}{dt}H(t) - H(t)A(t) - A^*(t)H(t) - K(0) & -H(t)B(t) \\ -B^*(t)H(t) & K(\tau) \end{pmatrix}$$

положительно определена на отрезке  $[0, T]$  тогда и только тогда, когда матрица

$$M(t) = \begin{pmatrix} I & D^*(t) \\ 0 & I \end{pmatrix} C(t) \begin{pmatrix} I & 0 \\ D(t) & I \end{pmatrix}$$

положительно определена при  $t \in [0, T]$ . Возьмем  $D(t) = K^{-1}(\tau)B^*(t)H(t)$ , тогда

$$M(t) = \begin{pmatrix} -\frac{d}{dt}H(t) - H(t)A(t) - A^*(t)H(t) - K(0) - H(t)B(t)K^{-1}(\tau)B^*(t)H(t) & 0 \\ 0 & K(\tau) \end{pmatrix}.$$

Следовательно, если  $H(t) > 0$  и  $K(s) > 0$  удовлетворяют неравенству (1.16), то  $C(t)$  положительно определена на  $[0, T]$ , и в силу теоремы 2 нулевое решение системы (1.6) асимптотически устойчиво.

Теорема доказана.

Используя функционал (1.14) и проведенные рассуждения, ниже мы получим оценки решений системы линейных дифференциальных уравнений (1.6).

**Теорема 4.** Пусть существуют матрицы  $H(t)$  и  $K(s)$ , удовлетворяющие условиям теоремы 2. Обозначим через  $c_1(t) > 0$  минимальное собственное значение матрицы (1.12) и через  $k > 0$  — максимальное число такое, что

$$\frac{d}{ds}K(s) + kK(s) \leq 0, \quad s \in [0, \tau]. \quad (1.17)$$

Тогда для решения задачи (1.13) справедливо неравенство

$$\begin{aligned} & \langle H(t)y(t), y(t) \rangle + \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds \\ & \leq \exp\left(-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) \left[ \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds \right], \quad t > \tau, \end{aligned} \quad (1.18)$$

где

$$\varepsilon(t) = \min\{c_1(t), k\|H(t)\|\}. \quad (1.19)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Для решения  $y(t)$  начальной задачи (1.13) выше было установлено тождество (1.15). По условию  $c_1(t) > 0$  является минимальным собственным числом матрицы  $C(t)$ , тогда

$$\begin{aligned} \left\langle C(t) \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t-\tau) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t-\tau) \end{pmatrix} \right\rangle & \geq c_1(t)(\|y(t)\|^2 + \|y(t-\tau)\|^2) \\ & \geq \frac{c_1(t)}{\|H(t)\|} \langle H(t)y(t), y(t) \rangle. \end{aligned} \quad (1.20)$$

Из условия (1.17) имеем

$$-\left\langle \frac{d}{dt}K(t-s)y(s), y(s) \right\rangle \geq k \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle. \quad (1.21)$$

Учитывая оценки (1.20) и (1.21), из тождества (1.15) получаем неравенство

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left[ \langle H(t)y(t), y(t) \rangle + \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds \right] \\ & + \frac{c_1(t)}{\|H(t)\|} \langle H(t)y(t), y(t) \rangle + k \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds \leq 0, \quad t > \tau. \end{aligned}$$

Поскольку  $\varepsilon(t) = \min\{c_1(t), k\|H(t)\|\}$ , из определения (1.14) функционала  $v(t, y)$  имеем

$$\frac{d}{dt}v(t, y) + \frac{\varepsilon(t)}{\|H(t)\|}v(t, y) \leq 0, \quad t > \tau.$$

Следовательно,

$$v(t, y) \leq e^{-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi} v(\tau, y), \quad t > \tau.$$

Теорема доказана.

**Следствие.** Для решения начальной задачи (1.13) справедливо неравенство

$$\|y(t)\|^2 \leq h_1^{-1}(t) \exp\left(-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) \times \left[ \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds \right], \quad t > \tau,$$

где  $h_1(t) > 0$  — минимальное собственное число матрицы  $H(t)$ .

Доказательство непосредственно вытекает из оценки (1.18).

Рассмотрим систему (1.6) с возмущением:

$$y'(t) = (A(t) + A_1(t))y(t) + (B(t) + B_1(t))y(t - \tau), \quad t > \tau, \quad (1.22)$$

где  $A_1(t)$ ,  $B_1(t)$  — матрицы размера  $n \times n$  с непрерывными элементами. Предположим, что нулевое решение невозмущенной системы (1.6) асимптотически устойчиво. Ниже мы укажем условия на матрицы  $A_1(t)$  и  $B_1(t)$ , при которых нулевое решение системы (1.22) также будет асимптотически устойчиво.

**Теорема 5.** Пусть выполнены условия теоремы 2. Предположим, что матрицы  $A_1(t)$  и  $B_1(t)$  такие, что

$$C(t) - C_1(t) > 0, \quad t \in [0, T], \quad (1.23)$$

где

$$C_1(t) = \begin{pmatrix} H(t)A_1(t) + A_1^*(t)H(t) & H(t)B_1(t) \\ B_1^*(t)H(t) & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда нулевое решение системы (1.22) асимптотически устойчиво.

Доказательство. Пусть  $y(t)$  — решение начальной задачи для системы (1.22)

$$\begin{aligned} y'(t) &= (A(t) + A_1(t))y(t) + (B(t) + B_1(t))y(t - \tau), \quad t > \tau, \\ y(t) &= \varphi(t), \quad t \in [0, \tau], \end{aligned} \quad (1.24)$$

где  $\varphi(t) \in C[0, \tau]$  — заданная вектор-функция. Используя функционал (1.14), как при доказательстве теоремы 2, получим тождество

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}v(t, y) &\equiv - \left\langle C(t) \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t - \tau) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t - \tau) \end{pmatrix} \right\rangle \\ &+ \left\langle C_1(t) \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t - \tau) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t - \tau) \end{pmatrix} \right\rangle + \int_{t-\tau}^t \left\langle \frac{d}{dt}K(t-s)y(s), y(s) \right\rangle ds. \end{aligned}$$

Следовательно, если матрицы  $A_1(t)$  и  $B_1(t)$  такие, что выполнено неравенство (1.23), то функционал  $v(t, y)$  удовлетворяет условиям теоремы Красовского [2] об асимптотической устойчивости. Следовательно, нулевое решение системы (1.22) асимптотически устойчиво.

Теорема доказана.

**Следствие.** Пусть выполнены условия теоремы 4, матрицы  $A_1(t)$  и  $B_1(t)$  такие, что

$$\|C_1(t)\| < c_1(t),$$

где  $c_1(t)$  — минимальное собственное число матрицы  $C(t)$ . Тогда для решения начальной задачи (1.24) имеет место оценка

$$\|y(t)\|^2 \leq h_1^{-1}(t) \exp\left(-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon_1(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) \times \left[ \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds \right], \quad t > \tau,$$

где  $h_1(t) > 0$  — минимальное собственное число матрицы  $H(t)$ ,  $\varepsilon_1(t) = \min\{c_1(t) - \|C_1(t)\|, k\|H(t)\|\} > 0$ , число  $k > 0$  определяется неравенством (1.17).

## § 2. Линейные дифференциальные уравнения с параметром

В этом параграфе мы рассмотрим системы вида (1.6) с параметрами и укажем условия, при которых имеет место асимптотическая устойчивость нулевых решений.

Вначале рассмотрим систему

$$\frac{d}{dt}y(t) = \mu A(t)y(t) + B(t)y(t-\tau), \quad t > \tau > 0, \quad (2.1)$$

где  $A(t)$ ,  $B(t)$  — матрицы размера  $n \times n$  с непрерывными  $T$ -периодическими элементами,  $\mu > 0$  — вещественный параметр.

Для системы дифференциальных уравнений без запаздывания ( $B(t) \equiv 0$ ) имеет место следующий результат [6].

**Теорема (Крейн).** Если для любого  $t \in [0, T]$  спектр матрицы  $A(t)$  принадлежит левой полуплоскости  $\{\lambda \mid \operatorname{Re} \lambda < 0\}$ , то существует  $\mu_1 > 0$  такое, что при  $\mu > \mu_1$  нулевое решение системы

$$\frac{dy}{dt} = \mu A(t)y, \quad t > 0, \quad (2.2)$$

асимптотически устойчиво.

Мы покажем, что аналогичный результат имеет место в случае систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом.

**Теорема 6.** Если для любого  $t \in [0, T]$  спектр матрицы  $A(t)$  принадлежит левой полуплоскости  $\{\lambda \mid \operatorname{Re} \lambda < 0\}$ , то существует  $\mu_0 > 0$  такое, что при  $\mu > \mu_0$  нулевое решение системы (2.1) асимптотически устойчиво.

**Доказательство.** В силу теоремы 3 если существуют матрицы  $H(t)$  и  $K(s)$ , удовлетворяющие условиям (1.10), (1.11) и неравенству вида (1.16)

$$\frac{d}{dt}H(t) + \mu H(t)A(t) + \mu A^*(t)H(t) + H(t)B(t)K^{-1}(\tau)B^*(t)H(t) < -K(0), \quad (2.3)$$

то нулевое решение системы (2.1) асимптотически устойчиво. Построим такие матрицы  $H(t)$  и  $K(s)$ .



Из доказательства теоремы Крейна вытекает, что для матрицанта системы (2.2) имеет место оценка

$$\|Y(t)\|^2 \leq c_\varepsilon e^{-\varepsilon\mu t}, \quad t \in [0, T], \quad \varepsilon > 0, \quad \mu > \mu_1.$$

Следовательно, в силу упомянутого выше критерия асимптотической устойчивости нулевого решения систем вида (1.7) при  $\mu > \mu_1$  существует единственное решение  $H(t) = H^*(t)$  краевой задачи

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}H + \mu HA(t) + \mu A^*(t)H = -I, \\ H(0) = H(T) > 0. \end{cases} \quad (2.4)$$

Решение этой задачи может быть записано в виде

$$\begin{aligned} H(t) &= (Y^{-1}(t))^* \left[ \int_t^\infty (Y(s))^* Y(s) ds \right] Y^{-1}(t) \\ &= \int_0^\infty (Y(\eta+t)Y^{-1}(t))^* (Y(\eta+t)Y^{-1}(t)) d\eta. \end{aligned}$$

При каждом фиксированном  $t$  рассмотрим матрицу

$$\tilde{Y}(\eta) = Y(\eta+t)Y^{-1}(t).$$

Очевидно, она является матрицантом системы

$$\frac{d\tilde{y}}{d\eta} = \mu A(\eta+t)\tilde{y}.$$

Тогда из теоремы Крейна имеем оценку

$$\|\tilde{Y}(\eta)\|^2 \leq \tilde{c}_\varepsilon e^{-\varepsilon\mu\eta}, \quad \eta \in [0, T], \quad \varepsilon > 0, \quad \mu > \mu_1. \quad (2.5)$$

Учитывая свойство матрицанта

$$\tilde{Y}(\eta+kT) \equiv \tilde{Y}(\eta)\tilde{Y}^k(T), \quad k = 1, 2, \dots,$$

перепишем формулу для решения  $H(t)$  задачи (2.4) в виде

$$\begin{aligned} H(t) &= \int_0^\infty (\tilde{Y}(\eta))^* \tilde{Y}(\eta) d\eta = \sum_{k=0}^\infty \int_{kT}^{(k+1)T} (\tilde{Y}(\eta))^* \tilde{Y}(\eta) d\eta \\ &= \int_0^T (\tilde{Y}(\eta))^* \tilde{Y}(\eta) d\eta + (\tilde{Y}(T))^* \left[ \int_0^T (\tilde{Y}(\eta))^* \tilde{Y}(\eta) d\eta \right] \tilde{Y}(T) \\ &\quad + (\tilde{Y}^2(T))^* \left[ \int_0^T (\tilde{Y}(\eta))^* \tilde{Y}(\eta) d\eta \right] \tilde{Y}^2(T) + \dots \end{aligned}$$

Обозначим

$$D = \int_0^T (\tilde{Y}(\eta))^* \tilde{Y}(\eta) d\eta,$$

тогда, очевидно, имеем неравенство

$$\|H(t)\| \leq \|D\| + \|\tilde{Y}(T)\|^2 \|D\| + \|\tilde{Y}(T)\|^4 \|D\| + \dots$$

В силу оценки (2.5) существует  $\mu_2 \geq \mu_1$  такое, что при  $\mu \geq \mu_2$

$$\|\tilde{Y}(T)\|^2 \leq 1/2.$$

Отсюда

$$\|H(t)\| \leq \frac{1}{1 - \|\tilde{Y}(T)\|^2} \|D\| \leq 2\|D\|.$$

Учитывая определение интеграла  $D$  и оценку (2.5), получим

$$\|D\| \leq \int_0^T \|\tilde{Y}(\eta)\|^2 d\eta \leq \tilde{c}_\varepsilon \int_0^T e^{-\varepsilon\mu\eta} d\eta = \frac{\tilde{c}_\varepsilon}{\varepsilon\mu} (1 - e^{-\varepsilon\mu T}) \leq \frac{\tilde{c}_\varepsilon}{\varepsilon\mu}.$$

Следовательно,

$$\|H(t)\| \leq \frac{\tilde{c}}{\mu}, \quad \tilde{c} = \frac{2\tilde{c}_\varepsilon}{\varepsilon}. \quad (2.6)$$

Возьмем теперь  $K(s) = \frac{1}{2}e^{-s}I$ . Тогда проверка неравенства (2.3) для матриц  $H(t)$  и  $K(s)$  сводится к проверке неравенства

$$2e^\tau H(t)B(t)B^*(t)H(t) < \frac{1}{2}I. \quad (2.7)$$

В силу (2.6) при  $\mu \geq \mu_2$  имеем

$$\|2e^\tau H(t)B(t)B^*(t)H(t)\| \leq 2e^\tau \|H(t)\|^2 \|B(t)\|^2 \leq \frac{2\tilde{c}^2 e^\tau}{\mu^2} \|B(t)\|^2.$$

Поэтому для любой непрерывной матрицы  $B(t)$  и любого  $\tau > 0$  существует  $\mu_0 \geq \mu_2$  такое, что при  $\mu > \mu_0$  неравенство (2.7) выполнено. Следовательно, при  $\mu > \mu_0$  нулевое решение системы (2.1) асимптотически устойчиво.

Теорема доказана.

Рассмотрим систему

$$\frac{d}{dt}y(t) = [A_0 + A_1(\omega t)]y(t) + By(t - \tau), \quad t > \tau > 0, \quad (2.8)$$

где спектр постоянной матрицы  $A_0$  размера  $n \times n$  лежит в левой полуплоскости  $\{\lambda \mid \operatorname{Re} \lambda < 0\}$ ,  $A_1(t)$  — матрица размера  $n \times n$  с непрерывными  $T$ -периодическими элементами, причем

$$\int_0^T A_1(\xi) d\xi = 0, \quad (2.9)$$

$B$  — постоянная матрица размера  $n \times n$ ,  $\omega > 0$  — вещественный параметр.

**Теорема 7.** Пусть

$$\|B\| < \frac{1}{8\|H_0\|},$$

где  $H_0$  — решение матричного уравнения Ляпунова

$$HA_0 + A_0^*H = -I. \quad (2.10)$$

Тогда существует  $\omega_0 > 0$  такое, что при  $\omega > \omega_0$  нулевое решение системы (2.8) асимптотически устойчиво.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сделав замену  $\xi = \omega t$ ,  $\tilde{y}(\xi) = y(\xi/\omega)$ , перепишем систему (2.8) в виде

$$\frac{d}{d\xi}\tilde{y}(\xi) = \frac{1}{\omega}[A_0 + A_1(\xi)]\tilde{y}(\xi) + \frac{1}{\omega}B\tilde{y}(\xi - \omega\tau), \quad \tau > 0.$$

В силу теоремы 3 если существуют матрицы  $H(\xi)$  и  $K(s)$ , удовлетворяющие условиям (1.10) и (1.11), такие, что

$$\begin{aligned} - \left[ \frac{d}{d\xi}H(\xi) + \frac{1}{\omega}H(\xi)(A_0 + A_1(\xi)) + \frac{1}{\omega}(A_0 + A_1(\xi))^*H(\xi) \right] - K(0) \\ > \frac{1}{\omega^2}H(\xi)BK^{-1}(\tau)B^*H(\xi), \end{aligned} \quad (2.11)$$

то нулевое решение системы (2.8) асимптотически устойчиво. Рассмотрим матрицу

$$H(\xi) = \omega H_0 - H_1(\xi),$$

где  $H_0$  — решение уравнения (2.10),

$$H_1(\xi) = H_0 \int_0^\xi A_1(\eta) d\eta + \int_0^\xi A_1^*(\eta) d\eta H_0.$$

Очевидно,  $H(0) = \omega H_0 > 0$ , и в силу условия (2.9)  $H(T) = H(0)$ , при этом

$$\frac{d}{d\xi}H(\xi) + \frac{1}{\omega}H(\xi)(A_0 + A_1(\xi)) + \frac{1}{\omega}(A_0 + A_1(\xi))^*H(\xi) = -C(\xi, \omega), \quad (2.12)$$

где

$$C(\xi, \omega) = I + \frac{1}{\omega}[H_1(\xi)(A_0 + A_1(\xi)) + (A_0 + A_1(\xi))^*H_1(\xi)].$$

Тогда найдется  $\omega_1 > 0$  такое, что при  $\omega \geq \omega_1$

$$C(\xi, \omega) > \frac{1}{2}I, \quad \xi \in [0, T]. \quad (2.13)$$

Следовательно, матрица  $H(\xi)$  является эрмитовым решением задачи вида (1.8). Тогда, как мы отмечали выше,

$$H(\xi) > 0, \quad \xi \in [0, T],$$

при этом по построению существует  $\omega_0 \geq \omega_1$  такое, что при  $\omega > \omega_0$

$$\|H(\xi)\| \leq 2\omega\|H_0\|, \quad \xi \in [0, T]. \quad (2.14)$$

По условию теоремы для нормы матрицы  $B$  существует  $\alpha > 0$  такое, что

$$\|B\| \leq \frac{e^{-\alpha}}{8\|H_0\|}. \quad (2.15)$$

Возьмем в качестве  $K(s)$  следующую матрицу:

$$K(s) = \frac{1}{4}e^{-\frac{2\alpha s}{\tau}}I, \quad \alpha > 0.$$

Очевидно, матрицы  $H(\xi)$  и  $K(s)$  удовлетворяют условиям (1.10), (1.11). Покажем, что при  $\omega > \omega_0$  неравенство (2.11) будет выполнено. Из (2.12), (2.13) имеем

$$-\left[\frac{d}{d\xi}H(\xi) + \frac{1}{\omega}H(\xi)(A_0 + A_1(\xi)) + \frac{1}{\omega}(A_0 + A_1(\xi))^*H(\xi)\right] - K(0) > \frac{1}{2}I - K(0) = \frac{1}{4}I.$$

Следовательно, нужно показать, что при  $\omega > \omega_0$  имеет место неравенство

$$\frac{1}{\omega^2}H(\xi)BK^{-1}(\tau)B^*H(\xi) \leq \frac{1}{4}I, \quad \xi \in [0, T]. \quad (2.16)$$

Действительно, учитывая (2.14) и (2.15), получаем

$$\frac{1}{\omega^2}\|H(\xi)BK^{-1}(\tau)B^*H(\xi)\| = \frac{4e^{2\alpha}}{\omega^2}\|H(\xi)B(\tau)B^*H(\xi)\| \leq 4^2e^{2\alpha}\|H_0\|^2\|B\|^2 \leq \frac{1}{4},$$

т. е. (2.16) выполнено.

Теорема доказана.

### § 3. Квазилинейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом

Рассмотрим квазилинейную систему дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом (0.1)

$$y'(t) = A(t)y(t) + B(t)y(t - \tau) + F(t, y(t), y(t - \tau)), \quad t > \tau,$$

где  $A(t)$  и  $B(t)$  — вещественнозначные непрерывные  $T$ -периодические матрицы,  $F(t, u, v)$  — вещественнозначная вектор-функция, удовлетворяющая условию Липшица и

$$\|F(t, u, v)\| \leq q\|u\|^{1+\omega}, \quad q, \omega \geq 0 — \text{постоянные.} \quad (3.1)$$

Используя модифицированный функционал Ляпунова — Красовского вида (1.14), можно провести исследования асимптотической устойчивости нулевого решения этой системы и получить оценки решений, характеризующие убывание при  $t \rightarrow \infty$ .

**Теорема 8.** Пусть  $\omega > 0$ , выполнены условия теоремы 4 и

$$r^{\omega/2} = \left(1 - \exp\left(-\frac{\omega}{2} \int_0^T \frac{\varepsilon(s + \tau)}{\|H(s + \tau)\|} ds\right)\right) \times \left(q\omega \int_0^T \frac{\|H(\xi + \tau)\|}{h_1^{1+\omega/2}(\xi + \tau)} \exp\left(-\frac{\omega}{2} \int_0^\xi \frac{\varepsilon(s + \tau)}{\|H(s + \tau)\|} ds\right) d\xi\right)^{-1}, \quad (3.2)$$

где  $\varepsilon(t) > 0$  определено в (1.19),  $h_1(t) > 0$  — минимальное собственное значение матрицы  $H(t)$ . Тогда нулевое решение системы (0.1) асимптотически устойчиво и множество вещественнозначных функций

$$\mathcal{E} = \left\{ \varphi(t) \in C[0, \tau] : \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^\tau \langle K(\tau - s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds < r \right\} \quad (3.3)$$

является множеством притяжения нулевого решения. При этом для решения системы (0.1) с начальными данными  $\varphi(t) \in \mathcal{E}$  имеет место оценка

$$\begin{aligned} \|y(t)\|^2 \leq & h_1^{-1}(t) \exp\left(-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) \\ & \times \left[ \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds \right] \\ & \times \left( 1 - r^{-\omega/2} \left[ \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds \right]^{\omega/2} \right)^{-2/\omega}, \quad t > \tau. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Доказательство. Рассмотрим начальную задачу для системы (0.1)

$$\begin{aligned} y'(t) &= A(t)y(t) + B(t)y(t-\tau) + F(t, y(t), y(t-\tau)), \quad t > \tau, \\ y(t) &= \varphi(t), \quad t \in [0, \tau], \end{aligned} \quad (3.5)$$

где  $\varphi(t) \in C[0, \tau]$  — заданная вещественнозначная вектор-функция. Рассмотрим функционал  $v(t, y)$ , определенный в (1.14). Как при доказательстве теоремы 2, имеем тождество

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}v(t, y) \equiv & -\left\langle C(t) \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t-\tau) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y(t) \\ y(t-\tau) \end{pmatrix} \right\rangle \\ & + \int_{t-\tau}^t \left\langle \frac{d}{dt}K(t-s)y(s), y(s) \right\rangle ds + 2 \operatorname{Re} \langle H(t)F(t, y(t), y(t-\tau)), y(t) \rangle. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Поскольку  $c_1(t) > 0$  — минимальное собственное значение матрицы  $C(t)$ , в силу условия (3.1) получаем неравенство

$$\frac{d}{dt}v(t, y) \leq -c_1(t)\|y(t)\|^2 + \int_{t-\tau}^t \left\langle \frac{d}{dt}K(t-s)y(s), y(s) \right\rangle ds + 2q\|H(t)\|\|y(t)\|^{2+\omega}.$$

Учитывая неравенство (1.17) и определение функционала  $v(t, y)$ , имеем

$$\frac{d}{dt}v(t, y) \leq -\frac{\varepsilon(t)}{\|H(t)\|}v(t, y) + \frac{2q\|H(t)\|}{h_1^{1+\omega/2}(t)}v^{1+\omega/2}(t, y),$$

где  $h_1(t) > 0$  — минимальное собственное значение матрицы  $H(t)$ ,  $\varepsilon(t) > 0$  определено в (1.19). Введем следующие обозначения:

$$\alpha(t) = -\frac{\varepsilon(t)}{\|H(t)\|}, \quad \beta(t) = \frac{2q\|H(t)\|}{h_1^{1+\omega/2}(t)}. \quad (3.7)$$

По построению  $\alpha(t) < 0$ ,  $\beta(t) > 0$  — непрерывные  $T$ -периодические функции. Очевидно, последнее неравенство переписывается в виде

$$\frac{d}{dt}v(t, y) \leq \alpha(t)v(t, y) + \beta(t)v^{1+\omega/2}(t, y).$$

Отсюда в силу неравенства Гронуолла (см., например, [13]) получаем оценку

$$v(t, y) \leq e^{\int_{\tau}^t \alpha(\xi) d\xi} v(\tau, y) \left( 1 - \frac{\omega}{2} v^{\omega/2}(\tau, y) \int_{\tau}^t \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi \right)^{-2/\omega}. \quad (3.8)$$

Оценим выражение, стоящее в круглых скобках:

$$\begin{aligned} w(t, y, \tau) &= 1 - \frac{\omega}{2} v^{\omega/2}(\tau, y) \int_{\tau}^t \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi \\ &\geq 1 - \frac{\omega}{2} v^{\omega/2}(\tau, y) \int_{\tau}^{\infty} \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Рассмотрим интеграл

$$\begin{aligned} J &= \int_{\tau}^{\infty} \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi \\ &= \int_{\tau}^{T+\tau} \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi + \int_{T+\tau}^{2T+\tau} \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi + \dots = J_1 + J_2 + \dots \end{aligned}$$

В силу  $T$ -периодичности функций  $\alpha(t)$  и  $\beta(t)$  получаем

$$J_k = e^{\frac{(k-1)\omega}{2} \int_{\tau}^{T+\tau} \alpha(s) ds} J_1, \quad k = 2, \dots$$

Поэтому, учитывая, что  $\alpha(t) < 0$ , интеграл  $J$  представим в виде

$$J = \left( 1 - e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{T+\tau} \alpha(s) ds} \right)^{-1} J_1 = \left( 1 - e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{T+\tau} \alpha(s) ds} \right)^{-1} \int_{\tau}^{T+\tau} \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi.$$

Отсюда в силу (3.9) получаем

$$\begin{aligned} w(t, y, \tau) &\geq 1 - \frac{\omega}{2} v^{\omega/2}(\tau, y) \left( 1 - e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{T+\tau} \alpha(s) ds} \right)^{-1} \int_{\tau}^{T+\tau} \beta(\xi) e^{\frac{\omega}{2} \int_{\tau}^{\xi} \alpha(s) ds} d\xi \\ &= 1 - \frac{\omega}{2} v^{\omega/2}(\tau, y) \left( 1 - e^{\frac{\omega}{2} \int_0^T \alpha(s+\tau) ds} \right)^{-1} \int_0^T \beta(\xi + \tau) e^{\frac{\omega}{2} \int_0^{\xi} \alpha(s+\tau) ds} d\xi. \end{aligned}$$

Вспоминая обозначения (3.7), имеем

$$w(t, y, \tau) \geq 1 - r^{-\omega/2} v^{\omega/2}(\tau, y),$$

где  $r$  определено в (3.2). Из определения (1.14) следует, что

$$v(\tau, y) = \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds.$$

Если  $\varphi(t)$  принадлежит множеству  $\mathcal{E}$ , определенному в (3.3), то  $w(t, y, \tau) > 0$ . Следовательно, из (3.8) для решения задачи (3.5) имеем оценку

$$v(t, y) \leq \exp\left(-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) v(\tau, y) (1 - r^{-\omega/2} v^{\omega/2}(\tau, y))^{-2/\omega},$$

из которой вытекают асимптотическая устойчивость нулевого решения системы (0.1), а также неравенство (3.4).

Теорема доказана.

**Теорема 9.** Пусть  $\omega = 0$ , выполнены условия теоремы 4 и

$$c_1(t) - 2q\|H(t)\| > 0, \quad t \in [0, T],$$

где  $c_1(t)$  — минимальное собственное число матрицы (1.12). Тогда нулевое решение системы (0.1) асимптотически устойчиво, при этом для решения системы (0.1) с начальными данными  $\varphi(t) \in C[0, \tau]$  имеет место оценка

$$\begin{aligned} & \langle H(t)y(t), y(t) \rangle + \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds \\ & \leq \exp\left(-\int_{\tau}^t \frac{\varepsilon(\xi)}{\|H(\xi)\|} d\xi\right) \left[ \langle H(\tau)\varphi(\tau), \varphi(\tau) \rangle + \int_0^{\tau} \langle K(\tau-s)\varphi(s), \varphi(s) \rangle ds \right], \quad t > \tau, \end{aligned} \quad (3.10)$$

где

$$\varepsilon(t) = \min\{c_1(t) - 2q\|H(t)\|, k\|H(t)\|\}. \quad (3.11)$$

**Доказательство.** Рассмотрим начальную задачу (3.5) для системы (0.1). Пусть  $v(t, y)$  — функционал (1.14). По аналогии с доказательством теоремы 2 имеем тождество (3.6), из которого, учитывая условия (1.17) и (3.1), получаем неравенство

$$\frac{d}{dt}v(t, y) \leq -(c_1(t) - 2q\|H(t)\|)\|y(t)\|^2 - k \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds.$$

Следовательно, имеем

$$\frac{d}{dt}v(t, y) + \frac{(c_1(t) - 2q\|H(t)\|)}{\|H(t)\|} \langle H(t)y(t), y(t) \rangle + k \int_{t-\tau}^t \langle K(t-s)y(s), y(s) \rangle ds \leq 0$$

и в силу определения функционала (1.14) получаем неравенство

$$\frac{d}{dt}v(t, y) + \frac{\varepsilon(t)}{\|H(t)\|} v(t, y) \leq 0, \quad t > \tau,$$

где  $\varepsilon(t)$  определено в (3.11). Отсюда непосредственно вытекает оценка (3.10).

Теорема доказана.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Демиденко Г. В., Матвеева И. И. Асимптотические свойства решений дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Вестн. НГУ. Серия: математика, механика, информатика. 2005. Т. 5, № 3. С. 20–28.
2. Красовский Н. Н. Некоторые задачи теории устойчивости движения. М.: Физматгиз, 1959.
3. Эльсгольц Л. Э., Норкин С. Б. Введение в теорию дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. М.: Наука, 1971.
4. Хейл Дж. Теория функционально-дифференциальных уравнений. М.: Мир, 1984.
5. Корневский Д. Г. Устойчивость динамических систем при случайных возмущениях параметров. Алгебраические критерии. Киев: Наук. думка, 1989.
6. Далецкий Ю. Л., Крейн М. Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. М.: Наука, 1970.
7. Годунов С. К. Современные аспекты линейной алгебры. Новосибирск: Научная книга, 1997.
8. Richard J. P. Time-delay systems: an overview of some recent advances and open problems // Automatica. 2003. V. 39, N 10. P. 1667–1694.
9. Хусаинов Д. Я., Иванов А. Ф., Кожаметов А. Т. Оценки сходимости решений линейных стационарных систем дифференциально-разностных уравнений с постоянным запаздыванием // Дифференц. уравнения. 2005. Т. 41, № 8. С. 1137–1140.
10. Демиденко Г. В., Матвеева И. И. Об устойчивости решений линейных систем с периодическими коэффициентами // Сиб. мат. журн. 2001. Т. 42, № 2. С. 332–348.
11. Демиденко Г. В., Матвеева И. И. Об устойчивости решений квазилинейных периодических систем дифференциальных уравнений // Сиб. мат. журн. 2004. Т. 45, № 6. С. 1271–1284.
12. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. М.: Мир, 1989.
13. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир, 1970.

*Статья поступила 18 апреля 2007 г.*

*Демиденко Геннадий Владимирович, Матвеева Инесса Изотовна  
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,  
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090  
demidenk@math.nsc.ru, matveeva@math.nsc.ru*