

УДК 517.95

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СИЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ В ЦЕЛОМ ОДНОГО КЛАССА
НЕЛИНЕЙНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ

В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М. Отелбаев, А. А. Дурмагамбетов,
Е. Н. Сейткулов

Аннотация. Получен критерий сильной разрешимости в целом одного класса нелинейных эволюционных уравнений в гильбертовом пространстве.

Ключевые слова: уравнения Навье — Стокса, сильное решение в целом.

1. Введение. Пусть H — сепарабельное действительное гильбертово пространство. Норму в H будем обозначать через $|\cdot|$, а скалярное произведение — через $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Пусть $C^\infty(H; 0, a)$ — множество бесконечно гладких на $[0, a]$ ($a > 0$) функций со значениями в H . Пополнение множества $C^\infty(H; 0, a)$ в метрике, определяемой скалярным произведением

$$\langle x, y \rangle_{H_2} = \int_0^a \langle x(t), y(t) \rangle dt, \quad x(t), y(t) \in C^\infty(H; 0, a),$$

будем обозначать через $H_2 = H_2[0, a]$.

Пусть A — самосопряженный неотрицательный оператор с вполне непрерывным обратным, а $D(A)$ — область определения оператора A . В пространстве функций со значениями в H рассмотрим задачу Коши

$$u'_t + Au + B(u, u) = f(t), \quad u(0) = 0, \quad 0 < t < a, \quad (1)$$

где $B(u, g)$ — билинейный оператор, а $f(t)$ — функция со значениями в H .

Система уравнений Навье — Стокса может быть записана в виде (1), а известная проблема существования сильного решения в целом сводится к аналогичной проблеме для абстрактного уравнения (1).

В этой работе мы рассматриваем вопрос сильной разрешимости задачи (1) в целом, при этом предполагая, что A и $B(\cdot, \cdot)$ связаны некоторыми условиями подчиненности преобразования $B(\cdot, \cdot)$ оператору A . А именно, потребуем выполнения следующего условия:

$$|(A + E)^{-\gamma} B(u, g)| \leq c[|(A + E)^{\gamma_0} u| |(A + E)^{\gamma_0 + 1/2} g| + |(A + E)^{\gamma_0} g| |(A + E)^{\gamma_0 + 1/2} u|] \quad (2)$$

для всех γ и γ_0 , удовлетворяющих соотношениям

$$\gamma_0 = \delta_0 - \gamma/2, \quad -\infty < \gamma < 3/4, \quad 0 < \delta_0 < 1/2, \quad (3)$$

где δ_0 — постоянная, а c зависит от γ . Условия (2), (3) суть условия подчиненности нелинейного оператора $B(\cdot, \cdot)$ оператору A . Для трехмерной системы уравнений Навье — Стокса они выполняются при $\delta_0 = 3/8$. Условия подчиненности (2), (3) нами выбраны в соответствии с неравенствами, которым удовлетворяет нелинейный член в системе уравнений Навье — Стокса. На самом же деле их можно сильно разнообразить, в частности, потребовать выполнения условия (3) только для некоторых γ , а не для всех $\gamma \in (-\infty, 3/4)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Будем говорить, что задача (1) *сильно разрешима в целом*, если при любом $a > 0$ из условия $f(t) \in H_2[0, a]$ вытекает существование решения $u(t)$ задачи (1) в $(0, a)$ такого, что $u' + Au \in H_2[0, a]$.

Основным результатом работы является

Теорема А. Пусть $A \geq E$, A^{-1} вполне непрерывен и выполнены условия (2), (3). Тогда задача (1) *сильно разрешима в целом тогда и только тогда, когда решение $(w(t), s(t))$ системы уравнений*

$$\begin{aligned} -s'(t) + As(t) + B_w^*s(t) &= 0, & s(a) &= 0, & 0 < t < a, \\ w' + Aw(t) + B(w, w) &= s(t), & w(0) &= 0, & 0 < t < a, \end{aligned} \quad (4)$$

является только нуль-решением, т. е. $s(t) \equiv 0$ и $w(t) \equiv 0$.

Здесь B_w^* — оператор, сопряженный к B_w , а B_w определяется формулой $B_w g = B(w, g) + B(g, w)$. Эта теорема будет доказана в п. 3. Ниже поясним смысл слова «решение», употребляемое в этой теореме.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Пару $\{w_1, w_2\}$ бесконечно гладких вектор-функций со значениями в $D(A) \subseteq H$, удовлетворяющих условиям

- а) $w_1 = 0$ в окрестности $t = 0$, а $w_2 = 0$ в окрестности $t = a$,
- б) $Aw_j \in H_2[0, a]$ ($j = 1, 2$),

назовем *пробной функцией*. Множество пробных функций обозначим через D_a .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Пару вектор-функций $(w(t), s(t))$ назовем *решением задачи (4)*, если выполнены условия

- в) при любом $\delta \in (0, a)$ имеют место соотношения

$$w(t), s(t) \in H_2[0, a], \quad w' + Aw \in H_2[0, a - \delta];$$

- г) если $(w_1, w_2) \in D_a$ и $B_w w_1 \in H_2[0, a]$, то справедливы равенства

$$\langle s, w_1' + Aw_1 + B_w w_1 \rangle_{H_2[0, a]} = 0;$$

$$\langle -w_2' + Aw_2 + (1/2)B_w^* w_2, w \rangle_{H_2[0, a]} - \langle w_2, s \rangle_{H_2[0, a]} = 0.$$

Таким образом, в теореме А речь идет об обобщенном решении.

Отметим, что уравнение для $s(t)$ обратно-параболическое и условие Коши задано на правом конце. Более того, оно линейное однородное. Поэтому если $w(t)$ в окрестности точки $t = a$ такова, что выражение $B_w^*s(t)$ подчиняется выражению $-s'(t) + As(t)$, то такая задача имеет только нуль-решение. Но так как в точке $t = a$ вектор-функция $w(t)$ может иметь особенности, то решение задачи для $s(t)$ возможно ненулевое. Поэтому теорема А не решает проблемы существования сильного решения в целом, а сводит ее к другой проблеме.

Из системы (4) можно исключить $s(t)$. Тогда из (4) для $w(t)$ получим двухточечную задачу

$$\begin{aligned} \left(-\frac{d^2}{dt^2} + A^2\right)w + \left(-\frac{d}{dt} + A\right)B(w, w) + B_w^* \left(\frac{d}{dt}w + Aw + B(w, w)\right) &= 0, & (4') \\ (w' + Aw(t) + B(w, w))|_{t=a} &= 0, & w(0) &= 0. \end{aligned}$$

Линейная часть (которая «кажется» главной частью) в этой задаче «эллиптически», но тем не менее нам не удалось доказать, что решением является только нуль-решение. Для системы уравнений Навье — Стокса верна слабая (энергетическая) оценка. Мы такой оценкой не пользуемся, и наши основные результаты верны и без наличия слабых априорных оценок. Поэтому наш главный результат сохраняет ценность, если даже кому-то удастся решить проблему существования сильного решения системы уравнений Навье — Стокса. Более того, теорема А допускает обобщения на довольно широкий класс параболических уравнений. Отметим, что существуют примеры, когда система (4) имеет нетривиальное обобщенное решение. Таким примером может послужить следующая система двух (скалярных) уравнений:

$$\begin{aligned} -s'(t) + s(t) + 2w(t)s(t) &= 0, & w' + w(t) + w^2(t) - s(t) &= 0, \\ w(0) = 0, & s(1) = 0, & 0 < t < 1. \end{aligned} \quad (4'')$$

Краткое содержание этой работы изложено в [1] (где условие г) определения 3 следует заменить условием г) определения 3 настоящей работы). Полученные в этой статье результаты можно применить к системе уравнений Навье — Стокса, а также к уравнению магнитной газовой динамики. Такие применения будут изложены в одной из следующих работ.

2. Оценки решений одного нелинейного параболического уравнения в гильбертовом пространстве. Положим

$$T(\lambda)g = \int_0^t e^{-(A+\lambda E)(t-\xi)} g(\xi) d\xi,$$

где E — единичный оператор, а $\exp(-A - \lambda E)(t - \xi)$ понимается в смысле спектрального разложения.

Помимо $T(\lambda)$ введем оператор $T(\lambda, \alpha)$, действующий по формуле

$$T(\lambda, \alpha)v = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t e^{-(A+\lambda)(t-\xi)} (t-\xi)^{\alpha-1} v(\xi) d\xi, \quad (5)$$

где $\Gamma(\alpha)$ — гамма-функция, $\alpha > 0$.

Лемма 1. Если $\alpha, \beta > 0$, то $T(\lambda, \alpha)T(\lambda, \beta) = T(\lambda, \alpha + \beta)$, $T(\lambda, 1) = T(\lambda)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем

$$\begin{aligned} T(\lambda, \alpha)T(\lambda, \beta)v &= (\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta))^{-1} \int_0^t e^{-(A+\lambda)(t-\xi)} (t-\xi)^{\alpha-1} \\ &\quad \times \left(\int_0^\xi e^{-(A+\lambda)(\xi-\eta)} (\xi-\eta)^{\beta-1} v(\eta) d\eta \right) d\xi \\ &= (\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta))^{-1} \int_0^t e^{-(A+\lambda)(t-\eta)} v(\eta) \left(\int_\eta^t (t-\xi)^{\alpha-1} (\xi-\eta)^{\beta-1} d\xi \right) d\eta, \end{aligned}$$

но

$$\begin{aligned} \int_{\eta}^t (t-\xi)^{\alpha-1} (\xi-\eta)^{\beta-1} d\xi &= \int_0^{t-\eta} (t-\eta-\tau)^{\alpha-1} \tau^{\beta-1} d\tau \\ &= \int_0^{t-\eta} (t-\eta)^{\alpha-1} \left(1 - \frac{\tau}{t-\eta}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{\tau}{t-\eta}\right)^{\beta-1} (t-\eta)^{\beta} d\left(\frac{\tau}{t-\eta}\right) \\ &= \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} (t-\eta)^{\alpha+\beta-1}, \end{aligned}$$

поэтому

$$T(\lambda, \alpha)T(\lambda, \beta)v = T(\lambda, \alpha + \beta)v.$$

Так как $\Gamma(1) = 1$, получаем $T(\lambda, 1) = T(\lambda)$. Лемма доказана.

Отметим, что в силу доказанной леммы вместо $T(\lambda, \alpha)$ можно писать

$$T(\lambda, \alpha) = T^{\alpha}(\lambda)$$

и понимать $T(\lambda, \alpha)$ как дробные степени оператора $T(\lambda)$. При $\alpha = 0$ в качестве $T^{\alpha}(\lambda)$ можно взять E , так как при $\alpha \rightarrow 0$ сильным пределом семейства $T^{\alpha}(\lambda)$ будет именно E .

Из леммы 1 получаем равенство ($0 \leq \alpha \leq 1$)

$$T(\lambda) = (A + \lambda E)^b T^{\alpha}(\lambda) (A + \lambda E)^{-b} T^{1-\alpha}(\lambda).$$

Далее, обозначим

$$T(\lambda, \alpha, b) = (A + \lambda E)^b T^{\alpha}(\lambda). \quad (6)$$

Лемма 2. При $0 \leq \alpha \leq 1$, $\gamma - \theta + b \geq 0$, $\alpha + \theta - \gamma - b > 1/2$, $\lambda \geq 1$ верна оценка

$$\int_0^a |(A + \lambda)^{\gamma+1/2} T(\lambda, \alpha, b)v|^2 dt < C \int_0^a |(A + \lambda)^{\theta} v|^2 dt,$$

где $T(\lambda, \alpha, b)$ из (6).

Доказательство. Имеем

$$\begin{aligned} M &\equiv \int_0^a |(A + \lambda)^{\gamma+1/2} T(\lambda, \alpha, b)v|^2 dt \\ &= \frac{1}{\Gamma^2(\alpha)} \int_0^a \left| \int_0^t (A + \lambda)^{\gamma+b+1/2} (t-\xi)^{\alpha-1} e^{-(A+\lambda)(t-\xi)} v(\xi) d\xi \right|^2 dt \\ &= C \int_0^a \left| \int_0^t (A + \lambda)^{\gamma+b-\theta+1/2} (t-\xi)^{\gamma+b-\theta+1/2} e^{-(A+\lambda)(t-\xi)} \right. \\ &\quad \left. \times (t-\xi)^{\alpha+\theta-\gamma-b-1/2-1} (A + \lambda)^{\theta} v(\xi) d\xi \right|^2 dt. \end{aligned}$$

Здесь и в дальнейшем C — постоянная (вообще говоря, разная в разных местах), точное значение которой неважно. Далее, при $\gamma + b - \theta + 1/2 \geq 0$ имеем

$$\|(A + \lambda)^{\gamma+b-\theta+1/2}(t - \xi)^{\gamma+b-\theta+1/2}e^{-(A+\lambda)(t-\xi)}\| \leq \sup_{x \geq 0} x^{\gamma+b-\theta+1/2}e^{-x} < \infty,$$

где $\|\cdot\|$ — норма оператора. Это неравенство является следствием спектрального разложения. Отсюда

$$M \leq C \int_0^a \left(\int_0^t (t - \xi)^{\alpha+\theta-\gamma-b-\frac{3}{2}} |(A + \lambda)^\theta v(\xi)| d\xi \right)^2 dt.$$

Вне отрезка $[0, a]$ функцию $|(A + \lambda)^\theta v(\xi)|$ продолжим нулем. Тогда из последнего неравенства вытекает

$$M \leq C \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |t - \xi|^{\alpha+\theta-\gamma-b-\frac{3}{2}} e^{-\delta|t-\xi|} \chi_a(\xi) |(A + \lambda)^\theta v(\xi)| d\xi \right)^2 dt,$$

где $\chi_a(\xi)$ — характеристическая функция отрезка $[0, a]$, а C и $\delta > 0$ — постоянные.

Пользуясь оценками операторов, инвариантных относительно сдвига (см. [2]), получаем

$$\begin{aligned} M &\leq C \left[\int_{-\infty}^{\infty} |\xi|^{\alpha+\theta-\gamma-b-\frac{3}{2}} e^{-\delta|\xi|} d\xi \right]^2 \int_{-\infty}^{\infty} \chi_a(\xi) |(A + \lambda)^\theta v(\xi)|^2 d\xi \\ &= C \left[\int_{-\infty}^{\infty} |\xi|^{\alpha+\theta-\gamma-b-\frac{3}{2}} e^{-\delta|\xi|} d\xi \right]^2 \int_0^a |(A + \lambda)^\theta v(\xi)|^2 d\xi. \end{aligned}$$

Так как $\alpha + \theta - \gamma - b > 1/2$, лемма доказана.

Лемма 3. Пусть $0 \leq \alpha \leq 1$, $\gamma + b - \theta \geq 0$, $\alpha - \gamma - b + \theta > 1/2$, $\lambda \geq 1$. Тогда

$$\sup_{0 < t < a} |(A + \lambda)^\gamma T(\lambda, \alpha, b)v(t)|^2 \leq C \int_0^a |(A + \lambda)^\theta v(t)|^2 dt.$$

Доказательство. Имеем

$$\begin{aligned} &|(A + \lambda)^\gamma T(\lambda, \alpha, b)v(t)|^2 \\ &= \frac{1}{\Gamma^2(\alpha)} \left| \int_0^t (A + \lambda)^{\gamma+b-\theta} (t - \xi)^{\gamma+b-\theta} e^{-(A+\lambda)(t-\xi)} (t - \xi)^{\alpha-1-\gamma-b+\theta} (A + \lambda)^\theta v(\xi) d\xi \right|^2 \\ &\leq C \left(\int_0^t |(t - \xi)^{\alpha-1-\gamma-b+\theta} (A + \lambda)^\theta v(\xi)| d\xi \right)^2 \leq C \int_0^t |(A + \lambda)^\theta v(\xi)|^2 d\xi. \end{aligned}$$

При переходе использовали неравенство Коши. Отсюда ввиду произвольности $t \in (0, a)$ получаем результат леммы.

Введем норму

$$|v|_{\gamma, \lambda}^2 = \sup_{0 < t < a} |(A + \lambda)^\gamma v(t)|^2 + \int_0^a |(A + \lambda)^{\gamma+1/2} v(t)|^2 dt.$$

Из лемм 2 и 3 вытекает

Следствие 1. Если $0 \leq \alpha \leq 1$, $\gamma + b - \theta \geq 0$, $\alpha - \gamma - b + \theta > 1/2$, $\lambda \geq 1$, то

$$|T(\lambda, \alpha, b)v|_{\gamma, \lambda}^2 \leq C \int_0^a |(A + \lambda)^\theta v|^2 dt.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В определении нормы $|\cdot|_{\gamma, \lambda}$ к первому члену применим лемму 3, а ко второму — лемму 2.

Лемма 4. Пусть $0 \leq \alpha \leq 1$, $\gamma + b - \theta \geq 0$, $\alpha - \gamma - b + \theta > 1/2$, $\lambda \geq 1$. Тогда если $\varepsilon > 0$, то

$$|T(\lambda, \alpha, b)v|_{\gamma-\varepsilon, \lambda}^2 \leq C\lambda^{-2\varepsilon} \int_0^a |(A + \lambda)^\theta v(t)|^2 dt.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Используя следствие 1, имеем

$$|T(\lambda, \alpha, b)v|_{\gamma-\varepsilon, \lambda}^2 \leq \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{2\varepsilon} |T(\lambda, \alpha, b)v|_{\gamma, \lambda}^2 \leq C\lambda^{-2\varepsilon} \int_0^a |(A + \lambda)^\theta v(t)|^2 dt.$$

Лемма доказана.

Лемма 5. Имеет место неравенство

$$|T(\lambda)v|_{l, \lambda}^2 \leq 2 \int_0^a |(A + \lambda)^{l-\frac{1}{2}}v|^2 dt,$$

где $l \in \mathbb{R}$, $\lambda \geq 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем $(Tv)' + (A + \lambda)Tv = v$, $Tv|_{t=0} = 0$, где $T = T(\lambda)$. Умножим это уравнение на $(A + \lambda)^{2l}Tv$ скалярно и проинтегрируем от 0 до t . Тогда получим

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} |(A + \lambda)^l Tv|^2(t) + \int_0^t |(A + \lambda)^{l+1/2} Tv|^2 dt &= \int_0^t \langle (A + \lambda)^{l-1/2} v, (A + \lambda)^{l+1/2} Tv \rangle dt \\ &\leq 1/2 \int_0^t |(A + \lambda)^{l-1/2} v|^2 dt + 1/2 \int_0^t |(A + \lambda)^{l+1/2} Tv|^2 dt. \end{aligned}$$

Отсюда легко вытекает утверждение леммы.

Лемма 6. Пусть $b \geq 0$, $\alpha - b > -1$ и $\lambda \geq 1$. Тогда оператор $T(\lambda, \alpha + 1, b)$ вполне непрерывен из $H_2[0, a]$ в $H_2[0, a]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $v(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n$, где $\{\varphi_n\}$ — полная ортонормированная система собственных векторов самосопряженного оператора $A \geq 0$, соответствующих собственным числам $\{\lambda_n\}$. Последние занумерованы в порядке неубывания, и так как резольвента оператора A вполне непрерывна, то $\lambda_n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow \infty$.

При $\lambda \geq 1$ имеем

$$T(\lambda, \alpha + 1, b)v = \frac{1}{\Gamma(\alpha + 1)} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n (\lambda_n + \lambda)^b \int_0^t (t - \xi)^\alpha e^{-(\lambda_n + \lambda)(t - \xi)} \langle v(\xi), \varphi_n \rangle d\xi$$

$$= \frac{1}{\Gamma(\alpha+1)} \sum_{n=1}^N \varphi_n (\lambda_n + \lambda)^b \int_0^t (t-\xi)^\alpha e^{-(\lambda_n+\lambda)(t-\xi)} \langle v(\xi), \varphi_n \rangle d\xi$$

$$+ \frac{1}{\Gamma(\alpha+1)} \sum_{n=N+1}^{\infty} \varphi_n (\lambda_n + \lambda)^b \int_0^t (t-\xi)^\alpha e^{-(\lambda_n+\lambda)(t-\xi)} \langle v(\xi), \varphi_n \rangle d\xi = S_N v + M_N v,$$

т. е. $T(\lambda, \alpha, b) = S_N + M_N$.

Оператор S_N есть конечная сумма компактных операторов, так как их ядра имеют слабую особенность. Поэтому достаточно доказать, что при $N \rightarrow \infty$

$$\|M_N\| \rightarrow 0. \quad (7)$$

Но

$$\int_0^a |M_N v|^2(t) dt = C \sum_{n=N+1}^{\infty} \int_0^a (\lambda_n + \lambda)^{2b} \left| \int_0^t (t-\xi)^\alpha e^{-(\lambda_n+\lambda)(t-\xi)} \langle v(\xi), \varphi_n \rangle d\xi \right|^2 dt$$

$$\leq C \int_0^a \frac{1}{(\lambda_N + \lambda)^{2\varepsilon}} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\int_0^t (\lambda_n + \lambda)^{b+\varepsilon} (t-\xi)^{b+\varepsilon} \right. \\ \left. \times e^{-(\lambda_n+\lambda)(t-\xi)} \langle v(\xi), \varphi_n \rangle (t-\xi)^{\alpha-b-\varepsilon} d\xi \right)^2 dt.$$

Возьмем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $\alpha - b - \varepsilon > -1$. Это можно сделать, ибо $\alpha - b > -1$. Воспользуемся известным неравенством

$$\sup_{x>0} x^{b+\varepsilon} e^{-x} < \infty,$$

справедливым при $b + \varepsilon > 0$. Получаем

$$\int_0^a |M_N v|^2 dt \leq \frac{C}{(\lambda_N + \lambda)^{2\varepsilon}} \int_0^a \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\int_0^t |\langle v(\xi), \varphi_n \rangle| (t-\xi)^{\alpha-b-\varepsilon} d\xi \right)^2 dt.$$

Теперь воспользуемся приемом, использованным при доказательстве леммы 2. Тогда

$$\int_0^a |M_N v|^2 dt \leq \frac{C}{(\lambda_N + \lambda)^{2\varepsilon}} \sum_{n=N+1}^{\infty} \int_0^a |\langle v(\xi), \varphi_n \rangle|^2 d\xi \leq \frac{C}{(\lambda_N + \lambda)^{2\varepsilon}} \int_0^a |v(\xi)|^2 d\xi.$$

В силу произвольности $v \in H_2[0, a]$, поскольку $\lambda_N \rightarrow +\infty$, а $\varepsilon > 0$, приходим к соотношению (7). Лемма доказана.

Лемма 7. Пусть $0 \leq \alpha \leq 1$, $\gamma + b - \theta \geq 0$, $\alpha - \gamma - b + \theta > 1/2$, $\lambda \geq 1$, $0 < -\theta - \varepsilon < 3/4$, $\varepsilon \geq 0$. Тогда

$$|T(\lambda, \alpha, b)B(u, v)|_{\gamma, \lambda}^2 \leq C \lambda^{-2\varepsilon} |u|_{\frac{3}{8} + \frac{\theta+\varepsilon}{2}, 1}^2 |v|_{\frac{3}{8} + \frac{\theta+\varepsilon}{2}, 1}^2,$$

где C не зависит от $\varepsilon \geq 0$ и $\lambda \geq 1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно следствию 1

$$|T(\lambda, \alpha, b)B(u, v)|_{\gamma, \lambda}^2 \leq C \int_0^a |(A+\lambda)^\theta B(u, v)|^2 dt \leq C \lambda^{-2\varepsilon} \int_0^a |(A+\lambda)^{\theta+\varepsilon} B(u, v)|^2 dt.$$

Теперь используем условия (2), (3):

$$\begin{aligned} |T(\lambda, \alpha, b)B(u, v)|_{\gamma, \lambda}^2 &\leq C\lambda^{-2\varepsilon} \int_0^a |(A+E)^{\frac{3}{8}+\frac{\theta+\varepsilon}{2}} u|^2 |(A+E)^{\frac{7}{8}+\frac{\theta+\varepsilon}{2}} v|^2(t) \\ &\quad + |(A+E)^{\frac{3}{8}+\frac{\theta+\varepsilon}{2}} v|^2 |(A+E)^{\frac{7}{8}+\frac{\theta+\varepsilon}{2}} u|^2(t) dt \leq C\lambda^{-2\varepsilon} |u|_{\frac{3}{8}+\frac{\theta+\varepsilon}{2}, 1}^2 |v|_{\frac{7}{8}+\frac{\theta+\varepsilon}{2}, 1}^2. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Лемма 8. Пусть $\gamma \geq -1/4$. Тогда

$$|T(\lambda)B(u, v)|_{\gamma, 1}^2 \leq C|u|_{\gamma_0, 1}^2 |v|_{\gamma_0, 1}^2, \quad \gamma_0 = 1/8 + \gamma/2.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Используем лемму 5 и затем условия (2), (3):

$$\begin{aligned} |T(\lambda)B(u, v)|_{\gamma, 1}^2 &\leq 2 \int_0^a |(A+E)^{\gamma-1/2} B(u, v)|^2 dt \\ &\leq C \int_0^a |(A+E)^{\gamma_0} u|^2(t) |(A+E)^{\gamma_0+1/2} v|^2(t) + |(A+E)^{\gamma_0} v|^2(t) |(A+E)^{\gamma_0+1/2} u|^2(t) dt. \end{aligned}$$

Отсюда вытекает результат леммы.

Лемма 9. Пусть $f(t) \in H_2[0, a]$ и решение $u(t)$ задачи (1) удовлетворяет условию $|u|_{\gamma, 1}^2 = C < \infty$ при некотором $\gamma > 1/4$. Тогда $u' + Au \in H_2[0, a]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Решение задачи (1) обозначим через u_0 . Оно будет решением линейного уравнения

$$u'_t + Au + B(u_0, u) = f(t), \quad u(0) = 0, \quad 0 < t < a.$$

Обозначим $u(t) = e^{\lambda t} v(t)$ ($\lambda > 0$), тогда получим

$$v'_t + (A + \lambda)v + B(u_0, v) = e^{-\lambda t} f(t), \quad v(0) = 0.$$

Отсюда и из условий (2), (3) выводим, что

$$\begin{aligned} \int_0^a |v'_t + (A + \lambda)v|^2 dt &\leq 2 \int_0^a |f|^2(t) dt + 2 \int_0^a |B(u_0, v)|^2 dt \\ &\leq C + C \int_0^a |(A+E)^{\tilde{\gamma}} u_0|^2(t) |(A+E)^{\tilde{\gamma}+1/2} v|^2 + |(A+E)^{\tilde{\gamma}} v|^2(t) |(A+E)^{\tilde{\gamma}+1/2} u_0|^2 dt, \end{aligned}$$

где $3/8 > \tilde{\gamma} > 1/4$, $\tilde{\gamma} < \gamma$. Такой выбор $\tilde{\gamma}$ в силу $\gamma > 1/4$ возможен. Поэтому, используя условие леммы и выбирая $\lambda \geq 1$, находим, что при достаточно малом $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \int_0^a |g|^2 dt &\equiv \int_0^a |v'_t + (A + \lambda)v|^2 dt \leq C + C \int_0^a |(A+E)^{1-\varepsilon} v|^2 dt + C \sup_{0 < t < a} |(A+E)^{1/2-\varepsilon} v|^2 \\ &\leq C + \frac{C}{\lambda^\varepsilon} \int_0^a |(A + \lambda)^{1-\varepsilon/2} v|^2 dt + \frac{C}{\lambda^\varepsilon} \sup_{0 < t < a} |(A + \lambda)^{1/2-\varepsilon/2} v|^2, \end{aligned}$$

где через g обозначено выражение $v' + (A + \lambda)v$. Тогда $v' + (A + \lambda)v = g$, $v(0) = 0$. Умножим это уравнение скалярно на $(A + \lambda)^{1-\varepsilon}v$ и проинтегрируем от 0 до t . Имеем

$$\begin{aligned} \frac{|(A + \lambda)^{\frac{1-\varepsilon}{2}}v|^2}{2} + \int_0^t |(A + \lambda)^{1-\frac{\varepsilon}{2}}v|^2 dt &= \int_0^t \langle g, (A + \lambda)^{1-\varepsilon}v \rangle dt \\ &\leq \sqrt{\int_0^t |g|^2 dt} \sqrt{\int_0^t |(A + \lambda)^{1-\frac{\varepsilon}{2}}v|^2 dt} \leq \frac{1}{2} \int_0^t |g|^2 dt + \frac{1}{2} \int_0^t |(A + \lambda)^{1-\frac{\varepsilon}{2}}v|^2 dt. \end{aligned}$$

Из этого и предыдущих неравенств, если выберем λ достаточно большим ($\lambda^{-\varepsilon}C < 1/2$), вытекает, что $v' + (A + \lambda)v \in H_2[0, a]$. Отсюда, переходя от v к u , получаем утверждение леммы.

3. Условие существования гладкого решения и свойства разделяющей функции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Функция $f(t) \in H_2[0, a]$, $|f|_{H_2} \neq 0$, называется *разделяющей функцией задачи* (1), если выполнены условия

(а) решение $u(t)$ задачи (1) в $(0, a)$ существует и $u' + Au \in H_2[0, a - \varepsilon]$ при любом $\varepsilon \in (0, a)$, но $u' + Au \notin H_2[0, a]$;

(б) если $g(t) \in H_2[0, a]$ и $|g|_{H_2} < |f|_{H_2}$, то решение задачи

$$v'(t) + Av + B(v, v) = g(t), \quad v(0) = 0, \quad 0 < t < a,$$

существует и $v'(t) + Av \in H_2[0, a]$.

Теорема 1. Если существует $f(\cdot) \in H_2[0, a]$ такая, что задача (1) не имеет решения, удовлетворяющего условию $u' + Au \in H_2[0, a]$, то для задачи (1) существует разделяющая функция.

Лемма 10. Существует число $\varepsilon > 0$ такое, что если $|f|_{H_2[0, a]}^2 \leq \varepsilon$, то задача (1) имеет решение $u(t)$, для которого $u' + Au \in H_2[0, a]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Эта лемма для уравнений Навье — Стокса хорошо известна (см. [3, с. 203, теоремы 8 и 9]). Тем не менее мы приведем ее полное доказательство, так как известные авторам доказательства абстрактных лемм типа нашей леммы 10 используют различные условия (на $f(\cdot)$ и на нелинейность).

Обозначим $v = e^{-\lambda t}u$, $\lambda \geq 1$. Тогда для v получаем

$$v'_t + Av + \lambda v + e^{\lambda t}B(v, v) - e^{-\lambda t}f(t) = 0, \quad v(0) = 0.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} v &= -T(\lambda)B(v, v)e^{\lambda t} + T(\lambda)e^{-\lambda t}f(t) \\ &= \int_0^t e^{-(A+\lambda)(t-\xi)}(-B(v(\xi), v(\xi))e^{\lambda\xi} + e^{-\lambda\xi}f(\xi)) d\xi = R(v). \end{aligned}$$

Далее,

$$\begin{aligned} R(v_1) - R(v_2) &= \int_0^t e^{-(A+\lambda)(t-\xi)+\lambda\xi}[-B(v_1, v_1) + B(v_2, v_2)] d\xi \\ &= \int_0^t e^{-(A+\lambda)(t-\xi)+\lambda\xi}[B(v_1, v_2 - v_1) + B(v_2 - v_1, v_2)] d\xi. \end{aligned}$$

Теперь по лемме 8

$$|R(v_1) - R(v_2)|_{\theta - \frac{1}{2}, 1} \leq C(|v_1|_{\frac{\theta}{2} - \frac{1}{8}, 1} + |v_2|_{\frac{\theta}{2} - \frac{1}{8}, 1})(|v_1 - v_2|_{\frac{\theta}{2} - \frac{1}{8}, 1}).$$

Берем $\theta = 1$. Тогда $1/2 = \theta - 1/2 > \theta/2 - 1/8 = 3/8$ и

$$|R(v_1) - R(v_2)|_{\frac{3}{8}, 1} \leq |R(v_1) - R(v_2)|_{\frac{1}{2}, 1} \leq C[|v_1|_{\frac{3}{8}, 1} + |v_2|_{\frac{3}{8}, 1}]|v_1 - v_2|_{\frac{3}{8}, 1}.$$

Отсюда следует, что в пространстве с нормой $|\cdot|_{\frac{3}{8}, 1}$ оператор R — сжатие, если v_1 и v_2 малы в этой норме.

По лемме 5

$$|T(\lambda)e^{-\lambda t}f(t)|_{\frac{3}{8}, 1}^2 \leq 2 \int_0^a |(A + E)^{-1/8}f|^2 dt \leq 2\varepsilon.$$

Поэтому уравнение $v = R(v)$ имеет решение v с ограниченной нормой $|v|_{\frac{3}{8}, 1}$. Возвращаясь от v к u , получаем, что $|u|_{\frac{3}{8}, 1}$ ограничена. Но тогда из леммы 9 вытекает утверждение леммы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Обозначим через r^* верхнюю грань всех тех чисел r таких, что если $|f|_{H_2}^2 < r$, то задача (1) имеет решение $u(t)$ такое, что $u' + Au \in H_2[0, a]$.

Пусть существует $f \in H_2[0, a]$ такая, что задача (1) не имеет решения, для которого $u' + Au \in H_2[0, a]$, т. е.

$$\int_0^{a-\delta} |u' + Au|^2 dt = \infty$$

при некотором $0 \leq \delta < a$. Отсюда и из леммы 10 следует, что r^* существует и $0 < r^* < \infty$.

Из определения r^* вытекает, что найдутся функции $f_n \in H_2[0, a]$ и числа $0 \leq \delta_n < a$, $n = 1, 2, \dots$, такие, что

$$\int_0^a |f_n|^2(t) dt \geq r^*, \quad \int_0^a |f_n|^2(t) dt \rightarrow r^*$$

при $n \rightarrow \infty$,

$$\int_0^{a-\delta_n} |u'_n + Au_n|^2 dt = \infty, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\int_0^{a-\delta_n-\varepsilon} |u'_n + Au_n|^2 dt < \infty \quad \text{при любом } \varepsilon > 0, \quad a - \delta_n - \varepsilon > 0,$$

где $u_n(t)$ — решение на $(0, a - \delta_n)$ задачи (1).

Используя сдвиг начала времени отсчета (при каждом n), можно считать, что $\delta_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$).

Последовательность $\{f_n\}$ имеет слабо сходящуюся к некоторому \tilde{f} подпоследовательность; ее также обозначим через $\{f_n\}$. Итак,

$$u'_n + Au_n + B(u_n, u_n) = f_n \stackrel{H_2}{\rightharpoonup} \tilde{f} \in H_2[0, a], \quad n \rightarrow \infty, \quad u_n|_{t=0} = 0, \quad (8)$$

$$\int_0^{a-\varepsilon} |u'_n + Au_n|^2 dt < \infty \quad \text{при любом } 0 < \varepsilon < a,$$

$$\int_0^a |u'_n + Au_n|^2 dt = \infty, \quad |f_n|_{H_2[0,a]}^2 \rightarrow r^*.$$

Для \tilde{f} из (8) возможны два случая.

СЛУЧАЙ 1. Решение задачи (1) с $f = \tilde{f} \in H_2[0, a]$ удовлетворяет условию $u' + Au \in H_2[0, a]$.

СЛУЧАЙ 2. Существует $\varepsilon \geq 0$ такое, что для решения задачи (1) с $f = \tilde{f} \in H_2[0, a]$ выполнено

$$\int_0^{a-\varepsilon} |u' + Au|^2 dt = \infty.$$

Исключим первый случай.

Лемма 11. Если f_n слабо сходится к \tilde{f} ($f_n \rightharpoonup \tilde{f}$) в $H_2[0, a]$ и решение $\tilde{u}(t)$ задачи (1) с $f = \tilde{f}$ удовлетворяет условию $\tilde{u}' + A\tilde{u} \in H_2[0, a]$, то найдется n (достаточно большое) такое, что решение u_n задачи (1), в котором $f = f_n$, также удовлетворяет условию $u'_n + Au_n \in H_2[0, a]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть \tilde{u} — решение задачи (1) при $f = \tilde{f}$. По предположению $\tilde{u}' + A\tilde{u} \in H_2[0, a]$. Для разности $\tilde{u} - u_n \equiv \omega_n$ получаем

$$\begin{aligned} 0 &= \omega'_n + A\omega_n + B(\tilde{u}, \tilde{u}) - B(u_n, u_n) + f_n - \tilde{f} \\ &= \omega'_n + A\omega_n + B(\tilde{u}, \tilde{u}) - B(\tilde{u} - \omega_n, \tilde{u} - \omega_n) + f_n - \tilde{f} \\ &= \omega'_n + A\omega_n + B(\tilde{u}, \omega_n) + B(\omega_n, \tilde{u}) - B(\omega_n, \omega_n) + f_n - \tilde{f}, \quad \omega_n|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

Обозначим $\omega_n = e^{\lambda t} y_n$. Имеем

$$y'_n + Ay_n + \lambda y_n E + B(\tilde{u}, y_n) + B(y_n, \tilde{u}) - e^{\lambda t} B(y_n, y_n) = (\tilde{f} - f_n) e^{-\lambda t} \equiv g_n, \quad y_n|_{t=0} = 0.$$

Перейдем к интегральной записи и используем лемму 1:

$$\begin{aligned} y_n(t) &= -T(\lambda)[B(\tilde{u}, y_n) + B(y_n, \tilde{u}) - e^{\lambda t} B(y_n, y_n)] + T(\lambda)g_n \\ &= -T(\lambda)[B(\tilde{u}, y_n) + B(y_n, \tilde{u}) - e^{\lambda t} B(y_n, y_n)] + T(\lambda, \alpha, b)[T(\lambda, 1 - \alpha, -b)g_n], \end{aligned} \quad (9)$$

где $0 < \alpha < 1$. Возьмем $-\alpha + b > -1$, $b \leq 0$. Тогда по лемме 6 оператор $T(\lambda, 1 - \alpha, -b)$ вполне непрерывен в $H_2[0, a]$. Поэтому, так как $g_n = (\tilde{f} - f_n) e^{-\lambda t} \rightarrow 0$ в $H_2[0, a]$, из (9) получаем

$$\begin{aligned} y_n &= -T(\lambda)[B(\tilde{u}, y_n) + B(y_n, \tilde{u}) - e^{\lambda t} B(y_n, y_n)] + T(\lambda, \alpha, b)d_n, \\ |d_n|_{H_2[0,a]} &\rightarrow 0, \quad 0 < \alpha < 1, \quad -\alpha + b > -1, \quad b \leq 0, \end{aligned} \quad (10)$$

где $d_n = T(\lambda, 1 - \alpha, -b)g_n$. Теперь из следствия 1 будем иметь

$$|T(\lambda, \alpha, b)d_n|_{\gamma, \lambda}^2 \leq C|d_n|_{H_2[0,a]}^2 \rightarrow 0$$

при $\theta = 0$, $\lambda \geq 1$, $\gamma + b \geq 0$, $\alpha - b - \gamma > 1/2$, $-\alpha + b + 1 > 0$, $b \leq 0$, $\alpha \in (0, 1)$ и $n \rightarrow \infty$. (Такие условия выполняются, например, если $\gamma = 1/4 + \delta$, $b = -\delta/2$, $\alpha = 3/4 + \delta$, где $\delta > 0$ мало.)

Уравнение (10) рассмотрим в пространстве с нормой $|\cdot|_{\gamma,\lambda}$:

$$\begin{aligned} y_n &= -T(\lambda)[B(\tilde{u}, y_n) + B(y_n, \tilde{u}) - e^{\lambda t}B(y_n, y_n)] + r_n \equiv R_\lambda(y_n), \\ |r_n|_{\gamma,\lambda} &\rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty, \text{ где } r_n = T(\lambda, \alpha, b)d_n. \end{aligned} \quad (11)$$

Далее,

$$\begin{aligned} |R_\lambda(y) - R_\lambda(g)|_{\gamma,\lambda}^2 &= |-T(\lambda)(B(\tilde{u}, y - g) + B(y - g, \tilde{u})) \\ &+ T(\lambda)(e^{\lambda t}(B(y - g, y) + B(g, y - g)))|_{\gamma,\lambda}^2 \leq 2|T(\lambda)(B(\tilde{u}, y - g) \\ &+ B(y - g, \tilde{u}))|_{\gamma,\lambda}^2 + 2|T(\lambda)(e^{\lambda t}(B(y - g, y) + e^{\lambda t}B(g, y - g)))|_{\gamma,\lambda}^2 \\ &\leq 2\lambda^{-2\varepsilon}|T(\lambda)(B(\tilde{u}, y - g) + B(y - g, \tilde{u}))|_{\gamma+\varepsilon,\lambda}^2 \\ &\quad + 2e^{2a\lambda}|T(\lambda)(B(y - g, y) + B(g, y - g))|_{\gamma,\lambda}^2. \end{aligned}$$

Воспользуемся леммой 7 (беря $\alpha = 1$, $b = 0$, $\theta = \gamma - 1/2 + 2\varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ малое):

$$\begin{aligned} |R_\lambda(y) - R_\lambda(g)|_{\gamma,\lambda}^2 &\leq C\lambda^{-2\varepsilon}(|\tilde{u}|_{\frac{\gamma}{2}+\frac{1}{8}+\frac{3\varepsilon}{2},1}^2|y - g|_{\frac{\gamma}{2}+\frac{1}{8}+\frac{3\varepsilon}{2},1}^2 \\ &\quad + Ce^{2\lambda a}(|y - g|_{\frac{\gamma}{2}+\frac{1}{8}+\frac{3\varepsilon}{2},1}^2(|y|_{\frac{\gamma}{2}+\frac{1}{8}+\frac{3\varepsilon}{2},1}^2 + |g|_{\frac{\gamma}{2}+\frac{1}{8}+\frac{3\varepsilon}{2},1}^2))). \end{aligned}$$

Если $3/8 > \gamma > 1/4$, то можно ε брать таким малым, чтобы $\gamma/2 + 1/8 + 3\varepsilon/2 < \gamma$, поэтому

$$|R_\lambda(y) - R_\lambda(g)|_{\gamma,\lambda}^2 \leq C\lambda^{-2\varepsilon}(|\tilde{u}|_{\gamma,1}^2|y - g|_{\gamma,1}^2) + Ce^{2\lambda a}(|y - g|_{\gamma,1}^2(|y|_{\gamma,1}^2 + |g|_{\gamma,1}^2)).$$

Величина $|\tilde{u}|_{\gamma,1}^2$ ограничена, тем самым, выбрав предварительно λ большим, а затем радиус шара, из которого берется y и g , малым, получаем, что $R_\lambda(g)$ — сжатие. Но тогда уравнение (11) при больших n имеет решение с малой нормой $|\cdot|_{\gamma,1}$. Возвращаясь от y_n к $w_n = \tilde{u} - u_n$, получаем, что $|\tilde{u} - u_n|_{\gamma,1} < \infty$ при больших n . Так как $|\tilde{u}|_{\gamma,1} < \infty$, выводим, что $|u_n|_{\gamma,1} < \infty$. Поэтому для u_n выполнены условия леммы 9. Следовательно, $u'_n + Au_n \in H_2[0, a]$. Лемма доказана.

Из леммы 11 вытекает, что случай 1 не может иметь места. Таким образом, имеет место случай 2. Из (8) и известных свойств слабого предела следует, что $|\tilde{f}(t)|_{H_2[0,a]} \leq r^*$. Поэтому если $|g(t)|_{H_2[0,a]} < |\tilde{f}(t)|_{H_2[0,a]}$, то $|g(t)|_{H_2[0,a]} < r^*$. Отсюда и из определения r^* вытекает, что $v' + Av \in H_2[0, a]$, где $v(t)$ — решение задачи

$$v'_t + Av + B(v, v) = g(t), \quad v(0) = 0, \quad 0 < t < a.$$

Следовательно, \tilde{f} — разделяющая функция. Теорема 1 доказана.

Приведем некоторые свойства разделяющей функции задачи (1). Сразу заметим, что в неравенстве $|\tilde{f}(t)|_{H_2[0,a]} \leq r^*$ достигается равенство, в противном случае из определения числа r^* вытекало бы условие $u' + Au \in H_2[0, a]$, где $u(t)$ — решение задачи (1) при $f = \tilde{f}$. Но это, так как имеет место только случай 2, невозможно, поэтому $|\tilde{f}(t)|_{H_2[0,a]} = r^* > 0$.

Теорема 2. Пусть $s(t)$ — разделяющая функция ($|s|_{H_2[0,a]} > 0$), а $w(t)$ — решение задачи (1) при $f = s(t)$. Тогда пара $(w(t), s(t))$ удовлетворяет системе уравнений (4) (см. введение).

Доказательство. Напомним, что слово «решение» понимаем в смысле определения 3. Итак, пусть $w(t)$ — решение задачи (1), в котором $f = s(t)$ — разделяющая функция и (w_1, w_2) — произвольная пара из D_a и $B_w w_1 \in H_2[0, a]$

(где D_a из определения 2). Для $v = w(t) + \varepsilon w_1$ имеем

$$\begin{aligned} \int_0^a |v' + Av + B(v, v)|^2 dt &= \int_0^a |s(t) + \varepsilon(w_1' + Aw_1 + B_w w_1) + \varepsilon^2 B(w_1, w_1)|^2 dt \\ &= \int_0^a (|s(t)|^2 + 2\varepsilon \langle s, w_1' + Aw_1 + B_w w_1 \rangle) dt + \varepsilon^2 O(1). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что множитель при первой степени ε должен обратиться в нуль, в противном случае, подбирая ε малым, мы можем добиться выполнения неравенства $|v' + Av + B(v, v)|_{H_2[0, a]} < |s(t)|_{H_2[0, a]}$, но тогда из определения разделяющей функции вытекает, что $v' + Av \in H_2[0, a]$.

Отсюда, так как w_1 бесконечно дифференцируема и удовлетворяет условию (б) из определения 2, получаем, что $w_1' + Aw_1 \in H_2[0, a]$. Это противоречит тому, что $s(t)$ — разделяющая функция. Таким образом, выполняется равенство

$$\langle s(t), w_1' + Aw_1 + B_w w_1 \rangle_{H_2[0, a]} = 0.$$

Далее, так как $w' + Aw + B(w, w) = s(t)$, имеем

$$\begin{aligned} 0 &= \langle w' + Aw + B(w, w) - s, w_2 \rangle_{H_2} = \langle -w_2' + Aw_2, w \rangle_{H_2} + \langle B(w, w) - s, w_2 \rangle_{H_2} \\ &= \langle -w_2' + Aw_2, w \rangle_{H_2} + \frac{1}{2} \langle B_w w, w_2 \rangle_{H_2} - \langle w_2, s \rangle_{H_2} \\ &= \langle -w_2' + Aw_2, w \rangle_{H_2} + \frac{1}{2} \langle w, B_w^* w_2 \rangle_{H_2} - \langle w_2, s \rangle_{H_2} \\ &= \left\langle -w_2' + Aw_2 + \frac{1}{2} B_w^* w_2, w \right\rangle_{H_2} - \langle w_2, s \rangle_{H_2}. \end{aligned}$$

Здесь $H_2 = H_2[0, a]$. Таким образом, $(w, s(t))$ — решение системы (4). Теорема доказана.

Можно доказать, что для разделяющей функции выполняется условие $s' - As \in H_2[0, a - \delta]$ при любом $0 < \delta < a$.

Теорема 3. Пусть $f(t)$ — разделяющая функция задачи (1) и $w(t)$ — решение задачи (1) в $(0, a)$. Тогда

$$(|w_t'|^2 - |Aw + B(w, w)|^2)'_t = 0$$

при $0 < t < a$.

Доказательство. Умножим первое уравнение (4) скалярно на $w'(t)$ и проинтегрируем от 0 до t . После несложных вычислений получим равенство приведенное в теореме.

Доказательство теоремы А. Пусть задача (1) не сильно разрешима. Тогда существуют $a > 0$ и $f(t) \in H_2[0, a]$ такие, что для решения $u(t)$ задачи (1) выполнено $u' + Au \notin H_2[0, a]$. Из теоремы 1 получаем, что существует разделяющая функция $s(t)$. Если $w(t)$ — решение задачи (1) при $f(t) = s(t)$, то из теоремы 2 получаем, что пара (w, s) — нетривиальное решение системы (4).

Обратно, докажем, что если система (4) имеет нетривиальное решение, то задача (1) не сильно разрешима. Допустим противное. Пусть на $[0, a]$, $a > 0$, система (4) имеет нетривиальное решение $(w(t), s(t))$, но задача (1) сильно разрешима. Тогда $w' + Aw \in H_2[0, a]$ в силу того, что $s(t) \in H_2[0, a]$.

Пусть пара (w_1, w_2) из класса пробных функций D_a и $B_w w_1 \in H_2[0, a]$. Тогда из определения решения имеем

$$0 = \int_0^a \langle s, w_1' + Aw_1 + B_w w_1 \rangle dt = \int_0^a \langle s, w_1' + Aw_1 + B(w, w_1) + B(w_1, w) \rangle dt. \quad (12)$$

Рассмотрим задачу

$$\tilde{g}' + A\tilde{g} + B(w, \tilde{g}) + B(\tilde{g}, w) = s(t), \quad \tilde{g}(0) = 0, \quad 0 < t < a. \quad (13)$$

Положим $\tilde{g} = e^{\lambda t} g$. Для g имеем

$$g' + (A + \lambda)g + B(w, g) + B(g, w) = e^{-\lambda t} s(t), \quad g(0) = 0, \quad 0 < t < a. \quad (14)$$

Обозначим $g' + (A + \lambda)g \equiv v$. Тогда система (14) эквивалентна уравнению

$$v + D(\lambda)v = e^{-\lambda t} s(t), \quad \lambda \geq 1, \quad (15)$$

где $D(\lambda)$ — оператор, действующий по формуле

$$D(\lambda)v \equiv B(T(\lambda)v, w) + B(w, T(\lambda)v).$$

Возьмем $\lambda \geq 1$ и $0 < \varepsilon < 1/2 - \delta_0$. Оценим норму оператора $D(\lambda)$:

$$\begin{aligned} |D(\lambda)u|_{H_2[0, a]}^2 &= \int_0^a |D(\lambda)u|^2 dt = \int_0^a |B(T(\lambda)u, w) + B(w, T(\lambda)u)|^2 dt \\ &\leq C \int_0^a |(A + E)^{\delta_0} T(\lambda)u|^2 |(A + E)^{\delta_0 + 1/2} w|^2 + |(A + E)^{\delta_0} w|^2 |(A + E)^{\delta_0 + 1/2} T(\lambda)u|^2 dt \\ &\leq C |(A + \lambda)^{-\varepsilon}| \int_0^a |(A + E)^{\delta_0 + \varepsilon} T(\lambda)u|^2 |(A + E)^{\delta_0 + 1/2} w|^2 \\ &\quad + |(A + E)^{\delta_0} w|^2 |(A + E)^{\delta_0 + 1/2 + \varepsilon} T(\lambda)u|^2 dt \\ &\leq \frac{C}{\lambda^\varepsilon} \int_0^a |(A + E)^{1/2} T(\lambda)u|^2 |(A + E)w|^2 + |(A + E)^{1/2} w|^2 |(A + E)T(\lambda)u|^2 dt. \end{aligned}$$

Воспользуемся приемом из доказательства леммы 9. Тогда получаем

$$|D(\lambda)u|_{H_2[0, a]}^2 \leq \frac{C}{\lambda^\varepsilon} |u|_{H_2[0, a]}^2 |w' + Aw|_{H_2[0, a]}^2 \leq \frac{C_1}{\lambda^\varepsilon} |u|_{H_2[0, a]}^2.$$

Отсюда вытекает, что $\|D(\lambda)\| \leq 1/2$ при достаточно больших λ . Поэтому уравнение (15) имеет решение $v \in H_2[0, a]$. Но $v = g' + (A + \lambda)g$, следовательно, уравнение (14) имеет решение g такое, что $g' + (A + \lambda)g \in H_2[0, a]$. Возвращаясь от g к \tilde{g} , получаем, что решение \tilde{g} задачи (13) удовлетворяет условию $\tilde{g}' + A\tilde{g} \in H_2[0, a]$.

Возьмем в (12) $w_1 = w_{1n}$ ($n = 1, 2, \dots$) так, чтобы в $H_2[0, a]$

$$\frac{d}{dt}(w_{1n}) + Aw_{1n} \rightarrow \tilde{g}' + A\tilde{g} \quad (16)$$

при $n \rightarrow \infty$. Это возможно, так как $A \geq E$ — постоянный самосопряженный оператор и гладкие функции плотны в пространстве Соболева. Как и при оценке нормы $D(\lambda)$, можно показать, что для любого v выполнена оценка

$$|B(w, v) + B(v, w)|_{H_2[0, a]} \leq C|v' + Av|_{H_2[0, a]},$$

если $v(0) = 0$ и $v' + Av \in H_2[0, a]$. Поэтому из (16) вытекает, что в $H_2[0, a]$

$$B(w_{1n}, w) + B(w, w_{1n}) \rightarrow B(\tilde{g}, w) + B(w, \tilde{g}).$$

Отсюда и из (12), переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, находим

$$0 = \int_0^a |s(t)|^2 dt.$$

Следовательно, $s(t) \equiv 0$. Но тогда второе уравнение системы (4) дает, что $w \equiv 0$. Пришли к противоречию. Теорема А доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.1. Основные результаты пп. 1–3 можно распространить на более общие уравнения, например на следующее:

$$u'_t + Au + \theta(t)B(u) = f(t), \quad u|_{t=0} = 0, \quad (17)$$

где $A = A^*$ — самосопряженный неотрицательный оператор с вполне непрерывной резольвентой, $\theta(t)$ — непрерывная скалярная функция, $B(\cdot)$ — нелинейный оператор, которые удовлетворяют условиям

$$B(u) - B(u + \varepsilon w) = \varepsilon B_u w + D(u, w, \varepsilon)\varepsilon^2,$$

здесь B_u — линейный при каждом u , $D(u, w, \varepsilon)$ — нелинейный операторы, для которых

$$|B_u w| \leq \varphi(|A^{\gamma-1/2}u|)[|A^\gamma u||A^{\gamma-1/2}w| + |A^{\gamma-1/2}u||A^\gamma w|],$$

$$|D(u, w, \varepsilon)| \leq \psi(|A^{\gamma-1/2}u|, |A^{\gamma-1/2}w|, \varepsilon)[|A^\gamma u||A^{\gamma-1/2}w| + |A^{\gamma-1/2}u||A^\gamma w|],$$

где γ — постоянная, $1/2 < \gamma < 1$, $\varphi(\cdot)$ — непрерывная на $[0, \infty)$, а $\psi(x, y, \varepsilon)$ — непрерывная при $0 \leq x < \infty$, $0 \leq y < \infty$, $0 \leq \varepsilon \leq 1$ функции. Можно доказать, что для задачи (17) при выполнении вышеприведенных условий верна теорема о разделяющей функции и имеет место теорема, аналогичная теореме А. Отметим, что условие $A \geq E$ несущественно; достаточно, чтобы A был полуограничен снизу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Отелбаев М., Дурмагамбетов А. А., Сейткулов Е. Н. Условия существования сильного решения в целом одного класса нелинейных эволюционных уравнений в гильбертовом пространстве // Докл. РАН. 2006. Т. 408, № 4. С. 446–449.
2. Хёрмандер Л. Оценки для операторов, инвариантных относительно сдвига. М.: Изд-во иностр. лит., 1962.
3. Ладыженская О. А. Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1970.

Статья поступила 26 декабря 2006 г., окончательный вариант — 6 августа 2007 г.

Отелбаев Мухтарбай, Дурмагамбетов Асет Асхатбекович,
Сейткулов Ержан Нураханович
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева,
ул. Мунайтпасова, 7, Астана 010010, Казахстан
otelbayev_m@rambler.ru, aset.durmagambetov@gmail.com, erj@mail.ru