

УДК 517.983

О ФУНКЦИЯХ ОДНОГО САМОСОПРЯЖЕННОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

В. Б. Коротков

Аннотация. Построен самосопряженный ахизеровский интегральный оператор S в $L_2(-1, 1)$ со спектром $\{-1; 0; 1\}$, обладающий свойством: любая функция $\varphi(S)$, не кратная S , не является ахизеровским интегральным оператором.

Ключевые слова: ахизеровский интегральный оператор, функция самосопряженного оператора, спектральная функция.

Памяти С. Л. Соболева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Интегральный оператор в $L_2(-1, 1)$ назовем *ахизеровским*, или *B-интегральным*, оператором, если его ядро $K(s, t)$ удовлетворяет следующему B-условию Н. И. Ахизера [1]: существует измеримая п. в. конечная неотрицательная функция $\Lambda(s)$, $s \in [-1, 1]$, такая, что $|K(s, t)| \leq \Lambda(s)\Lambda(t)$ для п. в. $(s, t) \in [-1, 1]^2$.

Теорема. Существует самосопряженный ахизеровский интегральный оператор S в $L_2(-1, 1)$ со спектром $\{-1; 0; 1\}$, обладающий свойством: любая функция $\varphi(S)$, не равная αS для любого числа α , не является ахизеровским интегральным оператором.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Напомним, что ортонормированная система $\{\psi_n\} \subset L_2(0, 1)$ называется *системой абсолютной сходимости* для l_2 [2], если для любой последовательности $\{a_n\} \in l_2$ имеем $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| |\psi_n(s)| < \infty$ для п. в. $s \in [0, 1]$, при этом множество сходимости ряда зависит от $\{a_n\}$. Из теоремы 13 в [2] следует, что существуют ортонормированная система $\{\varphi_n\} \subset L_2(0, 1)$ абсолютной сходимости для l_2 и измеримое множество $e \subset [0, 1]$ положительной меры такие, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_n(s)|^2 = \infty \quad \text{для всех } s \in e. \quad (1)$$

Разобьем интервал $(-1, 0)$ на два непересекающихся интервала Δ и Δ_1 . Пусть $\{e_n\}$ — последовательность попарно не пересекающихся измеримых подмножеств интервала Δ_1 с положительными мерами, и пусть $\{\varphi_n\} \subset L_2(0, 1)$ — ортонормированная система абсолютной сходимости для l_2 , удовлетворяющая условию (1). Продолжим функции φ_n , $n = 1, 2, 3, \dots$, нулем на $(-1, 0)$ и за продолженными функциями сохраним их прежнее обозначение. Рассмотрим операторы τ_1 и τ_2 в $L_2(-1, 1)$, определяемые равенствами

$$\tau_1 f = \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{\chi_{e_n}}{\sqrt{m e_n}} \right) \varphi_n, \quad \tau_2 f = \sum_{n=1}^{\infty} (f, \varphi_n) \frac{\chi_{e_n}}{\sqrt{m e_n}}, \quad f \in L_2(-1, 1),$$

здесь χ_{e_n} — характеристическая функция множества e_n , (\cdot, \cdot) — скалярное произведение в $L_2(-1, 1)$. Покажем, что оператор $\tau_1 : L_2(-1, 1) \rightarrow L_2(-1, 1)$ B -интегральный с ядром

$$K_1(s, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(s) \frac{\chi_{e_n}(t)}{\sqrt{m e_n}}.$$

Действительно, для любой функции $f \in L_2(-1, 1)$ для п. в. $s \in [-1, 1]$

$$\int_{-1}^1 |K_1(s, t)| |f(t)| dt = \sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_n(s)| \int_{-1}^1 |f(t)| \frac{\chi_{e_n}(t)}{\sqrt{m e_n}} dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n |\varphi_n(s)| < \infty,$$

так как $\{\varphi_n\}$ — система абсолютной сходимости для l_2 и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$. Кроме того,

$$|K_1(s, t)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} |\varphi_n(s)| \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \frac{\chi_{e_n}(t)}{\sqrt{m e_n}} = \Lambda_1(s) \Lambda_2(t) \leq \Lambda(s) \Lambda(t),$$

где $\Lambda(\xi) = \max(\Lambda_1(\xi), \Lambda_2(\xi))$, так что ядро K_1 удовлетворяет B -условию Ахиезера. В силу того, что множества e_n , $n = 1, 2, 3, \dots$, попарно не пересекаются, оператор $\tau_2 : L_2(-1, 1) \rightarrow L_2(-1, 1)$ является интегральным оператором с ядром

$$K_2(s, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_{e_n}(s)}{\sqrt{m e_n}} \overline{\varphi_n(t)},$$

которое, как и ядро K_1 , также удовлетворяет B -условию Ахиезера. Рассмотрим B -интегральный оператор $S = \tau_1 + \tau_2$. Так как $\tau_1^* = \tau_2$, $\tau_2^* = \tau_1$, то S — самосопряженный оператор в $L_2(-1, 1)$. Обозначим через Σ замкнутую линейную оболочку ортонормированного семейства $\left\{ \frac{\chi_{e_n}(t)}{\sqrt{m e_n}} \right\} \cup \{\varphi_k\}$. Оператор S отображает Σ на Σ и сужение σ оператора S на Σ является унитарным оператором. При этом $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ — самосопряженный оператор. Поэтому спектр оператора σ расположен на пересечении единичной окружности и отрезка $[-1, 1]$. Этот спектр не может состоять из одной точки (-1 или 1), в противном случае по спектральной теореме σ был бы равен -1_{Σ} или 1_{Σ} , где 1_{Σ} — тождественный оператор в Σ , что невозможно в силу равенств $\sigma \varphi_n = \chi_{e_n} / \sqrt{m e_n}$. Таким образом, спектр оператора σ — множество $\{-1; 1\}$. Следовательно, по спектральной теореме $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ равен разности двух операторов ортогонального проектирования на два ортогональных друг другу подпространства Σ_1 и Σ_2 пространства Σ . Обозначим через P_i определенный на $L_2(-1, 1)$ и действующий в $L_2(-1, 1)$ оператор ортогонального проектирования на Σ_i , $i = 1, 2$. Мы имеем $S = P_1 - P_2$ или $S = P_2 - P_1$. Будем считать для определенности, что $S = P_1 - P_2$. Отметим, что спектр оператора S — множество $\{-1; 0; 1\}$. Пусть φ — скалярная функция, определенная на спектре S ; рассмотрим два случая: 1) $\varphi(0) \neq 0$; 2) $\varphi(0) = 0$. Покажем, что в первом случае $\varphi(S)$ — не интегральный оператор. Пусть $\varphi(0) = \lambda \neq 0$. Тогда сужение оператора $\varphi(S)$ на $L_2(\Delta)$ есть оператор $\lambda 1_{\Delta}$, где 1_{Δ} — тождественный оператор в $L_2(\Delta)$ (здесь Δ — интервал, введенный в начале доказательства теоремы). Но тождественный оператор в $L_2(\Delta)$ не интегральный (см., например, [3, с. 20]). Таким образом, в случае $\varphi(0) \neq 0$ оператор $\varphi(S)$ не интегральный. Перейдем к случаю $\varphi(0) = 0$. Пусть оператор $\varphi(S)$ не кратен S , т. е. $\varphi(S) \neq \alpha S$ для любого числа α . Мы имеем

$\varphi(S) = \varphi(-1)P_2 + \varphi(1)P_1$ и, кроме того, $\beta = \varphi(-1) + \varphi(1) \neq 0$. Покажем, что $\varphi(S)$ не является B -интегральным оператором. Рассмотрим систему

$$P_1 - P_2 = S, \quad \varphi(1)P_1 + \varphi(-1)P_2 = \varphi(S).$$

Если предположить, что $\varphi(S)$ — B -интегральный оператор, то из $\beta \neq 0$ и B -интегральности S и $\varphi(S)$ следует, что P_1, P_2 — B -интегральные операторы. Тогда B -интегральным будет оператор $S^+ = P_1 + P_2$. Но

$$S^+ f = \sum_{n=1}^{\infty} (f, \varphi_n) \varphi_n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{\chi_{e_n}}{\sqrt{m e_n}} \right) \frac{\chi_{e_n}}{\sqrt{m e_n}}, \quad f \in L_2(-1, 1).$$

Покажем, что оператор

$$L f = \sum_{n=1}^{\infty} (f, \varphi_n) \varphi_n, \quad f \in L_2(-1, 1),$$

не является B -интегральным. Действительно, если L — B -интегральный оператор, то его ядро $L(s, t)$ удовлетворяет B -условию Ахиезера $|L(s, t)| \leq \tilde{L}(s)\tilde{L}(t)$. Тогда для всех $f \in L_2(-1, 1)$

$$\begin{aligned} \|L f\|^2 &= (L f, L f) = (L^2 f, f) = (L f, f) \\ &\leq \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 |L(s, t)| |f(t)| |f(s)| dt ds \leq \left(\int_{-1}^1 \tilde{L}(\xi) |f(\xi)| d\xi \right)^2. \end{aligned}$$

Отсюда по теореме IV.2.13 из [3, с. 125] L — карлемановский интегральный оператор. В силу следствия IV.2.4 из [3, с. 121] для п. в. $s \in [-1, 1]$ имеем $\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_n(s)|^2 < \infty$, что противоречит (1). Таким образом, L не является B -интегральным оператором. Так как оператор

$$M f = \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{\chi_{e_n}}{\sqrt{m e_n}} \right) \frac{\chi_{e_n}}{\sqrt{m e_n}}, \quad f \in L_2(-1, 1),$$

B -интегральный, то оператор $S^+ = L + M$ не является B -интегральным. Полученное противоречие завершает доказательство теоремы.

Пусть E_λ — разложение единицы построенного в доказательстве теоремы самосопряженного оператора S и $E(\Delta) = E_\delta - E_\gamma, \Delta = [\gamma, \delta]$.

Следствие 1. Операторы E_λ не являются B -интегральными при $\lambda > -1$.

Следствие 2. Операторы $E(\Delta), \Delta = [\gamma, \delta]$, не являются B -интегральными при $\gamma < -1 < \delta < 0$ и при $0 < \gamma < 1 < \delta$.

Следуя Карлеману [4] и Н. И. Ахиезеру [1], определим спектральную функцию $F_\lambda(S)$ оператора S равенствами: $F_\lambda(S) = E_\lambda$ при $\lambda < 0$; $F_\lambda(S) = 0$ при $\lambda = 0$; $F_\lambda(S) = E_\lambda - 1$ при $0 < \lambda$. Здесь 1 — тождественный оператор в $L_2(-1, 1)$.

Следствие 3. $F_\lambda(S)$ не является B -интегральным оператором при $-1 < \lambda < 0$ и $0 < \lambda < 1$.

Следствие 4. Оператор S^2 и резольвента Фредгольма $S(S - \lambda I)^{-1}$, где $\lambda \neq \pm 1, \lambda \neq 0$, не являются B -интегральными.

Следствие 5. Совокупность всех B -интегральных операторов в $L_2(-1, 1)$ не является алгеброй.

В заключение заметим, что если в доказательстве теоремы оператор L не интегральный, то и $\varphi(S)$ — не интегральный оператор. Нам неизвестно, существует ли ортонормированная система $\{\varphi_n\}$ абсолютной сходимости для l_2 такая, что оператор L не интегральный.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахизер Н. И. Интегральные операторы с ядрами Карлемана // Успехи мат. наук. 1947. Т. 2, № 5. С. 93–132.
2. Никишин Е. М. Резонансные теоремы и нелинейные операторы // Успехи мат. наук. 1970. Т. 25, № 6. С. 129–191.
3. Коротков В. Б. Интегральные операторы. Новосибирск: Наука, 1983.
4. Carleman T. Sur les équations intégrales singulières a noyau réel et symétrique. Uppsala: A.-B. Lundequistska Bokhandeln, 1923.

Статья поступила 16 января 2007 г.

Коротков Виталий Борисович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090