

О ГОЛОМОРФНОМ ПРОДОЛЖЕНИИ В ОКРЕСТНОСТЬ ОСТРИЯ КЛИНА НЕОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Е. В. Юрьева

Аннотация. Некоторые известные теоремы о возможности голоморфного продолжения функций в окрестность острия клина распространяются на случай двустороннего n -кругового клина необщего положения (т. е. такого, в который нельзя вписать клин общего положения).

Ключевые слова: аналитическое продолжение, теорема Боголюбова, интегральная формула Вейля, амеба гиперповерхности.

Введение

Богатство проблематики голоморфного продолжения в многомерном комплексном анализе обнаружилось в 1906 г. благодаря феномену Гартогса «принудительного» голоморфного продолжения: оказывается, функция, голоморфная в окрестности замкнутой гиперповерхности, автоматически голоморфно продолжается в область, ограниченную этой гиперповерхностью [1, 2]. В частности, голоморфная функция $n \geq 2$ переменных не может иметь изолированных особых точек: особенности таких функций обязаны выходить на границу области или простираются в бесконечность. Другой пример неожиданного «принудительного» продолжения для голоморфных функций многих переменных дает теорема Боголюбова об острие клина (edge of the wedge theorem) [3] (см. также [4]).




Рис. 1.

Она утверждает, в частности, что если функция $f(z)$ голоморфна в трубчатой области $\mathcal{T} = \mathbb{R}^n + i\Gamma$, основанием Γ которой служит световой конус $y_1^2 > y_2^2 + \dots + y_n^2$, и непрерывна в его замыкании $\overline{\mathcal{T}}$, то она голоморфно продолжается в \mathbb{C}^n . Если требовать голоморфность $f(z)$ лишь в конечной части $\mathcal{T} \cap \{|z| < r\}$, то она будет продолжаться в полную шаровую окрестность $|z| < r/8$. Результат Боголюбова был обобщен в статье С. И. Пинчука [5], где вместо клина над световым конусом рассматривался клин с острием на порождающем многообразии, ограниченный гладкими гиперповерхностями в общем положении. В работах [3, 5] рассматривались двусторонние клины (рис. 1). Затем последовал ряд работ Е. М. Чирки, Г. М. Хенкина, Р. А. Айрапетяна, связанных с проблематикой продолжения CR -функций

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Рособразования «Развитие научного потенциала высшей школы» (код проекта 2.1.1/4620).

с острия M в односторонние клины. Наиболее общая ситуация такого типа описана А. Е. Тумановым [6]: в качестве острия клина выступало гладкое порождающее многообразие M коразмерности m , являющееся общим краем r многообразий M_j , при этом все непрерывные CR -функции на $\bigcup_{j=1}^r M_j$ допускают CR -продолжение в клин с острием M и гранями M_j . Отметим, что во всех указанных результатах рассматривались только клины общего положения.

Цель настоящей статьи состоит в исследовании вопросов продолжения в окрестность острия двустороннего клина необщего положения; при этом рассматриваются лишь n -круговые клины. В основе доказательств лежат интегральная формула Вейля и существование аналитических поверхностей, «проникающих» из одной части двустороннего клина в другую его часть через острие. В заключительном параграфе показывается, что клины с наличием указанных аналитических поверхностей можно строить с помощью некоторых комплексных алгебраических гиперповерхностей. Оказывается, что один класс таких гиперповерхностей определяется полиномами, которые введены физиками Ли и Янгом [7] в исследовании модели Изинга, и этот класс может значительно пополниться благодаря статьям [8, 9] по современной теории амёб.

§ 1. Голomorphic продолжение функций в окрестность острия n -кругового клина

Напомним вначале теорему Пинчука.

Теорема [5]. Если порождающее многообразие

$$M = \{z \in D : \varphi_1(z) = \dots = \varphi_n(z) = 0\}$$

задается функциями φ_j класса C^2 и функции f^+ и f^- , голоморфные соответственно в областях

$$D^+ = \{z \in D : \varphi_1(z) > 0, \dots, \varphi_n(z) > 0\},$$

$$D^- = \{z \in D : \varphi_1(z) < 0, \dots, \varphi_n(z) < 0\},$$

непрерывно продолжаются на M , а на M их значения совпадают: $f^+|_M = f^-|_M$, то f^+ и f^- продолжаются до функции f , голоморфной в окрестности M .




Рис. 2.

Заметим, что теорему Боголюбова можно получить из сформулированной теоремы Пинчука, вписав в световой конус Γ многогранный клин (рис. 2). Условие, что многообразии M порождающее, существенно и явно используется в доказательстве теоремы. Кроме того, следует отметить, что по самому определению порождающего многообразия через функции φ_j рассмотренный в теореме Пинчука клин ограничен гиперповерхностями в общем положении. Это также существенно в доказательстве Пинчука, поскольку он использует известную теорему Кнезера о вложенном ребре. Рассмотрим один вариант теоремы об острие клина в случае необщего положения, в котором в качестве острия рассматривается вещественный n -мерный тор.

Теорема. Пусть D^+ и D^- — две n -круговые области, замыкания которых пересекаются по единичному тору $T^n = \{|z_1| = \dots = |z_n| = 1\}$, а объединение $D^+ \cup T^n \cup D^-$ содержит диагональ $\Delta = \{|z_1| = \dots = |z_n|\}$. Если функции f^+ и f^-

голоморфны в областях D^+ и D^- соответственно и непрерывно продолжаются на T^n с совпадающими значениями: $f^+|_{T^n} = f^-|_{T^n}$, то f^+ и f^- продолжаются до функции f , голоморфной в окрестности T^n .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Воспользуемся идеей привлечения интеграла типа Вейля, который рассмотрен в статье А. К. Циха [10] в вопросе продолжения голоморфных функций на аналитические множества. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим следующий полиэдр Вейля:

$$W_\varepsilon = \left\{ z : \frac{1}{2} < |z_1| < 2, 1 - \varepsilon < \left| \chi \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \right| < 1 + \varepsilon, \dots, 1 - \varepsilon < \left| \chi \left(\frac{z_1}{z_n} \right) \right| < 1 + \varepsilon \right\},$$

где χ — функция одного переменного, голоморфная в окрестности единичной окружности, причем модуль χ равен единице на этой окружности. Например, в качестве χ достаточно взять дробно-линейную функцию

$$u = \chi(t) = \frac{t - a}{1 - \bar{a}t},$$

осуществляющую автоморфизм единичного круга, где модуль $|a|$ достаточно мал. При малых ε остов $\partial_0 W_\varepsilon$ полиэдра W_ε состоит из 2^n связных компонент

$$|z_1| = 2^{\pm 1}, \left| \chi \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \right| = 1 \pm \varepsilon, \dots, \left| \chi \left(\frac{z_1}{z_n} \right) \right| = 1 \pm \varepsilon,$$

принадлежащих $D^+ \cup D^-$. В самом деле, для функций $\chi\left(\frac{z_1}{z_j}\right)$ прообразы окружностей $|u| = 1 \pm \varepsilon$ таковы, что модули $\left|\frac{z_1}{z_j}\right|$ близки к единице, поэтому остов $\partial_0 W_\varepsilon$ расположен близко к диагонали $\Delta = \{|z_1| = \dots = |z_n|\}$. В то же время ввиду соотношения $|z_1| = 2^{\pm 1}$ на $\partial_0 W_\varepsilon$ этот остов не пересекается с тором T^n , поэтому по условию теоремы $\partial_0 W_\varepsilon$ принадлежит $D^+ \cup D^-$.

Введем функцию f на $D^+ \cup T^n \cup D^-$ так, что $f = f^\pm|_{D^\pm}$, и для краткости письма обозначим дроби $\chi\left(\frac{z_1}{z_j}\right)$ через $\chi_j(z)$. Для полиэдра W_ε и функции f напишем интеграл типа Вейля

$$F(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\partial_0 W_\varepsilon} \frac{f(\zeta)H(\zeta, z) d\zeta_1 \wedge \dots \wedge d\zeta_n}{(\zeta_1 - z_1)(\chi_2(\zeta) - \chi_2(z)) \dots (\chi_n(\zeta) - \chi_n(z))}, \quad (1)$$

где $z \in W_\varepsilon$ и $H(\zeta, z)$ — гефериан мероморфных функций $\chi_1 = \zeta_1, \chi_2, \dots, \chi_n$. Напомним (см. [1] или [10]), что гефериан для семейства χ_1, \dots, χ_n — это определитель $\det(a_{ij}(\zeta, z))$, где голоморфные функции $a_{ij}(\zeta, z)$ определяются из разложений $\chi_i(\zeta) - \chi_i(z) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(\zeta, z)(\zeta_j - z_j)$, $i = 1, \dots, n$. Так как подынтегральное выражение непрерывно по совокупности переменных $(\zeta, z) \in \partial_0 W_\varepsilon \times W_\varepsilon$ и голоморфно зависит от параметра z , то $F(z)$ голоморфна в W_ε .

Представим интеграл (1) в виде повторного:

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(|\zeta_1|=2) - (|\zeta_1|=\frac{1}{2})} \frac{\Phi(\zeta_1, z) d\zeta_1}{\zeta_1 - z_1}, \quad (2)$$

где

$$\Phi(\zeta_1, z) = \frac{1}{(2\pi i)^{n-1}} \int_{\partial_0 \tilde{W}_\varepsilon(\zeta_1)} \frac{f(\zeta)H(\zeta, z) d\zeta_2 \wedge \dots \wedge d\zeta_n}{(\chi_2(\zeta) - \chi_2(z)) \dots (\chi_n(\zeta) - \chi_n(z))},$$

а $\widetilde{W}_\varepsilon(\zeta_1)$ — это полиэдр Вейля в пространстве $\mathbb{C}_{\zeta'}^{n-1}$ переменных $\zeta' = (\zeta_2, \dots, \zeta_n)$ (зависящий от параметра ζ_1 из окружностей $|\zeta_1| = 2^{\pm 1}$), который задается неравенствами

$$1 - \varepsilon < \left| \chi \left(\frac{\zeta_1}{\zeta_2} \right) \right| < 1 + \varepsilon, \dots, 1 - \varepsilon < \left| \chi \left(\frac{\zeta_1}{\zeta_n} \right) \right| < 1 + \varepsilon.$$

Заметим, что $\widetilde{W}_\varepsilon(\zeta_1)$ представляет собой декартову степень G^{n-1} плоской области G , причем для любого $z \in W_\varepsilon$ на остове $\partial_0 \widetilde{W}_\varepsilon(\zeta_1) = (\partial G)^{n-1}$ выполняются неравенства $|\chi_j(\zeta)| > |\chi_j(z)|$. Поскольку χ биголоморфна вблизи единичной окружности, уравнения (относительно неизвестных ζ_j) $\chi_j(\zeta) = \chi_j(z)$ равносильны уравнениям $\frac{\zeta_1}{\zeta_j} = \frac{z_1}{z_j}$ и имеют единственные решения $\zeta_j = \frac{\zeta_1 z_j}{z_1}$. Поэтому по кратной формуле Коши [11, разд. 5.3]

$$\Phi(\zeta_1, z) = f \left(\zeta_1, \frac{\zeta_1}{z_1} z' \right) \frac{H(\zeta, z)}{\prod_2^n \frac{\partial \chi_j}{\partial \zeta_j}(\zeta)} \Big|_{\zeta = (\zeta_1, \frac{\zeta_1}{z_1} z')}, \quad z' = (z_2, \dots, z_n).$$

Докажем, что множитель при f равен единице. Гефериан $H(\zeta, z)$ представляет собой определитель от нижнетреугольной матрицы и равен

$$H(\zeta, z) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21}(\zeta, z) & a_{22}(\zeta, z) & 0 & \dots & 0 \\ a_{31}(\zeta, z) & 0 & a_{33}(\zeta, z) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}(\zeta, z) & 0 & 0 & \dots & a_{nn}(\zeta, z) \end{vmatrix} = \prod_2^n a_{jj}(\zeta_1, \zeta_j, z_1, z_j).$$

Для вычисления a_{jj} воспользуемся явным видом дробно-линейной функции χ , для которой

$$\chi(\tau) - \chi(t) = \frac{(\tau - t)(1 - |a|^2)}{(1 - \bar{a}\tau)(1 - \bar{a}t)}.$$

Имеем

$$\chi \left(\frac{\zeta_1}{\zeta_j} \right) - \chi \left(\frac{z_1}{z_j} \right) = \frac{1 - |a|^2}{(\zeta_j - \bar{a}\zeta_1)(z_j - \bar{a}z_1)} (z_j(\zeta_1 - z_1) - z_1(\zeta_j - z_j)).$$

Тем самым

$$a_{jj}(\zeta, z) = \frac{z_1(|a|^2 - 1)}{(\zeta_j - \bar{a}\zeta_1)(z_j - \bar{a}z_1)},$$

откуда

$$a_{jj}(\zeta, z) \Big|_{\zeta_j = \frac{z_j}{z_1} \zeta_1} = \frac{z_1^2(|a|^2 - 1)}{\zeta_1(z_j - \bar{a}z_1)^2}.$$

В то же время

$$\frac{\partial}{\partial \zeta_j} \left(\chi \left(\frac{\zeta_1}{\zeta_j} \right) \right) \Big|_{\zeta_j = \frac{z_j}{z_1} \zeta_1} = \frac{\zeta_1(|a|^2 - 1)}{(\zeta_j - \bar{a}\zeta_1)^2} \Big|_{\zeta_j = \frac{z_j}{z_1} \zeta_1} = \frac{z_1^2(|a|^2 - 1)}{\zeta_1(z_j - \bar{a}z_1)^2}.$$

В итоге получаем

$$\Phi(\zeta_1, z) = f \left(\zeta_1, \frac{\zeta_1}{z_1} z' \right),$$

т. е. интеграл (2) равен

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(|\zeta_1|=2)-(|\zeta_1|=\frac{1}{2})} \frac{f(\zeta_1, \frac{\zeta_1}{z_1} z') d\zeta_1}{\zeta_1 - z_1}, \quad z = (z_1, z') \in W_\varepsilon. \quad (3)$$

Докажем, что $F(z) = f(z)$ в $W_\varepsilon \cap (D^+ \cup D^-)$. Вначале покажем, что $F(z) = f(z)$ на диагонали Δ . В самом деле, для каждой точки $z \in \Delta$ рассмотрим комплексную прямую $l_z = \{\zeta = (\zeta_1, \frac{\zeta_1}{z_1} z') : \zeta_1 \in \mathbb{C}\}$, проходящую через z и лежащую в Δ . По условию теоремы сужение $f(\zeta_1, \frac{\zeta_1}{z_1} z')$ функции f на l_z голоморфно в кольцах $\mathcal{A}^- = \{\frac{1}{2} < |\zeta_1| < 1\}$ и $\mathcal{A}^+ = \{1 < |\zeta_1| < 2\}$ и непрерывно на окружности $C = \{|\zeta_1| = 1\}$. Прибавив к интегралу (3) и вычтя из него интеграл по единичной окружности C , представим интеграл $F(z)$ для $z_1 \in \mathcal{A}^+ \cup \mathcal{A}^-$ в виде суммы $F^+(z) + F^-(z)$ двух интегралов Коши со свойствами

$$F^\pm(z) = f(z), \quad z \in \mathcal{A}^\pm, \quad F^\pm(z) = 0, \quad z \in \mathcal{A}^\mp.$$

Отсюда получаем, что $F = F^+ + F^-$ совпадает с f в $\mathcal{A}^+ \cup C \cup \mathcal{A}^-$, т. е. F совпадает с f на диагонали Δ .

Так как Δ является множеством единственности в кусках $W_\varepsilon \cap D^\pm$, имеем совпадение $F(z) = f(z)$ всюду в $W_\varepsilon \cap (D^+ \cup D^-)$. Таким образом, получаем голоморфное продолжение функции f в окрестность остова единичного поликруга T^n .

Следующий пример показывает, что в теореме нельзя опустить условие о том, что диагональ Δ переходит из D^+ в D^- через тор T^n .

ПРИМЕР. Рассмотрим функцию $f(z, w) = (z - w) \ln(z - w)$, голоморфную в клине $K = \{2|z| < |w|^2 + 1, |z| > |w|\}$.

Эта функция однозначна в K . Кроме того, она непрерывна на части границы K , где $2|z| = |w|^2 + 1, z \neq w$. В соответствии с правилом Лопитала она непрерывно продолжается нулем на комплексную прямую $z = w$, следовательно, $f(z, w)$ непрерывна в замыкании \overline{K} . Предположим, что для $f(z, w)$ существует голоморфное продолжение $F(z, w)$ хотя бы в некоторую окрестность острия $|z| = |w| = 1$. Будучи равной нулю на комплексной прямой $z = w$, функция F должна делиться на $z - w$ (см. [1, с. 163]):

$$F(z, w) = (z - w)h(z, w),$$

где h голоморфна в некоторой окрестности острия клина K . Таким образом, в указанной окрестности мы будем иметь

$$h(z, w) = \frac{F(z, w)}{z - w} = \frac{f(z, w)}{z - w} = \ln(z - w),$$

т. е. h должна быть неограниченной при $(z, w) \rightarrow (1, 1)$ в клине K . Получаем противоречие с голоморфностью h в окрестности острия $|z| = |w| = 1$.

§ 2. О клинах, образуемых алгебраическими гиперповерхностями

Существует класс полиномов (зависящий от $\frac{n(n-1)}{2}$ вещественных параметров), введенных физиками Ли и Янгом [7], нулевые множества которых определяют клины, для которых выполняются условия теоремы.

Такие полиномы задаются следующим образом. Пусть $x_{\alpha\beta} = x_{\beta\alpha}$ ($\alpha \neq \beta$, $\alpha, \beta = 1, 2, \dots, n$) — действительные числа, абсолютные значения которых не превосходят 1. Выберем в множестве индексов $I = \{1, \dots, n\}$ произвольное подмножество a , которое может быть пустым либо совпадать с I ; тем самым всего имеется 2^n выборов $a \subset I$. Рассмотрим произведение всех $x_{\alpha\beta}$, где α пробегает a , а β пробегает дополнительное множество $I \setminus a$. Определим для каждого $a \subset I$ произведение:

$$P_a = \prod_{\substack{\alpha \in a, \\ \beta \in I \setminus a}} x_{\alpha\beta}.$$

Тогда искомым полином имеет вид

$$\mathcal{B}_n(z_1, \dots, z_n) = \sum_{a \subset I} P_a z^a = \sum_{a \subset I} \left(\prod_{\substack{\alpha \in a, \\ \beta \in I \setminus a}} x_{\alpha\beta} \right) z^a,$$

где $z^a = \prod_{\alpha \in a} z_\alpha$. В частности, для $n = 1$ полином \mathcal{B}_1 равен $1 + z_1$. Далее,

$$\mathcal{B}_2 = 1 + x_{12}(z_1 + z_2) + z_1 z_2,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_3 = 1 + z_1 x_{12} x_{13} + z_2 x_{21} x_{23} + z_3 x_{31} x_{32} + z_1 z_2 x_{13} x_{23} + z_2 z_3 x_{21} x_{31} \\ + z_3 z_1 x_{32} x_{12} + z_1 z_2 z_3. \end{aligned}$$

Лемма (Ли — Янг [7]). Если $\mathcal{B}_n(z_1, \dots, z_n) = 0$ и $|z_k|$, $k = 1, \dots, n$, не меньше 1, то

$$1 = |z_1| = |z_2| = \dots = |z_n|.$$

Следствие 1. Гиперповерхность $V = \{z \in \mathbb{C}^n : \mathcal{B}_n(z_1, \dots, z_n) = 0\}$ пересекает остов $T^n = \{|z_1| = \dots = |z_n| = 1\}$ и располагается вне клина $D^+ \cup T^n \cup D^-$, где

$$D^+ = \{z : |z_j| > 1 \forall j = 1, \dots, n\}, \quad D^- = \{z : |z_j| < 1 \forall j = 1, \dots, n\}.$$

Доказательство. В силу симметричности матрицы $\|x_{\alpha\beta}\|$ имеем $P_a = P_{I \setminus a}$. Поэтому

$$\mathcal{B}_n \left(\frac{1}{z_1}, \dots, \frac{1}{z_n} \right) = \frac{\mathcal{B}_n(z_1, \dots, z_n)}{z_1 \dots z_n}.$$

Таким образом, гиперповерхность V ведет себя симметричным образом относительно областей D^- и D^+ , т. е. по лемме Ли — Янга V может пересекать замыкания $\overline{D^-}$ и $\overline{D^+}$ лишь по остову T^n .

Фактически утверждение следствия 1 показывает, что дополнение к гиперповерхности V на схеме Рейнхарта определяет n -круговой клин. Этот клин удобнее рассматривать в логарифмической шкале.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ [8]. Амебой \mathcal{A}_V алгебраической гиперповерхности $V \subset (\mathbb{C} \setminus 0)^n$ называется ее образ в \mathbb{R}^n при отображении

$$\text{Log} : (z_1, \dots, z_n) \rightarrow (\text{Log } |z_1|, \dots, \text{Log } |z_n|).$$




Рис. 3.

Амеба комплексной кривой $V = \{\mathcal{B}_2(z_1, z_2) = 0\}$ при $|x_{12}| < 1$ изображена на рис. 3.

Структуру амебы гиперповерхности $V = \{\mathcal{B}(z) = 0\}$ в некотором смысле отражает многогранник Ньютона $\mathcal{N}_{\mathcal{B}}$ полинома $\mathcal{B}(z)$ (напомним, что *многогранником Ньютона* полинома $\mathcal{B}(z) = \sum_{\alpha \in A \subset \mathbb{Z}^n} c_{\alpha} z^{\alpha}$ называется выпуклая оболочка в \mathbb{R}^n множества A). Известно (см. [8]), что дополнение $\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{A}_V$ к амебе \mathcal{A}_V состоит

из конечного числа связных компонент E_{ν} , открытых и выпуклых. Каждая из компонент E_{ν} соответствует некоторой целочисленной точке ν из многогранника Ньютона $\mathcal{N}_{\mathcal{B}}$. Более того, конус рецессии компоненты E_{ν} (т. е. максимальный конус среди тех, сдвиги которых помещаются в E_{ν}) совпадает с двойственным конусом к многограннику $\mathcal{N}_{\mathcal{B}}$ в точке ν . Для полинома $\mathcal{B}_n(z_1, \dots, z_n)$ многогранник Ньютона представляет собой единичный куб $[0, 1]^n$, поэтому дополнение $\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{A}_V$ состоит только из 2^n компонент, соответствующих вершинам куба. По следствию 1 из леммы Ли — Янга диагональ $\text{Log}|z_1| = \dots = \text{Log}|z_n|$ лишь в точке $\bar{0}$ пересекает амебу \mathcal{A}_V , значит, она в этой точке переходит из компоненты $E_{\bar{0}} = E_{(0, \dots, 0)}$ в компоненту $E_{\bar{1}} = E_{(1, \dots, 1)}$. Из теоремы получаем такое

Следствие 2. Пусть функции $f_{\bar{0}}$ и $f_{\bar{1}}$ голоморфны в областях $\text{Log}^{-1}(E_{\bar{0}})$ и $\text{Log}^{-1}(E_{\bar{1}})$. Если $f_{\bar{0}}$ и $f_{\bar{1}}$ непрерывно продолжаются на единичный остов $T^n = \{|z_1| = \dots = |z_n| = 1\}$ с совпадающими на T^n значениями, то они голоморфно продолжаются до целой функции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. Ч. 2. Функции нескольких переменных. М.: Наука, 1985.
2. Владимиров В. С. Методы теории функций многих комплексных переменных. М.: Наука, 1964.
3. Боголюбов Н. Н., Медведев Б. В., Поливанов М. К. Вопросы теории дисперсионных соотношений. М.: Физматгиз, 1958.
4. Антипова И. А., Исаева Е. В. К теореме Боголюбова о голоморфном продолжении функций с острия в клин // Вестн. КрасГУ. 2005. Т. 4. С. 154–157.
5. Пинчук С. И. Теорема Боголюбова об «острие клина» для порождающих многообразий // Мат. сб. 1974. Т. 94. С. 468–482.
6. Туманов А. Е. Продолжение CR-функций в клин // Мат. сб. 1990. Т. 181, № 7. С. 951–964.
7. Lee T. D., Yang C. N. Statistical theory of equations of state and phase transitions. II. Lattice gas and ising model // Phys. Review. 1952. V. 87, N 3. P. 410–419.
8. Forsberg M., Passare M., Tsikh A. Laurent determinants and arrangements of hyperplane amoebas // Adv. Math. 2000. V. 151. P. 45–70.
9. Passare M., Rullgård H. Amoebas, Monge–Ampère measures, and triangulations of the Newton polytope // Duke Math. J. 2004. V. 121, N 3. P. 481–507.
10. Цих А. К. Слабо голоморфные функции на полных пересечениях, их голоморфное продолжение // Мат. сб. 1987. Т. 133, № 4. С. 429–445.
11. Цих А. К. Многомерные вычеты и их приложения. М.: Наука, 1988.

Статья поступила 22 апреля 2010 г.

Юрьева Евгения Викторовна
Сибирский федеральный университет, Институт математики,
пр. Свободный, 79, Красноярск 660041
evg_yurieva@fromru.com