

ОБ АППРОКСИМАЦИИ НЕКОТОРЫХ СТАТИСТИК
КРИТЕРИЕВ СОГЛАСИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ
ДИСКРЕТНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ ДАННЫХ

Ж. А. Асылбеков,
В. Н. Зубов, В. В. Ульянов

Аннотация. Исследуется скорость слабой сходимости распределений статистик $\{t_\lambda(\mathbf{Y}), \lambda \in \mathbb{R}\}$ критериев согласия со степенными мерами расхождения к хи-квадрат распределению. Статистики построены по n наблюдениям случайной величины с тремя возможными исходами. Доказано, что

$$\Pr(t_\lambda(\mathbf{Y}) < c) = G_2(c) + O(n^{-50/73}(\log n)^{315/146}),$$

где $G_2(c)$ — функция распределения хи-квадрат случайной величины с двумя степенями свободы. В доказательстве используется теорема М. Н. Хаксли (1993 г.) о приближении числа точек с целочисленными координатами, содержащихся в выпуклом множестве с гладкой границей на плоскости, его площадью.

Ключевые слова: точность хи-квадрат приближения, критерий согласия со степенными мерами расхождения, целочисленные точки, теорема Хаксли.

1. Введение и основной результат

Пусть $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)$ — случайный вектор, имеющий мультиномиальное распределение $M_3(n, \boldsymbol{\pi})$, т. е.

$$\Pr(Y_1 = n_1, Y_2 = n_2, Y_3 = n_3) = \begin{cases} n! \prod_{j=1}^3 \frac{\pi_j^{n_j}}{n_j!} & n_j = 0, \dots, n, n_1 + n_2 + n_3 = n; \\ 0 & \text{иначе,} \end{cases}$$

где $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$, $\pi_j > 0$, $\sum_{j=1}^3 \pi_j = 1$. Вектор \mathbf{Y} возникает, например, в результате n наблюдений случайной величины, принимающей три значения с вероятностями π_1, π_2, π_3 . При этом Y_i соответствует частоте появлений i -го значения. Далее будем считать выполненной простую гипотезу $H_0: \boldsymbol{\pi} = \mathbf{p}$, где $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$, $p_j > 0$, $j = 1, 2, 3$, и $p_1 + p_2 + p_3 = 1$. Если наблюдается случайная величина с более чем тремя значениями, то вектор \mathbf{p} состоит из теоретических вероятностей попадания наблюдаемой случайной величины в некоторые три попарно не пересекающиеся области при условии справедливости H_0 , при этом

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 11-01-00515).

Y_i — число значений, попавших в i -ю область. Для построения соответствующего критерия согласия часто используется один из представителей семейства статистик со степенными мерами расхождения, имеющего вид

$$t_\lambda(\mathbf{Y}) = \frac{2}{\lambda(\lambda+1)} \sum_{j=1}^3 Y_j \left[\left(\frac{Y_j}{np_j} \right)^\lambda - 1 \right], \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1. При $\lambda = 0$ и $\lambda = -1$ статистику t_λ следует понимать как результат предельного перехода.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Статистики t_λ впервые введены в [1, 2]. Полагая $\lambda = 1$, $\lambda = -1/2$ и $\lambda = 0$, получаем критерий хи-квадрат Карла Пирсона, статистику Фримана — Тьюки и логарифмическую статистику отношения правдоподобия соответственно.

Наша задача состоит в исследовании точности приближения хи-квадрат распределением для $\Pr(t_\lambda(\mathbf{Y}) < c)$, где c здесь и в дальнейшем обозначает произвольное положительное число. Поскольку компоненты вектора \mathbf{Y} удовлетворяют равенству $Y_1 + Y_2 + Y_3 = n$, введем случайные величины

$$X_j = (Y_j - np_j)/\sqrt{n}, \quad j = 1, 2, 3, \quad \mathbf{X} = (X_1, X_2)$$

и будем исследовать свойства вектора \mathbf{X} . Компоненты \mathbf{X} сконцентрированы на решетке

$$L = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2); x_j = (n_j - np_j)/\sqrt{n}, j = 1, 2\},$$

где n_j — неотрицательные целые числа.

Имеем

$$\Pr(t_\lambda(\mathbf{Y}) < c) = \Pr(T_\lambda(X_1, X_2) < c) = \Pr(\mathbf{X} \in B^\lambda),$$

где

$$B^\lambda = \{(x, y) : T_\lambda(x, y) < c\} \quad (1)$$

и

$$\begin{aligned} T_\lambda(x, y) = & \frac{2}{\lambda(\lambda+1)} (np_1 + \sqrt{n}x) \left[\left(1 + \frac{x}{\sqrt{np_1}} \right)^\lambda - 1 \right] \\ & + \frac{2}{\lambda(\lambda+1)} (np_2 + \sqrt{n}y) \left[\left(1 + \frac{y}{\sqrt{np_2}} \right)^\lambda - 1 \right] \\ & + \frac{2}{\lambda(\lambda+1)} (np_3 - \sqrt{n}(x+y)) \left[\left(1 - \frac{x+y}{\sqrt{np_3}} \right)^\lambda - 1 \right]. \quad (2) \end{aligned}$$

Множество B^λ принадлежит классу так называемых обобщенных выпуклых множеств, что будет показано в разд. 3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Множество $B \subset \mathbb{R}^2$ называется *обобщенным выпуклым множеством*, если его можно представить в следующем виде:

$$B = \{(x, y) : \lambda_1(y) < x < \theta_1(y), y \in B_1\} = \{(x, y) : \lambda_2(x) < y < \theta_2(x), x \in B_2\},$$

где $B_1 \subset \mathbb{R}$, $B_2 \subset \mathbb{R}$ и $\lambda_1, \theta_1, \lambda_2, \theta_2$ — непрерывные функции, определенные на B_1 и B_2 соответственно.

В предположении, что выполнена основная гипотеза, для определенного выше случайного вектора \mathbf{X} и произвольного ограниченного обобщенного выпуклого множества B Ярнольд в [3] получил асимптотическое разложение

$$\Pr(\mathbf{X} \in B) = J_1 + J_2 + O(n^{-1}),$$

где

$$J_1 = J_1(B) = \iiint_B \phi(\mathbf{x}) \left\{ 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} h_1(\mathbf{x}) + \frac{1}{n} h_2(\mathbf{x}) \right\} d\mathbf{x},$$

$$h_1(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \frac{x_j}{p_j} + \frac{1}{6} \sum_{j=1}^3 x_j \left(\frac{x_j}{p_j} \right)^2,$$

$$h_2(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} h_1(\mathbf{x})^2 + \frac{1}{12} \left(1 - \sum_{j=1}^3 \frac{1}{p_j} \right) + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^3 \left(\frac{x_j}{p_j} \right)^2 - \frac{1}{12} \sum_{j=1}^3 x_j \left(\frac{x_j}{p_j} \right)^3,$$

а также $x_3 = -x_1 - x_2$,

$$J_2 = J_2(B) = -\frac{1}{n} \sum_{y \in L_2} \chi_{B_1}(y) [S_1(\sqrt{n}x + p_1 n) \phi(x, y)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)}$$

$$- \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{B_2}(x) [S_1(\sqrt{n}y + p_2 n) \phi(x, y)]_{\lambda_2(x)}^{\theta_2(x)} dx, \quad (3)$$

где

$$L_2 = \{y : y = (1/\sqrt{n})(m - np_2), m \in \mathbb{Z}\}, \quad (4)$$

$$S_1(x) = x - [x] - 1/2, \quad [h(x)]_{\lambda(y)}^{\theta(y)} = h(\theta(y)) - h(\lambda(y)),$$

$$\phi(x, y) = \frac{1}{2\pi|\Omega|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x, y)\Omega^{-1}(x, y)^T\right)$$

и Ω — ковариационная матрица вектора \mathbf{X} . Здесь $\chi_A(x)$ — индикаторная функция, а функции $\theta_1, \lambda_1, \theta_2, \lambda_2$ суть непрерывные функции из определения 1 для множества B .

Шиотани и Фуджикоши в [4] показали, что в случаях $\lambda = 0, \lambda = -1/2$

$$J_1(B^\lambda) = G_2(c) + O(n^{-1}),$$

$$J_2(B^\lambda) = (N^\lambda - nV^\lambda) \frac{e^{-\frac{c}{2}}}{2\pi n} \sqrt{p_1 p_2 p_3} + o(1), \quad (5)$$

$$V^\lambda = V^1 + O(n^{-1}),$$

где $G_2(c)$ — функция распределения хи-квадрат распределения с двумя степенями свободы, N^λ — число точек решетки L в множестве B^λ , V^λ — объем множества B^λ . Эти результаты были обобщены Ридом на случай произвольного $\lambda \in \mathbb{R}$ в теореме 3.1 в [2], из которой вытекает, что

$$\Pr(T_\lambda < c) = \Pr(\chi_2^2 < c) + J_2(B^\lambda) + O(n^{-1}),$$

причем для $J_2(B^\lambda)$ справедливо представление (5). Этим задача оценки погрешности аппроксимации предельным распределением сводится к оценке порядка малости члена $J_2(B^\lambda)$.

Поскольку B^λ — обобщенное выпуклое множество (это будет показано в леммах 5 и 8), для члена $J_2(B^\lambda)$ справедлив результат Ярнольда (см. [3, теорема 3]):

$$J_2(B^\lambda) = O(n^{-1/2}).$$

В настоящей статье этот результат заметно улучшен.

Теорема 1. При всех $\lambda \in \mathbb{R}$ справедлива оценка

$$J_2(B^\lambda) = O(n^{-50/73}(\log n)^{315/146}). \quad (6)$$

Следствие 1. При всех $\lambda \in \mathbb{R}$ справедливо приближение

$$\Pr(t_\lambda(\mathbf{Y}) < c) = G_2(c) + O(n^{-50/73}(\log n)^{315/146}),$$

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Необходимо отметить, что в отличие от работ [2, 4], из которых следует лишь стремление к нулю величины $J_2(B^\lambda)$ при $n \rightarrow \infty$, в теореме 1 доказана степенная скорость такого стремления, которая лучше $O(n^{-1/2})$. Более того, показатель степени у n в (6) равен $-50/73$, что несколько лучше даже показателя $-2/3$, который получен Ярнольдом для классического критерия хи-квадрат Пирсона, т. е. для частного случая, когда $\lambda = 1$ (см. [3, теорема 4]). Наше уточнение опирается на результат из [5] о приближении числа целых точек в множестве с гладкой границей на плоскости площадью этого множества. В 2003 г. Хаксли в [6] улучшил результат из [5]. Однако при нашем подходе затруднительно использовать это улучшение. Объяснение причин требует введения дополнительных обозначений и анализа результата из [5], что и сделано в начале разд. 5 настоящей работы. Согласно нижним оценкам, полученным Харди в [7], порядок $J_2(B^1)$ не может быть лучше $O(n^{-3/4} \log \log n)$. Ситуация меняется, когда проблема рассматривается для мультиномиального распределения $M_k(n, \boldsymbol{\pi})$ с $k > 5$. Тогда, используя результат Гётце [8], можно доказать (см. [9, теорема 1]), что

$$J_2(B^1) = O(n^{-1}).$$

Заметим, что и в общем случае $\lambda \neq 1$ при рассмотрении мультиномиального распределения $M_k(n, \boldsymbol{\pi})$ с $k > 3$ порядок $J_2(B^\lambda)$ улучшается с ростом k , хотя и не достигает $O(n^{-1})$ (см. [10, теорема 2]). Однако в этом случае рассуждения значительно усложняются и требуется использование теоретико-числовых результатов о числе целых точек в выпуклых множествах с гладкой границей для пространств размерности $k - 1$. При этом общий результат дает худшее следствие для случая $k = 3$, чем (6).

Доказательство теоремы 1 структурно разделено на две части. В первой (см. разд. 2) для произвольного λ оценивается порядок аппроксимации $J_2(B^\lambda)$ первым слагаемым в (5). Во второй части (см. разд. 3–5) анализируется применимость результата Хаксли из теории чисел к множеству B^λ и на основе этого строится окончательная оценка для $J_2(B^\lambda)$.

Авторы признательны профессорам Ф. Гётце и Я. Фуджикоши за полезные обсуждения.

2. Редукция члена J_2

Пусть $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\lambda}_1$ — функции из определения 1 для эллипса $B^1 = \{(x, y) : T_1(x, y) < c\}$ с

$$T_1(x, y) = \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_3}\right)x^2 + \frac{2}{p_3}xy + \left(\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3}\right)y^2$$

и B_1^1 — область определения этих функций.

Лемма 1. Мера Лебега множества $B_1^\lambda \setminus B_1^1$ есть величина порядка $O(n^{-1/2})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Решая уравнение $T_1(x, y) = c$ относительно x , найдем явный вид функций $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\lambda}_1$:

$$\hat{\theta}_1(y) = -\frac{p_1 y}{p_1 + p_3} + \frac{\sqrt{p_1 p_2 p_3} \sqrt{-y^2 + c p_2 (p_1 + p_3)}}{p_2 (p_1 + p_3)},$$

$$\hat{\lambda}_1(y) = -\frac{p_1 y}{p_1 + p_3} - \frac{\sqrt{p_1 p_2 p_3} \sqrt{-y^2 + c p_2 (p_1 + p_3)}}{p_2 (p_1 + p_3)}.$$

Отсюда получаем область определения этих функций:

$$B_1^1 = [-\sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)}, \sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)}]. \quad (7)$$

Учитывая, что B^λ — выпуклое множество с гладкой границей (это будет показано в леммах 5 и 8), мы можем найти точки, в которых прямые, параллельные оси Ox , касаются кривой, задаваемой соотношением $T_\lambda(x, y) = c$. Эти точки имеют минимальную и максимальную ординаты (y_{\min} и y_{\max}) среди всех точек эллипса. Таким образом, их ординаты будут концами отрезка B_1^λ . Поскольку начиная с некоторого n всюду на множестве B^λ выполнено неравенство

$$\frac{\partial^2 T_\lambda}{\partial x^2}(x, y) > 0,$$

при фиксированном y функция $T_\lambda(x, y)$ в точке касания достигает минимума, равного c , если

$$\frac{\partial T_\lambda}{\partial x}(x, y) = 0.$$

Решая это уравнение относительно y , получаем, что точки с ординатами y_{\min} и y_{\max} расположены на прямой $x = -p_1 y / (p_1 + p_3)$. Подставляя это выражение в уравнение $T_\lambda(x, y) = c$, раскладывая левую часть по формуле Тейлора и выражая y , получаем, что

$$y_{\min} = -\sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)} + O(n^{-1/2}), \quad y_{\max} = \sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)} + O(n^{-1/2}).$$

Поэтому множество B_1^λ имеет вид

$$B_1^\lambda = [-\sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)} + O(n^{-1/2}), \sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)} + O(n^{-1/2})]. \quad (8)$$

Из (7) и (8) приходим к утверждению леммы. \square

Обозначим

$$B_{1-}^1 = [-\sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)} + n^{-1/2}, \sqrt{c p_2 (p_1 + p_3)} - n^{-1/2}]. \quad (9)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4. В множество $B_1^1 \setminus B_{1-}^1$ попадают ровно две точки решетки L_2 (см. (7), (9) и (4)).

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Мера Лебега множества $B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1$ есть $O(n^{-1/2})$ (см. лемму 1, (7) и (9)).

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Множество $B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1$ представляет собой объединение не более чем двух полуинтервалов.

Лемма 2. Существуют константы $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ такие, что функции θ_1 и λ_1 удовлетворяют следующим неравенствам:

$$|\theta_1(y) - \hat{\theta}_1(y)| \leq c_1 n^{-1/4}, \quad |\lambda_1(y) - \hat{\lambda}_1(y)| \leq c_2 n^{-1/4} \quad (10)$$

для всех $y \in B_1^\lambda \cap B_{1-}^1$ и $n \geq N = \lceil (cp_2(p_1 + p_3))^{-1} \rceil$.

Доказательство. Раскладывая в уравнении $T_\lambda(\theta_1(y), y) = c$ левую часть по степеням n , получим

$$T_1(\theta_1(y), y) + R(y)n^{-1/2} = c \quad (11)$$

с

$$|R(y)| \leq c_3. \quad (12)$$

Выражая $\theta_1(y)$ из (11), имеем

$$|\theta_1(y) - \hat{\theta}_1(y)| = \frac{\sqrt{p_1 p_2 p_3} |R(y)|}{\sqrt{n}} \times \left| \sqrt{-y^2 + \left(c - \frac{R(y)}{\sqrt{n}}\right) p_2 (p_1 + p_3) + \sqrt{-y^2 + cp_2(p_1 + p_3)}} \right|^{-1}. \quad (13)$$

Для $y \in B_{1-}^1$ в силу того, что B_{1-}^1 имеет вид (9), получим оценку

$$y^2 \leq cp_2(p_1 + p_3) - \frac{2\sqrt{cp_2(p_1 + p_3)}}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}. \quad (14)$$

Подставляя неравенство (14) в (13) и учитывая (12), имеем

$$|\theta_1(y) - \hat{\theta}_1(y)| = \frac{\sqrt{p_1 p_2 p_3} c_3}{c^{1/4} (p_2(p_1 + p_3))^{1/4}} n^{-1/4}$$

для всех $n \geq N = \lceil (cp_2(p_1 + p_3))^{-1} \rceil$. Отсюда вытекает первая оценка в (10). Вторая оценка в (10) доказывается аналогично. \square

Замечание 7. Аналогичные оценки можно получить для функций θ_2 и λ_2 .

Утверждение 1. Член $J_2(B^\lambda)$, определяемый формулой (3), можно представить в следующем виде:

$$J_2(B^\lambda) = \frac{d}{n} (N^\lambda - nV^\lambda) + O(n^{-3/4}), \quad (15)$$

где $d > 0$ — константа.

Доказательство. Рассмотрим по отдельности слагаемые в выражении (3). Положим

$$J_{2,1} = \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2} \chi_{B_1^\lambda}(y) [S_1(\sqrt{n}x + p_1 n) \phi(x, y)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)},$$

$$J_{2,2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{B_2^\lambda}(x) [S_1(\sqrt{n}y + p_2 n) \phi(x, y)]_{\lambda_2(x)}^{\theta_2(x)} dx. \quad (16)$$

Тогда

$$J_2(B^\lambda) = -(J_{2,1} + J_{2,2}). \quad (17)$$

Используя представление множества B_1^λ в виде объединения двух непересекающихся множеств: $B_1^\lambda = (B_1^\lambda \cap B_{1-}^1) \cup (B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1)$, можем переписать $J_{2,1}$ в виде

$$J_{2,1} = \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2} \chi_{B_1^\lambda \cap B_{1-}^1}(y) [S_1(\sqrt{n}x + p_1n)\phi(x, y)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)} + \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2} \chi_{B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1}(y) [S_1(\sqrt{n}x + p_1n)\phi(x, y)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)}. \quad (18)$$

Решетка L_2 имеет шаг $n^{-1/2}$, поэтому в множестве $B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1$ в силу замечаний 5 и 6 содержится $O(1)$ точек этой решетки. Следовательно, ввиду ограниченности функций S_1 и ϕ второе слагаемое в (18) есть $O(n^{-1})$. Пользуясь формулой Лагранжа, получим

$$J_{2,1} = \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2 \cap B_1^\lambda \cap B_{1-}^1} S_1(\sqrt{n}\theta_1(y) + p_1n) \frac{\partial \phi}{\partial x}(\xi_1(y), y)(\theta_1(y) - \hat{\theta}_1(y)) + \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2 \cap B_1^\lambda \cap B_{1-}^1} S_1(\sqrt{n}\lambda_1(y) + p_1n) \frac{\partial \phi}{\partial x}(\xi_2(y), y)(\hat{\lambda}_1(y) - \lambda_1(y)) + \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2 \cap B_1^\lambda \cap B_{1-}^1} d[S_1(\sqrt{n}x + p_1n)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)} + \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2 \cap (B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1)} [S_1(\sqrt{n}x + p_1n)\phi(x, y)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)},$$

где $\xi_1(y)$ и $\xi_2(y)$ — некоторые функции, определенные на $B_1^\lambda \cap B_{1-}^1$. Дополнительно запишем

$$\sum_{y \in L_2 \cap B_1^\lambda \cap B_{1-}^1} d[S_1(\sqrt{n}x + p_1n)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)} = \sum_{y \in L_2 \cap B_1^\lambda} d[S_1(\sqrt{n}x + p_1n)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)} - \sum_{y \in L_2 \cap (B_1^\lambda \setminus B_{1-}^1)} d[S_1(\sqrt{n}x + p_1n)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)}.$$

В силу замечания 5, леммы 2 и ограниченности функций S_1 и ϕ заключаем, что

$$J_{2,1} = \frac{1}{n} \sum_{x_2 \in L_2 \cap B_1^\lambda} d[S_1(\sqrt{n}x + p_1n)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)} + O(n^{-3/4}). \quad (19)$$

Продельвая то же самое с выражением (16), можем переписать его в виде

$$J_{2,2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{B_2^\lambda} d[S_1(\sqrt{n}y + p_2n)]_{\lambda_2(x)}^{\theta_2(x)} dx + O(n^{-3/4}). \quad (20)$$

Подставляя (19) и (20) в (17), получаем, что

$$-J_2(B^\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{y \in L_2 \cap B_1^\lambda} d[S_1(\sqrt{n}x + p_1n)]_{\lambda_1(y)}^{\theta_1(y)} + \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{B_2^\lambda} d[S_1(\sqrt{n}y + p_2n)]_{\lambda_2(x)}^{\theta_2(x)} dx + O(n^{-3/4}). \quad (21)$$

Вынося константу d из-под знаков суммы и интеграла в (21) и применяя рассуждения работы [3] (см. доказательство теоремы 4 в [3]), получаем (15). \square

3. Выпуклость множества B^λ

Для квадратичной формы

$$\Phi(h_1, h_2, \dots, h_m) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^m a_{ik} h_i h_k \quad (22)$$

запишем матрицу, ей соответствующую:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Теорема (критерий Сильвестра). Для того чтобы квадратичная форма (22) с симметричной матрицей (23) являлась положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрицы (23) были положительны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО см. в [11, гл. XVII, § 102, теорема 102.4].

Лемма 3. Пусть функция $f(x)$ задана и дважды дифференцируема на выпуклом множестве $Q \subset \mathbb{R}^2$. Тогда для того чтобы эта функция являлась строго выпуклой на множестве Q , достаточно, чтобы второй дифференциал $d^2 f$ этой функции во всех точках Q являлся строго положительно определенной квадратичной формой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО см. в [12, гл. 14, § 7, лемма 2].

Лемма 4. Функция $T_\lambda(x, y)$, определяемая формулой (2), строго выпукла на множестве $Q = \{(x, y) : x > -\sqrt{np_1}, y > -\sqrt{np_2}, x + y < \sqrt{np_3}\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Множество Q выпуклое, поскольку является открытым треугольником. Вычислим частные производные второго порядка функции $T_\lambda(x, y)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2(T_\lambda)}{\partial x^2} &= 2 \left[\frac{1}{p_1} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{np_1}} \right)^{\lambda-1} + \frac{1}{p_3} \left(1 - \frac{x+y}{\sqrt{np_3}} \right)^{\lambda-1} \right], \\ \frac{\partial^2(T_\lambda)}{\partial y^2} &= 2 \left[\frac{1}{p_2} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{np_2}} \right)^{\lambda-1} + \frac{1}{p_3} \left(1 - \frac{x+y}{\sqrt{np_3}} \right)^{\lambda-1} \right], \\ \frac{\partial^2(T_\lambda)}{\partial x \partial y} &= \frac{2}{p_3} \left(1 - \frac{x+y}{\sqrt{np_3}} \right)^{\lambda-1} = \frac{\partial^2(T_\lambda)}{\partial y \partial x}. \end{aligned}$$

Все указанные производные непрерывны в Q , поэтому функция $T_\lambda(x, y)$ дважды дифференцируема в Q . В силу леммы 3 утверждение леммы будет доказано, если мы покажем, что $d^2(T_\lambda)$ — строго положительно определенная квадратичная форма. Для этого в силу критерия Сильвестра достаточно показать, что главные миноры матрицы $A = \begin{pmatrix} \partial^2 T_\lambda / \partial x^2 & \partial^2 T_\lambda / \partial x \partial y \\ \partial^2 T_\lambda / \partial y \partial x & \partial^2 T_\lambda / \partial y^2 \end{pmatrix}$ положительны.

Понятно, что для любых $(x, y) \in Q$ главный минор первого порядка $A_1 = \partial^2(T_\lambda) / \partial x^2$ положителен. Для главного минора второго порядка имеем

$$A_2 = 4 \left[\frac{(ab)^{\lambda-1}}{p_1 p_2} + \frac{(ac)^{\lambda-1}}{p_1 p_3} + \frac{(bc)^{\lambda-1}}{p_2 p_3} \right] > 0,$$

где $a = 1 + x/\sqrt{np_1} > 0$, $b = 1 + y/\sqrt{np_2} > 0$, $c = 1 - (x+y)/\sqrt{np_3} > 0$. \square

Лемма 5. Множество B^λ строго выпуклое.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Фиксируем произвольные $\mathbf{x}_1 = (x_1, y_1) \in B^\lambda$, $\mathbf{x}_2 = (x_2, y_2) \in B^\lambda$, $t \in [0, 1]$. Тогда $T_\lambda(\mathbf{x}_1) < c$, $T_\lambda(\mathbf{x}_2) < c$. В силу леммы 4 функция $T_\lambda(x, y)$ строго выпуклая на Q . Поэтому

$$\begin{aligned} T_\lambda(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)) &< T_\lambda(\mathbf{x}_1) + t(T_\lambda(\mathbf{x}_2) - T_\lambda(\mathbf{x}_1)) \\ &= (1-t)T_\lambda(\mathbf{x}_1) + tT_\lambda(\mathbf{x}_2) < (1-t)c + tc = c. \end{aligned}$$

Следовательно, $\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \in B^\lambda$, и поэтому B^λ — выпуклое множество. Повторяя эти рассуждения для произвольной пары точек на границе множества B^λ , получим, что оно строго выпуклое. \square

4. Гладкость кривой $T_\lambda(x, y) = c$

Рассмотрим функцию $U(r, t) = T_\lambda(r \cos t, r \sin t) - c$ на множестве

$$S = (0, +\infty) \times [0, 2\pi] \cap \{(r, t) : r \cos t > -\sqrt{np_1}, \\ r \sin t > -\sqrt{np_2}, r \cos t + r \sin t < \sqrt{np_3}\}. \quad (24)$$

Лемма 6. Существуют такие s, N , что для любых $(r, t) \in \partial B^\lambda$ и $n \geq N$

$$\frac{\partial U(r, t)}{\partial r} \geq s > 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Разложим производную U :

$$\frac{\partial U(r, t)}{\partial r} = 2r \left(\cos^2 t \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_3} \right) + \sin^2 t \left(\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} \right) + \frac{2 \cos t \sin t}{p_3} \right) + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Очевидно, что на границе найдется такое r_1 , что $r(t) \geq r_1$ для любого t . В силу вида функции $U(r(t), t)$ и ее бесконечной дифференцируемости на множестве $(r, t) \in [0, r_0] \times [0, 2\pi]$ величину $O(1/\sqrt{n})$ можно считать равномерной по t . Переходя к двойному аргументу в тригонометрических функциях и затем используя формулу для косинуса вспомогательного аргумента, приходим к нижней оценке производной

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{2}{p_3} \right) + \sqrt{\frac{(1/p_1 - 1/p_2)^2}{4} + \frac{1}{p_3^2}} \cos(2t + \phi_0) \\ &> \frac{1}{2p_1} + \frac{1}{2p_2} + \frac{1}{p_3} - \sqrt{\left(\frac{1}{2p_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{2p_2}\right)^2 + \left(\frac{1}{p_3}\right)^2} > 0. \quad \square \end{aligned}$$

Лемма 7. Пусть (r_0, t_0) — точка множества S , в которой функция $U(r, t)$ обращается в нуль. Тогда для любого достаточно малого положительного числа ε найдется такая окрестность точки t_0 , что в пределах этой окрестности существует единственная функция $r = r(t)$, которая удовлетворяет условию $|r - r_0| < \varepsilon$ и является решением уравнения

$$U(r, t) = 0,$$

причем функция $r = r(t)$ непрерывна и пять раз дифференцируема в указанной окрестности точки t_0 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть (r_0, t_0) — точка множества S , в которой функция $U(r, t)$ обращается в нуль. Поскольку S является открытым множеством,

существует окрестность точки (r_0, t_0) , целиком лежащая в S . Функция $U(r, t)$ бесконечно дифференцируема в указанной окрестности. Следовательно, частная производная $\partial U/\partial r$ непрерывна в (r_0, t_0) . В силу леммы 6 частная производная $\partial U/\partial r$ не обращается в нуль в точке (r_0, t_0) . Стало быть, для функции $U(r, t)$ и точки (r_0, t_0) выполнены все условия теоремы о неявной функции (см., например, [13]). \square

Лемма 8. Для кривой

$$T_\lambda(x, y) = c \quad (25)$$

существует четырежды непрерывно дифференцируемая параметризация вида $x = x(t) = r(t) \cos t$, $y = y(t) = r(t) \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу леммы 5 множество $B^\lambda = \{(x, y) : T_\lambda(x, y) < c\}$ выпуклое. Кроме того, начало координат лежит внутри этой кривой, так как $T_\lambda(0, 0) = 0 < c$. Следовательно, для любого $t_0 \in [0, 2\pi]$ луч, выходящий из начала координат под углом t_0 к оси Ox , пересекает кривую (25) в единственной точке (x_0, y_0) . Перейдем к полярной системе координат: $x = r \cos t$, $y = r \sin t$. Тогда точка (x_0, y_0) перейдет в точку (r_0, t_0) , где $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$. Точка (x_0, y_0) лежит на кривой (25) по построению, тем самым

$$U(r_0, t_0) = T_\lambda(r_0 \cos t_0, r_0 \sin t_0) - c = T_\lambda(x_0, y_0) - c = 0.$$

Поэтому в силу леммы 7 найдется такая окрестность точки t_0 , что в пределах этой окрестности существует единственная функция $r = r(t)$, которая является решением уравнения $U(r, t) = 0$, причем эта функция $r = r(t)$ непрерывна и пять раз дифференцируема в указанной окрестности. Пусть $x(t) = r(t) \cos t$, $y(t) = r(t) \sin t$. Тогда в указанной окрестности точки t_0

$$T_\lambda(x(t), y(t)) = T_\lambda(r(t) \cos t, r(t) \sin t) = U(r(t), t) + c = c,$$

причем функции $x(t)$, $y(t)$ непрерывны и пять раз дифференцируемы в этой окрестности. Следовательно, они четырежды непрерывно дифференцируемы в этой окрестности и являются искомой параметризацией кривой (25) в указанной окрестности t_0 .

В силу произвольности выбора t_0 требуемая параметризация существует на всем сегменте $[0, 2\pi]$. \square

Следствие 2. Радиус кривизны кривой (25) не обращается в нуль всюду на этой кривой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $x(t), y(t)$ — параметризация кривой (25) из леммы 8. Покажем, что

$$(x'(t))^2 + (y'(t))^2 \neq 0 \quad \text{для всех } t \in [0, 2\pi]. \quad (26)$$

Предположим, что существует точка $t_0 \in [0, 2\pi]$ такая, что $(x'(t_0))^2 + (y'(t_0))^2 = 0$. Тогда в этой точке $r'^2(t_0) + r^2(t_0) = 0$. Следовательно,

$$r(t_0) = 0 \rightarrow \begin{cases} x(t_0) = 0, \\ y(t_0) = 0 \end{cases} \rightarrow T_\lambda(x(t_0), y(t_0)) = 0.$$

Это противоречит тому, что $x(t), y(t)$ — параметризация кривой (25).

Из формулы для радиуса кривизны:

$$\rho = \frac{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}{x'y'' - y'x''}, \quad (27)$$

и (26) получаем утверждение следствия. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Кривая $\{x(t), y(t)\}$, $t \in [a, b]$, называется *гладкой*, если функции $x(t), y(t)$ гладкие на $[a, b]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Гладкая кривая $\{x(t), y(t)\}$, $t \in [a, b]$, называется *регулярной*, если вектор $(x'(t), y'(t))^T$ не обращается в нуль всюду на $[a, b]$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Параметр l кривой $\{x(l), y(l)\}$ называется *натуральным*, если длина участка кривой, отвечающего изменению параметра l от a_1 до $b_1 > a_1$, равна $b_1 - a_1$.

Лемма 9. 1. Если параметр $l \in [a, b]$ кривой $\{x(l), y(l)\}$ натурален, то $\sqrt{(x'(l))^2 + (y'(l))^2} = 1$ в точках, где существуют непрерывные производные $x'(l), y'(l)$.

2 На каждой регулярной кривой существует натуральный параметр.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО см. в [14, гл. 1, § 1, лемма 2]. \square

Следствие 3. Радиус кривизны кривой (25) непрерывен всюду на этой кривой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $x(t), y(t)$ — параметризация кривой (25) из леммы 8. Покажем, что

$$x'y'' - y'x'' \neq 0 \quad \text{для всех } t \in [0, 2\pi]. \quad (28)$$

Сначала покажем, что $(x'')^2 + (y'')^2 \neq 0$ всюду на $[0, 2\pi]$. Предположим противное, т. е. пусть для некоторого $t_0 \in [0, 2\pi]$ выполнено

$$(x''(t_0))^2 + (y''(t_0))^2 = 0.$$

Подставляя сюда выражения для $x(t)$ и $y(t)$ из леммы 8, имеем

$$4(r'(t_0))^2 + (r''(t_0) - r(t_0))^2 = 0,$$

следовательно,

$$r'(t_0) = 0, \quad r''(t_0) = r(t_0). \quad (29)$$

Далее, дифференцируя тождество $U(r(t), t) = 0$ два раза в точке t_0 и учитывая (29), получим, что

$$\begin{aligned} & \frac{2r^2(t_0) \sin^2 t_0}{p_1 \left(1 + \frac{r(t_0) \cos t_0}{\sqrt{np_1}}\right)^{1-\lambda}} + \frac{2r^2(t_0) \cos^2 t_0}{p_2 \left(1 + \frac{r(t_0) \sin t_0}{\sqrt{np_2}}\right)^{1-\lambda}} \\ & + \frac{2(-r(t_0) \sin t_0 + r(t_0) \cos t_0)^2}{p_3 \left(1 - \frac{r(t_0) \cos t_0 + r(t_0) \sin t_0}{\sqrt{np_3}}\right)^{1-\lambda}} = 0. \end{aligned} \quad (30)$$

Здесь знаменатели в каждой дроби положительны в силу области определения функции $U(r, t)$ (см. (24)). Поэтому каждое слагаемое в (30) неотрицательно и необходимо обращается в нуль, следовательно, $\cos t_0 = \sin t_0 = 0$, но это противоречит основному тригонометрическому тождеству. Тем самым $(x'')^2 + (y'')^2 \neq 0$ всюду на кривой.

Из леммы 8 и (26) заключаем, что кривая (25) регулярна и в силу леммы 9 допускает натуральную параметризацию $x = \chi(l)$, $y = \gamma(l)$. Можно показать, что и в этом случае векторы $(\chi', \gamma')^T$, $(\chi'', \gamma'')^T$ ненулевые всюду на $l \in [0, L]$,

где L — длина кривой (25). Это легко показать от противного, пользуясь тем, что отображение $l : [0, 2\pi] \rightarrow [0, L]$, задаваемое по формуле

$$l(t) = \int_0^t \sqrt{x'^2(\tau) + y'^2(\tau)} d\tau, \quad (31)$$

гладкое и обратимое. Но тогда в силу леммы 9 $\chi'^2(l) + \gamma'^2(l) = 1$. Дифференцируя это тождество по l , получим $\chi'(l)\chi''(l) + \gamma'(l)\gamma''(l) = 0$, следовательно, векторы $(\chi', \gamma')^T$ и (χ'', γ'') ортогональны друг другу. Поэтому

$$\begin{vmatrix} \chi'(l) & \chi''(l) \\ \gamma'(l) & \gamma''(l) \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \chi'(l)\gamma''(l) - \gamma'(l)\chi''(l) \neq 0. \quad (32)$$

Значит, в силу взаимной однозначности отображения (31) выполнено (28). Отсюда и из формулы для радиуса кривизны (27) получаем утверждение следствия. \square

Следствие 4. Радиус кривизны кривой (25) дважды непрерывно дифференцируем относительно угла смежности всюду на этой кривой.

Доказательство. Пусть $\chi = \chi(l)$, $\gamma = \gamma(l)$ — натуральная параметризация кривой (25). Тогда в силу леммы 8, а также гладкости и обратимости отображения (31) $\chi(l)$ и $\gamma(l)$ являются четырежды непрерывно дифференцируемыми функциями. Пусть ρ — радиус кривизны кривой (25), ψ — ее угол смежности. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{d\psi} &= \frac{d\rho}{dl} \frac{dl}{d\psi} = \rho \frac{d\rho}{dl} = \frac{1}{2} \frac{d\rho^2}{dl} = \frac{1}{2} \frac{d\left(\frac{(\chi'^2 + \gamma'^2)^3}{(\chi'\gamma'' - \gamma'\chi'')^2}\right)}{dl} \\ &= \frac{1}{2} \frac{3(\chi'^2 + \gamma'^2)^2(2\chi'\gamma'' + 2\gamma'\chi'')}{(\chi'\gamma'' - \gamma'\chi'')^2} - \frac{(\chi'^2 + \gamma'^2)^3(\chi'\gamma''' - \gamma'\chi''')}{(\chi'\gamma'' - \gamma'\chi'')^3}. \end{aligned} \quad (33)$$

Поэтому в силу гладкости функций $\chi(l), \gamma(l)$ и свойства (32) радиус кривизны ρ непрерывно дифференцируем всюду на кривой (25).

Аналогично

$$\frac{d^2\rho}{d\psi^2} = \frac{d}{d\psi} \left(\frac{d\rho}{d\psi} \right) = \frac{1}{2\rho} \frac{d\left(\frac{d\rho^2}{dl}\right)}{dl}. \quad (34)$$

Не выписывая точной формулы для второй производной по тангенциальному углу, легко видеть, что она непрерывна в силу требований на $\chi(l), \gamma(l)$ и того факта, что в знаменателе результирующего выражения вновь получим $\chi'\gamma'' - \gamma'\chi''$ в некоторой степени. \square

5. Применение теоремы Хаксли к последовательности множеств $B^\lambda(n)$

Теорема 2 [5]. Пусть B — выпуклая евклидова плоская область площадью A , ограниченная простой замкнутой кривой C , состоящей из конечного числа частей C_i , каждая из которых три раза непрерывно дифференцируема в следующем смысле: радиус кривизны ρ непрерывен, не равен нулю на каждой части C_i и непрерывно дифференцируем относительно угла смежности ψ . Пусть число M достаточно велико, и пусть MB обозначает множество, образованное

увеличением множества B линейно в M раз. Тогда для любого изометрического вложения множества MB в евклидову плоскость число целых точек (m, n) в MB есть

$$AM^2 + O(IM^{46/73}(\log M)^{315/146}), \quad (35)$$

где I — число, зависящее от кривой C , но не от M и не от вложения множества MB .

Если помимо вышеуказанного части C_i четырежды непрерывно дифференцируемы в том смысле, что ρ дважды непрерывно дифференцируем по отношению к тангенциальному углу ψ , то тогда мы можем взять

$$I = \sum_i \min_{C_i} \left(1 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{d\rho}{d\psi} \right)^2 \right)^{-69/146} \rho^{46/73} + \sum_i \int_{C_i} \left(1 + \frac{|\rho d^2 \rho / d\psi^2|}{\rho^2 + (d\rho/d\psi)^2} \right) \times \left(1 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{d\rho}{d\psi} \right)^2 \right)^{-69/146} \left| \frac{d\rho}{d\psi} \right| \rho^{-33/73} d\psi \quad (36)$$

при условии, что M достаточно велико для выполнения неравенств

$$M \geq \frac{1}{\rho}, \quad \frac{1}{\rho^{64}} \left| \frac{d\rho}{d\psi} \right|^{53} \leq M^{11} (\log M)^{387/8}$$

по отдельности на каждом участке C_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО см. в [5, теоремы 5 и 6]. \square

Теперь докажем лемму, которая показывает, что в нашем случае благодаря теореме 2 величина I ограничена некоторой константой, не зависящей от n . Необходимо отметить, что в 2003 г. Хаксли в [6] несколько улучшил оценку в теореме 2, однако не получил явного представления для I , аналогичного (36). В связи с этим результат из [6] не может быть применен в нашем случае, так как граница ∂B^λ множества B^λ зависит от n , а тогда от n зависит и I . Поскольку при отсутствии явного выражения для I не представляется возможным оценить вклад I в порядок погрешности приближения, результат из [6] не используется в настоящей работе.

Лемма 10. Для всех достаточно больших n радиус кривизны ρ границы ∂B^λ равномерно по n ограничен сверху и равномерно отделен от нуля, а его первая и вторая производные по тангенциальному углу ψ равномерно ограничены сверху.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Напомним, что радиус кривизны и его производные задаются формулами (27), (33) и (34). Используем параметризацию в полярных координатах из леммы 8. В этом случае

$$\rho = \frac{(r^2(t) + r'^2(t))^{\frac{3}{2}}}{|2(r'(t))^2 + r^2(t) - r'(t)r''(t)|}, \quad (37)$$

а производные по тангенциальному углу выражаются аналогично с появлением дополнительных сомножителей вида

$$2(r'(t))^2 + r^2(t) - r'(t)r''(t) \quad (38)$$

в знаменателе.

Обозначим через $r_n(t)$ полярный радиус ∂B^λ и через $r(t)$ — полярный радиус ∂B^1 . Заметим, что точное выражение величины (38) для предельного

множества B^1 отделено от 0. Действительно, B^1 есть повернутый вокруг начала координат эллипс с осями $a(\bar{p}, c)$, $b(\bar{p}, c)$. Для простейшего эллипса вида $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, подставив нашу параметризацию, получим

$$r(t) = \left(\frac{\cos^2 t}{a^2} + \frac{\sin^2 t}{b^2} \right)^{-1/2} = \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) + \frac{\cos 2t}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \right)^{-1/2}, \quad (39)$$

$$r'(t) = \frac{\sin 2t}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) + \frac{\cos 2t}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \right)^{-3/2}, \quad (40)$$

$$r''(t) = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{\cos^2 2t}{4} + \frac{b^2 + a^2 \cos 2t}{b^2 - a^2} \frac{\cos 2t}{2} \right) \times \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) + \frac{\cos 2t}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \right)^{-5/2}. \quad (41)$$

Заметим, что $r(t)$ изменяется в ограниченных пределах:

$$\sqrt{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \left| \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right| \right)^{-1/2} \geq r(t) \geq \sqrt{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \left| \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right| \right)^{-1/2}. \quad (42)$$

Теперь для (38) получим

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) + \frac{\cos 2t}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \right)^{-3}}_A \left[\frac{\sin^2 2t \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)^2}{2} + \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) + \frac{\cos 2t}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{\cos^2 2t}{2} + \frac{b^2 + a^2 \cos 2t}{b^2 - a^2} \cos 2t \right) \right] = A^{-3} \left(\frac{1}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)^2 \right) = \frac{1}{a^2 b^2 A^3} > 0.$$

Поскольку в полярных координатах поворот сводится к преобразованию $t := t + c$, а оценка снизу может быть сделана не зависящей от t , мы доказали отделенность от нуля величины (38) для границы B^1 . Логично предположить, что точно таким же свойством обладает допредельное множество начиная с некоторого номера N , единого для всех t .

Ниже в лемме 11 доказана равномерная сходимость $r_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} r(t)$. Мы знаем, что производные решений $r_n(t)$, $r(t)$ выражаются через производные неявной функции по своим аргументам t и $r(t)$. При этом в знаменателе будет появляться первая производная по r от функционалов $T_\lambda(r, t)$, $T_1(r, t)$ в некоторой степени. Например,

$$r'_n(t) = - \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial t} / \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial r}, \quad r'(t) = - \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial t} / \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial r}.$$

Из леммы 6 следует, что

$$\exists N \forall n \geq N \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial r} \geq s > 0, \quad \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial r} \geq s > 0.$$

В лемме 6 фактически доказана равномерная оценка

$$\frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial r} = \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial r} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Проводя аналогичные рассуждения, можно получить то же для производных по t :

$$\frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial t} = \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial t} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Поэтому нетрудно видеть, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial r} &= \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial r} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \\ \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial r} &= \frac{\partial T_1(r_n(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_1(r_n(t), t)}{\partial r} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \end{aligned} \quad (43)$$

Распишем разность $r'_n(t) - r'(t)$:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial r} - \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial r} \\ &= \left(\frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r_n(t), t)}{\partial r} - \frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial r} \right) \\ &\quad + \left(\frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r(t), t)}{\partial r} - \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_1(r(t), t)}{\partial r} \right). \end{aligned}$$

Поскольку дробь $\frac{\partial T_\lambda(r, t)}{\partial t} \bigg/ \frac{\partial T_\lambda(r, t)}{\partial r}$ является независимой от n гладкой функцией с ненулевым знаменателем и поскольку переменные (r, t) изменяются в ограниченной области, можно применить (43), чтобы посредством теоремы Лагранжа получить равенство $|r'_n(t) - r'(t)| = M|r_n(t) - r(t)| + O(1/\sqrt{n})$, что приводит нас к равномерной сходимости первых производных полярного радиуса. Аналогично можно показать равномерную сходимость и для старших производных.

Из формул (39)–(42) вытекает ограниченность сверху для производных полярного радиуса ∂B^1 и ограниченность с обеих сторон самого полярного радиуса. При этом величина (38) отделена от нуля. В силу доказанного эти же утверждения справедливы и для полярного радиуса (вместе с производными) границы ∂B^λ по крайней мере начиная с некоторого номера N , единого для всех t . Теперь утверждение леммы следует из предыдущих рассуждений и формул (37), (34) и (33). \square

Следствие 5. Для достаточно большого n множество B^λ удовлетворяет условиям теоремы 2 с фактором $M = \sqrt{n}$.

Доказательство непосредственно следует из леммы 5 и следствий 3 и 4. \square

6. Доказательство основного результата

Напомним, что N^λ — число точек решетки L , попадающих в множество B^λ . Поскольку решетка L имеет шаг, равный $1/\sqrt{n}$, можно рассматривать N^λ как число целых точек в множестве $\sqrt{n}B^\lambda$, которое является линейным увеличением множества B^λ в \sqrt{n} раз. В силу следствия 5 можно применить теорему Хаксли к множеству B^λ с линейным фактором \sqrt{n} .

При этом необходимо отметить, что константа I , вообще говоря, зависит от n . Однако она ограничена, что нетрудно заключить из оценки сверху

$$I(n) \leq \min_C \rho^{\frac{46}{73}} + \int_C \frac{1 + \left| \frac{d^2 \rho}{d\psi^2} / \rho \right|}{\rho^{\frac{33}{73}}} \left| \frac{d\rho}{d\psi} \right| d\psi$$

и леммы 10. Следовательно, можно не учитывать ее при подсчете порядка погрешности. Тогда из теоремы 2 следует, что

$$N^\lambda - nV^\lambda = O(n^{23/73}(\log n)^{315/146}). \quad (44)$$

Остается подставить (44) в (15), и мы приходим к оценке (6).

ЗАМЕЧАНИЕ 8. Нами доказана равномерная сходимостъ полярного радиуса $r_n(t)$ и его производных к своим пределам, а также равномерная по n отделенность от 0 полярного радиуса. Отсюда следует, что выражения под знаками интеграла и \min в (36) равномерно сходятся. Известно (из теоремы Лебега), что из равномерной сходимости под знаками этих операторов вытекает возможность почленного перехода к пределу. Значит, $I(n)$ не только ограничена, но и сходится к своему пределу I_{B^1} .

Теорема 1 доказана.

7. Доказательство равномерной сходимости полярных радиусов

Лемма 11. Пусть $r_n(t)$ — полярный радиус множества B^λ , а $r(t)$ — полярный радиус множества B^1 . Тогда справедливо неравенство

$$|r_n(t) - r(t)| \leq \frac{C}{\sqrt{n}}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем

$$\begin{aligned} T_1(r_n(t), t) - T_1(r(t), t) &\leq |T_1(r_n(t), t) - T_\lambda(r_n(t), t)| \\ &\quad + |T_\lambda(r_n(t), t) - T_\lambda(r(t), t)| + |T_\lambda(r(t), t) - T_1(r(t), t)|. \end{aligned}$$

Поскольку из формулы Тейлора следует, что $T_\lambda(r, t) = T_1(r, t) + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, и ошибка равномерна по n из-за ограниченности множества изменения координат, получаем

$$|T_1(r_n(t), t) - T_\lambda(r_n(t), t)| = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \quad |T_\lambda(r(t), t) - T_1(r(t), t)| = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Более того, $T_\lambda(r_n(t), t) = c = T_1(r(t), t)$, и второе слагаемое может быть представлено в виде

$$|T_\lambda(r(t), t) - T_1(r(t), t)| = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} T_1(r_n(t), t) - T_1(r(t), t) &= \frac{(r_n(t) \cos t)^2}{p_1} + \frac{(r_n(t) \sin t)^2}{p_2} + \frac{(r_n(t)(\cos t + \sin t))^2}{p_3} \\ &\quad - \left[\frac{(r(t) \cos t)^2}{p_1} + \frac{(r(t) \sin t)^2}{p_2} + \frac{(r(t)(\cos t + \sin t))^2}{p_3} \right] \\ &= \left[\cos^2 t \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_3} \right) + \sin^2 t \left(\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} \right) + \frac{\sin 2t}{p_3} \right] (r_n^2(t) - r^2(t)). \end{aligned}$$

Из леммы 6 известно, что первый множитель равномерно ограничен снизу (обозначим его через E , а соответствующую нижнюю границу — через E_0). Имеем

$$|r_n(t) - r(t)| = O\left(\frac{1}{E(r_n(t) + r(t))\sqrt{n}}\right) = O\left(\frac{1}{E_0 r(t)\sqrt{n}}\right) = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Возможность последнего перехода следует из тривиальной неотрицательности $r_n(t)$ и существования равномерной нижней границы для $r(t)$. \square

ЛИТЕРАТУРА

1. Cressie N. A. C., Read T. R. C. Multinomial goodness-of-fit tests // J. Roy. Stat. Soc. Ser. B. 1984. V. 46, N 3. P. 440–464.
2. Read T. R. C. Closer asymptotic approximations for the distributions of the power divergence goodness-of-fit statistics // Ann. Inst. Stat. Math. 1984. V. 36. P. 59–69.
3. Yarnold J. K. Asymptotic approximations for the probability that a sum of lattice random vectors lies in a convex set // Ann. Math. Stat. 1972. V. 43, N 5. P. 1566–1580.
4. Siotani M., Fujikoshi Y. Asymptotic approximations for the distributions of multinomial goodness-of-fit statistics // Hiroshima Math. J. 1984. V. 14. P. 115–124. (Technical report of the Hiroshima statistical research group (1980)).
5. Huxley M. N. Exponential sums and lattice points. II // Proc. London Math. Soc. 1993. V. 66, N 3. P. 279–301.
6. Huxley M. N. Exponential sums and lattice points. III // Proc. London Math. Soc. 2003. V. 87, N 3. P. 591–609.
7. Hardy G. On Dirichlet's divisor problem // Proc. London Math. Soc. 1916. V. 15. P. 1–25.
8. Götze F. Lattice point problems and values of quadratic forms // Invent. Math. 2004. V. 157. P. 195–226.
9. Götze F., Ulyanov V. V. Asymptotic distribution of χ^2 -type statistics // Preprints der Forschergruppe spektrale Analysis und stochastische Dynamik. 2003. Universität Bielefeld. 15 p. (Preprintreihe 03–033).
10. Ulyanov V. V., Zubov V. N. Refinement on the convergence of one family of goodness-of-fit statistics to chi-squared distribution // Hiroshima Math. J. 2009. V. 39. P. 133–161.
11. Ильин В. А., Ким Г. Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998.
12. Ильин В. А., Поздняк Э. Г. Основы математического анализа М.: Наука. Физматлит, 2000. Ч. I.
13. Вайнберг М. М., Треногин В. А. Теория ветвления решений нелинейных уравнений. М.: Наука, 1969.
14. Тайманов И. А. Лекции по дифференциальной геометрии. М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика; Институт компьютерных исследований, 2006.

Статья поступила 17 января 2011 г.

Ульянов Владимир Васильевич, Асылбеков Женисбек Асылбекович
Московский гос. университет им. М. В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики,
Ленинские горы, Москва 119991
vulyan@gmail.com

Зубов Василий Николаевич
Акционерный коммерческий банк «Национальный клиринговый центр»,
Большой Кисловский пер., 13, Москва 125009