

## БУЛЕВОЗНАЧНЫЙ ПРИНЦИП ПЕРЕНОСА ДЛЯ ИНЪЕКТИВНЫХ БАНАХОВЫХ РЕШЕТОК

А. Г. Кусраев

**Аннотация.** Цель статьи — развить булевозначный подход к теории инъективных банаховых решеток и доказать булевозначный принцип переноса с  $AL$ -пространств на инъективные банаховы решетки. Устанавливается, что инъективная банахова решетка допускает вложение в подходящую булевозначную модель, превращаясь при этом в  $AL$ -пространство. В соответствии с этим фактом каждая теорема об  $AL$ -пространстве, доказуемая в рамках теории множеств Цермело — Френкеля, имеет свой аналог для исходной инъективной банаховой решетки. Перевод теорем об  $AL$ -пространствах в теоремы об инъективных банаховых решетках осуществляется с помощью общих операций и принципов булевозначного анализа.

DOI 10.17377/smzh.2015.56.511

**Ключевые слова:** инъективная банахова решетка,  $AL$ -пространство, свойство расщепления,  $M$ -проектор, оператор Магарам, булевозначное представление, спуск, подъем.

С. С. Кутателадзе к его семидесятилетию

### 1. Введение

Действительную банахову решетку  $X$  называют *инъективной*, если для любой банаховой решетки  $Y$ , любой замкнутой векторной подрешетки  $Y_0 \subset Y$  и любого линейного положительного оператора  $T_0 : Y_0 \rightarrow X$  существует положительное линейное продолжение  $T : Y \rightarrow X$  оператора  $T_0$  такое, что  $\|T_0\| = \|T\|$ . Инъективность банаховой решетки  $X$  равносильна тому, что если  $X$  линейно изометрична и порядково изоморфна замкнутой векторной подрешетке  $Y_0$  некоторой банаховой решетки  $Y$ , то существует сжимающий положительный проектор из  $Y$  на  $Y_0$ . Таким образом, инъективные банаховы решетки служат инъективными объектами в категории банаховых решеток со сжимающими линейными положительными операторами в качестве морфизмов. Арндт [1, теорема 2.2] установил, что инъективные объекты в категории банаховых решеток остаются теми же, если под морфизмом понимается регулярный оператор со сжимающим модулем<sup>1)</sup>.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 12-01-00623-а, 14-01-91339-ННИО-а, 15-51-53119-ГФЕН-а).

<sup>1)</sup>Если в определении инъективной банаховой решетки выполняется  $\|T\| \leq \lambda \|T_0\|$  (вместо  $\|T_0\| = \|T\|$ ), где  $1 \leq \lambda \in \mathbb{R}$ , то говорят о  $\lambda$ -инъективности. В данной работе мы ограничиваемся рамками изометрической теории, т. е. рассматриваем лишь 1-инъективные банаховы решетки. Относительно  $\lambda$ -инъективных банаховых решеток при  $\lambda > 1$  см., например, [2, 3].

Понятие инъективной банаховой решетки ввел Лотц [4]. Он же доказал среди прочего, что порядково полное  $AM$ -пространство<sup>2)</sup> с единицей и произвольное  $AL$ -пространство являются инъективными банаховыми решетками [4, предложения 2.1 и 3.2]. Картрайт [6, гл. 2] дал геометрическую характеристику инъективных банаховых решеток посредством свойства расщепления. Хейдон [7] обнаружил, что инъективная банахова решетка имеет смешанную  $AM$ - $AL$ -структуру.

Цель статьи — развить булевозначный подход к теории инъективных банаховых решеток и доказать булевозначный принцип переноса с  $AL$ -пространств на инъективные банаховы решетки. В разд. 2 собраны используемые понятия и факты о банаховых пространствах с булевыми алгебрами проекторов, инъективных банаховых решетках, пространствах Банаха — Канторовича и булевозначных моделях. Разд. 3 посвящен булевозначной интерпретации небольшого фрагмента теории банаховых решеток. В разд. 4 изложены основные результаты о булевозначном представлении инъективных банаховых решеток. В разд. 5 даны новые способы построения инъективных банаховых решеток. Основные результаты статьи анонсированы в [8].

Если не оговорено иное, то  $X$  и  $Y$  обозначают банаховы решетки, а  $\mathcal{L}(X, Y)$  — пространство ограниченных по норме линейных операторов из  $X$  в  $Y$ ; полагаем также  $\mathcal{L}(X) := \mathcal{L}(X, X)$  и  $X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ . Если  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  и  $\|T\| \leq 1$ , то оператор  $T$ , как обычно, называем *сжимающим*.

Теория банаховых решеток и положительных операторов представлена в [9–11]. Необходимые сведения о булевозначных моделях конспективно изложены в [9, гл. 9; 12, гл. 1]; подробности можно найти в [13–15].

В дальнейшем придерживаемся следующих обозначений:  $\mathbb{B}$  — полная булева алгебра с единицей  $\mathbb{1}$ , нулем  $\mathbb{0}$ , супремумом  $\vee$ , инфимумом  $\wedge$  и дополнением  $(\cdot)^*$ , причем  $\mathbb{1} \neq \mathbb{0}$ ;  $X_+$  и  $\mathbb{P}(X)$  — соответственно конус положительных элементов и булева алгебра всех порядковых проекторов в векторной решетке  $X$ ;  $\Lambda := \Lambda(\mathbb{B})$  — порядково полное  $AM$ -пространство с единицей такое, что булевы алгебры  $\mathbb{B}$  и  $\mathbb{P}(\Lambda)$  изоморфны. Под *разбиением единицы* в  $\mathbb{B}$  понимается семейство  $(b_\xi)_{\xi \in \Xi} \subset \mathbb{B}$  такое, что  $\bigvee_{\xi \in \Xi} b_\xi = \mathbb{1}$  и  $b_\xi \wedge b_\eta = \mathbb{0}$  при  $\xi \neq \eta$ . Символ  $:=$

используется как назначение по определению, а  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Q}$  и  $\mathbb{R}$  обозначают множества натуральных, рациональных и действительных чисел соответственно.

## 2. Предварительные сведения

**БАНАХОВО ПРОСТРАНСТВО С БУЛЕВОЙ АЛГЕБРОЙ ПРОЕКТОРОВ.** Возьмем произвольное банахово пространство  $X$ . Рассмотрим инъективное отображение  $\varphi := \varphi_X : \mathbb{B} \rightarrow \mathcal{L}(X)$ , удовлетворяющее условиям  $(b, d \in \mathbb{B})$ : (1)  $\varphi(b)$  — сжимающий проектор; (2)  $\varphi(\mathbb{1})$  и  $\varphi(\mathbb{0})$  совпадают соответственно с тождественным и нулевым операторами; (3) проекторы  $\varphi(b)$  и  $\varphi(d)$  коммутируют; (4)  $\varphi(b \wedge d) = \varphi(b) \circ \varphi(d)$  и  $\varphi(b^*) = I_X - \varphi(b)$ . Тогда множество  $\mathcal{B} := \varphi(\mathbb{B})$  называют *булевой алгеброй проекторов в  $X$* . В дальнейшем будем отождествлять булевы алгебры  $\mathbb{B}$  и  $\mathcal{B}$  и говорить о булевой алгебре проекторов  $\mathbb{B} \subset \mathcal{L}(X)$ .

Если  $(b_\xi)_{\xi \in \Xi}$  — разбиение единицы в  $\mathbb{B}$  и  $(x_\xi)_{\xi \in \Xi}$  — семейство в  $X$ , то элемент  $x \in X$ , удовлетворяющий равенству  $b_\xi x_\xi = b_\xi x$  для всех  $\xi \in \Xi$ , называют *перемешиванием*  $(x_\xi)$  относительно  $(b_\xi)$ . Банахово пространство  $X$  именуют

<sup>2)</sup>Это первый пример инъективной банаховой решетки, ранее указанный Абрамовичем [5] без введения соответствующего термина.

$\mathbb{B}$ -циклическим, если  $\mathbb{B} \subset \mathcal{L}(X)$  и перемешивание любого семейства из единичного шара  $U(X)$  пространства  $X$  относительно любого разбиения единицы в  $\mathbb{B}$  (с тем же множеством индексов) существует в  $U(X)$  и единственно (см. [9, определения 7.3.1, 7.3.3]).

Пусть  $X$  и  $Y$  — банаховы пространства, причем  $\mathbb{B} \subset \mathcal{L}(X)$  и  $\mathbb{B} \subset \mathcal{L}(Y)$ . Оператор  $T : X \rightarrow Y$  называют  $\mathbb{B}$ -линейным, если он линеен и коммутирует со всеми проекторами из  $\mathbb{B}$ , т. е.  $b \circ T = T \circ b$  ( $b \in \mathbb{B}$ ). (Здесь подразумевается, конечно, что  $\varphi_Y(b) \circ T = T \circ \varphi_X(b)$ .) Множество всех ограниченных  $\mathbb{B}$ -линейных операторов из  $X$  в  $Y$  обозначим символом  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}(X, Y)$ . Понятно, что если  $Y$   $\mathbb{B}$ -циклично, то  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}(X, Y)$  с индуцированной из  $\mathcal{L}(X, Y)$  нормой представляет собой  $\widehat{\mathbb{B}}$ -циклическое (или  $\mathbb{B}$ -циклическое, так как  $\widehat{\mathbb{B}} \simeq \mathbb{B}$ ) банахово пространство, где  $\widehat{\mathbb{B}} := \{\hat{\pi} : \pi \in \mathbb{B}\}$  и  $\hat{\pi}(T) : x \mapsto \pi T x$  для  $\pi \in \mathbb{B}$ . Би-ективный  $\mathbb{B}$ -линейный оператор называют  $\mathbb{B}$ -изоморфизмом, а изометрический  $\mathbb{B}$ -изоморфизм —  $\mathbb{B}$ -изометрией. Аналогично  $\mathbb{B}$ -линейный ( $\mathbb{B}$ -изометрический) решеточный гомоморфизм именуют решеточным  $\mathbb{B}$ -гомоморфизмом (*решеточной  $\mathbb{B}$ -изометрией*), см. ниже определение 2.5. Вместо решеточной  $\{0, 1\}$ -изометрии говорят просто о *решеточной изометрии*, и т. п.  $\mathbb{B}$ -циклическое банахово пространство  $X^{\#} := \mathcal{L}_{\mathbb{B}}(X, \Lambda)$ , где  $\Lambda = \Lambda(\mathbb{B})$ , называют  $\mathbb{B}$ -двойственным к  $X$ .

**ИНЪЕКТИВНЫЕ БАНАХОВЫ РЕШЕТКИ.** Геометрическое свойство, характеризующее инъективные банаховы решетки, найдено Картрайтом (см. [6, теоремы 2.9 и 3.6]).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1.** Банахова решетка обладает *свойством Картрайта*, если для любых  $x_1, x_2, y \in X_+$  и  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}_+$ , удовлетворяющих условиям  $\|x_1\| \leq \lambda_1$ ,  $\|x_2\| \leq \lambda_2$  и  $\|x_1 + x_2 + y\| \leq \lambda_1 + \lambda_2$ , существуют  $y_1, y_2 \in X_+$  такие, что  $y_1 + y_2 = y$ ,  $\|x_1 + y_1\| \leq \lambda_1$  и  $\|x_2 + y_2\| \leq \lambda_2$ . Говорят, что банахова решетка  $X$  имеет *свойство расщепления*, если в ней выполняется свойство Картрайта при  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ .

**Теорема 2.2.** Для банаховой решетка  $X$  равносильны следующие условия:

- (1)  $X$  имеет свойство Картрайта;
- (2)  $X$  имеет свойство расщепления;
- (3) второе сопряженное пространство  $X^{**}$  — инъективная банахова решетка.

Ключевую роль в теории инъективных банаховых решеток играет понятие  $M$ -проектора. В более широком контексте общей теории банаховых пространств понятие  $M$ -проектора представлено в [16].

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3.** Порядковый проектор  $\pi$  в банаховой решетке  $X$  называют  $M$ -проектором, если  $\|x\| = \max\{\|\pi x\|, \|\pi^\perp x\|\}$  для всех  $x \in X$ , где  $\pi^\perp := I_X - \pi$ .

Совокупность всех  $M$ -проекторов служит подалгеброй  $\mathbb{M}(X)$  булевой алгебры всех порядковых проекторов  $\mathbb{P}(X)$  в  $X$ . Если  $X \neq \{0\}$  обладает свойством Фату и Леви, то  $\mathbb{M}(X)$  является порядково замкнутой подалгеброй полной булевой алгебры  $\mathbb{P}(X)$ . В этом случае  $X$  является  $\mathbb{B}$ -циклической банаховой решеткой для любой порядково замкнутой подалгебры  $\mathbb{B} \subset \mathbb{M}(X)$ .

Напомним, что банахова решетка  $X$  обладает *свойством Леви* (или *монотонно полна*), если  $0 \leq x_\alpha \uparrow$  и  $\|x_\alpha\| \leq 1$  влечет, что  $\sup_\alpha x_\alpha$  существует в  $X$ , и *свойством Фату* (или *порядково полунепрерывна*), если  $0 \leq x_\alpha \uparrow x$  влечет  $\|x_\alpha\| \uparrow \|x\|$  (см. [17, определение 7; 11, определение 2.4.18]).

Нам потребуются также некоторые результаты, полученные Хейдоном в [7, теорема 3F(ii), следствие 5D], которые можно суммировать следующим образом.

**Теорема 2.4.** *Банахова решетка инъективна в том и только в том случае, когда она имеет свойства Картрайта, Леви и Фату. Инъективная банахова решетка  $X$  является  $AL$ -пространством в том и только в том случае, когда в ней нет  $M$ -проекторов, отличных от 0 и  $I_X$ .*

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5.** По определению *полная булева алгебра  $M$ -проекторов* в банаховой решетке  $X$  — произвольная порядково замкнутая подалгебра  $\mathbb{B} \subset \mathbb{M}(X)$ . Банахову решетку  $X$  называют  *$\mathbb{B}$ -циклической* если она является  $\mathbb{B}$ -циклическим банаховым пространством относительно некоторой полной булевой алгебры  $M$ -проекторов  $\mathbb{B} \subset \mathbb{P}(X)$ .

**ПРОСТРАНСТВА БАНАХА — КАНТОРОВИЧА.** Пусть  $E$  — порядково полная векторная решетка. Напомним, что *пространством Банаха — Канторовича* над  $E$  называют векторное пространство  $X$ , снабженное разложимой нормой  $|\cdot| : X \rightarrow E$  и полное по норме относительно порядковой сходимости в  $E$ . (Не путать с *пространством Канторовича — Банаха* или, короче, *КВ-пространством*, которое по определению есть банахова решетка с порядково непрерывной нормой, обладающая свойством Леви (см. [17, с. 89; 11, определение 2.4.11]).)

*Разложимость* нормы означает, что для любых  $e_1, e_2 \in E_+$  и  $x \in X$  из представления  $|x| = e_1 + e_2$  следует существование таких  $x_1, x_2 \in X$ , что  $x = x_1 + x_2$  и  $|x_k| = e_k$  ( $k := 1, 2$ ). Если пространство Банаха — Канторовича является одновременно векторной решеткой и норма монотонна ( $|x| \leq |y| \Rightarrow |x| \leq |y|$ ), то его называют *решеткой Банаха — Канторовича*. Любая решетка Банаха — Канторовича является решеточно упорядоченным модулем над  $f$ -алгеброй  $\text{Orth}(E_0)$ , где  $E_0 := \{|x| : x \in X\}^{\perp\perp}$ . В дальнейшем предполагается, что  $E = E_0$ . Детальное изложение теории пространство Банаха — Канторовича см. в [9].

Если нормирующая решетка  $E$  пространства Банаха — Канторовича  $X$  является банаховой решеткой, то  $X$  можно снабдить *смешанной нормой*  $\| \|x\| \| := \| |x| \|$  ( $x \in X$ ). В этом случае  $(X, \| \cdot \|)$  — банахово пространство, называемое *во-полным банаховым пространством со смешанной нормой* [9, 7.1.1]. Следующий результат см. в [9, теорема 7.3.3(1)].

**Теорема 2.6.** *Банахово пространство  $\mathbb{B}$ -циклично относительно некоторой полной булевой алгебры проекторов  $\mathbb{B}$  в том и только в том случае, когда оно линейно изометрично во-полному пространству со смешанной нормой, нормирующая решетка которого  $\Lambda$  является порядково полным  $AM$ -пространством с единицей, причем  $\mathbb{B}$  изоморфна  $\mathbb{P}(\Lambda)$ .*

**БУЛЕВОЗНАЧНЫЕ МОДЕЛИ.** По фиксированной полной булевой алгебре  $\mathbb{B}$  определяется универсум  $\mathbb{B}$ -значных множеств  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Относительно элементов универсума  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  можно формировать математические утверждения. Возьмем теоретико-множественную формулу  $\varphi = \varphi(u_1, \dots, u_n)$  и заменим переменные  $u_1, \dots, u_n$  элементами  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Тогда получим некоторое утверждение об объектах  $x_1, \dots, x_n$ . Каждому такому утверждению естественным образом приписывается элемент  $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket \in \mathbb{B}$  — *булева оценка истинности* утверждения  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  в универсуме  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , которая определяется индукцией по сложности формулы  $\varphi$ , начиная с булевых оценок истинности для элементарных формул  $\llbracket x \in y \rrbracket \in \mathbb{B}$  и  $\llbracket x = y \rrbracket \in \mathbb{B}$ , где  $x, y \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ .

Говорят, что утверждение  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  истинно внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , если выполняется  $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket = 1$ . В этом случае пишут также  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$ .

Пару  $(\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}, \llbracket \cdot \rrbracket)$  называют *булевозначной моделью* теории множеств Цермело — Френкеля с аксиомой выбора, сокращенно ZFC. Важнейшими свойствами булевозначной модели являются: *принцип переноса*, утверждающий, что все теоремы теории ZFC истинны внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ ; *принцип максимума*, гарантирующий существование специальных «булевозначных объектов»; *принцип перемешивания*, дающий способ конструирования таких объектов (см. [13–15]).

Существует каноническое вложение универсума фон Неймана (т. е. класса всех множеств)  $\mathbb{V}$  в булевозначный универсум  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , сопоставляющее множеству  $x \in \mathbb{V}$  его *стандартное имя*  $x^\wedge \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Оно отображает  $\mathbb{V}$  на  $\mathbb{V}^{(2)}$ , где  $2 := \{0, 1\} \subset \mathbb{B}$ . Формула называется *ограниченной*, если все входящие в нее кванторы имеют вид  $(\forall x \in y)$  или  $(\exists x \in y)$ , или в ZFC доказуема эквивалентная ей формула такого типа. *Ограниченный принцип переноса* утверждает, что для всякой ограниченной теоретико-множественной формулы  $\varphi$  и любого конечного набора  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}$  в ZFC доказуема эквивалентность

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) \iff \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \varphi(x_1^\wedge, \dots, x_n^\wedge).$$

Для произвольного элемента  $X \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  *спуск*  $X \downarrow$  определяется как множество  $X \downarrow := \{x \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} : \llbracket x \in X \rrbracket = 1\}$ . Предположим, что  $X, Y, f, P \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  таковы, что  $\llbracket f : X \rightarrow Y \rrbracket = 1$  и  $\llbracket P \subset X^2 \rrbracket = 1$ , т. е.  $f$  — отображение из  $X$  в  $Y$  и  $P$  — бинарное отношение на  $X$  внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Тогда  $f \downarrow$  — единственное отображение из  $X \downarrow$  в  $Y \downarrow$ , для которого  $\llbracket f \downarrow(x) = f(x) \rrbracket = 1$  ( $x \in X \downarrow$ ), а  $P \downarrow$  — единственное бинарное отношение на  $X \downarrow$  такое, что  $(x_1, x_2) \in P \downarrow \iff \llbracket (x_1, x_2) \in P \rrbracket = 1$ .

**БУЛЕВОЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА И БАНАХОВЫ ПРОСТРАНСТВА.** Под *полем действительных чисел* понимаем порядково полное упорядоченное поле (с различными нулем и единицей). Применяя принципы переноса и максимума к ZFC-теореме «Существует поле действительных чисел», находим элемент  $\mathcal{R} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , для которого  $\llbracket \mathcal{R} \text{ — поле действительных чисел} \rrbracket = 1$ . Будем называть  $\mathcal{R}$  *полем действительных чисел внутри*  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Следующий результат, найденный Гордоном [18], утверждает, что интерпретация поля действительных чисел в модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  представляет собой универсально полную векторную решетку, булева алгебра порядковых проекторов которого изоморфна  $\mathbb{B}$  (см. [9, теорема 8.1.2; 12, теорема 2.2.4]).

**Теорема 2.7.** Пусть  $\mathcal{R}$  — поле действительных чисел внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Тогда  $\mathcal{R} \downarrow$  (со спущенными операциями и порядком) является универсально полной векторной решеткой. Более того, существует булев изоморфизм  $\chi : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{R} \downarrow)$  такой, что для всех  $x, y \in \mathcal{R} \downarrow$  и  $b \in \mathbb{B}$  выполняются эквивалентности

$$\chi(b)x = \chi(b)y \iff b \leq \llbracket x = y \rrbracket, \quad \chi(b)x \leq \chi(b)y \iff b \leq \llbracket x \leq y \rrbracket.$$

Пусть  $\Lambda = \mathcal{R} \downarrow$  обозначает ограниченную часть универсально полной векторной решетки  $\mathcal{R} \downarrow$ , т. е.  $\Lambda$  — порядково плотный идеал в  $\mathcal{R} \downarrow$ , порожденный порядковой единицей  $1 := 1^\wedge \in \mathcal{R} \downarrow$ . Возьмем ненулевое банахово пространство  $\mathcal{X} = (\mathcal{X}, \|\cdot\|_{\mathcal{X}})$  внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  и обозначим  $\mathcal{X} \downarrow := \{x \in \mathcal{X} \downarrow : \|x\| \in \Lambda\}$ , где  $\|\cdot\|$  — спуск нормы  $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$ . Тогда  $\mathcal{X} \downarrow := (\mathcal{X} \downarrow, \|\cdot\|)$  — пространство Банаха — Канторовича над  $\Lambda$ , именуемое *ограниченным спуском*  $\mathcal{X}$ . Так как  $\Lambda$  — порядково полное АМ-пространство с единицей,  $\mathcal{X} \downarrow$  — банахово пространство со смешанной нормой над  $\Lambda$  и, следовательно,  $\mathbb{B}$ -циклическое банахово пространство (см. [9, 7.3.3]). Следующий результат о булевозначном представлении банаховых пространств см. в [9, теорема 8.3.5(2)].

**Теорема 2.8.** *Ограниченный спуск ненулевого банахова пространства из модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  является  $\mathbb{B}$ -циклическим банаховым пространством. Обратно, если дано  $\mathbb{B}$ -циклическое банахово пространство  $X$ , то в модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  существует единственное с точностью до изометрического изоморфизма банахово пространство  $\mathcal{X}$ , ограниченный спуск которого  $\mathbb{B}$ -изометричен  $X$ ; символически,  $\mathcal{X} \downarrow \simeq_{\mathbb{B}} X$ .*

Элемент  $\mathcal{X} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  из теоремы 2.8 называют *булевозначным представлением*  $X$ , причем  $X$  и  $\mathcal{X} \downarrow$  часто отождествляются. Пусть  $\mathcal{X}$  и  $\mathcal{Y}$  — булевозначные представления  $\mathbb{B}$ -циклических банаховых пространств  $X$  и  $Y$  соответственно. Символом  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  обозначается элемент из  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , изображающий пространство всех ограниченных линейных операторов из  $\mathcal{X}$  в  $\mathcal{Y}$  в модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ .

Следующий результат утверждает, что  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  служит булевозначным представлением банахова пространства  $\mathbb{B}$ -линейных ограниченных операторов  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}(X, Y)$  (см. [9, теорема 8.3.6]).

**Теорема 2.9.** *Если  $\tau \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \downarrow$ , то существует единственный оператор  $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{B}}(X, Y)$  такой, что  $\llbracket \tau(x) = T(x) \rrbracket = 1$  для всех  $x \in X$ . Соответствие  $\tau \mapsto T$  осуществляет  $\mathbb{B}$ -изометрию ограниченного спуска банахова пространства  $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$  из модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  на  $\mathbb{B}$ -циклическое банахово пространство  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}(X, Y)$ . В частности,  $\mathbb{B}$ -изометричны  $\mathbb{B}$ -циклические банаховы пространства  $\mathcal{X}^* \downarrow$  и  $X^{\#}$ .*

### 3. Булевозначные банаховы решетки

В этом разделе рассматривается булевозначная интерпретация некоторых понятий теории банаховых решеток. При этом ограничиваемся лишь несколькими необходимыми в дальнейшем фактами. Доказательства могут быть получены с учетом приемов из [12, 18, 19] с очевидными модификациями, но для полноты изложения дадим независимые доказательства.

**Теорема 3.1.** *Ограниченный спуск ненулевой банаховой решетки из модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  есть  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка. Обратно, если  $X$  —  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка, то в модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  существует единственное с точностью до решеточной изометрии банахово пространство  $\mathcal{X}$ , ограниченный спуск которой решеточно  $\mathbb{B}$ -изометричен  $X$ . Более того, отображение  $\pi \mapsto \pi \downarrow := \pi \downarrow|_X$  осуществляет изоморфизм булевых алгебр  $\mathbb{M}(\mathcal{X}) \downarrow$  и  $\mathbb{M}(X)$ ; символически,  $\mathbb{M}(\mathcal{X}) \downarrow \simeq \mathbb{M}(X \downarrow)$ .*

**Доказательство.** Предположим, что  $X$  —  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка с нормой  $\|\cdot\|_X$ , и покажем  $\mathbb{B}$ -изометричность  $X$  ограниченному спуску  $\mathcal{X} \downarrow$  некоторой банаховой решетки  $\mathcal{X} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Банахова часть требуемого следует из теорем 2.6 и 2.8. В частности, можем считать, что  $X$  совпадает с  $\mathbb{B}$ -циклическим банаховым пространством  $\mathcal{X} \downarrow$  для некоторого банахова пространства  $\mathcal{X}$  внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ .

Положим  $\mathcal{X}_+ := X_+ \uparrow$ . Для любого экстенционального отображения  $f$  выполняется  $f(A) \uparrow = f \uparrow(A \uparrow)$ , где  $A \subset \text{dom}(f)$  (см. [13, теорема 5.5.6(2); 9, П.10(2, 4)]. Применяя это соотношение к операции сложения  $f : (x, y) \mapsto x + y$  ( $x, y \in X$ ), где  $A := X_+ \times X_+$ , и операции умножения  $f : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$  ( $\lambda \in \Lambda, x \in X$ ), где  $A := \Lambda_+ \times X_+$ , получим  $\llbracket \mathcal{X}_+ + \mathcal{X}_+ = \mathcal{X}_+ \rrbracket = 1$  и  $\llbracket \mathcal{X}_+ \cdot \mathcal{X}_+ = \mathcal{X}_+ \rrbracket = 1$ , т. е.  $\llbracket \mathcal{X}_+ - \text{выпуклый конус} \rrbracket = 1$ . Более того,  $\llbracket \text{конус } \mathcal{X}_+ \text{ острый} \rrbracket = 1$ , поскольку  $\llbracket \pm x \in \mathcal{X}_+ \text{ и } \|x\| \leq 1 \rrbracket = 1$  влечет  $\pm x \in \mathcal{X}_+ \downarrow \cap X \subset X_+$ , а значит,  $x = 0$ . Теперь определим порядок в  $\mathcal{X}$  формулой  $\llbracket (\forall x, y \in \mathcal{X})(x \leq y \leftrightarrow y - x \in \mathcal{X}_+) \rrbracket = 1$ .

В силу принципа переноса  $(\mathcal{X}, \mathcal{X}_+)$  — упорядоченное банахово пространство внутри  $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ . В частности,  $\llbracket x \leq y \rrbracket = \mathbf{1} \iff x \leq y$  для всех  $x, y \in X$ .

Рассмотрим предложение  $\sigma \equiv (\forall a \in \{0, 1\}) (\forall x, y \in \mathcal{X}) (ax \leq ay \leftrightarrow (a \neq 1 \vee x \leq y))$ , представляющее собой весьма простую теорему теории ZF. В силу принципу переноса  $\llbracket \sigma \rrbracket = \mathbf{1}$ . Подсчет булевых оценок истинности для кванторов приводит к равносильной формулировке последнего равенства:  $\llbracket ax \leq ay \rrbracket = \llbracket a = 1 \rrbracket^* \vee \llbracket x \leq y \rrbracket$  выполняется для всех  $a \in \{0, 1\} \downarrow$  и  $x, y \in \mathcal{X} \downarrow$ . Используя булев изоморфизм  $\chi : \mathbb{B} \rightarrow \{0, 1\} \downarrow$  (см. [6, П.16 (1)]), можно заменить  $a \in \{0, 1\} \downarrow$  на  $\chi(b)$  для некоторого  $b \in \mathbb{B}$  и написать  $b^* \vee \llbracket x \leq y \rrbracket = \llbracket \chi(b)x \leq \chi(b)y \rrbracket$ . Легко видеть, что (сравни с теоремой 2.7)

$$b \leq \llbracket x \leq y \rrbracket \iff \chi(b)x \leq \chi(b)y \quad (b \in \mathbb{B}; x, y \in \mathcal{X} \downarrow).$$

Последнее соотношение позволяет устанавливать взаимосвязь между порядковыми свойствами  $X$  и  $\mathcal{X}$ . В качестве примера покажем, что  $\mathcal{X}$  — векторная решетка, т. е. предложение  $(\forall x \in \mathcal{X}) (\exists y \in \mathcal{X}) y = \sup\{x, -x\}$  истинно внутри  $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ . Используя правила вычисления булевых оценок (см. [13, 5.4.2; 9, П.10(1)]) и принцип максимума, достаточно доказать, что для любого  $x \in X$  существует  $y \in X$ , для которого  $\llbracket y = \sup\{x, -x\} \rrbracket = \mathbf{1}$ . По условию в  $X$  существует  $y = |x|$ , и по определению порядка в  $\mathcal{X}$  имеем  $\llbracket \pm x \leq y \rrbracket = \mathbf{1}$ . Тем самым остается лишь проверить справедливость равенства  $\llbracket (\forall u \in \mathcal{X}) (\pm x \leq u \rightarrow y \leq u) \rrbracket = \mathbf{1}$ . Вновь привлекая правила [9, П.4, П.10(1)], замечаем что последнее равносильно неравенству  $\llbracket \pm x \leq u \rrbracket \leq \llbracket y \leq u \rrbracket$  ( $u \in X$ ). Если теперь  $b = \llbracket \pm x \leq u \rrbracket$ , то  $\pm \chi(b)x \leq \chi(b)u$  и  $\chi(b)y \leq \chi(b)u$  ввиду теоремы 2.7. Отсюда следует  $b \leq \llbracket y \leq u \rrbracket$ .

Далее,  $\Lambda$ -значная норма  $|\cdot|$  пространства  $X$  является спуском нормы  $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$  внутреннего банахова пространства  $\mathcal{X}$ , причем  $\|x\|_X = \||x|\|_{\infty}$  ( $x \in X$ ). Поэтому норма  $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$  монотонна внутри  $\mathbb{V}(\mathbb{B})$  в том и только в том случае, когда  $|x| \leq |y|$  влечет  $\|x\| \leq \|y\|$  для всех  $x, y \in X$ . По условию  $\|\cdot\|_X$  — монотонная норма. Предположим, что  $|x| \leq |y|$  для некоторых  $x, y \in X$ . Если бы требуемое неравенство  $\|x\| \leq \|y\|$  оказалось ложным, то можно было бы подобрать такие  $\pi \in \mathbb{B} = \mathbb{P}(\Lambda)$  и  $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ , что  $\pi|x| > \pi(|y| + \varepsilon \mathbf{1})$ . Отсюда  $\|\pi x\|_X = \|\pi|x|\|_{\infty} \geq \|\pi|y|\|_{\infty} + \varepsilon > \|\pi y\|_X$ , что противоречит условию, так как на самом деле  $\pi x \leq \pi y$ . Таким образом,  $(\mathcal{X}, \mathcal{X}_+)$  — банахова решетка внутри  $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ .

Возьмем какой-нибудь  $M$ -проектор  $\pi$  в  $\mathcal{X}$ , и пусть  $\Pi$  — ограничение спуска  $\pi \downarrow$  на  $X$ . Тогда  $\llbracket \pi \circ \pi = \pi \rrbracket = \mathbf{1}$ ,  $\llbracket 0 \leq \pi x \leq x (x \in \mathcal{X}_+) \rrbracket = \mathbf{1}$ , и  $\llbracket \|x\| = \max\{\|\pi x\|, \|\pi^\perp x\|\} (x \in \mathcal{X}) \rrbracket = \mathbf{1}$  ввиду определений. В силу [9, П.9 (4, 7)] имеем  $\pi \downarrow = (\pi \circ \pi) \downarrow = \pi \downarrow \circ \pi \downarrow$  и, стало быть  $\Pi = \Pi \circ \Pi$ . По определению спуска  $\llbracket \pi x = \Pi x \rrbracket = \mathbf{1}$  ( $x \in X$ ), поэтому выполняется  $0 \leq \Pi x \leq x$  для всех  $x \in X_+$ . Наконец, соотношения  $\llbracket \|x\| = \max\{\|\pi x\|, \|\pi^\perp x\|\} (x \in \mathcal{X}) \rrbracket = \mathbf{1}$  и  $|x| = |\Pi x| \vee |\Pi^\perp x|$  ( $x \in X$ ) равносильны, откуда выводим  $\|x\|_X = \||\Pi x| \vee |\Pi^\perp x|\|_{\infty} = \max\{\|\Pi x\|_X, \|\Pi^\perp x\|_X\}$ . Таким образом,  $\Pi$  служит  $M$ -проектором в  $X$ , т. е.  $\Pi \in \mathbb{M}(X)$ . Те же рассуждения в обратном порядке убеждают, что если  $\Pi$  — произвольный  $M$ -проектор в  $X$ , то  $\pi := \Pi \uparrow$  также  $M$ -проектор в  $\mathcal{X}$ , т. е.  $\pi \in \mathbb{M}(\mathcal{X}) \downarrow$ . Как видно, спуск и подъем устанавливают биекцию между  $\mathbb{M}(\mathcal{X}) \downarrow$  и  $\mathbb{M}(X)$ . Очевидно, что эта биекция является булевым изоморфизмом.

Непосредственная проверка того, что ограниченный спуск ненулевой банаховой решетки есть  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка, предлагается читателю.  $\triangleright$

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2.** Элемент  $\mathcal{X} \in \mathbb{V}(\mathbb{B})$  из теоремы (3.1 называют *булевозначным представлением*  $\mathbb{B}$ -циклической банаховой решетки  $X$ .

**Следствие 3.3.** Если  $\mathcal{X}$  — булевозначное представление  $\mathbb{B}$ -циклической банаховой решетки  $X$ , то условия  $\mathbb{B} = \mathbb{M}(X)$  и  $\llbracket \mathbb{M}(\mathcal{X}) = \{0, I_{\mathcal{X}}\} \rrbracket = \mathbb{1}$  равносильны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО следует непосредственно из теоремы 3.1, так как  $\mathbb{B}$  изоморфна спуску двухэлементной булевой алгебры  $\{0, I_{\mathcal{X}}\}$  (см. [9, П.16 (1)]).  $\triangleright$

**Следствие 3.4.** Банахова решетка  $X$  решеточно изометрична ограниченному спуску ненулевой банаховой решетки из модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  в том и только в том случае, когда она  $\mathbb{B}$ -циклическа относительно полной булевой алгебры  $M$ -проекторов в  $X$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5. Говорят, что направленное вниз множество  $A$  в  $\mathbb{B}$ -циклическом банаховом пространстве  $X$   $\mathbb{B}$ -сходится к нулю, если для любого  $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$  существует разбиение единицы  $(\pi_a)_{a \in A}$  в  $\mathbb{B}$  такое, что  $\|\pi_a\| \leq \varepsilon$  для всех  $a \in A$ . Норму в  $X$  называют *порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывной*, если любое направленное вниз множество  $A \subset X$  такое, что  $\inf A = 0$ ,  $\mathbb{B}$ -сходится к нулю. (Сравни с  $m$ -сходимостью Такеути [20].)

**Теорема 3.6.** Предположим, что  $X$  —  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка, а  $\mathcal{X} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  — ее булевозначное представление. Тогда имеют место утверждения:

- (1)  $X$  порядково полна  $\iff \llbracket \mathcal{X} \text{ порядково полна} \rrbracket = \mathbb{1}$ ;
- (2)  $X$  имеет свойство Леви (Фату)  $\iff \llbracket \mathcal{X} \text{ имеет свойство Леви (Фату)} \rrbracket = \mathbb{1}$ ;
- (3)  $X$  имеет порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывную норму  $\iff \llbracket \mathcal{X} \text{ имеет порядков непрерывную норму} \rrbracket = \mathbb{1}$ ;
- (4)  $X$  имеет свойство Леви и норма в ней порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывна  $\iff \llbracket \mathcal{X} \text{ — KB-пространство} \rrbracket = \mathbb{1}$ ;
- (5) оператор  $S \in X^\#$  порядково непрерывен  $\iff \llbracket \text{функционал } \sigma := S \uparrow \in \mathcal{X}^* \text{ порядково непрерывен} \rrbracket = \mathbb{1}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) Так же, как и в [9, теорема 8.1.2], можно доказать, что для порядково ограниченного множества  $A \subset X_+$  существует  $a = \sup(A)$  в том и только в том случае, когда  $\llbracket \text{существует } \sup(A \uparrow) \rrbracket = \mathbb{1}$  и при этом  $\llbracket a = \sup(A \uparrow) \rrbracket = \mathbb{1}$ . Таким образом, порядковая полнота  $\mathcal{X}$  внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  влечет порядковую полноту  $X$ . Наоборот, предположим, что  $X$  порядково полна, и возьмем непустое множество  $\mathcal{A} \subset \mathcal{X}_+$ , ограниченное сверху элементом  $u \in \mathcal{X}$ . Без ограничения общности можно предположить, что  $\llbracket \|u\| \leq \mathbb{1} \rrbracket = \mathbb{1}$ . Тогда  $A := \mathcal{A} \downarrow$  содержится в  $X$  и, принимая во внимание правило сокращения стрелок  $\mathcal{A} \downarrow \uparrow = \mathcal{A}$  (см. [13, 5.4.3(2)]), получим следующее: существует  $a = \sup(\mathcal{A} \downarrow)$  в том и только в том случае, когда  $\llbracket \text{существует } \sup(\mathcal{A}) \rrbracket = \mathbb{1}$  и при этом  $\llbracket a = \sup(\mathcal{A}) \rrbracket = \mathbb{1}$ .

(2) Без ограничения общности можно предположить, что направленные вверх множества в определениях свойств Леви и Фату содержатся в единичных парах  $U(X)$  и  $U(\mathcal{X})$ . Более того, если множество  $A \subset X$  направлено вверх, то  $\llbracket A \uparrow \text{ направлено вверх} \rrbracket = \mathbb{1}$ , а из соотношения  $\llbracket \mathcal{A} \subset \mathcal{X} \text{ направлено вверх} \rrbracket = \mathbb{1}$  следует, что  $\mathcal{A} \downarrow$  направлено вверх. Заметим также, что  $U(\mathcal{X}) \downarrow = \{x \in \mathcal{X} \downarrow : \|x\| \leq \mathbb{1}\} = U(X)$ . Пусть  $\mathcal{X}$  имеет свойство Леви и возьмем направленное вверх множество  $A \subset U(X)$ . Тогда  $\{|a| : a \in A\} \subset [-1, 1]$  и, следовательно,  $\llbracket \{|a| : a \in A \uparrow\} \subset [-1, 1] \rrbracket = \mathbb{1}$ , т. е.  $\llbracket A \uparrow \subset U(\mathcal{X}) \rrbracket = \mathbb{1}$ . По условию  $a = \sup(A \uparrow)$  существует в  $\mathcal{X}$ , откуда  $a = \sup(A)$  в  $X$ . Обратное устанавливается аналогично. Чтобы убедиться в справедливости утверждения относительно свойства Фату, достаточно заметить, что  $|a| = \sup\{|a'| : a' \in A\}$  в  $\Lambda$  в том и только в том



случае, если  $\|\pi a\| = \|\pi a\|_\infty = \sup\{\|\pi a'\|_\infty : a' \in A\}$  для любого  $\pi \in \mathbb{P}(\Lambda)$ , так как  $AM$ -пространство  $\Lambda$  имеет свойство Леви.

(3) Используя приведенные в (2) замечания, легко видеть, что  $\llbracket \mathcal{X} \text{ имеет порядково непрерывную норму} \rrbracket = 1$  в том и только в том случае, когда для любого направленного вниз множества  $A \subset X_+$ , удовлетворяющего условию  $\inf(A) = 0$ , имеем  $\inf\{|a| : a \in A\} = 0$  в  $\Lambda$ . В соответствии с [9, теорема 8.1.8] последнее свойство равносильно следующему: для любого  $\varepsilon > 0$  существует разбиение единицы  $(\pi_a)_{a \in A}$  в  $\mathbb{B}$  такое, что  $|\pi_a a| = \pi_a |a| < \varepsilon 1$  для всех  $a \in A$ . Это сразу же дает требуемое, так как соотношения  $|\pi_a a| \leq \varepsilon 1$  и  $\|\pi_a a\| \leq \varepsilon$  равносильны.

(4) Следует непосредственно из (2) и (3).

(5) В силу теоремы 2.9  $S \in X^\#$  в том и только в том случае, если выполняется  $\llbracket \sigma := S \uparrow \in \mathcal{X}^* \rrbracket = 1$ . Более того,  $S$  и  $\sigma$  положительны или нет одновременно. Поэтому можно ограничиться случаем положительного  $S$ . Заметим также, что если  $\llbracket \mathcal{A} \subset \mathcal{X}^+ \cap U(\mathcal{X}) \rrbracket = 1$  и  $A = \mathcal{A} \downarrow$ , то  $S(A) = \sigma(\mathcal{A}) \downarrow$  в силу [9, П.9 (4, 7)], а если  $A \subset X_+$  и  $\mathcal{A} = A \uparrow$ , то  $\llbracket \sigma(\mathcal{A}) = S(A) \uparrow \rrbracket = 1$  ввиду [9, П.10 (2, 4)]. Далее, используя те же соображения, что и в (1), но заменив в них супремум инфимумом, находим, что если  $S$  порядково непрерывен, то  $\llbracket \inf(A) = 0 \rrbracket = 1$  влечет  $\llbracket \inf \sigma(\mathcal{A}) = 0 \rrbracket = 1$ , а если  $\llbracket \sigma \text{ порядково непрерывен} \rrbracket = 1$ , то  $\inf(A) = 0$  влечет  $\inf S(A) = 0$ .  $\triangleright$

Пусть  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}^\times(X, \Lambda)$  обозначает пространство всех ограниченных по норме порядково непрерывных  $\mathbb{B}$ -линейных операторов из  $X$  в  $\Lambda$ , а  $\mathcal{X}^\times$  — полоса в  $\mathcal{X}^*$ , состоящая из порядково непрерывных функционалов.

**Следствие 3.7.**  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка  $X$  имеет порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывную норму в том и только в том случае, если  $X^\# = \mathcal{L}_{\mathbb{B}}^\times(X, \Lambda)$ .

**Доказательство.** В силу теоремы 3.6(3),(5) и характеристики банаховых решеток с порядково непрерывной нормой достаточно заметить, что  $\mathbb{B}$ -циклические банаховы решетки  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}^\times(X, \Lambda)$  и  $\mathcal{X}^\times \downarrow$  решеточно  $\mathbb{B}$ -изометричны.  $\triangleright$

**Замечание 3.8.** Дальнейшие результаты о порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывных нормах см. в [12, следствия 5.9.7, 5.9.9, теорема 5.9.8]. В контексте  $\mathbb{B}$ -циклических банаховых решеток порядковая непрерывность нормы не очень интересна в отличие от порядковой  $\mathbb{B}$ -непрерывности см. [12, 5.15.9].

#### 4. Представление инъективных банаховых решеток

Результаты разд. 3 позволяют получить булевозначное представление инъективных банаховых решеток.

**Теорема 4.1.** Пусть  $X$  —  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка и  $\mathcal{X}$  — ее булевозначное представление в  $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ . Выполняются следующие утверждения:

- (1)  $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \llbracket \mathcal{X} \text{ инъективна} \rrbracket$  в том и только в том случае, когда  $X$  инъективна;
- (2)  $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \llbracket \mathcal{X} \text{ есть } AM\text{-пространство} \rrbracket$  в том и только в том случае, когда  $X$  есть  $AM$ -пространство;
- (3)  $\mathbb{V}(\mathbb{B}) \models \llbracket \mathcal{X} \text{ есть } AL\text{-пространство} \rrbracket$  в том и только в том случае, когда  $X$  инъективна и  $\mathbb{B} = \mathbb{M}(X)$ .

**Доказательство.** (1) Теоремы 2.2 и 2.4 имеют место внутри  $\mathbb{V}(\mathbb{B})$  в силу принципа переноса. По теореме 3.6(2) нужно лишь показать, что  $\llbracket \mathcal{X} \text{ имеет свойство расщепления} \rrbracket = 1$  в том и только в том случае, когда  $X$  имеет

свойство расщепления. По теореме 3.1  $X$  является решеткой Банаха — Канторовича, причем  $\Lambda$ -значная норма  $|\cdot|$  в  $X$  является ограниченным спуском нормы банаховой решетки  $\mathcal{X}$ . Отсюда легко усмотреть, что  $\llbracket \mathcal{X} \text{ имеет свойство расщепления} \rrbracket = \mathbb{1}$  равносильно следующему утверждению: для любых  $x, y, z \in X_+$ , удовлетворяющих неравенствам  $|x| \leq \mathbb{1}$ ,  $|y| \leq \mathbb{1}$  и  $|x + y + z| \leq 2\mathbb{1}$ , существуют такие  $u, v \in X_+$ , что  $z = u + v$ ,  $|x + u| \leq \mathbb{1}$  и  $|y + v| \leq \mathbb{1}$ . Но последнее, в свою очередь, равносильно свойству расщепления в  $X$ , так как соотношения  $|x| \leq C\mathbb{1}$  и  $\|x\|_X = \||x|\|_\infty \leq C$  равносильны.

(2) Поскольку  $\Lambda$ -значная норма  $|\cdot|$  в  $X$  совпадает с ограниченным спуском нормы  $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$ , а решеточная операция  $(x, y) \mapsto x \vee y$  в  $X$  — с ограничением на  $X^2$  спуска аналогичной операции в  $\mathcal{X}$ , то  $\llbracket \|\cdot\|_{\mathcal{X}} \text{ служит } M\text{-нормой} \rrbracket = \mathbb{1}$  в том и только в том случае, когда  $|x \vee y| = |x| \vee |y|$  для всех  $x, y \in X_+$ . Отсюда выводим  $\|x \vee y\|_X = \||x \vee y|\|_\infty = \||x| \vee |y|\|_\infty = \|x\|_X \vee \|y\|_X$ , так как  $(\Lambda, \|\cdot\|_\infty)$  является  $AM$ -пространством. Обратное, если  $X$  — это  $AM$ -пространство, но при этом  $|x \vee y| > |x| \vee |y|$  для некоторых  $x, y \in X$ , то можно выбрать строго положительное  $\varepsilon \in \mathbb{R}$  и порядковый проектор  $\pi \in \mathbb{P}(\Lambda)$  такие, что

$$|\pi x \vee \pi y| - \varepsilon \pi \mathbb{1} = \pi(|x \vee y| - \varepsilon \mathbb{1}) \geq \pi(|x| \vee |y|) = |\pi x| \vee |\pi y|.$$

Отсюда вытекает противоречивая оценка

$$\|\pi x \vee \pi y\| - \varepsilon = \||\pi x \vee \pi y| - \varepsilon \pi \mathbb{1}\|_\infty \geq \||\pi x| \vee |\pi y|\|_\infty = \|\pi x\| \vee \|\pi y\| = \|\pi x \vee \pi y\|.$$

(3) В силу принципа переноса и теоремы 2.4 можно утверждать, что  $\llbracket \mathcal{X} \text{ является } AL\text{-пространством в том и только в том случае, если } \mathcal{X} \text{ инъективна и } \mathbb{M}(\mathcal{X}) = \{0, I_X\} \rrbracket = \mathbb{1}$ . Значит, требуемый результат следует непосредственно из (1) и теоремы 3.1.  $\triangleright$

**Следствие 4.2.** *Ненулевая банахова решетка  $X$  со свойствами Леви и Фату инъективна в том и только в том случае, когда ее представление в модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , где  $\mathbb{B}$  изоморфна полной булевой алгебре  $\mathbb{M}(X)$ , является  $AL$ -пространством<sup>3)</sup>.*

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3.** Говорят, что положительный оператор  $T$  из векторной решетки  $X$  в векторную решетку  $Y$  имеет *свойство Леви*, если  $Y = T(X)^{\perp\perp}$  и  $\sup x_\alpha$  существует в  $X$  для любой возрастающей сети  $(x_\alpha) \subset X_+$ , если только сеть  $(Tx_\alpha)$  порядково ограничена в  $Y$ . *Оператором Магарам* называют порядково непрерывный оператор  $T : X \rightarrow Y$ , сохраняющий интервалы, т. е.  $T([0, x]) = [0, Tx]$  для всех  $x \in X_+$  (см. [9, 3.4.1]).  $\Lambda$ -значную норму  $|\cdot|$  на векторной решетке  $X$  называют *аддитивной*, если  $|x + y| = |x| + |y|$  для всех  $x, y \in X_+$ .

Рассмотрим векторные решетки  $X$  и  $Y$ , причем будем предполагать, что  $Y$  порядково полна. Пусть оператор  $\Phi \in L_+(X, Y)$  строго положителен, т. е.  $x > 0$  влечет  $\Phi(x) > 0$  для всех  $x \in X$ . Положим  $|x| := \Phi(|x|)$  ( $x \in X$ ). Тогда  $(X, |\cdot|)$  — решеточно нормированное пространство с аддитивной нормой. Обозначим символом  $L^1(\Phi)$  пространство Банаха — Канторовича, возникающее как  $bo$ -пополнение пространства  $(X, |\cdot|)$  (см. [9, теоремы 2.2.8 и 2.2.11]). При этом  $L^1(\Phi) = X$  лишь в том случае, когда  $\Phi$  — строго положительный оператор Магарам со свойством Леви (см. [9, 3.5.1]).

<sup>3)</sup>Нулевая банахова решетка  $X = \{0\}$  формально инъективна, но для нее утверждение следствия некорректно, так как булева алгебра  $\mathbb{B} = \mathbb{M}(X) = \{0\}$  и универсум  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  в этом случае вырожденны. Во всех аналогичных ситуациях  $X$  по умолчанию предполагается ненулевым.

**Теорема 4.4.** *Предположим, что  $X$  — банахова решетка,  $\mathbb{B}$  — полная булева алгебра,  $\Lambda$  — порядково полное  $AM$ -пространство с единицей такое, что булевы алгебры  $\mathbb{P}(\Lambda)$  и  $\mathbb{B}$  изоморфны. Тогда равносильны следующие утверждения:*

- (1)  $X$  инъективна и булева алгебра  $\mathbb{M}(X)$  изоморфна  $\mathbb{B}$ ;
- (2)  $X$  решеточно изометрична ограниченному спуску некоторого ненулевого  $AL$ -пространства из модели  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ ;
- (3) существует строго положительный оператор Магарам  $\Phi : X \rightarrow \Lambda$  со свойством Леви такой, что  $\|x\|_X = \|\Phi(|x|)\|_\infty$  для всех  $x \in X$ ;
- (4) существует  $\Lambda$ -значная аддитивная норма  $|\cdot|$  на  $X$  такая, что  $(X, |\cdot|)$  — решетка Банаха — Канторовича,  $|X|^{\perp\perp} = \Lambda$  и  $\|x\|_X = \||x|\|_\infty$  для всех  $x \in X$ .

Доказательство. (1)  $\iff$  (2) Вытекает из следствия 4.2 и теоремы 4.1(3).

(2)  $\implies$  (3) Предположим, что булевозначное представление  $\mathcal{X}$  банаховой решетки  $X$  является  $AL$ -пространством внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ . Работая внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  и используя принцип переноса, найдем строго положительный порядково непрерывный функционал  $\phi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{R}$  со свойством Леви, для которого  $\|x\|_{\mathcal{X}} = \phi(|x|)$  при всех  $x \in \mathcal{X}$ . Спуск  $\Phi' := \phi \downarrow$  оператора  $\Phi$ , а значит, и его ограничение  $\Phi := \Phi'|_X : X \rightarrow \Lambda$ , представляет собой строго положительный оператор Магарам со свойством Леви (см. [21; 9, теорема 3.6.4(4)]. Поскольку  $|\cdot| = (\|\cdot\|_{\mathcal{X}}) \downarrow$ , получаем  $|x| = \Phi(|x|)$  для всех  $x \in X$ . По определению ограниченного спуска имеем  $\|x\|_X = \||x|\|_\infty = \|\Phi(|x|)\|_\infty$ .

(3)  $\implies$  (4) Если выполняется (3), то  $\Lambda$ -значная аддитивная норма на  $X$  определяется формулой  $|x| := \Phi(|x|)$  ( $x \in X$ ). Тот факт, что  $(X, |\cdot|)$  — пространство Банаха — Канторовича, следует из [9, 3.5.1–3.5.3].

(4)  $\implies$  (2) Следует непосредственно из теорем 2.6, 3.1 и 4.1(3).  $\triangleright$

**Следствие 4.5.** *Если  $\Phi$  — строго положительный оператор Магарам со свойством Леви, принимающий значения из порядково полного  $AM$ -пространства с единицей  $\Lambda$ , и  $\|x\| = \|\Phi(|x|)\|_\infty$  ( $x \in L^1(\Phi)$ ), то  $(L^1(\Phi), \|\cdot\|)$  — инъективная банахова решетка, причем существует булев изоморфизм  $\varphi$  из  $\mathbb{B} := \mathbb{P}(\Lambda)$  на  $\mathbb{M}(L^1(\Phi))$  такой, что  $\pi \circ \Phi = \Phi \circ \varphi(\pi)$  для всех  $\pi \in \mathbb{B}$ . Обратно, произвольная инъективная банахова решетка  $X$  с булевой алгеброй  $M$ -проекторов  $\mathbb{B} = \mathbb{M}(X)$  решеточно  $\mathbb{B}$ -изометрична  $(L^1(\Phi), \|\cdot\|)$  для некоторого строго положительного оператора Магарам  $\Phi$  со свойством Леви, принимающего значения из порядково полного  $AM$ -пространства с единицей  $\Lambda = \Lambda(\mathbb{B})$ .*

**Следствие 4.6.** *Инъективная банахова решетка  $X$  имеет порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывную норму для любой полной булевой алгебры  $M$ -проекторов  $\mathbb{B} \subset \mathbb{M}(X)$ .*

Доказательство следует непосредственно из 3.6(3) и 4.4(2).  $\triangleright$

Оператор Магарам  $\Phi$  в теореме 4.4(3) и следствии 4.5 не единствен. Если  $\sigma$  — автоморфизм полной булевой алгебры  $\mathbb{B}$ , то существует единственный решеточный изоморфизм  $\hat{\sigma}$  решетки  $\Lambda = \Lambda(\mathbb{B})$  на себя такой, что  $\hat{\sigma}(\pi \mathbb{1}) = \sigma(\pi) \mathbb{1}$ . Этот изоморфизм  $\hat{\sigma}$  называют *сдвигом* посредством  $\sigma$ . Пусть даны сдвиг  $\hat{\sigma}$  посредством некоторого автоморфизма  $\sigma$  и обратимый положительный оргоморфизм  $\beta$  в  $L^1(\Phi)$ . Тогда  $\Psi = \hat{\sigma} \circ \Phi \circ \beta$  — строго положительный оператор Магарам со свойством Леви, причем  $L^1(\Phi) = L^1(\Psi)$ . Более того, если  $\beta$  является изометрией, то банаховы решетки  $L^1(\Phi)$  и  $L^1(\Psi)$  совпадают:

$$\|\Psi(|x|)\|_\infty = \|\hat{\sigma} \circ \Phi(|\beta x|)\|_\infty = \|\Phi(|\beta x|)\|_\infty = \|\beta x\| = \|x\| = \|\Phi(|x|)\|_\infty.$$

Следующий результат утверждает, что этот пример исчерпывающий.

**Теорема 4.7.** Пусть  $X$  — инъективная банахова решетка, а  $\Phi, \Psi : X \rightarrow \Lambda$  — строго положительные операторы Магарам со свойством Леви, для которых  $\|\Phi(|x|)\|_\infty = \|x\|_X = \|\Psi(|x|)\|_\infty$  при всех  $x \in X$ . Тогда существуют автоморфизм  $\sigma$  булевой алгебры  $\mathbb{B}$  и обратимый положительный изометрический ортоморфизм  $\beta$  в  $X$  такие, что  $\Psi = \hat{\sigma} \circ \Phi \circ \beta$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Если выполнены указанные выше предположения, то  $\Phi(X) = \Lambda = \Psi(X)$  и по следствию 4.5 существуют булевы изоморфизмы  $\varrho, \tau : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{M}(X)$  такие, что  $\pi \circ \Phi = \Phi \circ \varrho(\pi)$  и  $\pi \circ \Psi = \Psi \circ \tau(\pi)$  для всех  $\pi \in \mathbb{B}$ . Заметим, что  $\sigma := \tau^{-1} \circ \varrho$  представляет собой автоморфизм булевой алгебры  $\mathbb{B}$ . Пусть  $\hat{\sigma}$  — соответствующий сдвиг в  $\Lambda$ . Как видно из определений (см. [9, 5.3.2, 5.3.3]),  $\hat{\sigma}(\pi\lambda) = \sigma(\pi)\hat{\sigma}(\lambda)$  для всех  $\pi \in \mathbb{B}$  и  $\lambda \in \Lambda$ . Положим  $\Phi_1 = \hat{\sigma} \circ \Phi$  и заметим, что  $\Phi_1$  — строго положительный оператор Магарам со свойством Леви. Более того,  $\Psi$  абсолютно непрерывен относительно  $\Phi_1$ . Действительно, для  $\pi \in \mathbb{B}$  и  $x \in X$  имеем

$$\sigma(\pi)\Phi_1(x) = \sigma(\pi)\hat{\sigma}(\Phi(x)) = \hat{\sigma}(\pi\Phi(x)) = \hat{\sigma}(\Phi(\varrho(\pi)x)) = \Phi_1(\varrho(\pi)x) = \Phi_1(\tau\sigma(\pi)x),$$

следовательно,  $\pi \circ \Phi_1 = \Phi_1 \circ \tau(\pi)$  ( $\pi \in \mathbb{B}$ ). Если теперь  $\pi\Phi_1(x) = 0$  для некоторых  $\pi \in \mathbb{B}$  и  $x \in X_+$ , то  $\Phi_1(\tau(\pi)x) = 0$  и  $\tau(\pi)x = 0$ , так как оператор  $\Phi_1$  строго положителен. Отсюда следует, что  $\pi\Psi(x) = \Psi(\tau(\pi)x) = 0$ , а значит,  $\Psi(x) \in \Phi_1(x)^{\perp\perp}$  для всех  $x \in X_+$ . По теореме Люксембурга — Шэна [9, теорема 3.4.9] существует последовательность положительных ортоморфизмов  $(\beta_n)$  в  $X$  такая, что  $\Psi(x) = \sup_n \Phi_1(\beta_n x)$  для любого  $x \in X_+$ . Поскольку  $\Phi_1$  имеет свойство Леви, равенство  $\beta = \sup_n \beta_n$  корректно определяет положительный ортоморфизм в  $X$ .

Более того,  $\Psi(x) = \Phi_1(\beta x)$  ( $x \in X$ ) или  $\Psi = \hat{\sigma} \circ \Phi \circ \beta$  ввиду порядковой непрерывности  $\Phi_1$ . Обратимость  $\beta$  следует из строгой положительности оператора  $\Psi$ , а изометричность  $\beta$  равносильна условию  $\|\Phi(|x|)\|_\infty = \|\Psi(|x|)\|_\infty$  ( $x \in X$ ).  $\triangleright$

**ЗАМЕЧАНИЕ 4.8.** Если  $\Phi$  и  $\Psi$  те же, что и в теореме 4.7, то нормы  $x \mapsto \|\Phi(|x|)\|_\infty$  и  $x \mapsto \|\Psi(|x|)\|_\infty$  эквивалентны тогда и только тогда, когда  $\Psi = \hat{\sigma} \circ \Phi \circ \beta$  для некоторого автоморфизма  $\sigma$  булевой алгебры  $\mathbb{B}$  и обратимого положительного ортоморфизма  $\beta$  в  $X$ .

Рассмотрим инъективную банахову решетку, представленную как  $L^1(\Phi)$ . Обозначим символом  $L^0(\Phi)$  универсальное пополнение векторной решетки  $L^1(\Phi)$  с фиксированной порядковой единицей  $\mathbb{1}$ . В  $L^0(\Phi)$  существует единственная структура полупростой  $f$ -алгебры, кольцевая единица которой совпадает с  $\mathbb{1}$ . Пусть  $L_\infty(\Phi)$  обозначает порядковый идеал в  $L^0(\Phi)$ , порожденный элементом  $\mathbb{1}$ , который снабдим соответствующей  $M$ -нормой. Для непустого  $X \subset L^0(\Phi)$  определим множество  $X' \subset L^0(\Phi)$  формулой  $X' := \{x' \in L^0(\Phi) : x' \cdot X \subset L^1(\Phi)\}$ . Если  $X$  и  $L$  — порядково плотные идеалы в  $L^0(\Phi)$ , то между  $\mathbb{P}(X)$  и  $\mathbb{P}(L)$  существует канонический изоморфизм, при котором проекторы из  $\mathbb{P}(X)$  и  $\mathbb{P}(L)$  соответствуют друг другу лишь в том случае, когда они имеют общее продолжение на  $L^0(\Phi)$ .

**Теорема 4.9.** Пусть  $X$  — некоторая  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка с порядково  $\mathbb{B}$ -непрерывной нормой,  $X^u$  — ее универсальное пополнение. Существует порядково плотный идеал  $L$  в  $X^u$ , являющийся инъективной банаховой решеткой, причем булевы алгебры  $\mathbb{M}(L)$  и  $\mathbb{B}$  канонически изоморфны. Более того, если  $L = L^1(\Phi)$  для некоторого строго положительного оператора Магарам  $\Phi : L \rightarrow \Lambda = \Lambda(\mathbb{B})$  со свойством Леви, то отображение, сопоставляющее

оператор

$$S_{x'} : X \rightarrow \Lambda, \quad S_{x'} : x \mapsto \Phi(x \cdot x') \quad (x \in X)$$

элементу  $x' \in X'$ , является решеточной  $\mathbb{B}$ -изометрией из  $X'$  на  $X^\#$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Булевозначное представление  $\mathcal{X}$  решетки  $X$  представляет собой банахову решетку с порядково непрерывной нормой внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  (см. теорему 3.6). Работая внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ , можем подобрать строго положительный порядково непрерывный функционал  $\phi : L^1(\phi) \rightarrow \mathcal{R}$  со свойством Леви, где  $L^1(\phi)$  — порядково плотный идеал в максимальном расширении  $\mathcal{X}^u$  решетки  $\mathcal{X}$ . Положим  $\mathcal{X}' := \{x \in \mathcal{X}^u : x \cdot \mathcal{X} \subset L^1(\phi)\}$ . Каждому элементу  $x' \in \mathcal{X}'$  поставим в соответствие функционал  $\sigma_{x'} : x \mapsto \phi(xx')$  ( $x \in \mathcal{X}$ ). Тем самым получим решеточный изоморфизм из  $\mathcal{X}'$  на дуальное пространство  $\mathcal{X}^*$ . Легко видеть, что  $\mathcal{X}^u \downarrow = X^u$ . Определим  $\Phi$  как ограничение  $\phi \downarrow$  на  $L := L^1(\Phi) = \{x \in X^u : \phi \downarrow(x) \in \Lambda\}$ . Как видно,  $\Phi$  — строго положительный оператор Магарам со свойством Леви, стало быть,  $L^1(\phi) \downarrow = L^1(\Phi)$ . Остается заметить, что отождествление  $X$  с порядковым идеалом  $\mathcal{X} \downarrow$  позволяет написать  $\mathcal{X}^* \downarrow = X^\#$ ,  $\mathcal{X}' \downarrow = X'$  и  $S_{x'} = \sigma_{x'} \downarrow = \sigma_{x'} \downarrow|_X$ .  $\triangleright$

**Следствие 4.10.** Произвольная инъективная банахова решетка  $X$  с булевой алгеброй  $M$ -проекторов  $\mathbb{B} := \mathbb{M}(X)$  решеточно  $\mathbb{B}$ -изометрична  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}^\times(\mathcal{X}(X), \Lambda)$ , где  $\Lambda = \Lambda(\mathbb{B})$ . Если  $X$  представлено в виде  $L^1(\Phi)$  для строго положительного оператора Магарам  $\Phi : X \rightarrow \Lambda$  со свойством Леви, то решеточная  $\mathbb{B}$ -изометрия сопоставляет элементу  $x \in X$  оператор  $S_x : \pi \mapsto \Phi(\pi x)$  ( $\pi \in \mathcal{X}(X)$ ).

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Положим  $X := L^1(\Phi)$  в теореме 4.9. Тогда  $\mathcal{X} = L^1(\phi)$  и, стало быть,  $\mathcal{X}' = L^\infty(\phi)$ . Отсюда выводим  $X' = \mathcal{X}' \downarrow = L^\infty(\phi) \downarrow = L^\infty(\Phi)$ . Остается заметить, что  $L^\infty(\Phi)$  и  $\mathcal{X}(X)$  решеточно  $\mathbb{B}$ -изометричны и  $X^\# = \mathcal{L}_{\mathbb{B}}^\times(X, \Lambda)$  по следствию 3.7.  $\triangleright$

**Следствие 4.11.** Возьмем инъективную банахову решетку  $X$ . Если  $E$  и  $\Lambda$  — порядково полные  $AM$ -пространства с единицей такие, что  $\mathbb{B} := \mathbb{P}(\Lambda) \simeq \mathbb{M}(X)$  и  $\mathbb{P}(E) \simeq \mathbb{P}(X)$ , то  $X$  решеточно  $\mathbb{B}$ -изометрична  $\mathcal{L}_{\mathbb{B}}^\times(E, \Lambda)$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ 4.12.** Теорема 4.4 позволяет указать полную систему инвариантов, определяющих инъективную банахову решетку с точностью до решеточной изометрии, и получить представление инъективных банаховых решеток в виде прямой суммы банаховых решеток непрерывных вектор-функций (см. [22]).

**ЗАМЕЧАНИЕ 4.13.** Следствие 4.10, по существу, основная теорема о представлении Хейдона [7, теорема 5C]. Другой результат Хейдона о представлении [7, теорема 6H] утверждает, что инъективную банахову решетку можно представить в виде  $L^1(\mathbf{m})$  для некоторой  $\Lambda$ -значной модулярной меры Магарам  $\mathbf{m}$ . Этот факт легко выводится из нашей реализационной теоремы 4.4, поскольку отображение  $\Phi : L^1(\mathbf{m}) \rightarrow \Lambda$ , определенное как  $\Phi : f \mapsto \int f d\mathbf{m}$ , представляет собой оператор Магарам со свойством Леви и  $L^1(\mathbf{m}) = L^1(\Phi)$  (см. [9, теорема 6.1.10]). Третий результат Хейдона о представлении [7, теорема 7B] можно также вывести из теоремы 4.4, используя представление пространств Банаха — Канторовича посредством непрерывных банаховых расслоений (см. [9, § 2.4]).

### 5. Примеры инъективных банаховых решеток

Теорема 4.4 и следствие 4.5 доставляют множество примеров инъективных банаховых решеток. Пусть  $X$  и  $Y$  — порядково полные векторные решетки,

а  $\Phi : X \rightarrow Y$  — строго положительный оператор Магарам со свойством Леви. Обозначим через  $Y(e)$  и  $\|\cdot\|_e := \|\cdot\|_\infty$  соответственно порядковый идеал в  $Y$  и  $M$ -норму в  $Y(e)$ , ассоциированные с элементом  $e \in Y_+$ . Тогда векторная решетка  $L^1(\Phi, e) := \{x \in X : \Phi(|x|) \in Y(e)\}$  со смешанной нормой  $\|x\| := \|\Phi(|x|)\|_e$  представляет собой инъективную банахову решетку. Обозначим символом  $\mathcal{C}(e)$  булеву алгебру осколков элемента  $e$ , т. е.  $\mathcal{C}(e) := \{d \in Y_+ : d \wedge (e - d) = 0\}$ .

**Теорема 5.1.** Пусть  $(\Omega, \Sigma, \mu)$  — пространство с конечной мерой,  $Y$  — некоторое  $KV$ -пространство,  $e \in Y_+$  и  $I_\mu : x \mapsto \int_\Omega x(\omega) d\mu(\omega)$  ( $x \in L^1(\mu, Y)$ ) — интеграл Бохнера. Тогда пространство  $L^1(\mu, Y, e) := \{x \in L^1(\mu, Y) : I_\mu(|x|) \in Y(e)\}$ , снабженное нормой  $\|x\| := \|I_\mu(|x|)\|_e$ , будет инъективной банаховой решеткой, причем  $\mathbb{M}(L^1(\mu, Y, e)) \simeq \mathcal{C}(e)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Порядковая непрерывность нормы в  $Y$  влечет, что норма в  $L^1(\mu, Y)$  также порядково непрерывна [23], но тогда и оператор  $I_\mu$  порядково непрерывен. Так как  $Y$  имеет свойство Леви,  $L^1(\mu, Y)$  также имеет свойство Леви [24], следовательно,  $I_\mu$  — оператор со свойством Леви (в смысле определения 4.3). Теперь требуемое немедленно вытекает из следствия 4.5, так как  $I_\mu$ , очевидно, сохраняет интервалы.  $\triangleright$

Пусть  $E, F$  и  $G$  — архимедовы векторные решетки, причем  $F$  порядково полна, и  $h : G \rightarrow E$  — решеточный гомоморфизм. Напомним, что  $L^r(E, F)$  обозначает векторную решетку всех регулярных операторов из  $E$  в  $F$ . Возьмем положительный оператор  $S : G \rightarrow F$ , обозначим символом  $\Lambda_S$  порожденный им порядковый идеал в векторной решетке  $L^r(G, F)$  и снабдим  $\Lambda_S$   $M$ -нормой  $\|\cdot\|_\infty = \|\cdot\|_S$ , ассоциированной с единицей  $S$ . Обозначим символом  $L^r(E|h, F|S)$  множество всех  $T \in L^r(E, F)$ , для которых  $|T| \circ h \in \Lambda_S$ . Как видно,  $L^r(E|h, F|S)$  — идеал в  $L^r(E, F)$ , причем оператор  $T \in L^r(E, F)$  входит в  $L^r(E|h, F|S)$  в том и только в том случае, когда существует  $C \in \mathbb{R}_+$  такое, что  $|Tx| \leq CS(|y|)$ , при условии, что  $x \in E, y \in G$  и  $|x| \leq h(|y|)$ . Для  $T \in L^r(E|h, F|S)$  положим

$$\|T\|_S := \inf\{\lambda \in \mathbb{R}_+ : |Tx| \leq \lambda S|y| \ (\forall (x, y) \in E \times G, |x| \leq h(|y|))\}.$$

**Теорема 5.2.** Пусть  $E, F$  и  $G$  — векторные решетки, а  $h : G \rightarrow E$  — решеточный гомоморфизм, причем  $F$  порядков полна, а  $h(G)$  — мажорирующая подрешетка в  $E$ . Тогда векторная решетка  $L^r(E|h, F|S)$ , снабженная нормой  $\|\cdot\|_S$ , будет инъективной банаховой решеткой и  $\mathbb{M}(L^r(E|h, F|S))$  изоморфна булевой алгебре осколков  $\mathcal{C}(S)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Оператор композиции справа  $R_h : T \mapsto T \circ h$ , действующий из  $L^r(E, F)$  в  $L^r(G, F)$ , сохраняет интервалы (см. [1, следствие 1.2]). Кроме того, непосредственно проверяется, что  $R_h$  строго положителен, порядково непрерывен и имеет свойство Леви. Заметим также, что ограничение  $R_h$  на  $L^r(E|h, F|S)$  принимает свои значения из  $\Lambda_S$  и  $\|T\|_S = \|R_h(|T|)\|_\infty$  для любого  $T \in L^r(E|h, F|S)$ . Теперь требуемое следует из теоремы 4.4.  $\triangleright$

Если  $G$  — векторная подрешетка  $E$  и  $h$  — вложение  $G$  в  $E$ , то  $R_h$  — оператор ограничения  $T \mapsto T|_G$ , действующий из  $L^r(E|G, F|S) := L^r(E|h, F|S)$  в  $\Lambda_S$ . Как видно, оператор  $T \in L^r(E, F)$  входит в  $L^r(E|G, F|S)$  в том и только том случае, если существует  $C \in \mathbb{R}_+$  такое, что  $|Tx| \leq CS(|y|)$  для всех  $x \in E$  и  $y \in G, |x| \leq |y|$ .

**Следствие 5.3.** Пусть  $E, F$  и  $G$  — векторные решетки, причем  $F$  порядково полна, а  $G$  — мажорирующая подрешетка  $E$ . Тогда  $(L^r(E|G, F|S), \|\cdot\|_S)$  — инъективная банахова решетка и  $\mathbb{M}(L^r(E|G, F|S))$  изоморфна булевой алгебре осколков  $\mathcal{C}(S)$ .

Предположим, что  $F = G$  и  $S = I_G$ . Операторы из  $L^r(E|G, F|S)$  принято называть *центральными относительно  $G$* , причем используют обозначения  $Z(E|G) := L^r(E|G, F|S)$  и  $\|\cdot\|_n := \|\cdot\|_S$  (см. [25, определения 2.1, 2.2]). Более того,  $\|\cdot\|_n$  называют *естественной нормой* в  $Z(E|G)$  (см. [25, определение 4.1]). Для этого частного случая получаем следующий слегка усиленный результат Викстеда [25, теорема 5.2, проблема 5.3].

**Следствие 5.4.** Пусть  $E$  — векторная решетка, а  $G$  — порядково полная мажорирующая подрешетка  $E$ . Тогда  $Z(E|G)$  с естественной нормой является инъективной банаховой решеткой и  $\mathbb{M}(Z(E|G))$  изоморфна  $\mathbb{P}(G)$ .

**Теорема 5.5.** Пусть  $\Lambda$  — порядково полное АМ-пространство с единицей и  $\mathcal{A}$  — булева алгебра с единицей  $\mathbb{1}$ . Тогда порядково полная векторная решетка  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$  всех  $\Lambda$ -значных порядково ограниченных конечно аддитивных мер на  $\mathcal{A}$ , снабженное нормой  $\|\nu\| := \|\nu|(\mathbb{1})\|_\infty$  ( $\nu \in ba(\mathcal{A}, \Lambda)$ ), где  $\nu|(\mathbb{1}) \in \Lambda_+$  — полная вариация  $\nu$ , является инъективной банаховой решеткой и  $\mathbb{M}(ba(\mathcal{A}, \Lambda)) \simeq \mathbb{P}(\Lambda)$ .

**Доказательство.** Ясно, что  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$  — порядково полная векторная решетка, поскольку  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$  как упорядоченное векторное пространство изоморфно некоторому пространству регулярных операторов (см. [9, 4.2.8, 4.2.9]). Поэтому в соответствии с теоремой 4.4(4) нужно лишь доказать, что  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$  представляет собой пространство Банаха — Канторовича с аддитивной  $\Lambda$ -значной нормой. Очевидно, что  $\Lambda$ -значная норма, определенная формулой  $|\nu| := \nu|(\mathbb{1})$ , аддитивна на конусе положительных мер. Кроме того, она разложима. В самом деле, если  $|\nu| = \lambda_1 + \lambda_2$  для некоторых  $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda_+$ , то  $\lambda_k = \alpha_k |\nu|$  для подходящих ортоморфизмов  $0 \leq \alpha_1, \alpha_2 \leq I_\Lambda$ ,  $\alpha_1 + \alpha_2 = I_\Lambda$ , и, полагая  $\nu_k := \alpha_k \nu$ , получим  $\nu = \nu_1 + \nu_2$  и  $|\nu_k| = |\alpha_k \nu|(\mathbb{1}) = \alpha_k |\nu|(\mathbb{1}) = \lambda_k$  ( $k := 1, 2$ ). Для любого ограниченного семейства  $(\nu_\xi)_{\xi \in \Xi}$  в  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$  и любого разбиения единицы  $(\pi_\xi)_{\xi \in \Xi}$  в  $\mathbb{P}(\Lambda)$  сумма  $\nu(A) := o\text{-}\sum_{\xi \in \Xi} \pi_\xi \nu_\xi(A)$  существует. Более того,  $\nu$  — единственный элемент в  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$  удовлетворяющий соотношениям  $\pi_\xi \nu = \pi_\xi \nu_\xi$  ( $\xi \in \Xi$ ). В силу [6, теорема 2.2.3] остается доказать равномерную полноту  $ba(\mathcal{A}, \Lambda)$ , которая проверяется стандартными рассуждениями.  $\triangleright$

Конструкция магарамова расширения положительного оператора [9, § 4.5] вместе со следствием 4.5 позволяет связать инъективную банахову решетку с каждым положительным оператором со значениями в порядково полном АМ-пространстве с единицей. Если  $M$  — множество в векторной решетке  $X$ , то символом  $M^\downarrow$  обозначаем совокупность всех элементов  $x \in X$  вида  $x = \inf(A)$ , где  $A$  — направленное вниз подмножество  $M$ . Множество  $M^\uparrow$  определяется аналогично с учетом направленности вверх множества. Полагаем также  $M^{\downarrow\uparrow} := (M^\downarrow)^\uparrow$ . Обозначим символом  $\mathcal{Z}_m(X)$  порядково замкнутую  $f$ -подалгебру центра  $\mathcal{Z}(X)$ , порожденную множеством проекторов  $\mathbb{M}(X)$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.6.** Подпространство  $X_0$   $\mathbb{B}$ -циклического банахова пространства  $X$  называют  $\mathbb{B}$ -плотным, если для любых  $x \in X$  и  $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$  существуют  $x_\varepsilon \in X$ , разбиение единицы  $(\pi_\xi)_{\xi \in \Xi}$  в  $\mathbb{M}(X)$  и семейство  $(x_\xi)_{\xi \in \Xi}$  в  $X_0$  такие, что  $\|x - x_\varepsilon\| \leq \varepsilon$  и  $\pi_\xi x_\varepsilon = \pi_\xi x_\xi$  ( $\xi \in \Xi$ ).

**Теорема 5.7.** Пусть  $E$  — векторная решетка,  $\Lambda$  — порядково полное  $AM$ -пространство с единицей и  $\Phi : E \rightarrow \Lambda$  — линейный строго положительный оператор. Существует единственная (с точностью до линейной изометрии) инъективная банахова решетка  $X$ , удовлетворяющая следующим условиям:

- (1) булевы алгебры  $\mathbb{M}(X)$  и  $\mathbb{P}(\Lambda)$  изоморфны;
- (2) существуют решеточный изоморфизм  $\iota : E \rightarrow X$  и изоморфизм  $f$ -алгебр  $h$  из  $\mathcal{Z}(\Lambda)$  на  $\mathcal{Z}_m(X)$  такие, что  $\|\sigma\Phi(x)\|_\infty = \|h(\sigma)\iota(x)\|$  ( $x \in E_+$ ,  $\sigma \in \mathcal{Z}(\Lambda)_+$ );
- (3) множество  $\iota(E)$   $\mathbb{B}$ -плотно в  $X$ ;
- (4)  $X = X_0^{\uparrow}$ , где  $X_0$  состоит из всех конечных сумм вида  $\sum_{k=1}^n \pi_k \iota(x_k)$ , где  $\pi_k \in \mathbb{M}(X)$  и  $x_k \in E$  ( $k = 1, \dots, n \in \mathbb{N}$ ).

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Магарамово продолжение  $\tilde{\Phi}$  оператора  $\Phi$  является строго положительным оператором Магарам со свойством Леви (см. [9, предложения 3.5.1, 3.5.3, теорема 3.5.2]). Если  $X = L^1(\tilde{\Phi})$  — область определения  $\tilde{\Phi}$  и  $\|x\| = \|\tilde{\Phi}(|x|)\|_\infty$  ( $x \in X$ ), то  $X$  — инъективная банахова решетка по теореме 4.4. Условия (1)–(4) немедленно вытекают из [9, 3.5.1, 3.5.8(1)].

Можно дать другое доказательство, интерпретируя в булевозначном универсуме  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  хорошо известную конструкцию, позволяющую строить  $AL$ -пространство  $(E^\varphi, \|\cdot\|^\varphi)$ , исходя из строго положительного линейного функционала  $\varphi \in E^\sim$  (см., например, [11, предложение 2.5.16]). Для этой цели нужно заметить, что а) стандартное имя  $E^\wedge$  решетки  $E$  есть векторная решетка над полем рациональных чисел  $\mathbb{Q}^\wedge$  внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ ; б) модифицированный подъем  $\varphi = \Phi^\uparrow$  оператора  $\Phi$  — строго положительный  $\mathbb{Q}^\wedge$ -линейный функционал на  $E^\wedge$  внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ ; в) предложение 2.5.16 из [11] остается в силе для векторной решетки  $E$  над  $\mathbb{Q}$  и  $\mathbb{Q}$ -линейного  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ . Подробности см. в [12, § 5.5].  $\triangleright$

**Теорема 5.8.** Предположим, что  $X$  и  $Y$  — инъективные банаховы решетки. Пусть  $\sigma$  — порядково непрерывный булев гомоморфизм из  $\mathbb{P}(X)$  в  $\mathbb{P}(Y)$ , индуцирующий булев изоморфизм  $\mathbb{M}(X)$  на  $\mathbb{M}(Y)$ . Тогда существует единственный положительный порядково непрерывный линейный оператор  $P_\sigma : Y \rightarrow X$  такой, что  $\|\pi P_\sigma(y)\|_X = \|\sigma(\pi)y\|_Y$  для всех  $\pi \in \mathbb{P}(X)$  и  $y \in Y_+$ . Более того,  $P_\sigma$  — оператор Магарам,  $\|P_\sigma\| \leq 1$  и  $\pi P_\sigma y = P_\sigma(\sigma(\pi)y)$  для всех  $\pi \in \mathbb{P}(X)$  и  $y \in Y$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Обозначим символом  $\hat{\sigma}$  единственный  $\Lambda$ -линейный порядково непрерывный гомоморфизм  $f$ -алгебр из  $\mathcal{Z}(X)$  в  $\mathcal{Z}(Y)$ , расширяющий  $\sigma$ . В соответствии со следствием 4.5 можно предположить, что  $X = L^1(\Phi)$  и  $Y = L^1(\Psi)$  для строго положительных операторов Магарам  $\Phi : X \rightarrow \Lambda$  и  $\Psi : Y \rightarrow \Lambda$ , обладающих свойством Леви, причем  $\|x\|_X = \|\Phi(|x|)\|_\infty$  и  $\|y\|_Y = \|\Psi(|y|)\|_\infty$  для всех  $x \in X$  и  $y \in Y$ . Для фиксированного  $y \in Y$  определим оператор  $\Phi_y : \mathcal{Z}(X) \rightarrow \Lambda$  формулой  $\Phi_y(\rho) = \Psi(\hat{\sigma}(\rho)y)$ . Как видно,  $\Phi_y$  будет  $\Lambda$ -линейным и порядково непрерывным как композиция таких операторов. По следствию 4.10 существует единственный  $x \in X$  такой, что  $\Phi(\rho x) = \Phi_y(\rho) = \Psi(\hat{\sigma}(\rho)y)$  для всех  $\rho \in \mathcal{Z}(X)$ . Определим  $P_\sigma := P : Y \rightarrow X$ , полагая  $P_y := x$ , и заметим, что  $\Phi(\rho P_y) = \Psi(\hat{\sigma}(\rho)y)$  для всех  $y \in Y$  и  $\rho \in \mathcal{Z}(X)$ . Последнее соотношение влечет, что  $P$  линеен, поскольку  $P_{y_1 + y_2}$  и  $tP_y$  удовлетворяют условиям, определяющим  $P(y_1 + y_2)$  и  $P(ty)$  соответственно. Кроме того, для произвольных  $\pi \in \mathcal{Z}(X)_+$  и  $y \in Y_+$  имеем  $\|\pi P(y)\|_X = \|\Phi(\pi P_y)\|_\infty = \|\Psi(\hat{\sigma}(\pi)y)\|_\infty = \|\hat{\sigma}(\pi)y\|_Y$ . Далее, если  $P_y \notin X_+$  для некоторого положительного  $y \in Y$ , то найдется порядковый проектор  $\rho$  в  $X$  такой, что  $\rho P_y < 0$ , и приходим к противоречию с тем, что  $0 > \Phi(\rho P_y) = \Psi(\hat{\sigma}(\rho)y) \geq 0$ . Порядковая непрерывность  $P$  легко усматривается



из следствия 4.6 с учетом равенства  $\|P_\sigma(y)\|_X = \|\pi y\|_Y$  ( $y \in Y_+$ ) и свойства  $\sigma$ .

Допустим, что положительный оператор  $P_1 : Y \rightarrow X$  удовлетворяет условию  $\|\pi P_1(y)\|_X = \|\sigma(\pi)y\|_Y$  для  $\pi \in \mathbb{P}(X)$  и  $y \in Y_+$ . Отождествляя булевы алгебры  $\mathbb{B}$  и  $\mathbb{M}(X)$ , получаем  $\|\rho\Phi(\pi P_1(y))\|_\infty = \|\rho\Phi(\pi P(y))\|_\infty$  для всех  $\rho \in \mathbb{B} \subset \mathbb{P}(X)$  и, следовательно,  $\Phi(\pi(P_1(y) - P(y))) = 0$  для всех  $\pi \in \mathbb{P}(X)$ , т. е.  $P_1 y = P y$ . Аналогичные рассуждения показывают, что  $\pi P y = P(\sigma(\pi)y)$  для  $\pi \in \mathbb{P}(X)$  и  $y \in Y$ , стало быть,  $\pi P y = P(\hat{\sigma}(\pi)y)$  также для всех  $\pi \in \mathcal{Z}(X)$  и  $y \in Y$ . Отсюда следует, что  $P$  обладает свойством Магарам. Действительно, если  $0 \leq x_0 \leq P y$  для некоторого  $y \in Y_+$ , то существует такой  $\pi \in \mathcal{Z}(X)_+$ , что  $x_0 = \pi P y$ , значит,  $x_0 = P(y_0)$  для  $y_0 := \hat{\sigma}(\pi)y$ . Оставшаяся часть доказательства легко выводится из соотношения  $\Phi(\rho P y) = \Psi(\hat{\sigma}(\rho)y)$ .  $\triangleright$

**Следствие 5.9.** Пусть  $Y$  — инъективная банахова решетка,  $\mathbb{B} = \mathbb{M}(Y)$  и  $X$  — порядково замкнутая  $\mathbb{B}$ -инвариантная подрешетка  $Y$ . Тогда  $X$  с индуцированной нормой также является инъективной банаховой решеткой и  $\mathbb{M}(X) = [\mathbb{0}, \omega^*]$ , где  $\omega = \bigvee\{\pi \in \mathbb{B} : \pi|_X = 0\}$ . Более того, если  $X$  имеет слабую порядковую единицу, то существует порядково непрерывный положительный проектор  $\mathcal{E}$  в  $Y$  на  $X$  такой, что  $\pi \circ \mathcal{E} = \mathcal{E} \circ \pi$  и  $\|\hat{\sigma}(\rho)y\| = \|\rho\mathcal{E}y\|$  для всех  $\pi \in \mathbb{B}$ ,  $y \in Y_+$  и  $\rho \in \mathcal{Z}(X)_+$ , где  $\hat{\sigma}(\rho)$  — единственное продолжение  $\rho$  на все  $Y$ , обращающееся в нуль на  $X^\perp$ .

**Доказательство.** Если  $Y = L^1(\Phi)$  для строго положительного оператора Магарам  $\Phi : Y \rightarrow \Lambda$  со свойством Леви, то таким же будет и ограничение  $\Psi := \Phi|_X$ , стало быть, банахова решетка  $X = L^1(\Psi)$  инъективна. Без ограничения общности можем предположить, что  $\mathbb{1}^{\perp\perp} = Y$ , где  $\mathbb{1}$  — слабая порядковая единица в  $X$ . Для  $\pi \in \mathbb{P}(X)$  обозначим символом  $\sigma(\pi)$  порядковый проектор на полосу  $\pi(\mathbb{1})^{\perp\perp}$  в  $Y$ . Отображение  $\pi \mapsto \sigma(\pi)$  из  $\mathbb{P}(X)$  в  $\mathbb{P}(Y)$  представляет собой порядково непрерывный булев гомоморфизм. Остается применить теорему 5.8 (сравни [12, теорема 5.4.4]).  $\triangleright$

**Замечание 5.10.** Теорему 5.8 для частного случая  $L^1$ -пространства см. в [26, теорема 365R]. Оператор  $\mathcal{E}$  из следствия 5.9 — аналог классического условного математического ожидания [26, 365R]; подробнее об этом см. в [12, § 5.4].

Еще одну серию примеров инъективных банаховых решеток доставляет булевозначная интерпретация теоремы Гротендика о том, что банахово пространство будет  $AL$ -пространством, если сопряженное к нему пространство линейно изометрично банахову пространству ограниченных непрерывных функций на локально компактном пространстве, исчезающих на бесконечности (см. [27, теорема 27.4.1]).

**Определение 5.11.** Говорят, что норма в банаховой решетке  $X$  имеет свойство Накано, если для любого направленного вверх множества  $A \subset X_+$  выполняется  $\inf\{\|b\| : b \in B\} = \sup\{\|a\| : a \in A\}$ , где  $B := \{x \in X : (\forall a \in A) a \leq x\}$  — совокупность всех верхних границ множества  $A$ .

**Теорема 5.12.** Пусть  $Y$  — одновременно  $\mathbb{B}$ -циклическая банахова решетка и  $AM$ -пространство со свойством Накано. Предположим, что  $X$  —  $\mathbb{B}$ -циклическое банахово пространство и существует линейная  $\mathbb{B}$ -изометрия  $\Phi$  из  $Y$  на  $X^\#$ . Тогда  $X_+ := \{x \in X : (\forall y \in Y_+) \langle x, \Phi(y) \rangle \geq 0\}$  — выпуклый острый конус, а  $X$  с соответствующим упорядочением будет инъективной банаховой решеткой, причем булевы алгебры  $\mathbb{B}$  и  $\mathbb{M}(X)$  изоморфны.

**Доказательство.** Пусть  $\mathcal{X}$  и  $\mathcal{Y}$  — булевозначные представления  $X$  и  $Y$  соответственно. Положим  $\varphi := \Phi^\uparrow$  и заметим, что  $\llbracket \mathcal{X} \rrbracket$  — банахово простран-

ство,  $\mathcal{Y}$  —  $AM$ -пространство и  $\varphi$  — линейная изометрия из  $\mathcal{Y}$  на  $\mathcal{X}^*$   $\| = 1$  (см. теоремы 2.8 и 4.1). Более того,  $\| \mathcal{Y}$  имеет свойство Накано  $\| = 1$ , и, следовательно,  $\| \mathcal{Y}$  решеточно изометрична  $\mathcal{C}_0(K)$  для некоторого локально компактного хаусдорфова топологического пространства  $K$   $\| = 1$  в силу теоремы Накано об изометрической характеристизации пространства  $\mathcal{C}_0(K)$  всех вещественнозначных непрерывных функций на  $K$ , исчезающих на бесконечности, снабженного супремум-нормой [28]. Упомянутая теорема Гротендика справедлива внутри  $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$  в силу принципа переноса, следовательно,  $\| \mathcal{X}$  есть  $AL$ -пространство  $\| = 1$ , и остается прилечь следствие 4.5.  $\triangleright$

Автор выражает благодарность рецензенту за большой труд по выявлению многочисленных погрешностей в первоначальном варианте статьи.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Arendt W. Factorization by lattice homomorphisms // *Math. Z.* 1984. Bd 185. Heft 4. S. 567–571.
2. Lindenstrauss J., Tzafriri L. On the isomorphic classification of injective Banach lattices // *Adv. Math.* 1981. V. 78. P. 489–498.
3. Mangheni P. J. The classification of injective Banach lattices // *Israel J. Math.* 1984. V. 48. P. 341–347.
4. Lotz H. P. Extensions and liftings of positive linear mappings on Banach lattices // *Trans. Amer. Math. Soc.* 1975. V. 211. P. 85–100.
5. Абрамович Ю. А. Инъективные оболочки нормированных решеток // *Докл. АН СССР.* 1971. Т. 197, № 4. С. 743–745.
6. Cartwright D. I. Extension of positive operators between Banach lattices. Providence RI: Amer. Math. Soc., 1975. (Mem. Amer. Math. Soc.).
7. Haydon R. Injective Banach lattices // *Math. Z.* 1977. Bd 156. S. 19–47.
8. Кусраев А. Г. Булевозначный анализ и инъективные банаховы решетки // *Докл. РАН.* 2012. Т. 444, № 2. С. 143–145.
9. Кусраев А. Г. Мажорируемые операторы. М.: Наука, 2003.
10. Aliprantis C. D., Burkinshaw O. Positive operators. London etc: Acad. Press Inc., 1985.
11. Meyer-Nieberg P. Banach Lattices. Berlin etc.: Springer-Verl., 1991.
12. Kusraev A. G., Kutateladze S. S. Boolean valued analysis: Selected topics. Vladikavkaz: Vladikavkaz Sci. Center Press, 2014. (Trends in Science. The South of Russia).
13. Кусраев А. Г., Кутателадзе С. С. Введение в булевозначный анализ. М.: Наука, 2005.
14. Bell J. L. Boolean-valued models and independence proofs in set theory. New York etc.: Clarendon Press, 1985.
15. Takeuti G., Zaring W. M. Axiomatic set theory. New York: Springer-Verl., 1973.
16. Harmand P., Werner D., Wener W.  $M$ -Ideals in Banach spaces and Banach algebras. Berlin etc.: Springer-Verl., 1993. (Lecture Notes in Math, 1547).
17. Abramovich Y. A., Aliprantis C. D. Positive operators // *Handbook of the geometry of Banach spaces.* V. 1 / Eds. W. B. Johnson and J. Lindenstrauss. Amsterdam etc.: Elsevier, 2001. P. 85–122.
18. Гордон Е. И. Вещественные числа в булевозначных моделях теории множеств и  $K$ -пространства // *Докл. АН СССР.* 1977. Т. 237, № 4. С. 773–775.
19. Гордон Е. И.  $K$ -пространства в булевозначных моделях теории множеств // *Докл. АН СССР.* 1981. Т. 258, № 4. С. 777–780.
20. Takeuti G. Boolean completion and  $m$ -convergence // *Categorical aspects of topology and analysis* (Ottawa, Ont., 1980). Berlin etc.: Springer-Verl., 1982. P. 333–350. (Lecture Notes in Math.; V. 915).
21. Кусраев А. Г. Порядково непрерывные функционалы в булевозначных моделях теории множеств // *Сиб. мат. журн.* 1984. Т. 25, № 1. С. 57–65.
22. Кусраев А. Г. О классификации инъективных банаховых решеток // *Докл. РАН.* 2013. Т. 453, № 1. С. 12–16.
23. Cartwright D. I. The order completeness of some spaces of vector-valued functions // *Bull. Austral. Math. Soc.* 1974. V. 11. P. 57–61.

24. Бухвалов А. В. Геометрические свойства банаховых пространств измеримых вектор-функций // Докл. АН СССР. 1978. Т. 239, № 6. С. 1279–1282.
25. Wickstead A. W. Relatively central operators on Archimedean vector lattices // Proc. Roy. Irish Acad. Sect. 1980. V. A80, N 2. P. 191–208.
26. Fremlin D. H. Measure theory. V. 3. Measure Algebras. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.
27. Semadeni Z. Banach spaces of continuous functions. Warszawa: Polish Sci. Publ., 1971. V. 1.
28. Nakano H. Über die Charakterisierung des allgemeinen  $C$ -Raumen // Proc. Imp. Acad. Tokyo. 1941. V. 17. P. 301–307.

*Статья поступила 26 сентября 2014 г.*

Кусраев Анатолий Георгиевич  
Южный математический институт  
Владикавказского научного центра РАН,  
ул. Маркуса, 22, Владикавказ 362027;  
Северо-Осетинский гос. университет им. К. Л. Хетагурова,  
ул. Ватутина, 44-46, Владикавказ 362025  
kusraev@smath.ru