

Une extension d'un théorème concernant les métriques pseudoriemanniennes conformes

Liviu Nicolescu

Abstract

Dans cette Note nous présentons une extension d'un théorème sur l'algèbre de déformation associée à une paire de métriques pseudo-riemanniennes conformes sur une variété différentiable (Théorème 1).

Mathematics Subject Classification: 53B20, 53B21.

Key words: algèbre de déformation, métriques conformes.

Les variétés différentiables, les applications différentiables, les champs tensoriels et les connexions linéaires qui interviennent dans la suite sont supposées de classe C^∞ .

Soit M une variété différentiable à n dimensions. Désignons par $\mathcal{F}(M)$ l'anneau des fonctions réelles, différentiables définies sur M et par $\mathcal{T}_s^r(M)$ le $\mathcal{F}(M)$ -module des champs de tenseurs du type (r, s) sur M . Particulièrement, pour $\mathcal{T}_0^1(M)$ on emploie de même la notation $\mathcal{X}(M)$.

Soit $A \in \mathcal{T}_2^1(M)$. Si on définit le produit de deux champs de vecteurs X et Y par la formule

$$(*) \quad X \circ Y = A(X, Y),$$

alors le $\mathcal{F}(M)$ -module $\mathcal{X}(M)$ devient une $\mathcal{F}(M)$ -algèbre. L'algèbre définie par la formule $(*)$ s'appelle l'algèbre associée à A et on note $\mathcal{U}(M, A)$. Si $A = \bar{\nabla} - \nabla$, où ∇ et $\bar{\nabla}$ sont deux connexions linéaires sur M , alors $\mathcal{U}(M, A)$ s'appelle l'algèbre de déformation de la paire de connexions $(\nabla, \bar{\nabla})$ [8].

Définition ([4]). *Un élément $X \in \mathcal{U}(M, A)$ s'appelle champ presque principal s'il existe une fonction $f \in \mathcal{F}(M)$ et une 1-forme ω sur $t.q.$*

$$(*)' \quad A(Z, X) = fZ + \omega(Z)X, \quad (\forall) Z \in \mathcal{X}(M).$$

Remarque. i) Si $f = 0$, alors $(*)'$ nous montre que X est un champ principal.

ii) Si $\omega = 0$, alors $(*)'$ nous montre que X est un champ presque spécial.

iii) Si $f = 0$ et $\omega = 0$, alors $(*)'$ nous montre que X est un champ spécial.

iv) Si $A(X, X) = 0$, alors X s'appelle champ 2-nilpotent.

Dans cette Note nous présentons le théorème suivant:

Théorème 1. *Soit g et $\bar{g} = e^{2u} g$ ($u \in \mathcal{F}(M)$) deux métriques pseudoriemanniennes conformes sur la variété différentiable connexe M ($\dim M = n > 3$). Notons par ∇ , resp. $\bar{\nabla}$ la connexion de Levi-Civita associée à g , resp. \bar{g} . Soit $R \in \mathcal{T}_3^1(M)$, resp.*

$\bar{R} \in \mathcal{T}_3^1(M)$ le champ tensoriel de courbure de ∇ , resp. $\bar{\nabla}$. Soit $T_p M$ l'espace tangent en chaque point $p \in M$. Les propriétés suivantes sont équivalentes:

- (i) g et \bar{g} sont homothétiques,
- (ii) tout élément de l'algèbre $\mathcal{U}(M, \bar{\nabla} - \nabla)$ est un champ presque principal,
- (iii) tout élément de l'algèbre $\mathcal{U}(M, \bar{\nabla} - \nabla)$ est un champ principal,
- (iv) tout élément de l'algèbre $\mathcal{U}(M, \bar{\nabla} - \nabla)$ est un champ presque spécial,
- (v) tout élément de l'algèbre $\mathcal{U}(M, \bar{\nabla} - \nabla)$ est un champ spécial,
- (vi) tout élément de l'algèbre $\mathcal{U}(M, \bar{\nabla} - \nabla)$ est un champ 2-nilpotent,
- (vii) ∇ et $\bar{\nabla}$ possèdent les mêmes géodésiques,
- (viii) l'algèbre $\mathcal{U}(M, \bar{\nabla} - \nabla)$ est associative,
- (ix) $\bar{\nabla}_X R = \bar{\nabla}_X \bar{R}$, $(\forall) X \in \mathcal{X}(M)$, lorsque l'application $R_p : T_p M \times T_p M \times T_p M \rightarrow T_p M$ est une application surjective, $(\forall) p \in M$.
- (x) $R = \bar{R}$, lorsque $R_p : T_p M \times T_p M \times T_p M \rightarrow T_p M$ est une application surjective, $(\forall) p \in M$
- (xi) $\text{Ric } g = \text{Ric } \bar{g}$, lorsque $R_p : T_p M \times T_p M \times T_p M \rightarrow T_p M$ est une application surjective, $(\forall) p \in M$.

Pour démontrer le théorème 1 on utilisera le lemme suivant:

Lemme 2. Soit g et $\bar{g} = e^{2u} g$ ($u \in \mathcal{F}(M)$) deux métriques pseudoriemannniennes conformes sur une variété différentiable connexe M ($\dim M = n > 3$). Notons par ∇ , resp. $\bar{\nabla}$ la connexion de Levi-Civita associée à g , resp. \bar{g} . Soit $R \in \mathcal{T}_3^1(M)$, resp. $\bar{R} \in \mathcal{T}_3^1(M)$, le champ tensoriel de courbure de ∇ , resp. $\bar{\nabla}$. Soit $T_p M$ l'espace tangent en chaque point $p \in M$. Supposons que $R_p : T_p M \times T_p M \times T_p M \rightarrow T_p M$ est une application surjective, $(\forall) p \in M$.

- i) Si $\bar{\nabla}_X R = f \bar{\nabla}_X \bar{R}$, $(\forall) X \in \mathcal{X}(M)$, où $f \in \mathcal{F}(M)$, $f(p) \neq 0$, $(\forall) p \in M$, alors $u = \text{constante}$,
- ii) Si $R = \lambda \bar{R}$ où $\lambda = \text{constante} \neq 0$, alors $u = \text{constante}$,
- iii) Si $\text{Ric } g = \text{Ric } \bar{g}$, alors $u = \text{constante}$.

Démonstration du Lemme 2

i) De $\bar{\nabla}_X R = f \bar{\nabla}_X \bar{R}$, $(\forall) X \in \mathcal{X}(M)$ on a

$$(1) \quad (\bar{\nabla}_X R)(Y, Z, V) = f(\bar{\nabla}_X \bar{R})(Y, Z, V), \quad (\forall) X, Y, Z, V \in \mathcal{X}(M)$$

Pour tout $X, Y, Z, V \in \mathcal{X}(M)$ nous avons

$$(2) \quad (\bar{\nabla}_X R)(Y, Z, V) = (\nabla_X R)(Y, Z, V) + A(X, R(Y, Z)V) - R(A(X, Y), Z)V - R(Y, A(X, Z))V - R(Y, Z)A(X, V)$$

où $A = \bar{\nabla} - \nabla$. De (1) et (2) on obtient

$$(3) \quad f(\bar{\nabla}_X \bar{R})(Y, Z, V) = (\nabla_X R)(Y, Z, V) + A(X, R(Y, Z)V) - R(A(X, Y), Z)V - R(Y, A(X, Z))V - R(Y, Z)A(X, V)$$

On écrit aussi les deux relations obtenues par substitutions circulaires:

$$(3') \quad f(\bar{\nabla}_Y \bar{R})(Z, X, V) = (\nabla_Y R)(Z, X, V) + A(Y, R(Z, X)V) - R(A(Y, Z), X)V - R(Z, A(Y, X))V - R(Z, X)A(Y, V)$$

$$(3'') \quad \begin{aligned} f(\bar{\nabla}_Z \bar{R})(X, Y, V) &= (\nabla_Z R)(X, Y, V) + A(Z, R(X, Y)V) - \\ &- R(A(Z, X), Y)V - R(X, A(Z, Y))V - R(X, Y)A(Z, V) \end{aligned}$$

En tenant compte de (3), (3'), (3'') et en utilisant les identités de Bianchi:

$$\begin{aligned} (\nabla_X R)(Y, Z, V) + (\nabla_Y R)(Z, X, V) + (\nabla_Z R)(X, Y, V) &= 0, \\ (\bar{\nabla}_X \bar{R})(Y, Z, V) + (\bar{\nabla}_Y \bar{R})(Z, X, V) + (\bar{\nabla}_X \bar{R})(Y, Z, V) &= 0 \end{aligned}$$

on obtient

$$(4) \quad \begin{aligned} R(X, Y)A(Z, V) + R(Y, Z)A(X, V) + R(Z, X)A(Y, V) &= \\ = A(X, R(Y, Z)V) + A(Y, R(Z, X)V) + A(Z, R(X, Y)V) \end{aligned}$$

Soient A_{jk}^i , R_{jkl}^i , resp. g_{ij} les composantes de A , R , resp. g dans un système de coordonnées locales (x^1, \dots, x^n) . En coordonnées locales, la relation (4) s'écrit

$$(4') \quad A_{il}^s R_{sjk}^r + A_{jl}^s R_{ski}^r + A_{kl}^s R_{sij}^r - A_{is}^r R_{ljk}^s - A_{js}^r R_{lki}^s - A_{ks}^r R_{lij}^s = 0$$

De $\bar{g} = e^{2u}g$ on obtient

$$(5) \quad A_{jk}^i = \delta_j^i u_k + \delta_k^i u_j - g_{jk} u^i$$

où

$$u_i = \frac{\partial u}{\partial x^i}, \quad u^i = g^{ij} u_j, \quad g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i.$$

De (4') et (5) il résulte:

$$(6) \quad (g_{il} R_{sjk}^r + g_{jl} R_{ski}^r + g_{kl} R_{sij}^r) u^s + (\delta_i^r R_{ljk}^s + \delta_j^r R_{lki}^s + \delta_k^r R_{lij}^s) u_s = 0$$

En multipliant les formules (6) par g^{il} et en sommant, il résulte

$$(7) \quad (n-2)R_{sjk}^r u^s + (g^{rl} R_{sljk} + \delta_j^r R_{sk} - \delta_k^r R_{sj}) u^s = 0$$

où $R_{ij} = R_{ij}^r$ sont les composantes du tenseur de Ricci de g . En faisant $r = j$ et en sommant, de (7) on obtient

$$(8) \quad (n-2)R_{sk} u^s = 0.$$

Puisque $n > 3$, de (7) et (8) il résulte

$$(9) \quad (n-3)R_{sjk}^r u^s = 0$$

ou

$$(9') \quad R_{ijk}^s u_s = 0$$

Soit ω la 1-forme de composantes u_1, u_2, \dots, u_n . Alors (9') s'écrit

$$(9'') \quad \omega(R(X, Y)Z) = 0, \quad (\forall) X, Y, Z \in \mathcal{X}(M)$$

De (9''), pour tout $p \in M$ on obtient

$$(10) \quad \omega_p(R_p(X_p, Y_p)Z_p) = 0, \quad (\forall)X_p, Y_p, Z_p \in T_pM.$$

Puisque l'application $R_p : T_pM \times T_pM \times T_pM \rightarrow T_pM$ est une application surjective, $(\forall)p \in M$, il résulte que $\text{Im } R_p = T_pM$. De (10) on obtient

$$(10') \quad \omega_p(T_pM) = 0, \quad (\forall)p \in M$$

c'est-à-dire $\omega_p = 0$, $(\forall)p \in M$, donc $\omega = 0$. Il résulte $u_i = 0$, $i \in \{1, \dots, n\}$ ce qui nous montre que $u = \text{constante}$.

ii) De $R = \lambda \bar{R}$, il résulte $\bar{\nabla}_X R = \lambda \bar{\nabla}_X \bar{R}$, $(\forall)X \in \mathcal{X}(M)$ et en utilisant i) nous obtenons $u = \text{constante}$.

iii) Pour $\bar{g} = e^{2u}g$ on obtient

$$(11) \quad W(X, Y)Z = \bar{W}(X, Y)Z, \quad (\forall)X, Y, Z \in \mathcal{X}(M)$$

où W , resp. \bar{W} , est le tenseur conforme de Weyl [1], [2], [3] associé à g , resp. \bar{g} . Puisque g et \bar{g} conduisent au même tenseur de Ricci de (11) on obtient $R = \bar{R}$, d'où on tire immédiatement $u = \text{constante}$.

Démonstration du théorème 1

(i) \Leftrightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii) \Leftrightarrow (iv) \Leftrightarrow (v) \Leftrightarrow (vi) \Leftrightarrow (vii) \Leftrightarrow (viii) Voir [5]

(i) \Rightarrow (x) \Rightarrow (xi), (i) \Rightarrow (ix) Evidemment

(ix) \Rightarrow (i), (x) \Rightarrow (i), (xi) \Rightarrow (i). On utilise le Lemme 2.

Remarque. Quelques propriétés des métriques de Riemann qui conduisent au même tenseur de courbure ont été mises en évidence par K. Teleman [6].

References

- [1] M. Anastasiei, *Conformal structures on Banach vector bundles*, An. Șt. Univ. "Al.I.Cuza" Iași, Tomul XX s.I a, fasc 2 (1974), 351-358.
- [2] Gh. Gheorghiev, R. Miron, D.Papuc, *Geometrie analitică și diferențială*, vol. II, E.D.P. București, 1969.
- [3] R.S. Kulkarni, *Curvature and metric*, Ann. of Math., 91, 2(1970), 311-331.
- [4] L. Nicolescu, *Champs presque spéciaux dans l'algèbre de déformation*, Rev. Roum. de Math. Pures et Appl. XXVI, 4(1981).
- [5] L. Nicolescu, *Un théorème sur les métriques pseudoriemanniennes conformes*, An. Șt. Univ. "Al.I.Cuza" Iași, Tom XXIX s.I a, (1983), 65-70.
- [6] K. Teleman, *Asupra unei teoreme a lui Borel-Lichnerowicz*, Rev. Roum. de Math. Pures et Appl. III, 1(1958), 107-115.
- [7] C. Udriște, *Linii de câmp*, Ed. Tehnică, București, 1988.
- [8] I. Vaisman, *Sur quelques formules du calcul de Ricci global*, Comm. Math. Helvetic, 41 2(1966-1967), 73-89.

Liviu Nicolescu

University of Bucharest, Faculty of Mathematics and Informatics

14 Academiei St., RO 010014, Bucharest, Romania

e-mail address: lnicol@geometry.math.unibuc.ro