

О СХОДИМОСТИ РАЗЛОЖЕНИЙ ПО СОБСТВЕННЫМ И
ПРИСОЕДИНЕННЫМ ФУНКЦИЯМ НЕСАМОСОПРЯЖЕННОГО
ОПЕРАТОРА ТИПА ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ С РАЗРЫВНЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Небойша Лажетич

(Представлено 4. января 1980.)

§ I. ВВедение

I. Цель настоящей статьи показать, что главные результаты из работ В. А. Ильина [2,3], в которых установлены необходимые и достаточные условия базисности и равномерная равносходимость с тригонометрическим рядом Фурье для спектральных разложений, отвечающих обыкновенному несамосопряженному дифференциальному оператору

$$(1) \quad L(u) = u^{(n)} + p_1(x)^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)u' + p_n(x)u$$

с коэффициентами $p_k(x)$ из класса $C^{(n-k+1)}(G)$, рассматриваемому на произвольном интервале G действительной прямой, можно перенести полностью на случай несамосопряженного оператора Шредингера

$$(2) \quad L(u) = -u'' + q(x)u$$

с потенциалом $q(x)$ из класса $L_p^{\text{loc}}(G)$, $1 < p < \infty$, и частью на случай несамосопряженного оператора Штурма-Лиувилля

$$(3) \quad L(u) = -(p(x)u')' + q(x)u$$

с разрывным коэффициентом $p(x)$.

2. Следуя В. А. Ильину, определим собственным и присоединенные функции оператора (2) следующим образом.

Определение 1. Комплекснозначная функция $\hat{u}(x)$ из класса $L_2(G)$, $\hat{u}(x) \neq 0$, называется собственной функцией оператора (2), отвечающей

комплексному собственному значению λ , если она абсолютно непрерывна вместе со своей первой производной на любом отрезке интервала G и удовлетворяет почти всюду в G уравнению

$$-\overset{0}{u}''(x) + q(x)\overset{0}{u}(x) = \lambda \cdot \overset{0}{u}(x).$$

Комплекснозначная функция $\overset{0}{u}(x)$ из класса $L_2(G)$ называется присоединенной функцией порядка i ($i = 1, 2, \dots$) оператора (2), отвечающей собственному значению λ и собственной функции $\overset{0}{u}(x)$, если абсолютно непрерывна вместе со своей первой производной на любом отрезке интервала G и удовлетворяет почти всюду в G уравнению

$$-\overset{i}{u}''(x) + q(x)\overset{i}{u}(x) = \lambda \cdot \overset{i}{u}(x) + \overset{i-1}{u}(x).$$

Будем предполагать, что любому собственному значению оператора (2) отвечает собственная функция и присоединенная функция первого порядка. Пусть $\{\overset{i}{u}_n(x)\}_{i=0,1}^{\infty}$ —произвольная полная в $L_2(G)$ и минимальная система собственных и присоединенных функций оператора (2), и $\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ —соответствующая система собственных значений, не имеющих конечных точек сгущения и занумерованных в порядке неубывания величины $\nu_n = |\sqrt{\lambda_n}|$.*

Обозначим через $\{\overset{i}{v}_n(x)\}_{i=0,1}^{\infty}$ биортогонально сопряженную $k\{\overset{i}{u}_m(x)\}$ в $L_2(G)$ систему функций, т.е. такую систему, что $\overset{i}{v}_n(x) \in L_2(G)$ и

$$(\overset{i}{u}_n, \overset{j}{v}_m) = \int_G \overset{i}{u}_n(x) \overline{\overset{j}{v}_m(x)} dx = \begin{cases} 1, & \text{при } n = m \text{ и } i = j; \\ 0, & \text{в других случаях.} \end{cases}$$

Пусть $f(x)$ —произвольная функция из класса $L_2(G)$ и μ —произвольное положительное число. Составим частичную сумму порядка μ разложения функции $f(x)$ в биортогональный ряд

$$\sigma_{\mu}(x, f) = \sum_{\substack{1 \leq n \leq \mu \\ i=1,0}} (f, \overset{i}{v}_n) \overset{i}{u}_n(x).$$

Для той же функции составим модифицированную частичную сумму тригонометрического ряда Фурье

$$S_{\mu}(x, f) = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{|x-y| \leq R} \frac{\sin \mu(x-y)}{x-y} f(y) dy,$$

где x пробегает какой-либо компакт K интервала G , а R —достаточно малое положительное число. Известно, что на этом компакте сумма $S_{\mu}(x, f)$ отличается от частичной суммы тригонометрического ряда Фурье порядка $\left[\frac{2\pi}{|G|} \cdot \mu\right]^*$ на величину, равномерно на компакте K стремящуюся

*Если $\lambda = r \cdot e^{i\varphi}$, $r \geq 0$, то $\sqrt{\lambda} = \sqrt{r} \cdot e^{\frac{i\varphi}{2}}$, где $-\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$.
*[α] обозначает целую часть числа α .

к нулю.

Следуя Б. А. Ильину [2], введем следующее определение.

Определение 2. Система функций $\{\dot{u}_n(x)\}_{n=0,1}^{\infty}$ обладает свойством базисности, если для любой функции $f(x)$ из класса $L_2(G)$ и для любого компакта K интервала G справедливо равенство

$$\lim_{\mu \rightarrow +\infty} \|\sigma_\mu(x, f) - f(x)\|_{L_2(K)} = 0.$$

Имеет место следующее утверждение.

Теорема 1. Пусть $\{\dot{u}_n(x)\}_{n=0,1}^{\infty}$ — произвольная, полная и минимальная система собственных и присоединенных функций оператора (2), потенциал $q(x)$ которого принадлежит классу $L_p^{\text{loc}}(G)$, $1 < p < \infty$, $\{\dot{v}_n(x)\}_{n=0,1}^{\infty}$ — биортогонально сопряженная к $\{\dot{u}_n(x)\}$ в $L_2(G)$ система функций. Пусть собственные числа λ_n , $n \in N$, удовлетворяют условиям

$$(4) \quad 1) |Im\sqrt{\lambda_n}| \leq A, \quad n \in N;$$

$$(5) \quad 2) \sum_{\|Re\sqrt{\lambda_n}\| - \mu \leq 1} 1 \leq B, \quad \text{для любого числа } \mu \geq 0,$$

При этом постоянная A не зависит от λ_n , а постоянная B не зависит от μ , и λ_n .

Тогда следующие предложения равносильны:

а) Для любого компакта K интервала G существует постоянная $S(K)$, не зависящая от $n \in N$ и такая, что справедливы неравенства

$$(6) \quad \|\dot{u}_n\|_{L_2(K)} \cdot \|\dot{v}_n\|_{L_2(G)} \leq C(K), \quad n \in N, \quad i = 0, 1.$$

б) Система функций $\{\dot{u}_n(x)\}_{n=0,1}^{\infty}$ обладает свойством базисности.

в) Для любой функции $f(x)$ из класса $L_2(G)$ имеет место равенство

$$\lim_{\mu \rightarrow +\infty} (\sigma_\mu(x, f) - S_{\nu_{[\mu]}}(x, f)) = 0,$$

равномерно относительно x на любом компакте K интервала G .

3. Теорема 1 доказывается методом, разработанным В. А. Ильиным в статьях [2, 3]. В силу того, что потенциал $q(x)$ оператора (2) принадлежит лишь классу $L_p^{\text{loc}}(G)$ "антиаприонные" оценки (см. лемму 2) в нашем случае нельзя доказывать при помощи фундаментального решения, как это сделано в работе [3]. И. С. Ломов [6] эти оценки доказал при помощи асимптотического метода. И. Йо [4] использовал формулы среднего значения. Наше доказательство этих оценок тоже основано лишь на

формулах среднего значения для собственных и присоединенных функций оператора (2).

Напомним, что И. Йо в работе [4] замечает, что можно доказать равносильность предложений а) и б), если предложить что, $q(x)$ принадлежит лишь классу $L_1^{\text{loc}}(G)$.

Результаты, касающиеся оператора Штурма–Лиувилля (3), будут сформулированы в §4 настоящей статьи.

§ 2. Оценка спектральной функции оператора Шредингера

1. Оценки собственных и присоединенных функций оператора (2) и "антиаприорные" оценки, сформулированные в следующих двух леммах, играют важную роль в доказательстве теоремы 1, а имеют и самостоятельный интерес.

Лемма 1. *Пусть собственные числа λ_n , $n \in N$, оператора (2) удовлетворяют условиям (4)–(5) и $q(x) \in L_1^{\text{loc}}(G)$. Для любого компакта K интервала G существует постоянная $C(K, q)$ такая, что имеют место оценки*

$$(7) \quad \max_{x \in K} |\dot{u}_n(x)| \leq C(K, q) \cdot \| \dot{u}_n \|_{L_2(K_R)}, \quad n \in N, i = 0, 1, 2, \dots,$$

где $0 < R < \varrho(K, \partial(G))$. При этом $C(K, q)$ не зависит от $n \in N$ и i .

Лемма 2. *Пусть собственные числа λ_n , $n \in N$, оператора (2) удовлетворяют условиям (4)–(5) и $q(x) \in L_1^{\text{loc}}(G)$. Для любого компакта K интервала G существует постоянная $A(K, q)$ такая, что справедливы оценки*

$$(8) \quad \max_{x \in K} |\dot{u}_n^{i-1}(x)| \leq A(K, q) \cdot |\sqrt{\lambda_n}| \cdot \| \dot{u}_n^i \|_{L_2(K_R)}, \quad \text{при } \lambda_n \neq 0,$$

и

$$(9) \quad \max_{x \in K} |\dot{u}_n^{j-1}(x)| \leq A(K, q) \cdot \| \dot{u}_n^j \|_{L_2(K_R)}, \quad \text{при } \lambda_n = 0,$$

где $0 < R < \varrho(K, \partial G)$. При этом $A(K, q)$ не зависит от λ_n .

Здесь через $\varrho(K, \partial G)$ обозначено расстояние компакта K от границы интервала G , а через K_R множество $\{x \in G : \varrho(x, \tilde{K}) \leq R\}$, где \tilde{K} —пресечение всех отрезков интервала G , содержащих K .

Как уже замечено, оценки (7)–(9) появились в работах [4] и [6]. Доказательства весьма обширные и мы здесь не будем их проводить (см., например, [5]).

2. Приведем теперь формулы среднего значения для собственных и присоединенных функций оператора (2). Для любой точки x интервала

G и любого числа $h > 0$ такого, что $x - h$ и $x + h$ принадлежат интервалу G , имеют место следующие соотношения:

$$(10) \quad 1) \frac{\overset{0}{\hat{u}_n}(x+h) + \overset{0}{\hat{u}_n}(x-h)}{2} = \overset{0}{\hat{u}_n}(x) \cos \sqrt{\lambda_n} h - \\ - \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \cdot \int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{0}{\hat{u}_n}(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi;$$

$$2) \frac{\overset{1}{\hat{u}_n}(x+h) + \overset{1}{\hat{u}_n}(x-h)}{2} = \overset{1}{\hat{u}_n}(x) \cos \sqrt{\lambda_n} h - \overset{0}{\hat{u}_n}(x) \cdot \frac{h}{2\sqrt{\lambda_n}} \cdot \sin \sqrt{\lambda_n} h - \\ - \frac{1}{2\sqrt{\lambda_n}} \cdot \int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{1}{\hat{u}_n}(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi - \\ - \frac{1}{4 \cdot \lambda_n} \cdot \int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) \overset{0}{\hat{u}_n}(\xi) \cos \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi + \\ + \frac{1}{4 \cdot \lambda_n^{3/2}} \cdot \int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{0}{\hat{u}_n}(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi.$$
(11)

Соответствующие формулы имеют место для тех $n \in N$, для которых $\lambda_n = 0$. Не уменьшая общности, всюду в дальнейшем будем предполагать, что $\lambda_n \neq 0$, $n \in N$.

Формула (10) принадлежит Э. Ч. Титчмаршу [8], а формула (11) Е. И. Моисееву [7].

3. Важную роль в доказательстве импликации а) \Rightarrow в) играет следующая оценка спектральной функции

$$(12) \quad \theta(x, y, \mu) = \sum_{\substack{1 \leq n \leq \mu \\ i=1,0}} \overset{i}{\hat{u}_n}(x) \cdot \overline{\overset{i}{\hat{v}_n}(y)}, \quad \mu > 0,$$

отвечающей произвольной полной в $L_2(G)$ и минимальной системе $\{\overset{i}{\hat{u}_n}(x)\}_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty}$ собственных и присоединенных функций оператора (2).

Лемма 3. Пусть собственные числа λ_n , $n \in N$, оператора (2) удовлетворяют условиям (4)–(5) и справедливо утверждение а). Если $q(x) \in L_p^{\text{loc}}(G)$, $1 < p < \infty$, то имеет место оценка

$$(13) \quad \int_G \left| \theta(x, y, \mu) - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin \nu_{[\mu]}(x-y)}{x-y} \right|^2 dy = O(1), \quad \mu \rightarrow +\infty,$$

равномернаја относительно x на любом компакте K интеграла G .

Доказательство. Пусть K —произвольный компакт, лежащий строго внутри интервала G и R_0 —число такое, что $0 < 2R_0 < \varrho(K, \partial G)$. Пусть μ —фиксированное положительное число. В дальнейшем будем пользоваться функцией

$$(14) \quad \omega_R(x, y, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \frac{\sin \mu|x - y|}{|x - y|}, & \text{при } |x - y| \leq R \\ 0, & \text{при } |x - y| > R, \end{cases}$$

где $x \in K$, $y \in G$, $R \in [R_0, 2R_0]$.

Если $f(R)$ интегрируемая на сегменте $[R_0, 2R_0]$ функция, то величину

$$S_{R_0}(f) = \frac{1}{R_0} \int_{R_0}^{2R_0} f(R) dR$$

называют усреднением функции $f(R)$.

Первый шаг в доказательстве оценки (13) заключается в доказательстве оценки

$$(15) \quad \int_G \left| \sum_{\substack{\mu_n \leq \mu \\ i=0,1}}^i \bar{u}_n(x) \overline{v_n(y)} - S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu)) \right|^2 dy = O(1), \quad \mu \rightarrow +\infty,$$

равномерной относительно x на компакте K . Здесь введено обозначение

$$\mu_n = \left| Re \sqrt{\lambda_n} \right|, \quad n \in N.$$

Фиксируя точку $x \in K$, начнем с функции

$$\overset{0}{\omega}_n^R(x, \mu) = \int_G \omega_R(x, y, \mu) \overset{0}{u}_n(y) dy = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} (\overset{0}{u}_n(x+h) + \overset{0}{u}_n(x-h)) dh.$$

Используя формулу среднего значения (10), отсюда получим соотношение

$$(16) \quad \begin{aligned} \overset{0}{\omega}_n^R(x, \mu) &= \overset{0}{u}_n(x) \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h \cos \sqrt{\lambda_n} h}{h} dh - \\ &- \frac{1}{\pi \sqrt{\lambda_n}} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{0}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h) d\xi \right] dh. \end{aligned}$$

Аналогично, при помощи формулы среднего значения (11), получим соотношения

(17)

$$\begin{aligned} \overset{1}{\omega}_n^R(x, \mu) &= \int_G \omega_R(x, y, \mu) \overset{1}{u}_n(y) dy = \\ &= \overset{1}{u}_n(x) \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h \cos \sqrt{\lambda_n}}{h} dh - \overset{0}{u}_n(x) \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h \sin \sqrt{\lambda_n} h}{\sqrt{\lambda_n}} dh - \\ &\quad - \frac{1}{\pi \sqrt{\lambda_n}} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{1}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh - \\ &\quad - \frac{1}{2\pi \cdot \lambda_n} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|xi-\xi|-h) q(\xi) \overset{0}{u}_n(\xi) \cos \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh + \\ &\quad + \frac{1}{2\pi \cdot \lambda^{3/2}} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{0}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh. \end{aligned}$$

Умножим равенства (16) и (17) на $\overline{\overset{0}{v}_n(y)}$ и $\overline{\overset{1}{v}_n(y)}$ соответственно. Получаются равенства

$$\begin{aligned} (18) \quad \overset{0}{\omega}_n^R(x, \mu) \overline{\overset{0}{v}_n(y)} &= \overset{0}{u}_n(x) \overline{\overset{0}{v}_n(y)} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h \cos \sqrt{\lambda_n} h}{h} dh - \\ &\quad - \frac{1}{\pi \sqrt{\lambda_n}} \cdot \overline{\overset{0}{v}_n(y)} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{0}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh, \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} (19) \quad \overset{1}{\omega}_n^R(x, \mu) \overline{\overset{1}{v}_n(y)} &= \overset{1}{u}_n(x) \overline{\overset{1}{v}_n(y)} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h \cos \sqrt{\lambda_n} h}{h} dh - \\ &\quad - \overset{1}{u}_n(x) \overline{\overset{1}{v}_n(y)} \cdot \frac{1}{\pi \sqrt{\lambda_n}} \cdot \int_0^R \sin \mu h \sin \sqrt{\lambda_n} h dh - \\ &\quad - \frac{1}{\pi \sqrt{\lambda_n}} \cdot \overline{\overset{1}{v}_n(y)} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{1}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh - \\ &\quad - \frac{1}{2\pi \lambda_n} \cdot \overline{\overset{1}{v}_n(y)} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) \overset{0}{u}_n(\xi) \cos \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh + \end{aligned}$$

$$(19) \quad -\frac{1}{2\pi\lambda_n^{3/2}} \cdot \overline{\overline{v}_n(y)} \cdot \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overline{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh.$$

Введен обозначения

$$(20) \quad I_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R) = \frac{2}{\pi} \int_0^R \frac{\sin \mu h \cos \sqrt{\lambda_n} h}{h} dh,$$

и

$$(21) \quad \sqrt{\lambda_n} = \alpha_n + i \cdot \beta_n,$$

т.е. $\alpha_n = Re\sqrt{\lambda_n}$, $\beta_n = Im\sqrt{\lambda_n}$.

Тогда усреднение величины $I_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R)$ можно представить (см. [3]) в виде

$$(22) \quad S_{R_0}(I_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R)) = \delta_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu + S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R)).$$

При этом

$$(23) \quad \delta_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{+\infty} \frac{\sin \mu h \cos \alpha_n h}{h} dh = \begin{cases} 1 & \text{при } \alpha_n < \mu, \\ \frac{1}{2} & \text{при } \alpha_n = \mu, \\ 0 & \text{при } \alpha_n > \mu, \end{cases}$$

и $J_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R)$ —величина такая, что имеют место оценки

$$(24) \quad |S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R))| \leq \begin{cases} C_1(R_0, A), & \text{при любых } \sqrt{\lambda_n} \text{ и } \mu, \\ \frac{C_2(R_0, A)}{|\mu - \alpha_n|^2}, & \text{при } |\mu - \alpha_n| > 1. \end{cases}$$

Здесь постоянные $C_1(R_0, A)$ и $C_2(R_0, A)$ не зависят от $\sqrt{\lambda_n}$ и μ .

Введем и обозначение

$$\omega_n^{i R_0}(x, \mu) = \int_G S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu)) \overline{u}_n(y) dy, \quad n \in N, \quad i = 0, 1.$$

Так как справедливо равенство

$$S_{R_0}(\overline{\omega}_n^{i R_0}(x, \mu)) = \overline{\omega}_n^{i R_0}(x, \mu), \quad n \in N, \quad i = 0, 1,$$

то после применения операции усреднения к равенствам (18) и (19), получим следующие соотношения, имея в виду (22):

$$(25) \quad \begin{aligned} \overline{\omega}_n^{0 R_0}(x, \mu) \overline{\overline{v}_n(y)} &= \overline{u}_n(x) \overline{\overline{v}_n(y)} \delta_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu + \overline{u}_n(x) \overline{\overline{v}_n(y)} S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R)) - \\ &- \frac{1}{\pi\sqrt{\lambda_n}} \cdot \overline{\overline{v}_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overline{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh \right), \\ \overline{\omega}_n^{1 R_0}(x, \mu) \overline{\overline{v}_n(y)} &= \overline{u}_n(x) \overline{\overline{v}_n(y)} \delta_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu + \overline{u}_n(x) \overline{\overline{v}_n(y)} S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^\mu(R)) - \end{aligned}$$

(26)

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{\pi\sqrt{\lambda_n}} \cdot \overline{u_n(x)} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \sin \mu h \sin \sqrt{\lambda_n} h dh \right) - \\
& -\frac{1}{\pi\sqrt{\lambda_n}} \cdot \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overline{u_n(\xi)} \sin \sqrt{\lambda_n} (|x-\xi|-h) d\xi \right] dh \right) - \\
& -\frac{1}{2\pi\lambda_n} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) \overline{u_n(\xi)} \cos \sqrt{\lambda_n} (|x-\xi|-h) d\xi \right] dh \right) + \\
& + \frac{1}{2\pi\lambda_n^{3/2}} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overline{u_n(\xi)} \sin \sqrt{\lambda_n} (|x-\xi|-h) d\xi \right] dh \right).
\end{aligned}$$

В силу условия (4), нетрудно убедиться в том, что из $\mu_n > A$ вытекает $\mu_n = \alpha_n$. Не уменьшая общности, можно считать что $\mu > A + 1$.

Суммируя по всем $n \in N$ и имея в виду (23), из (25), и (26) получим следующее, пока формальное, соотношение в метрике $L_2(G)$ (относительно аргумента y):

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1,0}^{\infty} \omega_n^{R_0}(x,y) \overline{v_n(y)} = \sum_{\substack{\mu_n \leq \mu \\ i=0,1}}^{\infty} \overline{u_n(x)} \overline{v_n(y)} - \frac{1}{2} \sum_{\substack{\alpha_n = \mu \\ i=0,1}}^{\infty} \overline{u_n(x)} \overline{v_n(y)} + \\
& + \sum_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty} \overline{u_n(x)} \overline{v_n(y)} S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^{\mu}(R)) - \\
& - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \overline{u_n(x)} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h \sin \sqrt{\lambda_n} h}{\sqrt{\lambda_n}} dh \right) - \\
& - \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overline{u_n(\xi)} \sin \sqrt{\lambda_n} (|x-\xi|-h) d\xi \right] dh \right) - \\
& - \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) \overline{u_n(\xi)} \frac{\cos \sqrt{\lambda_n} (|x-\xi|-h)}{\lambda_n} d\xi \right] dh \right) + \\
& + \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \overline{v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overline{u_n(\xi)} \frac{(\sin \sqrt{\lambda_n} (|x-\xi|-h))}{\lambda_n^{3/2}} d\xi \right] dh \right).
\end{aligned} \tag{27}$$

Докажем теперь, что все ряды в правой части соотношения (27) сходятся в метрике $L_2(G)$, а L_2 —нормы их сумм, кроме первой, ограничены.

ны сверху постоянными, не зависящими от точек $x \in K$ и чисел $\mu > A + 1$. Этим будет доказано, что в метрике $L_2(G)$ справедливо равенство (27).

Поскольку число μ фиксированно и иммет место условие (5), то первые два ряда состоят из конечного числа членов, принадлежащих пространству $L_2(G)$. В силу оценок (5), (6) и (7), L_2 —норму второй суммы можно оценить следующим образом:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{\substack{\alpha_n=\mu \\ i=0,1}}^i \bar{u}_n(x) v_n(y) \right\|_{L_2(G)} &\leq \sum_{\substack{\alpha_n=\mu \\ i=0,1}} \max_{x \in K} |u_n(x)| \cdot \|v_n\|_{L_2(G)} \leq \\ &\leq C(K, q) \cdot \sum_{\substack{\alpha_n=\mu \\ i=0,1}} \left\| u_n \right\|_{L_2(K_{R_1})} \cdot \left\| v_n \right\|_{L_2(G)} \leq 2C(K, q)C(K_{R_1})B, \end{aligned}$$

где $0 < R_1 < \varrho(K, \partial G)$.

Что касается остальных рядов в правой части (27), мы докажем более сильные результаты: для любого $x \in K$ сходятся ряды, общие члены которых являются L_2 —нормами общих членов исходных рядов, причем сумма каждого из этих числовых рядов есть $O(1)$ при $\mu \rightarrow +\infty$ равномерно односительно x на компакте K .

Ряд

$$(28) \quad \sum_{\substack{n=1 \\ j=0,1}}^{\infty} |u_n(x)| |S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^{\mu}(R))| \cdot \|v_n\|_{L_2(G)}$$

представим в виде*

$$\sum_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty} (\cdot) = \sum_{\substack{0 \leq \mu_n \leq [A]+1 \\ i=0,1}} (\cdot) \sum_{[A']+1 < \alpha_n < \mu-1} (\cdot) + \sum_{\substack{|\alpha_n - \mu| \leq 1 \\ i=0,1}} (\cdot) + \sum_{\substack{\alpha_n > \mu+1 \\ i=0,1}} (\cdot),$$

и, используя оценки (5), (6), (7) и (24), оценим каждую из этих четырех сумм отдельно.

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{\substack{0 \leq \mu_n \leq [A]+1 \\ i=0,1}} (\cdot) &\leq \sum_{k=0}^{[A']+1} \left(\sum_{\substack{k \leq \mu_n < k+1 \\ i=0,1}} (\cdot) \right) \leq 2([A]) + 2)C_1(R_0, A)C(K, q)C(K_{R_1})B; \\ 2) \quad \sum_{\substack{[A]+1 < \alpha_n < \mu-1 \\ i=0,1}} (\cdot) &\leq \sum_{\substack{[A]+1 < \alpha_n \leq \frac{\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot) + \sum_{\substack{\frac{\mu}{2} < \alpha_n < \mu-1 \\ i=0,1}} (\cdot) \leq \end{aligned}$$

* $[A]$ обозначает целую часть числа A .

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{k=[A]+1}^{[\frac{\mu}{2}]} \left(\sum_{\substack{k < \alpha_n \leq k+1 \\ i=0,1}} (\cdot) \right) + \sum_{k=1}^{[\frac{\mu}{2}]} \left(\sum_{\substack{\mu-k-1 < \alpha_n \leq \mu-k \\ i=0,1}} (\cdot) \right) \leq \\
&\leq 2C_2(R_0, A)C(K, q)C(K_{R_1}) \cdot \left[\sum_{k=[A]+1}^{[\frac{\mu}{2}]} \left(\sum_{k < \alpha_n \leq k+1} \frac{1}{\alpha_n^2} \right) + \right. \\
&\quad \left. + \sum_{k=1}^{[\frac{\mu}{2}]} \left(\sum_{\mu-k-1 < \alpha_n \leq \mu-k} \frac{1}{|\alpha_n - \mu|^2} \right) \right] \leq 4C_2(R_0, A)C(K, q)C(K_{R_1})B \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \right); \\
3) \quad &\sum_{\substack{|\alpha_n - \mu| \leq 1 \\ i=0,1}} (\cdot) \leq 2C_1(R_0, A)C(K, q)C(K_{R_1})B; \\
4) \quad &\sum_{\alpha_n > \mu+1} (\cdot) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{\mu+k < \alpha_n \leq \mu+k+1} (\cdot) \right) \leq \\
&\leq 2C_2(R_0, A)C(K, q)C(K_{R_1}) \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{\mu+k < \alpha_n \leq \mu+k+1} \frac{1}{|\alpha_n - \mu|^2} \right) \leq \\
&\leq 2C_2(R_0, A)C(K, q)C(K_{R_1})B \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \right).
\end{aligned}$$

Рассмотрим теперь ряд

$$(29) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|\sqrt{\lambda_n}|} |{}^0 u_n(x)| \left| S_{R_0} \left(\int_0^R \sin \mu h \sin \sqrt{\lambda_n} h dh \right) \right| \cdot \|v_n\|_{L_2(G)}.$$

В силу оценки (4) и соотношения (21), имеют место следующие оценки:

$$\begin{aligned}
1) \quad &\left| S_{R_0} \left(\int_0^R \sin \mu h \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} h}{\sqrt{\lambda_n}} dh \right) \right| \leq C_3(R_0, A), \quad \text{для любых } \mu \text{ и } \sqrt{\lambda_n}; \\
2) \quad &\left| S_{R_0} \left(\int_0^R \sin \lambda h \sin \sqrt{\lambda_n} h dh \right) \right| \leq C_4(R_0, A), \quad \text{для любых } \mu \text{ и } \sqrt{\lambda_n};
\end{aligned}$$

$$(30) \quad 3) \quad \left| S_{R_0} \left(\int_0^R \sin \mu h \sin \sqrt{\lambda_n} h dh \right) \right| \leq \frac{C_5(R_0, A)}{|\alpha_n - \mu|^2}, \quad \text{при } |\alpha_n - \mu| > 1.$$

При этом постоянные $C_i(R_0, A)$, $i = 3, 4, 5$, зависят лишь от величин R_0 и A .

В доказательстве сходимости ряда (29) придется оценивать величину $\frac{1}{\|\sqrt{\lambda_n}\|} \cdot \overset{0}{u}_n(x) \cdot \|\overset{1}{v}_n\|_{L_2(G)}$. При помощи овенок (6) и (8) эта величина оценивается следующим способом:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|\sqrt{\lambda_n}\|} \cdot |\overset{0}{u}_n(x)| \cdot \|\overset{1}{v}_n\|_{L_2(G)} &\leq \frac{1}{\|\sqrt{\lambda_n}\|} \max_{x \in k} |\overset{0}{u}_n(x)| \cdot \|\overset{1}{v}_n\|_{L_2(G)} \leq \\ &\leq A(K, q) \|\overset{1}{u}_n\|_{L_2(K_{R_1})} \cdot \|\overset{1}{v}_n\|_{L_2(G)} \leq A(K, q) C(K_{R_1}). \end{aligned}$$

Добавив оценки (5) и (30), сходимость ряда (29) и равномерную относительно $x \in K$ и $\mu > A + 1$ ограниченность его суммы мы доказываем приемом, использованным в случае ряда (28).

Для того чтобы доказать сходимость ряда

$$(31) \quad \sum_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty} \frac{1}{\|\sqrt{\lambda_n}\|} \cdot \left| S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h) d\xi \right] dh \right) \right| \|\overset{i}{v}_n\|_{L_2(G)},$$

нам будут нужны оценки интеграла

$$(32) \quad \begin{aligned} &\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h) d\xi \right] dh = \\ &= \int_x^{x+R} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \cdot \left[\int_{\xi-x}^R \frac{\sin \mu h}{h} \sin \sqrt{\lambda_n}(\xi - x - h) dh \right] d\xi + \\ &+ \int_{x-R}^x q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \left[\int_{x-\xi}^R \frac{\sin \mu h}{h} \sin \sqrt{\lambda_n}(x - \xi - h) dh \right] d\xi, \end{aligned}$$

и его усреднения.

Заметим сначала, что справедливы оценки

$$\left| \int_{|x-\xi|}^R \frac{\sin \mu h}{h} \sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h) dh \right| \leq \begin{cases} \frac{D'_1(R_0, A)}{|x - \xi|^\delta}, & \text{для любых } \mu \text{ и } \sqrt{\lambda_n} \\ \frac{D'_2(R_0, A)}{|x - \xi|^\delta \cdot |\alpha_n - \mu|^{\delta/2}}, & \text{при } |\alpha_n - \mu| > 1. \end{cases}$$

При этом δ —произвольное число из интервала $(0, 1)$, а постоянные $D'_1(R_0, A)$ и $(D'_2(R_0, A)$ зависят лишь, от указанных величин. Доказательство этих оценок элементарно. В случае действительных чисел λ_n оценки, аналогичны оценкам (33)–(34), и использованы работе [1].

Рассмотрим теперь первый интеграл в правой части (32); аналогично рассматривается второй. В силу оценок (33)–(34), имеют место оценки

$$(35) \quad \left| \int_x^{x+R} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \left[\int_{\xi-x}^R \frac{\sin \mu h}{h} \sin \sqrt{\lambda_n}(\xi - x - h) dh \right] d\xi \right| \leq$$

$$\begin{cases} D'_1(R_0, A) \cdot \max_{x \in K_{2R_0}} |\overset{i}{u}_n(x)| \cdot \int_x^{x+R} \frac{|q(\xi)|}{(\xi - x)^\delta} d\xi, & \text{для любых } \sqrt{\lambda_n} \text{ и } \mu; \\ \frac{D'_2(R_0, A)}{|\alpha_n - \mu|^{\delta/2}} \cdot \max_{x \in K_{2R_0}} |\overset{i}{u}_n(x)| \cdot \int_x^{x+R} \frac{|q(\xi)|}{(\xi - x)^\delta} d\xi, & \text{при } |\alpha_n - \mu| > 1. \end{cases}$$

Пусть r -число такое, что $\frac{1}{r} + \frac{1}{p} = 1$. Определим число $\delta \in (0, 1)$ так чтобы было $\delta \cdot r < 1$. Тогда справедлива оценка

$$\int_x^{x+R} \frac{|q(x)|}{(\xi - x)^\delta} d\xi \leq \left[\frac{(2R_0)^{1-\delta \cdot r}}{1 - \delta \cdot r} \right]^{\frac{1}{r}} \cdot \|q\|_{L_p(K_{2R_0})}.$$

Отсюда, в силу (32) и (35), вытекают оценки

$$(36) \quad \left| \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h) d\xi \right] dh \right| \leq$$

$$\begin{cases} D_1(R_0, A, q) \max_{x \in K_{2R_0}} |\overset{i}{u}_n(x)|, & \text{для любых } \sqrt{\lambda_n} \text{ и } \mu; \\ \frac{D_2(R_0, A, q)}{|\alpha_n - \mu|^{\delta/2}} \max_{x \in K_{2R_0}} |\overset{i}{u}_n(x)|, & \text{при } |\alpha_n - \mu| > 1. \end{cases}$$

Справедлива и оценка

$$\left| \int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h)}{\sqrt{\lambda_n}} d\xi \right] dh \right| \leq$$

$$\leq D_3(R_0, A, q) \cdot \max_{x \in K_{2R_0}} |\overset{i}{u}_n(x)|,$$

для тех $n \in N$, для коротых $0 \leq \mu_n \leq [A] + 1$. При этом постоянные $D_i(R_0, A, q)$ зависят лишь от указанных величин, так что и для усреднений интегралов в левой части оценок (36)–(38) справедливы те же самые оценки.

Перейдем к доказательству сходимости ряда (31). Представим его в виде

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (\cdot) = & \sum_{\substack{0 \leq \mu_n \leq [A]+1 \\ i=0,1}} (\cdot) + \sum_{\substack{[A]+1 < \alpha_n \leq \frac{\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot) + \sum_{\substack{\frac{\mu}{2} < \alpha_n < \mu-1 \\ i=0,1}} (\cdot) + \sum_{\substack{|\alpha_n - \mu| \leq 1 \\ i=0,1}} (\cdot) + \\ & + \sum_{\substack{\mu+1 < \alpha_n \leq \frac{3\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot) + \sum_{\substack{\alpha_n > \frac{3\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot), \end{aligned}$$

и оценим отдельно каждую из полученных шести сумм.

1) В силу оценок (5), (6), (7) и (38), имеет место оценка

$$\sum_{\substack{0 \leq \mu_n \leq [A]+1 \\ i=0,1}} (\cdot) \leq 2D_3(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1})([A]+2)B.$$

Здесь и ниже K_{R_1} — компакт интервала G содержащий компакт K_{2R_0} .

2) Используя оценки (5), (6), (7) и (37), получим неравенства

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{[A]+1 < \alpha_n \leq \frac{\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot) & \leq 2D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) \cdot \sum_{[A]+1 < \alpha_n \leq \frac{\mu}{2}} \frac{1}{|\sqrt{\lambda_n}|(\mu - \alpha_n)^{\delta/2}} \leq \\ & \leq 2D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) \cdot \sum_{k=[A]+1}^{[\frac{\mu}{2}]} \left(\sum_{k < \alpha_n \leq k+1} \frac{1}{\alpha_n^{1+\delta/2}} \right) \leq \\ & \leq 2D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) B \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1+\delta/2}} \right). \end{aligned}$$

3) Вполне аналогично доказываются и оценки

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\frac{\mu}{2} < \alpha_n < \mu-1 \\ i=0,1}} (\cdot) & \leq 2D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) B \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1-\delta/2}} \right), \\ \sum_{\substack{\mu+1 < \alpha_n \leq \frac{3\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot) & \leq 2D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) B \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1-\delta/2}} \right). \end{aligned}$$

4) Полагаясь оценками (5), (6), (7) и (36), получим оценку

$$\sum_{\substack{|\alpha_n - \mu| \leq 1 \\ i=0,1}} (\cdot) \leq 2D_1(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) B.$$

5) Для того чтобы оценить последнюю сумму, используем следующий факт: $\alpha_n > \frac{3\mu}{2} \Rightarrow \frac{1}{\alpha_n - \mu} < \frac{3}{\alpha_n}$. Тогда, в силу оценок (5), (6), (7) и (37), справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{\alpha > \frac{3\mu}{2} \\ i=0,1}} (\cdot) &\leq 2D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) \cdot \sum_{\alpha_n > \frac{3\mu}{2}} \frac{1}{|\sqrt{\lambda_n}|(\alpha_n - \mu)^{\delta/2}} \leq \\ &\leq 6D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) \cdot \sum_{k=\lceil \frac{3\mu}{2} \rceil}^{\infty} \left(\sum_{k < \alpha_n \leq k+1}^{\infty} \frac{1}{\alpha_n^{1+\delta/2}} \right) \leq \\ &\leq 6D_2(R_0, A, q) C(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}) B \cdot \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{1+\delta/2}} \right). \end{aligned}$$

Итак, ряд (31) сходится, причем его сумма есть $O(1)$ при $\mu \rightarrow +\infty$ равномерно относительно x на компакте K .

Рассмотрим теперь ряд

$$(39) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left| S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) {}^0 u_n(\xi) \frac{\cos \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h)}{\lambda_n} d\xi \right] dh \right) \right| \| {}^1 v_n \|_{L_2(G)}.$$

Нетрудно убедиться в том, что для усреднения интеграла

$$\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) {}^0 u_n(\xi) \cos \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h) d\xi \right] dh$$

справедливы оценки вида (36) и (37). Для усреднения этого интеграла, умноженного на $\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}$, справедлива оценка вида (38), в силу того, что числа $\sqrt{\lambda_n}$ не имеют конечных точек сгущения.

Величина

$$\max_{x \in K_{2R_0}} |{}^0 u_n(x)| \cdot \| {}^1 v_n \|_{L_2(G)}$$

оценивается, при помощи оценок (6) и (8), следующим образом:

$$\begin{aligned} \max_{x \in K_{2R_0}} |{}^0 u_n(x)| \cdot \| {}^1 v_n \|_{L_2(G)} &\leq A(K_{2R_0}, q) |\sqrt{\lambda_n}| \| {}^1 u_n \|_{L_2(KR_1)} \cdot \| {}^1 v_n \|_{L_2(G)} \leq \\ &\leq |\sqrt{\lambda_n}| \cdot A(K_{2R_0}, q) C(K_{R_1}). \end{aligned}$$

Учитывая эти замечания, сходимость ряда (39) мы доказываем приемом, использованным в случае ряда (31).

То же самое можно сказать и о ряде

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) {}^0 u_n(\xi) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h)}{\lambda_n^{3/2}} d\xi \right] dh \right) \right| \| {}^1 u_n \|_{L_2(G)}.$$

Таким образом, мы доказали, что в метрике $L_2(G)$ имеет место равенство (27) и L_2 —нормы сумм всех рядов в правой части (27), кроме первого, ограничены сверху равномерно относительно точек $x \in K$ и чисел $\mu > A + 1$.

Заметим, что для любых фиксированных $x \in K$ и $\mu > A + 1$ функция $S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu))$ принадлежит классу $L_2(G)$. Это вытекает из явного вида функции $S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu))$:

$$(40) \quad S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu)) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin \mu|x-y|}{|x-y|}, & \text{при } |x-y| \leq R_0, \\ \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin \mu|x-y|}{|x-y|} \cdot \frac{2R_0 - |x-y|}{R_0}, & \text{при } R_0 \leq |x-y| \leq 2R_0, \\ 0, & \text{при } |x-y| \geq 2R_0. \end{cases}$$

Используя полноту системы $\left\{ \overset{i}{u}_n(x) \right\}_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty}$, нетрудно убедиться в том, что имеет место следующее соотношение в метрике $L_2(G)$:

$$(41) \quad S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu)) = \sum_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty} \overset{i}{\omega}_n^{R_0}(x, \mu) \cdot \overline{\overset{i}{v}_n(y)}.$$

В силу соотношений (27) и (41), приходим к выводу, что для любых фиксированных $x \in K$ и $\mu > A + 1$ справедливо следующее равенство в метрике $L_2(G)$:

$$(42) \quad \begin{aligned} S_{R_0}(\omega_R(x, y, \mu)) - \sum_{\substack{\mu_n \leq \mu \\ i=1,0}}^{\infty} \overset{i}{u}_n(x) \overline{\overset{i}{v}_n(y)} &= \\ = \sum_{i=1,0}^{\infty} n = 1^{\infty} \overset{i}{u}_n(x) \overline{\overset{i}{v}_n(y)} S_{R_0}(J_{\sqrt{\lambda_n}}^{\mu}(R)) - \frac{1}{2} \cdot \sum_{\substack{\alpha_n = \mu \\ i=0,1}}^{\infty} \overset{i}{u}_n(x) \overline{\overset{i}{v}_n(y)} - \\ - \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \overset{0}{u}_n(x) \overline{\overset{i}{v}_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \sin \mu h \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} h}{\sqrt{\lambda_n}} dh \right) - \\ - \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{\substack{n=1 \\ i=0,1}}^{\infty} \overset{i}{v}_n(y) S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{i}{u}_n(\xi) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n}(|x-\xi|-h)}{\sqrt{\lambda_n}} d\xi \right] dh \right) - \\ - \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \overset{i}{v}_n(y) S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} (|x-\xi|-h) q(\xi) \overline{\overset{0}{u}_n(\xi)} \right] dh \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot \frac{\cos \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h)}{\lambda_n} d\xi \Big] dh \Big) + \\ & + \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \overline{i v_n(y)} S_{R_0} \left(\int_0^R \frac{\sin \mu h}{h} \left[\int_{x-h}^{x+h} q(\xi) \overset{0}{u}_n(\xi) \frac{\sin \sqrt{\lambda_n}(|x - \xi| - h)}{\lambda_n^{3/2}} d\xi \right] dh \right). \end{aligned}$$

При этом L_2 -норма функции в левой части равенства (42) есть $O(1)$ при $\mu \rightarrow +\infty$ равномерно относительно x на компакте K .

Оценка (15) доказана.

Второй шаг в доказательстве оценки (13) заключается в доказательстве оценки

$$(43) \quad \left\| \sum_{\substack{\mu_n \leq \nu_{[\mu]} \\ i=0,1}} \overline{i u_n(x)} \overline{i v_n(x)} - \frac{1}{\pi} \frac{\sin \nu_{[\mu]}(x-y)}{x-y} \right\|_{L_2(G)} = O(1), \quad \mu \rightarrow +\infty,$$

равномерной относительно x на компакте K . В силу (40), оценка (43) получается с помощью оценки (15) при $\mu = \nu_{[\mu]}$ ^{*}

Осталось еще доказать оценку

$$(44) \quad \left\| \sum_{\substack{1 \leq n \leq \mu \\ i=0,1}} \overline{i u_n(x)} \overline{i v_n(x)} - \sum_{\substack{\mu_n \leq \nu_{[\mu]} \\ i=0,1}} \overline{i u_n(x)} \overline{i v_n(x)} \right\|_{L_2(G)} = O(1), \quad \mu \rightarrow +\infty,$$

равномерную относительно x на компакте K . Эта оценка доказывается при помощи оценок (4)–(7) (см. § 3, [3]).

Из оценок (43)–(44) вытекает оценка (13). Лемма 3 доказана.

§ 3. Доказательство теоремы 1

В силу того, что тригонометрическая система образует базис в пространстве $L_2(G)$, утверждение б) вытекает из утверждения в) немедленно. Импликация б) \Rightarrow а) доказывается методом, разработанным в § 1, [2]. Имея оценку (13), импликацию а) \Rightarrow в) доказываем приемом, использованным в § 4, [3].

§ 4. Случай оператора Штурма-Лиувилля

1. Рассмотрим оператор Штурма-Лиувилля

$$(45) \quad L(u) = -(p(x)u'(x))' + q(x)u(x)$$

на конечном интервале $G = (a, b)$, причем точка $x_0 \in G$ является точкой разрыва коэффициента $p(x)$. На коэффициенты оператора накладываются

*Заметим, что $\nu_{[\mu]} \rightarrow +\infty$ при $\mu \rightarrow \infty$.

следующие условия:

- 1) $p_1(x) \in C^{(2)}[a, x_0]$, $p_2(x) \in C^{(2)}[x_0, b]$;
- (46) 2) $p_1(x) \geq \alpha_1 > 0$ всюду на $[a, x_0]$, $p_2(x) \geq \alpha_2 > 0$ всюду на $[x_0, b]$;
- 3) $q(x)$ —комплекснозначная функция из класса $L_p^{\text{loc}}(G)$, $1 < p < \infty$,

Собственные и присоединенные функции оператора (45) определим следующим образом.

Определение 3. Комплекснозначная функция $\overset{0}{\dot{u}}(x)$ из класса $L_2(G)$, $\overset{0}{\dot{u}}(x) \neq 0$, называется собственной функцией оператора (45), отвечающей комплексному собственному значению λ , если:

- 1) $\overset{0}{\dot{u}}$ и $\overset{0}{\dot{u}}'(x)$ являются абсолютно непрерывными функциями на любом полуотрезке $[c, x_0] \subseteq (a, x_0]$, и на любом отрезке $[x_0, d] \subseteq [x_0, b)$;
- 2) $\overset{0}{\dot{u}}(x)$ удовлетворяет уравнению

$$-(p_1(x)\overset{0}{\dot{u}}'(x))' + q(x)\overset{0}{\dot{u}}(x) = \lambda \cdot \overset{0}{\dot{u}}(x)$$

почти всюду в интервале (a, x_0) , и уравнению

$$-(p_2(x)\overset{0}{\dot{u}}'(x))' + q(x)\overset{0}{\dot{u}}(x) = \lambda \cdot \overset{0}{\dot{u}}(x)$$

почти всюду в интервале (x_0, b) ;

3) $\overset{0}{\dot{u}}(x)$ удовлетворяет следующим условиям сопряжения в точке разыска x_0 :

- a) $(p_1(x_0))^{\frac{1}{4}} \cdot \overset{0}{\dot{u}}(x_0 - 0) = (p_2(x_0))^{\frac{1}{4}} \cdot \overset{0}{\dot{u}}(x_0 + 0)$;
- b) $(p_1(x_0))^{\frac{3}{4}} \cdot \overset{0}{\dot{u}}'(x_0 - 0) = \frac{1}{4}p'_1(x_0 - 0) \cdot (p_1(x_0))^{-\frac{1}{4}} \cdot \overset{0}{\dot{u}}(x_0 - 0) =$
 $= (p_2(x_0))^{\frac{3}{4}} \cdot \overset{0}{\dot{u}}'(x_0 + 0) + \frac{1}{4}p'_2(x_0 + 0) \cdot (p_2(x_0))^{-\frac{1}{4}} \cdot \overset{0}{\dot{u}}(x_0 + 0)$.

Определение 4. Комплекснозначная функция $\overset{i}{\dot{u}}(x)$ из класса $L_2(G)$ называется присоединенной функцией порядка i ($i = 1, 2, \dots$) оператора (45), отвечающей собственной функции $\overset{0}{\dot{u}}(x)$ и собственному числу λ , если

- 1') $\overset{i}{\dot{u}}(x)$ удовлетворяет условиям 1) и 3) определения рм 3;
- 2') $\overset{i}{\dot{u}}(x)$ удовлетворяет уравнению

$$-(p_1(x)\overset{i}{\dot{u}}'(x))' + q(x)\overset{i}{\dot{u}}(x) = \lambda \cdot \overset{i}{\dot{u}}(x) + \overset{i-1}{\dot{u}}(x)$$

почти всюду в интервале (a, x_0) , и уравнению

$$-(p_2(x)\overset{i}{\dot{u}}'(x))' + q(x)\overset{i}{\dot{u}}(x) = \lambda \cdot \overset{i}{\dot{u}}(x) + \overset{i-1}{\dot{u}}(x)$$

почти всюду в интервале (x_0, b) .

Будем предполагать, что любому собственному значению оператора (45) отвечает одна собственная и одна присоединенная функция.

Пусть $\left\{ \begin{smallmatrix} i \\ u_n(x) \end{smallmatrix} \right\}_{n=1}^{\infty}$ — произвольная полная в $L_2(G)$ и минимальная сист-

ема собственных и присоединенных функций оператора (45), $\left\{ \lambda_n \right\}_{n=1}^{\infty}$ — соответствующая система собственных значений, не имеющих конечных точек сгущения и занумерованных в порядке неубывания величины $|\sqrt{\lambda_n}|$.

Пусть $\left\{ \begin{smallmatrix} i \\ v_n(x) \end{smallmatrix} \right\}_{n=1}^{\infty}$ — биортогонально сопряженная к системе $\left\{ \begin{smallmatrix} i \\ u_n(x) \end{smallmatrix} \right\}$ в $L_2(G)$ система функций.

Имеет место следующее утверждение.

Теорема 2. Пусть собственные значения оператора (45), коэффициенты которого имеют свойства (46), удовлетворяют условиям (4)–(5).

Для того чтобы система $\left\{ \begin{smallmatrix} i \\ u_n(x) \end{smallmatrix} \right\}_{n=1}^{\infty}$ обладала свойством базисности,

необходимо и достаточно, чтобы для любого компакта K интервала G существовала постоянная $C(K)$, не зависящая от $n \in N$ и такая, что справедливы неравенства

$$(47) \quad \|u_n\|_{L_2(K)} \cdot \|v_n\|_{L_2(G)} \leq C(K), \quad n \in N, \quad i = 0, 1.$$

2. Следуя В. А. Ильину [1], введем в рассмотрение функции $\varrho_1(t)$ и $\varrho_2(t)$, определяемые соотношениями

$$\int_{x_0 - \varrho_1(t)}^{x_0} (p_1(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau = t, \quad \int_{x_0}^{x_0 + \varrho_2(t)} (p_2(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau = t.$$

Эти функции определены и монотонно возрастают на сегменте $0 \leq t \leq t_0$, где t_0 — достаточно малое число. Обратные функции $t = \bar{\varrho}_1(h)$ и $t = \bar{\varrho}_2(h)$ можно представить в виде

$$\bar{\varrho}_1(x_0 - x) = \int_x^{x_0} (p_1(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau, \quad \bar{\varrho}_2(x - x_0) = \int_{x_0}^x (p_2(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau.$$

При помощи этих функций, определим следующее преобразование функции и аргумента: для любой функции $f(x)$ из класса $L_2(G)$ определяется функция $\tilde{f}(t)$ из класса $L_2(\tilde{G})$, где

$$\tilde{G} = (-\bar{\varrho}_1(x_0 - a), \bar{\varrho}_2(b - x_0))$$

соотношениями

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f[x_0 - \varrho_1(-t)] \cdot (p_1[x_0 - \varrho_1(-t)])^{\frac{1}{4}}, & \text{при } -\bar{\varrho}_1(x_0 - a) \leq t < 0, \\ f[x_0 + \varrho_2(t)] \cdot (p_2[x_0 + \varrho_2(t)])^{\frac{1}{4}}, & 0 \leq t \leq \bar{\varrho}_2(b - x_0). \end{cases}$$

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 3. Пусть собственные числа оператора (45), коэффициенты которого обладают свойствами (46), удовлетворяют условиям (4)–(5) и пусть выполнены условия базисности (47).

Если $f(x)$ произвольная функция из класса $L_2(G)$ и K произвольный компакт интервала G , то следующие предположения равносильны:

a) $\sigma_\mu(x, f)$ сходится при $\mu \rightarrow \infty$ равномерно относительно x на компакте K .

b) $S_{\nu_{[\mu]}}(t, \tilde{f})$ сходится при $\mu \rightarrow \infty$ равномерно относительно t на соответствующем компакте $\tilde{K} \subseteq \tilde{G}$.

Теоремы 2 и 3 доказываются при помощи теоремы 1, использованием указанного преобразования функции и аргумента (см. [5]).

Замечание. Теоремы 1–3 остаются справедливыми и в том случае, когда любому собственному значению λ соответствующих операторов отвечает конечное число (больше единицы) присоединенных функций.

Автор благодарит профессора В. А. Ильина за постановку задачи и помочь в работе.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Ильин В. А., *О сходимости разложений по собственным функциям в точках разрыва коэффициентов дифференциального оператора*, Математические заметки, т. **22**, № 5 (1977), 679–698.
- [2] Ильин В. А., *Необходимые и достаточные условия базисности и равносходимости с тригонометрическим рядом спектральных разложений*, I, Дифференциальные уравнения, т. **16** №, 5 (1980), 771–794.
- [3] Ильин В. А., *Необходимые и достаточные условия базисности и равносходимости с тригонометрическим рядом спектральных разложений*. II, Дифференциальные уравнения, т. **16** №, 6 (1980), 980–1009.
- [4] Йо И., *Некоторые вопросы спектральной теории для одномерного несамосопряженного оператора Шредингера с потенциалом из L_1* , ДАН СССР, т. 250 Но 1 (1980), 39–41.
- [5] Лажетић Н., *О конвергенцији спектралних разлагања која одговарају обичним дифференцијалним операторима другог реда*, Докторска дисертација, Београд, 1980.
- [6] Ломов И. С., *Оценки собственных и присоединенных функций оператора типа Штурма-Лиувилля*, ДАН СССР, т. **248**, № 6 (1979), 1303–1306.
- [7] Моисеев Е. И., *Асимптотическая формула среднего значения для регулярного решения обыкновенного дифференциального уравнения*, Дифференциальные уравнения, т. **16**, № 5 (1980), 827–844.
- [8] Титчмарш Е. Ч., *Разложения по собственным функциям, связанные с дифференциальными уравнениями второго порядка*, ИЛ, Москва, 1960.

Природно-математички факултет
Институт за математику
Студентски трг 16/1
11000 Београд