

ГРУППЫ ПРОСТОЙ И КРАТНОЙ АНТИСИММЕТРИИ ЛЕНТ

Славик Яблан

Резюме. Воспроизведены новым методом известные по статьям [1, 2, 4] группы простой и кратной антисимметрии лент типа M^m непосредственно из групп симметрии лент и произведена частичная каталогизация полученных групп типа M^m .

Группы простой и кратной антисимметрии лент подробно рассмотрены в работах [1, 2, 4, 5]. Вывод групп антисимметрии лент типа M^1 осуществлен непосредственно из групп симметрии лент, применяя шубниковский метод [1], тогда как вывод групп кратной антисимметрии лент типа M^m [4, 5] осуществлен непосредственным применением групп простой и кратной антисимметрии бордюров.

В настоящей работе предлагается вывод групп простой и кратной антисимметрии лент обобщенным методом Шубникова-Заморзаева, опираясь на использование антисимметрических характеристик групп симметрии [6]. Приведенные в первой части статьи антисимметрические характеристики групп симметрии лент служили основной вывода групп простой и кратной антисимметрии лент. Принимая во внимание объемность полученных результатов, во второй части работы вместо полной каталогизации представлена частичная каталогизация групп простой и кратной антисимметрии лент типа M^m , в соответствии с методом [7].

1. Группы симметрии лент, их копредставления и антисимметрические характеристики

Тридцать одну группу симметрии лент приведем в виде каталожного обзора, в котором для каждой группы симметрии лент указаны: международный символ, перечень образующих, копредставление и антисимметрическая характеристика. Некоторые из групп симметрии лент представлены с помощью двух или трех различных копредставлений. Семь первых представляют собой группы симметрии бордюров.

AMS Subject Classification (1980): Primary 20H15.

p1	образуемая переносом X :	
	$\{X\}$	$AK : \{X\}$
p1a1	образуемая скользящим отражением P :	
	$\{P\}$	$AK : \{P\}$
p112	a) образуемая переносом X и вращением порядка $2T$:	
	$\{X, T\} \quad T^2 = (T_1 X)^2 = E$	$AK : \{T, TX\}$
	b) образуемая вращениями порядка $2T$, T_1 :	
	$\{T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = E$	$AK : \{T, T_1\}$
p1m1	образуемая переносом X и отражением R :	
	$\{X, R\} \quad XR = RX \quad R^2 = E$	$AK : \{X\}\{R\}$
p1m11	a) образуемая переносом X и отражением R_1 :	
	$\{X, R_1\} \quad R_1^2 = (R_1 X)^2 = E$	$AK : \{R_1, R_1, X\}$
	b) образуемая отражениями R_1 , и R_2 :	
	$\{R_1, R_2\} \quad R_1^2 = R_2^2 = E$	$AK : \{R_1, R_2\}$
p1ma2	a) образуемая скользящим отражением P и отражением R_1 :	
	$\{P, R_1\} \quad R_1^2 = (PR_1)^2 = E$	$AK : \{P\}, \{R_1\}$
	b) образуемая отражением R_1 , и вращением порядка $2T$:	
	$\{R_1, T\} \quad R_1^2 = T^2 = E$	$AK : \{R_1, T\}$
pmm2	a) образуемая переносом X и отражениями R R_1 :	
	$\{X, R, R_1\} \quad R^2 = R_1^2 = (R_1 X)^2 = E \quad XR = RX \quad RR_1 = R_1 R \quad AK : \{R\}\{R_1, R_1, X\}$	
	b) образуемая отражениями R , R_1 R_2 :	
	$\{R, R_1, R_2\} \quad R^2 = R_1^2 = R_2^2 = E \quad RR_1 = R_1 R \quad RR_2 = R_2 R$	$AK : \{R\}\{R_1, R_2\}$
p121	a) образуемая переносом X и вращением порядка $2T$:	
	$\{X, T\} \quad T^2 = (TX)^2 = E$	$AK : \{T, TX\}$
	b) образуемая вращениями порядка $2T$, T_1 :	
	$\{T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = E$	$AK : \{T, T_1\}$
p12122	a) образуемая винтовым движением S и вращением порядка $2T$:	
	$\{S, T\} \quad T^2 = (ST)^2 = E$	$AK : \{S\}\{T\}$
	b) образуемая вращениями порядка $2T$, T_1 :	
	$\{T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = E$	$AK : \{T\}\{T_1\}$
p21ma	образуемая винтовым движением S и отражением R :	
	$\{S, R\} \quad R^2 = (SR)^2 = E$	$AK : \{S\}\{R\}$
p2111	образуемая винтовым движением S и отражением R_1 :	
	$\{S, R_1\} \quad R_1^2 = (SR_1)^2 = E$	$AK : \{S\}\{R\}$
p112a	образуемая скользящим отражением P и вращением порядка $2T$:	
	$\{P, T\} \quad T^2 = (PT)^2 = E$	$AK : \{P\}\{T\}$
pm2m	a) образуемая переносом X и отражениями R R_1 :	
	$\{X, R, R_1\} \quad (XR_1)^2 = R^2 = R_1^2 = (RR_1)^2 = E \quad XR = RX \quad AK : \{R\}\{R_1, R_1, X\}$	
	b) образуемая отражениями R , R_1 R_2 :	
	$\{R, R_1, R_2\} \quad R^2 = R_1^2 = R_2^2 = (RR_1)^2 = (RR_2)^2 = E$	$AK : \{R\}\{R_1, R_2\}$
pm2a	a) образуемая скользящим отражением P и вращением порядка $2T$:	
	$\{P, T\} \quad T^2 = (PT)^2 = E$	$AK : \{P\}, \{T\}$
	b) образуемая вращением порядка $2T$ и отражением R_1 :	
	$\{T, R_1\} \quad T^2 = R_1^2 = E$	$AK : \{T\}\{R_1\}$

p211	a) образуемая переносом X :	
	$\{X, T\} \quad T^2 = E \quad TX = XT$	$AK : \{X\}\{T\}$
p1	a) образуемая переносом X и центральной симметрией Z :	
	$\{X, Z\} \quad Z^2 = (ZX)^2 = E$	$AK : \{Z, Z_1\}$
	б) образуемая центральными симметриями Z, Z_1 :	
	$\{Z, Z_1\} \quad Z^2 = Z_1^2 = E$	$AK : \{Z, Z_1\}$
p2mm	a) образуемая переносом X и отражениями R и R_1 :	
	$\{X, R, R_1\} \quad R^2 = (R_1 X)^2 = (RR_1)^2 = E \quad XR = RX \quad X R_1 = R_1 X$	$AK : \{X\}\{R\}\{R_1\}$
	б) образуемая переносом X отражением R и вращением порядка $2T$:	
	$\{X, R, T\} \quad T^2 = R^2 = (TR)^2 = E \quad XR = RX \quad XT = TX$	$AK : \{X\}\{R\}\{T\}$
p2aa	a) скользящим отражением P и вращением порядка $2T$:	
	$\{P, T\} \quad T^2 = E \quad PT = TP$	$AK : \{P\}\{T\}$
	б) образуемая скользящим отражениями P, Q :	
	$\{P, Q\} \quad P^2 = Q^2 E \quad PQ = QP$	$AK : \{P\}\{Q\}$
p11₂_m	a) образуемая переносом X отражением R и вращением порядка $2T$:	
	$\{X, R, T\} \quad R^2 = T^2 = (RT)^2 = E \quad XR = RX \quad (TX)^2 = E$	$AK : \{R\}\{T, TX\}$
	б) образуемая отражением R и вращением порядка $2T$:	
	$\{R, T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = (RT)^2 = (RT_1)^2 = R^2 = E$	$AK : \{R\}\{T, T_1\}$
	в) образуемая отражением R и центральными симметриями Z, Z_1 :	
	$\{R, Z, Z_1\} \quad Z^2 = Z_1^2 = (RZ)^2 = (RZ_1)^2 = R^2 = E$	$AK : \{R\}\{Z, Z_1\}$
pmmm	a) образуемая переносом X и отражениями R, R_1 и R_2 :	
	$\{X, R, R_1, R_2\} \quad R^2 = R_1^2 = R_2^2 = (RR_1)^2 = (R_1 R_2)^2 = (R_2 R)^2 = E \quad XR = RX$	
	$XR = RX \quad XR_1 = R_1 X \quad (XR_2)^2 = E$	$AK : \{R\}\{R_1\}\{R_2, XR_2\}$
	б) образуемая отражениями R, R_1, R_2, R_3 :	
	$\{R, R_1, R_2, R_3\} \quad R^2 = R_1^2 = R_2^2 = R_3^2 = (RR_1)^2 =$	
	$(R_1 R_2)^2 = (R_1 R_3)^2 = E$	$AK : \{R\}\{R_1\}\{R_2, R_3\}$
pmaa	a) образуемая скользящими отражениями P, Q и отражением R :	
	$\{P, Q, R_1\} \quad R_1^2 = (RR_1)^2 = (QR_1)^2 = E \quad P^2 = Q^2 \quad PQ = QP$	$AK : \{P\}\{Q\}\{R_1\}$
	б) образуемая отражением R_1 и вращениями порядка $2T, T_1$:	
	$\{R_1, T, T_1\} \quad R_1^2 = T^2 = T_1^2 = E \quad TR_1 T = T_1 R_1 T_1 \quad TR_1 T_1 = T_1 R_1 T$	$AK : \{R_1\}\{T\}\{T_1\}$
pmma	a) образуемая отражениями R, R_1 и скользящим отражением P :	
	$\{R, R_1, P\} \quad R^2 = R_1^2 = (RR_1)^2 = (PR_1)^2 = E \quad PR = RP$	$AK : \{P\}\{R\}\{R_1\}$
	б) образуемая скользящим отражением порядка $2T, T_1$:	
	$\{P, T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = (T_1 P)^2 = (T_1 PT)^2 = E$	$AK : \{P\}\{T\}\{T_1\}$
p2₁11	образуемая винтовым движением S :	
	$\{S\}$	$AK : \{S\}$
p222	a) образуемая вращениями порядка $\{2T, T_1 T_2\}$:	
	$\{T, T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = T_2^2 = (TT_1)^2 = (T_2 TT_2 T_1)^2 = E$	$AK : \{T_2\}\{T, T_1\}$
	б) образуемая переносом X и вращением порядка $2T, T_1$:	
	$\{X, T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = (TT_1)^2 = E \quad (TX)^2 = (T_1 X)^2 = E$	$AK : \{PX\}\{T, T_1\}$

p11m	образуемая переносом X и отражением R : $\{X, R\} \quad R^2 = E \quad XR = RX$	$AK : \{X\}\{R\}$
p11a	образуемая скользящим отражением P : $\{P\}$	$AK : \{P\}$
p21am	образуемая скользящим отражением P и отражением R : $\{P, R\} \quad R^2 = E \quad PR = RP$	$AK : \{P\}\{R\}$
p_m²11	a) образуемая переносом X отражением R_1 и вращением порядка $2T$: $\{X, R_1, T\} \quad R_1^2 = (R_1 X)^2 = T^2 = (TR_1)^2 = E$ $XT = TX \quad (TX)^2 = E$ б) образуемая отражением R_1 и вращением порядка $2T, T_1$: $\{R_1, T, T_1\} \quad T^2 = T_1^2 = R_1^2 = (TR_1)^2 = (T_1 R_1)^2 = E$	$AK : \{T\}\{R_1, R_1 X\}$ $AK : \{R_1\}\{T, T_1\}$
p1_m²1	a) образуемая переносом X отражением R и вращением порядка $2T$: $\{X, R, T\} \quad T^2 = (TX)^2 = R^2 = (TR)^2 = E \quad XR = RX$ б) образуемая отражением R и вращением порядка $2T, T_1$: $\{R, T, T_1\} \quad R^2 = T^2 = T_1^2 = (TR)^2 = (T_1 R)^2 = E$	$AK : \{R\}\{T, TX\}$ $AK : \{R\}\{T, T_1\}$
p1_a²1	a) образуемая скользящим отражением P и вращением порядка $2T$: $\{P, T\} \quad T^2 = (PT)^2 = E$ б) образуемая вращением порядка $2T$ и центральной симметрией Z : $\{T, Z\} \quad T^2 = Z^2 = E$	$AK : \{P\}\{T\}$ $AK : \{T\}\{Z\}$
pmam	a) образуемая скользящим отражением P и отражениями R, R_1 : $\{P, R, R_1\} \quad R^2 = R_1^2 = (RR_1)^2 = (PR_1)^2 = E \quad PR = RP$ б) образуемая вращением порядка $2T$ и отражениями R, R_1 : $\{T, R, R_1\} \quad T^2 = R^2 = R_1^2 = (RR_1)^2 = (TR)^2 = E$	$AK : \{P\}\{R\}\{R_1\}$ $AK : \{T\}\{R\}\{R_1\}$

Поскольку из групп симметрии с изоморфными антисимметрическими характеристиками выводится одно и то же число групп простой и кратной антисимметрии типа M^m при каждом фиксированном m и полученные группы одинаковы по структуре между собой, интересен только вывод групп простой и кратной антисимметрии типа M^m из групп симметрии с неизоморфными антисимметрическими характеристиками. Соответственно соотношению изоморфизма антисимметрических характеристик группы симметрии лент можно разделить на шесть классов эквивалентности:

1. **p1**, **p1a1**, **p2111**, **p11a**
2. **p2₁22**, **p1m1**, **p2₁ma**, **p_m²11**, **p1_a²11**, **pm2a**, **p211**, **p2aa**, **p11m**, **p21am**, **p1_a²1**
3. **pm2m**, **p11_m²**, **p222**, **p_m²11**, **p1_m²1**, **p1_a²1**
4. **p121**, **p112**, **p₁²**, **pm11**
5. **p2mm**, **ptaa**, **ptma**, **ptam**
6. **pmmm**

1. Частичный каталог групп простой и кратной антисимметрии лент типа M^m

Вывод групп простой и кратной антисимметрии лент типа M^m сводится таким образом к процессу вывода из групп симметрии – представителей классов 1–6), т.е. из групп 1.) $p1$, 2.) $p2_{122}$, 3.) $pm2m$, 4.) $p121$ 5.) $p2mm$, 6.) $ptmm$. Вывод групп простой и кратной антисимметрии типа m^m в рамках классов 1.), 2.), 5.), т.е. из групп симметрии $p1$, $p2_{122}$, $p2mm$ осуществляется тривиально, иключительно при соблюдении условия независимости антитождеств e_1, e_2, \dots, e_m [6, Теорема 1. б], следовательно процесс вывода необходимо осуществить только в рамках классов 3.), 4.) 6.), т.е. из групп симметрии $pm2m$, $p121$, $ptmm$.

Соответственно методу частичной каталогизации групп простой и кратной антисимметрии типа M^m [7] приведем частичный каталог групп простой и кратной антисимметрии, выводимых из групп $pm2m$, $p121$, $ptmm$. В табличном обзоре приведем по порядку: порождающую группу симметрии, множество образующих, антисимметрическую характеристику AK и антисимметрические характеристики AK^m (mAK)^{*} групп типа M^m (mM), образующие частичный каталог, причем возле каждой из таких групп указан тип группы M^m (mM) и тип антисимметрической характеристики AK^m .

pm2m	$\{R, R_1, R_2\}$	$AK : \{R\}\{R_1, R_2\}$
$m = 1$	$\{e_1\}\{E, E\}$	M^1
	$\{E\}\{e_1, e_1\}$	$(2)(3)^1$
	$\{e_1\}\{e_1, e_1\}$	M^1
	$\{E\}\{E, e_1\}$	$(2)(3)^1$
	$\{e_1\}\{E, e_1\}$	$(2)(4)^1$
	$\{e_1\}\{E, e_1\}$	$(2)(4)^1$
$m = 2$	$\{e_1\}\{E, E\}$	
	$\{e_1\}\{e_2, e_2\}$	M^2
	$\{e_1e_2\}\{e_2, e_2\}$	$(2)(3)^2$
	$\{e_1\}\{E, e_2\}$	M^2
	$\{e_1e_2\}\{E, e_2\}$	$(2)(4)^2$
	$\{e_1e_2\}\{E, E\}$	$(2)(4)^2$
	$(2)(4)^2 \rightarrow 6M^2$	2M
$m = 2$	$\{e_1\}\{e_2, e_2\}^{+*}$	
	$\{e_1\}\{e_2, e_2e_3\}$	M^3
	$\{e_1e_3\}\{e_2e_3, e_2e_3\}$	3M
	$(2)(4)^2 \rightarrow 4M^3$	
	$N_1(pm2m) = 5$	$N_2(pm2m) = 26 + 34 = 24$
		$N_3(pm2m) = 184 + 62 = 84$

^{*} С целью сокращенного обозначения, в рамках антисимметрических характеристик AK^m (mAK) приводим только антитождества, соответствующие антиобразующим

⁰ Случай когда нет необходимости в приведении групп типа mM , т.к. нет преобразования $E \leftrightarrow e^+$ где e^+ – произведение антитождеств e_1, e_2, \dots, e_m [7] или когда рассматриваемая группа является единственной в классе эквивалентности, определенном соотношением одинаковости типа AK^m , обозначенены знаком $+$.

p121	$\{T, T_1\}$		$AK : \{T, T_1, \}$
$m = 1$	$\{E, e_1\}$	M^1	$(4)^1$
	$\{e_1, e_1\}$	M^1	$(3)^1$
$m = 3$	$\underline{\{e_1, e_1\}^+}$		
	$\{e_1, e_1e_2\}$	M^2	
	$(4)^1 \rightarrow 2M^2$		
pmmm	$\{R, R_1, R_2, R_3\}$		$AK : \{R\}\{R_1\}\{R_2, R_3\}$
$m = 1$	$\{e_1\}\{E\}\{E, E\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{E\}\{e_1\}\{E, E\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{e_1\}\{e_1\}\{E, E\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{E\}\{E\}\{e_1, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{e_1\}\{E\}\{e_1, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{E\}\{e_1\}\{e_1, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{e_1\}\{e_1\}\{e_1, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(3)^1$
	$\{E\}\{E\}\{E, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(4)^1$
	$\{e_1\}\{E\}\{E, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(4)^1$
	$\{E\}\{e_1\}\{E, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(4)^1$
	$\{e_1\}\{e_1\}\{E, e_1\}$	M^1	$(2)(2)(4)^1$
$m = 2$	$\underline{\{e_1\}\{E\}\{E, E\}}$		
	$\{e_1\}\{e_2\}\{E, E\}$	M^2	$(2)(2)(3)^2$
	$\{e_1e_2\}\{e_2\}\{E, E\}$	M^2	$(2)(2)(3)^2$
	$\{e_1\}\{E\}\{e_2, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(3)^2$
	$\{e_1e_2\}\{E\}\{e_2, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(3)^2$
	$\{e_1\}\{e_2\}\{e_2, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(3)^2$
	$\{e_1e_2\}\{e_2\}\{e_2, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(3)^2$
	$\{e_1\}\{E\}\{E, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(4)^2$
	$\{e_1e_2\}\{E\}\{E, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(4)^2$
	$\{e_1\}\{e_2\}\{E, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(4)^2$
	$\{e_1e_2\}\{e_2\}\{E, e_2\}$	M^2	$(2)(2)(4)^2$
	$\{e_1e_2\}\{E\}\{E, E\}$	2M	$(2)(2)(4)^2$
	$(2)(2)(4)^1 \rightarrow 14M^2$		
$m = 3$	$\underline{\{e_1\}\{e_2\}\{E, E\}}$		
	$\{e_1\}\{e_2\}\{e_3, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(3)^3$
	$\{e_1e_3\}\{e_2\}\{e_3, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(3)^3$
	$\{e_1\}\{e_2e_3\}\{e_3, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(3)^3$
	$\{e_1e_3\}\{e_2e_3\}\{e_3, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(3)^3$
	$\{e_1\}\{e_2\}\{E, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(4)^3$
	$\{e_1e_3\}\{e_2\}\{E, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(4)^3$
	$\{e_1\}\{e_2e_3\}\{E, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(4)^3$
	$\{e_1e_3\}\{e_2e_3\}\{E, e_3\}$	M^3	$(2)(2)(4)^3$
	$\{e_1e_3\}\{e_2\}\{E, E\}$	3M	
	$\{e_1\}\{e_2e_3\}\{E, E\}$	3M	
	$\{e_1e_3\}\{e_2e_3\}\{E, E\}$	3M	
	$(2)(2)(4)^2 \rightarrow 12M^3$		

$m = 4$	$\{e_1\}\{e_2\}\{e_3, e_4\}$	
	$\{e_1\}\{e_2\}\{e_3, e_3e_4\}$	M^4
	$\{e_1e_4\}\{e_2\}\{e_3, e_3e_4\}$	M^4
	$\{e_1\}\{e_2e_4\}\{e_3, e_3e_4\}$	M^4
	$\{e_1e_4\}\{e_2e_4\}\{e_3, e_3e_4\}$	M^4
	$\{e_1e_4\}\{e_2\}\{e_3, e_3\}$	4M
	$\{e_1\}\{e_2e_4\}\{e_3, e_3\}$	4M
	$\{e_1e_4\}\{e_2e_4\}\{e_3, e_3\}$	4M
	$\{e_1\}\{e_2\}\{e_3e_4, e_3e_4\}$	4M
	$\{e_1e_4\}\{e_2\}\{e_3e_4, e_3e_4\}$	4M
	$\{e_1\}\{e_2e_4\}\{e_3e_4, e_3e_4\}$	4M
	$\{e_1e_4\}\{e_2e_4\}\{e_3e_4, e_3e_4\}$	4M
	$(2)(2)(4)^3 \rightarrow 8M^4$	

$$N_1(pmmm) = 11$$

$$N_3(pmmm) = 8412 + 428 = 1344$$

p1 $\{X\}$

$$N_1(p1) = 1$$

p2122 {S, T}

$$N_1(p2122) = 3 \quad N_2(2122) = 6$$

$$N_2(pmmm) = 414 + 710 = 126$$

$$N_4(pmmm) = 11768 + 1684 = 10080$$

$AK : \{X\}$

$AK : \{S\}\{T\}$

$$N_1(p2mm) = 7 \quad N_2(p2mm) = 76 = 42$$

$$N_3(p2mm) = 424 = 168$$

Из полученных результатов одновременно легко получаются числа N_m : $N_1 = 117$ $N_2 = 552$ $N_3 = 2520$ $n_4 = 10080$, соответствующие результатам в работе [4].

Из всех указанных в частичном каталоге групп простой или кратной антисимметрии типа M^m , в рамках типа антисимметрической характеристики которых существует число 4, выводится группы кратной антисимметрии типа M^{m+1} исключительно при соблюдении условия независимости антитождеств e_1, e_2, \dots, e_{m+1} ($1 \leq m \leq q - 1$), т.е. нет возможности появления одинаковых групп типа M^{m+1} , выводимых из какой-нибудь из таких групп типа M^m , причем тип антисимметрических характеристик AK^{m+1} полученных групп типа M^{m+1} одинаков типу антисимметрической характеристики AK^m поражающей группы типа M^m .

Таким образом минимальный частичный каталог групп простой и кратной антисимметрии лент типа M^m сводится к 18 группам типа M^1 , 15 группам типа M^2 и 2 группам типа 2M , 10 группам типа M^3 и 6 группам типа 3M , 4 группам типа M^4 и 7 группам типа 4M . Все группы простой и кратной антисимметрии лент типа M^m получаются непосредственно из указанных, в соответствии с [7].

Способ получения полного каталога из частичного каталога иллюстрирует пример группы $pm2m$, с множеством образующих $\{R, R_1, R_2\}$ и с антисимметрической характеристики $AK\{R\}\{R_1, R_2\}$. Трансформациям $p, m, 2, m$, из которых, в заданном порядке, состоит международный

символ группы, $pm2m$ соответствуют в одинаковом порядке, трансформации R_1R_2, R_1, RR_1, R и потому, применением штих соотношений можно непосредственно из соответствующих антисимметрических характеристик получить международные символы групп простой и кратной антисимметрии типа M^m , выводимых из группы $pm2m$.

Когда $m = 1$ получаем:

$\{e_1\}\{E, E\}$	$pm2_1m_1$	(1)
$\{E\}\{e_1, e_1\}$	pm_12_1m	(2)
$\{e_1\}\{e_1, e_1\}$	pm_12m_1	(3)
$\{E\}\{E, e_1\}$	p_1m2m	(4)
$\{e_1\}\{E, e_1\}$	$p_1m2_1m_1$	(5)

Когда $m = 2$, двенадцать групп типа M^m (обозначенных числами (1) – (12)), в соответствии с алгоритмом [7], получаем в форме сопственного каталога:

$\{e_1\}\{E, E\}$		$pm2_1m_1$
1) $\{e_1\}\{e_2, e_2\}$	M^2	$pm_{10}2_{11}m_1$
2) $\{e_1e_2\}\{e_2, e_2\}$	M^2	$pm_{10}2_1m_{11}$
3) $\{e_1\}\{E, e_2\}$	M^2	$p_{10}m2_1m_1$
4) $\{e_1e_2\}\{E, e_2\}$	M^2	$p_{10}m2_{11}m_{11}$
5) $\{e_1e_2\}\{E, E\}$	2M	
$\{E\}\{e_1, e_1\}$		pm_12_1m
1') $\{E\}\{e_1e_2, e_1, e_2\}$	2M	
2') $\{e_2\}\{e_1e_2, e_1, e_2\}$	M^2	$pm_{11}2_1m_{10}$
3') $\{E\}\{e_1, e_1e_2\}$	M^2	$p_{10}m_12_1m$
4') $\{e_2\}\{e_1, e_1e_2\}$	M^2	$pm_{10}2_{11}m_{10}$
5') $\{e_2\}\{e_1, e_1\}$	M^2	$pm_12_{11}m_{10}$
$\{e_1\}\{e_1, e_1\}$		pm_12m_1
1'') $\{e_1\}\{e_1e_2, e_1e_2\}$	M^2	$pm_{11}2_{10}m_1$
2'') $\{e_1e_2\}\{e_1e_2, e_1e_2\}$	2M	
3'') $\{e_1\}\{e_1, e_1e_2\}$	M^2	$p_{10}m_12_1m_{11}$
4'') $\{e_1e_2\}\{e_1, e_1e_2\}$	M^2	$p_{10}m_12_{10}m_{11}$
6'') $\{e_1e_2\}\{e_1, e_1\}$	M^2	$pm_12_{10}m_{11}$

Остальных двенадцать групп типа M^2 (обозначенных числами (13)–(24)) получаются из групп p_1m2m и p_1m2_1m исключительно при соблюдении условия независимости антитождеств e_1, e_2 [6, Теорема I, б)].

(13) $p_1m2_{10}m_{10}$	(19) $p_1m2_{11}m_{11}$
(14) $p_{11}m_{10}2_{10}m$	(20) $p_{11}m_{10}2_{11}m_{10}$
(15) $p_{11}m_{10}2m_{10}$	(21) $p_{11}m_2_1m_1$
(16) $p_{11}m_2_{10}m_{10}$	(22) $p_{11}m_{10}2_1m_{11}$
(17) $p_1m_{10}2_{10}m$	(23) $p_1m_{10}2_{11}m_1$
(18) $p_1m_{10}2m_{10}$	(24) $p_1m_{10}2_1m_{11}$

Аналогичным способом получается и полный каталог групп типа M^3 , выводимых из группы $pm2m$, который состоит из восьмидесяти четырех групп типа M^3 .

ЛИТЕРАТУРА

- [1] А.В. Шубников, *Черные-белые бесконечных лент*, Кристаллография, **7**, 2 1962, 186–191.
- [2] Н.В. Белов, Т.С. Кунцевич, Н.Н. Неронова, *Шубниковские группы (антисимметрии) для бесконечных двухсторонних лент*, Кристаллография, **7**, 5, 1962, 805–808.
- [3] А.М. Заморзаев, рит О группах симметрии и различного рода антисимметрии, Кристаллография, **8**, 3, 1963, 131–132.
- [4] А.Ф. Палистрант, А.М. Заморзаев, *Группы симметрии и различного рода антисимметрии бордюров и лент*, Кристаллография, **9**, 2, 1964, 155–161.
- [5] А.М. Заморзаев, *Теория простой и кратной антисимметрии бордюров*, Штиница, Кишинев, 1976.
- [6] С. Яблан, *Группы простой и кратной антисимметрии бордюров*, Publ. Inst. Math. (Beograd) **36** (50) 1986, 35–40.
- [7] С. Яблан, *Обобщенные пространственные шубниковские группы*, Publ. Inst. Math. (Beograd) **40** (54) 1986, 33–48.

Математички институт
Кнез михајлова 35
11000 Београд
Југославија

(Поступила 19 05 1986)