

РАЗРЕШИМОСТЬ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ  
ДЛЯ ОПЕРАТОРНО–ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОГО ТИПА.  
ВЫРОЖДЕННЫЙ СЛУЧАЙ  
С. Г. Пятков, Н. Л. Абашеева

**Аннотация:** Получен ряд результатов о разрешимости краевых задач для уравнения вида  $Bu_t - Lu = f$  ( $t \in (0, \infty)$ ) в случае, когда оператор  $B$  самосопряженный, а оператор  $L$  диссипативный в данном гильбертовом пространстве  $E$ . Оператор  $B$  может иметь ненулевое ядро, а  $L$  равномерно диссипативный на  $M$  ( $M$  — некоторое подпространство конечной коразмерности). Библиогр. 29.

Введение

Работа посвящена исследованию краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений вида

$$Mu = Bu_t - Lu = f, \quad t \in (0, \infty), \quad (1)$$

где  $B, L$  — линейные операторы, определенные в данном гильбертовом пространстве  $E$ . Мы не предполагаем, что оператор  $B$  обратим; в частности, он может иметь ненулевое ядро и спектр оператора  $B$  может содержать одновременно бесконечные подмножества положительной и отрицательной полуосей. Такие уравнения возникают в физике [1–9], геометрии, популяционной генетике [10–12] и некоторых других областях.

Ранее вопросы разрешимости краевых задач для таких уравнений исследовались в случае, когда операторы  $L, B$  самосопряжены в данном гильбертовом пространстве  $E$  [1, 5, 13–16]. В этой работе условие самосопряженности оператора  $L$  заменяется условием его диссипативности. Под диссипативным оператором мы понимаем оператор, удовлетворяющий условию:  $\operatorname{Re}(-Lu, u) \geq 0$  для всех  $u \in D(L)$ , здесь  $D(L)$  — область определения оператора  $L$ . Опишем содержание работы. Вначале мы получим некоторые вспомогательные результаты, связанные со свойствами соответствующего уравнению (1) спектрального пучка  $L - \lambda B$  и возникающих при этом операторов. Затем полученные результаты применим при исследовании уравнения (1). При этом используем методы теории интерполяции банаховых пространств. Отметим, что данная работа является продолжением работы авторов [17].

---

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 01–01–00796) и Министерства общего и профессионального образования РФ (код проекта Е00–1.0–79).

### 1. Вспомогательные утверждения

Норму и скалярное произведение в  $E$  обозначаем через  $\|\cdot\|$  и  $(\cdot, \cdot)$ . Пусть вложение  $H_1 \subset E$  плотно ( $H_1$  — гильбертово пространство). Через  $H'_1$  обозначаем негативное пространство, построенное по паре  $H_1, E$ . Основные предположения об операторах  $L, B$  состоят в следующем.

I. Найдется гильбертово пространство  $H_1$ , плотно вложенное в  $E$ , такое, что  $L \in L(H_1; H'_1)$  и  $B \in L(H_1, H'_1)$ . Оператор  $B : E \rightarrow E$  самосопряжен в  $E$ .  $H_1$  плотно вложено в  $D(|B|^{1/2})$  (с нормой графика).

II. Для  $u \in H_1$  выполнено неравенство  $\operatorname{Re}(-Lu, u) \geq 0$  и найдется постоянная  $\delta > 0$  такая, что

$$\operatorname{Re}(-Lu, u) \geq \delta \|u\|_{H_1}^2$$

для всех  $u \in H_1 \cap M^\perp$ , где  $M \subset H_1$  — некоторое конечномерное подпространство, а ортогональное дополнение берется в  $E$ . Для всех  $u \in M$  справедливо равенство  $\operatorname{Re}(Lu, u) = 0$ .

Далее считаем условия I, II выполненными.

Уравнению (1) соответствует спектральный пучок

$$Lu = \lambda Bu. \quad (2)$$

Под собственным элементом задачи (2) понимаем функцию  $u \in H_1$  ( $u \neq 0$ ) такую, что для некоторого  $\lambda \in \mathbb{C}$  выполнено равенство (2). Множество  $\{u_i\}_{i=0}^n$  ( $u_i \in H_1$ ) — цепочка собственных и присоединенных элементов длины  $n + 1$  (с.п.э.) задачи (2), соответствующих  $\lambda \in \mathbb{C}$ , если

$$(L - \lambda B)u_i = Bu_{i-1}, \quad u_{-1} = 0, \quad i = 0, \dots, n.$$

Корневое подпространство пучка (2), соответствующее некоторому  $\lambda \in \mathbb{C}$ , т. е. замыкание в  $H_1$  линейной оболочки с.п.э. задачи (2), соответствующих данному  $\lambda$ , будем обозначать через  $L_\lambda$ . Будем говорить, что  $\{u_i\}_{i=0}^m$ , где  $u_i \in H_1$  ( $i = 0, \dots, m-1$ ),  $u_m \in D(|B|^{1/2})$ , является *цепочкой с.п.э. длины  $m + 1$  пучка (2)*, соответствующих  $\lambda = \infty$ , если  $Bu_i = Lu_{i-1}$ ,  $i = 0, \dots, m$ ,  $u_{-1} = 0$ .

Положим

$$F_1 = \{u \in H_1 : (Lu, v) = 0 \quad \forall v \in \ker B \cap H_1\},$$

$$\tilde{F}_1 = \{u \in H_1 : (L^*u, v) = 0 \quad \forall v \in \ker B \cap H_1\}.$$

**Лемма 1.** Пусть

$$\ker B \cap M = \{0\}. \quad (3)$$

Тогда длины цепочек с.п.э. задачи (2), соответствующих  $\lambda = \infty$ , равны 1. Пространство  $H_1$  представимо в виде прямых сумм

$$H_1 = N + F_1, \quad H_1 = N + \tilde{F}_1, \quad (4)$$

где  $N = \ker B \cap H_1$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Действительно, если  $Bu_0 = 0$  и  $Bu_1 = Lu_0$ , то получаем  $(Lu_0, u_0) = (Bu_1, u_0) = 0$ . Тогда  $u_0 \in M \cap \ker B = \{0\}$ .

Из определения следует, что  $F_1$  — замкнутое подпространство  $H_1$ . Поскольку  $\ker L = \ker L^*$  (в силу диссипативности), элементы  $F_1$  представляются в виде  $u = u_0 + L^{-1}g$ , где  $u_0 \in \ker L$ ,  $g \in N^\perp \cap (\ker L)^\perp$ . Обозначим  $F_1^{\perp 1} = \{u \in H_1 : (u, Lv) = 0 \quad \forall v \in F_1\}$ . Тогда, очевидно,  $F_1^{\perp 1} = \overline{N} + \ker L = N + \ker L$ .

Пусть найдется элемент  $f \in H'_1$  такой, что  $(f, v) = 0$  для всех  $v \in N + F_1$ . Поскольку это равенство выполняется и при  $v \in \ker L \subset F_1$ , то  $f \in R(L)$ , т. е. существует  $u \in H_1$  такой, что  $f = Lu$ . Вспомогая определение  $F_1$ , получаем, что  $u \in F_1$ . Полагая  $v = u$ , имеем  $u \in M$ . Отсюда  $L^*u = -Lu$  и  $(u, Lv) = 0$  для любого  $v \in N + F_1$ . Тогда  $u \in F_1^{\perp 1}$ . Следовательно,  $u = u_1 + u_2$ , где  $u_1 \in N$ ,  $u_2 \in \ker L \subset M$ , так что  $(Lu, u) = (Lu_1, u_1) = 0$  и  $u_1 \in M \cap N = \{0\}$ . Итак,  $f = Lu_1 = 0$ . Тем самым мы показали плотность  $N + F_1$  в  $H_1$ . Покажем, что  $H_1 = N + F_1$ . Используя те же рассуждения, что приведены в доказательстве леммы 4 в [17], и условие (3), легко получить неравенство

$$\operatorname{Re}(-Lv, v) \geq \delta \|v\|_{H_1}^2 \quad \forall v \in N,$$

где  $\delta$  — некоторая положительная постоянная. Тогда

$$\|v\|_{H_1}^2 \leq c \operatorname{Re}(-Lv, v) = c \operatorname{Re}(-L(u+v), v) \leq c_1 \|u+v\|_{H_1} \|v\|_{H_1} \quad \forall u \in F_1, v \in N.$$

Отсюда с использованием неравенства треугольника получим неравенство

$$\|u+v\|_{H_1} \geq \delta_1 (\|u\|_{H_1} + \|v\|_{H_1}) \quad \forall u \in F_1, v \in N,$$

где  $\delta_1 > 0$ . Это неравенство и плотность  $N + F_1$  в  $H_1$  гарантируют первое из равенств (4). Второе доказывается по аналогии. Лемма доказана.

Вводим в подпространстве  $F_1$  норму  $\|\cdot\|_1$ , индуцированную из  $H_1$ . Положим  $F_0 = D(|B|^{1/2})/\ker B$ . Норму в пространстве  $F_0$  зададим с помощью равенства  $\|u\|_0 = \||B|^{1/2}u\|$ . Введем в  $F_0$  также индефинитную метрику  $[u, v]_0 = (Bu, v)$ , относительно которой в  $F_0$  определяется структура пространства Крейна [18]. Введем также пространство  $F_{-1}$  как пополнение  $F_0$  относительно нормы  $\|u\|_{-1} = \sup_{v \in F_1} |[u, v]_0|/\|v\|_1$ . В силу предыдущей леммы эта норма эквивалентна норме  $\|Bu\|_{H'_1}$ . Имеем  $F_1 \subset F_0 \subset F_{-1}$ , причем каждое вложение плотно.

Обозначим через  $S, \tilde{S}$  проекторы в  $H_1$ , отвечающие разложениям (4), т. е.  $R(S) = N, R(I-S) = F_1, R(\tilde{S}) = N, R(I-\tilde{S}) = \tilde{F}_1$ . Пусть  $S^*, \tilde{S}^* : H'_1 \rightarrow H'_1$  — сопряженные к операторам  $S, \tilde{S}$  (в смысле теории банаховых пространств). Имеем  $S^*, \tilde{S}^* \in L(H'_1, H'_1)$ . Кроме того,

$$\begin{aligned} R(S^*) &= F_1^\perp = \{f \in H'_1 : (f, v) = 0 \forall v \in F_1\} \subset R(L), \\ R(I-S^*) &= R(I-\tilde{S}^*) = N^\perp = \{Bf : f \in F_{-1}\}, \\ \tilde{S}^*L &= LS, \quad (I-\tilde{S}^*)L = L(I-S). \end{aligned} \quad (5)$$

Покажем второе равенство. По построению пространства  $F_{-1}$  подпространство  $G = \{Bf : f \in F_{-1}\}$  замкнуто в  $H'_1$ . Рассматривая равенство  $(Bf, v) = 0$  для  $f \in D(|B|^{1/2})$  и пользуясь самосопряженностью  $B$ , убеждаемся, что  $G^\perp \subset N$ . Кроме того, очевидно, что  $N \subset G^\perp$ . Третье равенство вытекает из определений подпространств  $F_1, \tilde{F}_1$  и цепочки равенств

$$(\tilde{S}^*Lu, v) = (Lu, \tilde{S}v) = (LSu, \tilde{S}v) = (LSu, v) \quad \forall u, v \in H_1.$$

Четвертое равенство следует из третьего.

Пусть  $u \in F_1$ . По определению подпространства  $F_1$  имеем  $Lu \in (I-\tilde{S}^*)H'_1$ . Тогда найдется элемент  $g \in F_{-1}$  такой, что  $Lu = Bg$ . По определению положим  $g = B^{-1}Lu, B^{-1}L : F_1 \rightarrow F_{-1}$ . Из определения нормы в пространстве  $F_{-1}$  вытекает, что  $A = B^{-1}L \in L(F_1, F_{-1})$ . Кроме того, в силу леммы 5 из работы [17]

мнимая ось, за исключением конечного числа точек, принадлежит  $\rho(A)$ . Рассмотрим оператор  $A$  как неограниченный оператор в  $F_0$  с областью определения  $D(A) = \{u \in F_1 : Au \in F_0\}$ . Оператор  $A : F_0 \rightarrow F_0$  замкнут и имеет то же самое резольвентное множество. По определению оператор  $A$   $J$ -диссипативен, т. е.  $\operatorname{Re}[Au, u]_0 \leq 0$ . Поскольку  $\rho(A) \cap \{z : \operatorname{Re} z = 0\} \neq \emptyset$ , легко заключить, что  $D(A)$  плотно в  $F_0$  и  $A$  — максимальный  $J$ -диссипативный оператор (см. [18, гл. 2, § 2]). Пусть  $\lambda_0 \in \sigma(A) \cap i\mathbb{R}$ . В соответствии с [19, теорема 3.1, лемма 3.1] и [17, лемма 5] найдется множество вида  $0 < |\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ , принадлежащее  $\rho(A)$ . Таким образом,  $\sigma(A) \cap i\mathbb{R}$  состоит из изолированных собственных значений. Возьмем  $\lambda \in \sigma(A) \cap i\mathbb{R}$ . Поскольку  $\ker(A - \lambda I) = \ker(L - \lambda B)$ , а последнее подпространство конечномерно, то конечномерно и подпространство  $\ker(A - \lambda I)$ . Кроме того, поскольку  $\ker(L^* - \bar{\lambda}B)$  конечномерно, из определения оператора  $A$  вытекает, что подпространство  $R(A)$  имеет конечную коразмерность. Тогда из теоремы 4.2 в [19] следует, что каждое такое собственное значение является нормальным собственным значением, т. е. изолированным собственным значением конечной кратности, причем область значений соответствующего проектора Рисса совпадает с корневым подпространством, отвечающим этому собственному значению. Непосредственно из определений также получаем равенство  $L_\lambda(A) = L_\lambda$ , где  $L_\lambda(A)$  — корневое подпространство оператора  $A$ , отвечающее собственному значению  $\lambda \in \sigma(A) \cap i\mathbb{R}$ . Обозначим через  $A^c$   $J$ -сопряженный к оператору  $A$ , т. е. сопряженный относительно индефинитной метрики  $[\cdot, \cdot]_0$ . Он также будет замкнутым, плотно определенным, максимально  $J$ -диссипативным [18, гл. 2, § 2]). Кроме того, спектры операторов  $A, A^c$  симметричны относительно вещественной оси.

Приведем некоторые свойства оператора  $A : F_0 \rightarrow F_0$ .

**Лемма 2.** *Найдется  $R > 0$  такое, что  $iy \in \rho(A)$  при  $|y| \geq R$  и справедлива оценка*

$$\|(A - iy)^{-1}f\|_{F_{-1}}(1 + |y|) + \|(A - iy)^{-1}f\|_{F_1} \leq c\|f\|_{F_{-1}} \quad \forall f \in F_{-1}. \quad (6)$$

Если в дополнение выполнено равенство

$$(F_1, F_{-1})_{1/2,2} = F_0, \quad (7)$$

то верна оценка

$$\|(A - iy)^{-1}f\|_{F_0}(1 + |y|) + \|(A - iy)^{-1}f\|_{D(A)} \leq c\|f\|_{F_0} \quad \forall f \in F_0. \quad (8)$$

**Доказательство.** Рассмотрим уравнение

$$(A - iy)u = f, \quad f \in F_{-1}. \quad (9)$$

В силу леммы 5 из [17] и свойств операторов  $\tilde{S}, S$  (см. (5)) найдется  $R_0 > 0$  такое, что  $\{iy : |y| \geq R_0\} \subset \rho(A)$ . Воспользуемся проектором  $P$ , построенным в доказательстве теоремы 7 из [17]. Ввиду леммы 4 из [17] имеем

$$\delta\|(I - P)u\|_{F_1}^2 \leq \operatorname{Re}[-Au, u]_0 = \operatorname{Re}[f, u]_0. \quad (10)$$

Кроме того, из (9) получим, что

$$|y|\|u\|_{F_{-1}}^2 + \|u\|_{F_1}^2 \leq 2\|f\|_{F_{-1}}^2 + c\|u\|_{F_1}^2.$$

Отсюда

$$(|y|\|u\|_{F_{-1}}^2 + \|u\|_{F_1}^2)/2 + |y|\|Pu\|_{F_{-1}}^2 \leq 2\|f\|_{F_{-1}}^2 + 2c\|(I - P)u\|_{F_1}^2 + 2c\|Pu\|_{F_1}^2. \quad (11)$$

Поскольку проектор  $P$  конечномерен, найдется постоянная  $c_1$  такая, что выполнено  $\|Pu\|_{F_1} \leq c_1 \|Pu\|_{F_{-1}}$ . Используя это неравенство, неравенства (10) и  $|ab| \leq |a|\delta/2 + |b|/(2\delta)$  в правой части (11), мы приходим к (6) при достаточно большом  $R \geq R_0$  и  $|y| \geq R$ .

Пусть в (9)  $f \in F_1$ . Тогда  $u \in D(A)$  и  $Au \in F_1$ . Применим оператор  $A - iy_0I$  ( $|y_0| \geq R$ ) к (9) и воспользуемся неравенством (6) применительно к  $v = (A - iy_0I)u$ . Поскольку  $iy_0 \in \rho(A)$ , имеем

$$\|(A - iy)^{-1}f\|_{F_1} \leq \frac{c}{1 + |y|} \|f\|_{F_1} \quad \forall f \in F_1.$$

Аналогичная оценка справедлива в  $F_{-1}$ , так что ввиду (7) оператор  $(A - iy)^{-1}$  определяет непрерывное отображение  $F_0$  в  $F_0$  и справедлива оценка

$$\|(A - iy)^{-1}f\|_{F_0} \leq \frac{c}{1 + |y|} \|f\|_{F_0} \quad \forall f \in F_0.$$

Из этой оценки вытекает неравенство (8).

Положим  $F_2 = D(A)$  (с нормой графика).

Построим проектор Рисса, отвечающий части спектра оператора  $A$ , лежащей на мнимой оси

$$P_\gamma u = -\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma (A - \lambda)^{-1} u d\lambda,$$

где  $\gamma$  — некоторая замкнутая гладкая кривая Жордана, симметричная относительно вещественной и мнимой осей (определение и свойства проектора Рисса см. в [20, 18]). Используя проектор Рисса, мы можем записать разложения

$$F_i = F_{ia} + F_{ib}, \quad F_{ia} = P_\gamma F_i, \quad F_{ib} = (I - P_\gamma)F_i \quad (i = -1, 0, 1, 2).$$

Пространства  $F_{0a}, F_{0b}$  инвариантны относительно  $A$ ,  $F_{0a} \cap D(A) = F_{2a}$ ,  $F_{0b} \cap D(A) = F_{2b}$ . Очевидными свойствами этого проектора также являются свойства  $P_\gamma|_{F_i} \in L(F_i)$  ( $i = -1, 0, 1, 2$ ). Это и теорема об интерполяции подпространств [21, п. 1.17.1] гарантируют, что равенство (7) эквивалентно равенству

$$(F_{1b}, F_{-1b})_{1/2,2} = F_{0b}.$$

Отметим также тот факт, что  $D(A^m)$  плотно в  $F_0$  для любого  $m \geq 1$  [22, § 11, п. 11.1].

Рассмотрим оператор  $A$  как оператор из  $F_{0b}$  в  $F_{0b}$  с областью определения  $F_{2b}$ . В силу известных свойств проекторов Рисса и леммы 2 мнимая ось принадлежит резольвентному множеству оператора  $A$  и оценки (6) и (8) справедливы для всех  $y \in \mathbb{R}$ .

Найдется  $\delta > 0$  такое, что (см. [22, п. 14.1])

$$S = \mathbb{C} \setminus (S^+ \cup S^-) \subset \rho(A),$$

$$S^{-(+)} = \{z : |\arg z| < \pi/2 - \delta \text{ (} |\arg z| > \pi/2 + \delta \text{), } |z| > \delta\}$$

и для любого луча  $\{\arg z = \theta\} \subset S$  имеют место оценки резольвенты

$$\|(A - \lambda)^{-1}f\|_{F_i} \leq c_1 \|f\|_{F_i} (1 + |\lambda|)^{-1} \quad (i = -1, 1).$$

Определим операторы

$$P^\pm f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma^\pm} \frac{A(A-z)^{-1}}{z} f dz, \quad \Gamma^\pm = \partial S^\pm, \quad f \in D(A^2), \quad (12)$$

где направление интегрирования положительно, т. е. против часовой стрелки. Для  $f \in D(A^2)$  интегралы в (12) нормально сходятся и  $(P^\pm)^2 f = P^\pm f$ . Однако операторы  $P^\pm$  не обязательно допускают продолжение до операторов класса  $L(F_0)$ . Рассмотрим оператор  $A$  как оператор в  $F_{-1}$  с областью определения  $F_1$ . Тогда предложение 3.1 в [23] (см. также лемму 1 в [24]) гарантирует, что после соответствующего продолжения справедливо включение

$$P^\pm \in L((F_1, F_{-1})_{s,2}) \quad \forall s \in (0, 1). \tag{13}$$

Будем говорить, что подпространство  $M \subset F_0$  неотрицательно (неположительно), если  $[u, u]_0 \geq 0$  ( $[u, u]_0 \leq 0$ ) для всех  $u \in M$ . Если выполнено условие  $[u, u]_0 \geq \delta \|u\|_{F_0}^2$  ( $\delta > 0$ ) для всех  $u \in M$ , то  $M$  называется равномерно положительным подпространством. Аналогично определяем положительные пространства, равномерно отрицательные и т. д. [18]. Неотрицательные и т. п. подпространства, для которых не существует нетривиальных неотрицательных расширений, называются максимальными неотрицательными подпространствами.

Положим  $F_{0b}^\pm = \overline{\{u \in D(A^2) : P^\pm u = u\}}$ .

**Лемма 3.** Подпространства  $F_{0a}$ ,  $L_\lambda(A)$  ( $\lambda \in i\mathbb{R}$ ) и  $F_{0b}$  проекционно полны, т. е. с нормой и индефинитной метрикой, индуцированной из  $F_0$ , они являются пространствами Крейна.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Обоснование проекционной полноты подпространства  $F_{0a} = R(P_\gamma)$  совпадает с соответствующим доказательством теоремы 2.24 в [18, гл. 2] с учетом того факта, что определение  $J$ -диссипативного оператора в [18] другое. Аналогично можно показать проекционную полноту каждого из подпространств  $L_\lambda(A)$ . Покажем, что  $F_{0b}$  проекционно полно. Поскольку  $F_{0b} = (I - P_\gamma)F_0$ , из определения получаем, что  $F_{0b}^{[\perp]} = \{u \in F_0 : P_\gamma u = u\}$  ( $F_{0b}^{[\perp]} = \{u \in F_0 : [u, v]_0 = 0 \forall v \in F_{0b}\}$ ). По построению

$$P_\gamma^c = -\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma (A^c - \lambda)^{-1} d\lambda,$$

т. е.  $P_\gamma^c$  — соответствующий проектор Рисса для оператора  $A^c$ . Тогда каждый элемент  $u \in F_{0b}^{[\perp]}$  принадлежит  $D(A^c)$ . Однако подпространство  $R(P_\gamma^c)$  проекционно полно по тем же причинам, что и  $R(P_\gamma)$ . Для доказательства проекционной полноты  $F_{0b}$  достаточно показать, что  $F_{0b}^{[\perp]} \cap F_{0b} = \{0\}$ . В этом случае в силу конечномерности  $F_{0b}^{[\perp]}$  все пространство представимо в виде прямой суммы  $F_0 = F_{0b} + F_{0b}^{[\perp]}$ . Если  $u \in F_{0b}^{[\perp]} \cap F_{0b}$ , то  $u \in F_{0b}^{[\perp]} \cap F_{0b}^{[\perp]}$  [18, гл. 1, предложение 7.5]). В этом случае  $[u, v]_0 = 0$  для  $v \in F_{0b}^{[\perp]}$ . Положим  $v = A^c u$ . По теореме 2.15 в [18, гл. 2, § 2]  $u \in D(A)$  и  $Au = -A^c u$ . Следовательно, подпространство  $\{\text{Lin } L_{\lambda_i}(A^c), i = 1, 2, \dots, m\} = R(P_\gamma^c)$  вырожденно, т. е. найдется элемент  $u \in R(P_\gamma^c)$  такой, что  $[u, v]_0 = 0$  для всех  $v \in R(P_\gamma^c)$ , а это противоречит проекционной полноте  $R(P_\gamma^c)$ .

**Лемма 4.** Пусть справедливо (7). Тогда операторы  $P^\pm$  допускают продолжение до операторов класса  $L(F_0)$ . Соответствующие подпространства  $F_{0b}^+ = R(P^+)$ ,  $F_{0b}^- = R(P^-)$  являются максимальными неотрицательным и неположительным подпространствами пространства  $F_{0b}$ , инвариантными относительно

оператора  $A : F_{0b} \rightarrow F_{0b}$ . В случае, если оператор  $A : F_{0b} \rightarrow F_{0b}$  равномерно  $J$ -диссипативен, условие (7) является необходимым и достаточным условием для того, чтобы проекторы  $P^\pm$  допускали продолжение до операторов класса  $L(F_0)$  и чтобы подпространства  $F_{0b}^\pm$  были максимальными семидефинитными подпространствами, инвариантными относительно  $A$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** В силу равенства (13) операторы  $P^\pm$  допускают продолжение до операторов класса  $L(F_0)$  и первая часть утверждения доказывается точно так же, как и в лемме 10 в [24]. Вторая часть утверждения есть следствие леммы 11 в [24].

**ЗАМЕЧАНИЕ 1.** Оператор  $A : F_{0b} \rightarrow F_{0b}$  равномерно  $J$ -диссипативен, например, в случае, если выполнено неравенство

$$|[Au, v]_0| \leq c \operatorname{Re}[-Au, u]_0^{1/2} \operatorname{Re}[-Av, v]_0^{1/2} \quad \forall u, v \in F_1,$$

которое всегда выполнено, если  $A$   $J$ -самосопряжен.

Положим  $A^+ = A|_{F_{0b}^+}$ ,  $A^- = A|_{F_{0b}^-}$ .

**Лемма 5.** При выполнении условия (7) операторы  $A^+$  и  $-A^-$  являются инфинитезимальными операторами аналитических полугрупп  $e^{A^+t}$  и  $e^{-A^-t}$ , и соответствующие полугруппы удовлетворяют оценкам

$$\|e^{A^+t}\|_{L(F_{0b}^+)} \leq ce^{-\delta t}, \quad \|e^{-A^-t}\|_{L(F_{0b}^-)} \leq ce^{-\delta t},$$

где  $c, \delta$  — некоторые положительные постоянные. При этом  $\{\lambda : \operatorname{Re} \lambda > -\delta_1\} \subset \rho(A^+)$ ,  $\{\lambda : \operatorname{Re} \lambda < \delta_1\} \subset \rho(A^-)$  для некоторого  $\delta_1 > 0$  и в этих полуплоскостях справедливы оценки резольвент

$$\|(A^+ - \lambda I)^{-1}\|_{L(F_{0b}^+)} \leq c/(1 + |\lambda|), \quad \|(A^- - \lambda I)^{-1}\|_{L(F_{0b}^-)} \leq c/(1 + |\lambda|),$$

где  $c$  — некоторая постоянная.

Доказательство приведено в [25, с. 472, 473; 23, следствие 3.3].

**Лемма 6.** Пусть выполнено (7). Тогда найдутся максимальное неотрицательное и максимальное неположительное подпространства пространства  $F_0$ , инвариантные относительно  $A$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Вначале приведем некоторые свойства цепочек с.п.э. оператора  $A$ .

Пусть  $\{u_i\}_{i=0}^{k-1}$  — цепочка с.п.э.  $A$ , соответствующая собственному значению  $\lambda \in i\mathbb{R}$ . Тогда  $u_i \in D(A^c)$  и  $A^c u_i = -A u_i$  для  $i \leq [(k-1)/2]$ . Пусть  $\{v_i\}_{i=0}^{m-1}$  — другая цепочка с.п.э.  $A$ , соответствующая  $\lambda$ , и  $m \geq k$ . Возможно, что  $v_i = u_i$  для каждого  $i$ . Если  $i \leq [(k-1)/2]$ , то

$$[u_i, v_j]_0 = 0 \quad \text{при} \quad i + j < m - 1. \quad (14)$$

Если  $i > [(k-1)/2]$  и  $m > k$ , то

$$[u_i, v_j]_0 = 0 \quad \text{при} \quad i + j \leq \left\lfloor \frac{k-1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor. \quad (15)$$

Если  $[u_0, v_{m-1}]_0 = 0$  и  $[u_{k-1}, v_0]_0 = 0$ , тогда равенство (14) справедливо для  $i + j \leq m - 1$ .

Эти соотношения доказаны (в несколько другом виде) при доказательстве теоремы 2.26 в [18, гл. 2]. Отметим также, что при  $\lambda \in i\mathbb{R}$  [18, гл. 2, следствие 2.17]

$$\ker(A - \lambda I) = \ker(A^c - \bar{\lambda}), \quad R(A - \lambda I) = (\ker(A^c - \bar{\lambda}))^{\perp}.$$

Рассмотрим корневое подпространство  $L_\lambda(A)$  ( $\lambda \in i\mathbb{R}$ ). Докажем вначале утверждение леммы для каждого из корневых подпространств  $L_\lambda(A)$  ( $\lambda \in i\mathbb{R}$ ). По лемме 3 в  $L_\lambda(A)$  можно рассмотреть индефинитную метрику, индуцированную из  $F_0$ . Рассмотрим оператор  $A|_{L_\lambda(A)} : L_\lambda(A) \rightarrow L_\lambda(A)$ . Без ограничения общности можем считать, что  $\lambda = 0$ , иначе рассмотрим оператор  $A - \lambda I$  вместо  $A$ .

Положим  $\ker A = M_0$  и  $N_0 = M_0 \cap (\ker A)^{\perp}$ . Представим  $M_0$  в виде прямой суммы  $M_0 = M_{0,1} + N_0$ . Подпространство  $M_{0,1}$  выбирается произвольно. Мы имеем  $M_{0,1}^{\perp} N_0$  и подпространство  $M_{0,1}$  невырожденно, т. е. не существует  $u \in M_{0,1}$ ,  $u \neq 0$ , такого, что  $[u, v]_0 = 0 \forall v \in M_{0,1}$ . Действительно, поскольку  $\ker A = \ker A^c$  и  $R(A)$  — замкнутое подпространство, элемент  $f \in N_0$  представим в виде  $f = Af_1$ . Тогда  $[u, f]_0 = [u, Af_1]_0 = [Au, f_1]_0 = 0$ , где  $u \in M_{0,1}$ . Предположим противное, т. е. что  $M_{0,1}$  вырожденное в  $F_0$ . Найдется  $f \in M_{0,1}$  такой, что  $[f, v]_0 = 0$  для  $v \in M_{0,1}$ . Следовательно,  $[f, v]_0 = 0$  для  $v \in N_0 + M_{0,1} = M_0$ , а этот факт влечет, что  $f \in N_0$ . Это противоречит равенству  $N_0 \cap M_{0,1} = \{0\}$ . Фиксируем оператор  $A^{-1} : R(A) \rightarrow F_0$  ( $R(A) \subset F_0$ ). Положим  $M_1 = \{A^{-1}f + f_1, f \in N_0, f_1 \in M_{0,1}\}$ , где элемент  $f_1 \in M_{0,1}$  определяется из условия  $[A^{-1}f + f_1, v]_0 = 0$  для каждого  $v \in M_{0,1}$ . Элемент  $f_1$  существует и единствен. Он может быть найден в виде  $f_1 = \sum_i c_i v_i$ , где  $\{v_i\}$  — базис в  $M_{0,1}$ . Поскольку  $M_{0,1}$  невырожденно, матрица  $[v_i, v_j]_0$  невырожденна. Как и ранее, представим подпространство  $M_1$  в виде прямой суммы  $M_1 = N_1 + M_{1,2}$ , где  $N_1 = M_1 \cap M_0^{\perp}$ . Положим  $M_{0,2} = AM_{1,2}$ . Имеем  $M_0 = M_{0,1} + M_{0,2} + AN_1$ . По построению  $M_{1,2}^{\perp} M_{0,1}$ . Поскольку каждый элемент  $f \in N_1$  представим в виде  $f = Af_1$ , в силу соотношений (14), (15)  $M_{1,2}^{\perp} AN_1$ . Из определения подпространства  $M_{1,2}$  выводим  $M_{1,2} \cap M_{0,2}^{\perp} = \{0\}$ . Полученные соотношения можно записать в виде

$$M_0 = M_{0,1} + M_{0,2} + AN_1, \quad M_1 = M_{1,2} + N_1, \quad M_{1,2}^{\perp} M_{0,1} + AN_1, \quad M_{1,2} \cap M_{0,2}^{\perp} = \{0\}.$$

Продолжим по индукции. Предположим, что при  $n = k$  мы построили подпространства  $M_i, N_i$ , и  $M_{i,j}$  со свойствами

$$M_0 = M_{0,1} + \dots + M_{0,n} + A^{n-1}N_{n-1}, \quad M_1 = M_{1,2} + M_{1,3} + \dots + M_{1,n} + A^{n-2}N_{n-1}, \dots, \tag{16}$$

$$M_i = M_{i,i+1} + M_{i,i+2} + \dots + M_{i,n} + A^{n-i-1}N_{n-1}, \dots, \quad M_{n-1} = M_{n-1,n} + N_{n-1}, \tag{17}$$

$$M_{i,i+1}^{\perp} M_{0,s} \quad (s \neq i+1), \quad M_{i,i+1}^{\perp} A^{n-1}N_{n-1} \quad (i \leq n-1), \quad M_{i,i+1} \cap M_{0,i+1}^{\perp} = \{0\}. \tag{18}$$

Построим эти подпространства при  $n = k + 1$ . Положим

$$M_k = \left\{ A^{-1}f + \sum_{i \leq k-1} f_{i,i+1}, \quad f \in N_{k-1}, \quad f_{i,i+1} \in M_{i,i+1} \right\},$$

где элементы  $f_{i,i+1}$  определяются из условий

$$\left[ A^{-1}f + \sum_{i \leq k-1} f_{i,i+1}, v \right]_0 = 0 \quad \forall v \in M_{0,1} + M_{0,2} + \dots + M_{0,k-1}.$$



В силу (18) нам достаточно иметь

$$[A^{-1}f + f_{i,i+1}, v]_0 = 0 \quad \forall v \in M_{0,i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, k-1.$$

Пусть  $\{v_i\}$  и  $\{g_i\}$  — некоторые базисы в  $M_{i,i+1}$  и  $M_{0,i+1}$ . Поскольку  $M_{i,i+1} \cap M_{0,i+1}^{[\perp]} = \{0\}$ , матрица  $a_{i,j} = [v_i, g_j]_0$  невырождена и элемент  $f_{i,i+1}$  может быть найден в виде  $f_{i,i+1} = \sum c_i v_i$ . По построению  $M_k[\perp]M_{0,i}$  для  $0 \leq i \leq k-1$ . Положим  $N_k = M_k \cap M_0^{[\perp]}$  и представим  $M_k$  в виде прямой суммы  $M_k = N_k + M_{k,k+1}$ . По определению положим  $M_{i,k+1} = A^{k-i}M_{k,k+1}$ . Покажем, что  $M_{k,k+1}[\perp]A^k N_k$ . Каждый элемент  $f_k \in N_k$  представим в виде  $f_k = Af_{k+1}$ , и мы имеем соответствующую цепочку  $f_{k+1}, f_k, f_{k-1}, \dots, f_0$  ( $Af_i = f_{i-1}$ ). Используя соотношения (14), (15) для этой цепочки и произвольной цепочки  $\{v_i\}_{i=0}^k$  ( $v_k \in M_{k,k+1}$ ), мы получим, что  $[v_i, f_0]_0 = 0$  для каждого  $i \leq k$  и, таким образом,  $M_{k,k+1}[\perp]A^k N_k$ . Кроме того,  $A^k(M_{k,k+1} + N_k) = A^{k-1}N_{k-1}$ . Мы показали (16)–(18) для  $n = k+1$ . Описанная процедура состоит из конечного числа шагов, поскольку подпространство  $L_0(A)$  конечномерно. В конце концов мы придем к ситуации, когда  $M_s \cap M_0^{[\perp]} = \{0\}$ . По построению  $M_s[\perp]M_{0,i}$  для  $i \leq s-1$  и, таким образом,  $M_s \cap (A^s M_s)^{[\perp]} = \{0\}$ . Положим  $M_{s,s+1} = M_s$  и  $M_{i,s+1} = A^{s-i}M_s$ . Получим множество подпространств  $\{M_{i,j}\}$  такое, что

$$M = \sum_{i,j:i < j, j=1,2,\dots,s} M_{i,j}, \quad AM_{i,j} = M_{i-1,j},$$

$$M_{i,i+1}[\perp]M_{0,j+1} \quad (i \neq j), \quad M_{i,i+1} \cap M_{0,i+1}^{[\perp]} = \{0\}, \quad (19)$$

где  $i < j \leq s+1$ . Покажем, что

$$\text{подпространство } C = \text{Lin}\{M_{i,j}, i \leq [(j-2)/2]\} \text{ нейтрально,} \quad (20)$$

т. е.  $[u, u]_0 = 0$  ( $\forall u \in C$ ). Действительно, пусть  $f \in M_{i,j}$  и  $g_{l,r} \in M_{l,r}$ , причем  $i \leq [(j-2)/2]$  и  $l \leq [(r-2)/2]$ . Для определенности предположим, что  $r \geq j$ . В силу соотношений (14), (15)  $[f, g]_0 = 0$  (у нас  $i+l \leq [(r-2)/2] + [(j-2)/2] \leq 2[(r-2)/2] < r-1$ ).

Возьмем произвольную цепочку подпространств  $\{M_{i,j}\}_{i=0}^{j-1}$  и покажем, что

$$M_{j-1-i,j} \cap M_{i,j}^{[\perp]} = \{0\}, \quad i \leq [(j-1)/2]. \quad (21)$$

Пусть  $f \in M_{j-1-i,j} \cap M_{i,j}^{[\perp]}$ . Имеем  $f = A^i f_1$  ( $f_1 \in M_{j-1,j}$ ). Используя соотношения (14), (15), придем к равенствам

$$[f, v]_0 = [A^i f_1, v]_0 = [f_1, A^i v]_0 = 0 \quad \forall v \in M_{i,j}.$$

В силу (19) и равенства  $A^i M_{i,j} = M_{0,j}$  мы заключаем, что  $f_1 = 0$ .

Из (14), (15) получим при  $m > k$ , что

$$M_{i,k}[\perp]M_{j,m} \quad (22)$$

в следующих случаях:

- а)  $i \leq [(k-1)/2]$  и  $i+j \leq m-1$ ;
- б)  $i > [(k-1)/2]$  и  $i+j \leq [(k-1)/2] + [(m-1)/2]$ .

Ввиду (21) для нечетного  $j$  подпространство  $M_{[(j-1)/2,j]}$  невырождено. По теореме 6.4 в [18, гл. 1] имеем разложение  $M_{[(j-1)/2,j]} = M_{[(j-1)/2,j]}^+ + M_{[(j-1)/2,j]}^-$  в

прямую сумму равномерно положительного и равномерно отрицательного подпространств. Положим

$$M^+ = \text{Lin}\{M_{i,j}, i \leq [(j-2)/2]; M_{[(j-1)/2],j}^+, j \text{ нечетно}\}.$$

Очевидно, подпространство  $M^+$  инвариантно относительно  $A$ . Покажем, что  $M^+$  — максимальное неотрицательное подпространство. Предположим противное. Пусть существует элемент  $\varphi \in M$  ( $\varphi \notin M^+$ ) такой, что подпространство  $\text{Lin}\{\varphi, M^+\}$  также неотрицательно. Без ограничения общности можем считать, что элемент  $\varphi$  представим в виде

$$\varphi = \sum_{i,j:i>[(j-1)/2]} \varphi_{i,j} + \sum_{k=0}^{[(s-1)/2]} \varphi_{k,2k+1}^-,$$

где  $\varphi_{i,j} \in M_{i,j}$  и  $\varphi_{k,2k+1} \in M_{k,2k+1}^-$ . Пусть  $\psi \in M^+$  обладает свойством  $[\psi, \psi]_0 = 0$ . Из неравенства Коши — Буняковского для неотрицательного линейала [18, гл. 1, предложения 1.16 и 1.17] получим  $[\varphi, \psi]_0 = 0$ . Предположим, что  $\psi \in M_{0,j}$  с  $j > 1$ . Из (22) вытекает, что  $[\varphi, \psi]_0 = [\varphi_{j-1,j}, \psi]_0 = 0$ . Тогда соотношения (21) гарантируют равенства  $\varphi_{j-1,j} = 0$  для  $j > 1$ . Возьмем  $\psi \in M_{1,j}$  с  $j \geq 4$  (т. е.  $1 \leq [(j-2)/2]$ ). Используя (21) и (22), придем к соотношениям

$$M_{j-2,j} \cap M_{1,j} = \{0\}, \quad M_{1,j}[\perp]M_{l,j} \quad (l < j-2), \quad M_{1,j}[\perp]M_{l,r} \quad (l \leq r-2, r \neq j).$$

Поскольку  $j \geq 4$ , подпространство  $M_{1,j}$  нейтрально и равенство  $[\varphi, \psi]_0 = 0$  влечет, что  $[\varphi_{j-2,j}, \psi]_0 = 0$ . Тогда  $\varphi_{j-2,j} = 0$ . Сейчас предположим, что  $j \geq 6$  и  $\psi \in M_{2,j}$  (т. е.  $2 \leq [(j-2)/2]$ ). Используя вышеприведенные рассуждения, придем к равенству  $\varphi_{j-3,j} = 0$  для  $j \geq 6$ . Повторяя рассуждения, мы можем заключить, что

$$\varphi_{j-i,j} = 0 \quad \forall i \leq [(j-2)/2] \text{ и } j \leq s.$$

Тогда

$$\varphi = \sum_{k=0}^{[(s-1)/2]} \varphi_{k,2k+1}^-.$$

Отметим, что (см. (22))  $\varphi_{k,2k+1}^-[\perp]\varphi_{l,2l+1}^-$  для  $k \neq l$ . Далее,

$$[\varphi, \varphi]_0 = \sum_{k=0}^{[(s-1)/2]} [\varphi_{k,2k+1}^-, \varphi_{k,2k+1}^-]_0 \geq 0.$$

По построению подпространств  $M_{k,2k+1}$  имеем  $\varphi_{k,2k+1}^- = 0$  для каждого  $k$ . Таким образом,  $\varphi = 0$ , и доказательство утверждения для линейала  $L_0(A)$  завершено. Подпространство  $M^-$  может быть построено по аналогии. Например, мы можем положить

$$M^- = \text{Lin}\{M_{i,j}, i \leq [(j-2)/2]; M_{[(j-1)/2],j}^-, j \text{ нечетно}\}.$$

По построению подпространства  $M^\pm$  обладают свойством

$$M^\pm \in D(A^c), \quad A^c f = -A f \quad (\forall f \in M^\pm). \tag{23}$$

Используя лемму 4, найдем максимальные неотрицательное и неположительное подпространства  $F_{0b}^\pm$  пространства  $F_{0b}$ , инвариантные относительно  $A$ , такие, что

$$F_{0b} = F_{0b}^+ + F_{0b}^- \quad (\text{сумма прямая}).$$

Рассмотрим  $L_{\lambda_i}(A)$ . По доказанному мы можем найти подпространства  $M_i^\pm$ , инвариантные относительно  $A$ , являющиеся максимальными неотрицательным и неположительным подпространствами  $L_{\lambda_i}(A)$ , инвариантными относительно  $A|_{L_{\lambda_i}(A)}$ , причем имеет место равенство (23). По следствию 2.18 в [18, гл. 2, § 2]  $M_i^+[\perp]M_j^+$  при  $i \neq j$  (и  $M_i^-[\perp]M_j^-$  при  $i \neq j$ ). Следовательно, подпространство  $F_{0a}^+ = \text{Lin}\{M_i^+, i = 1, 2, \dots, m\}$  — максимальное неотрицательное подпространство пространства  $F_{0a}$ , инвариантное относительно  $A$ . Соответственно подпространство  $F_{0a}^- = \text{Lin}\{M_i^-, i = 1, 2, \dots, m\}$  — максимальное неположительное подпространство пространства  $F_{0a}$ , инвариантное относительно  $A$ . Покажем, что  $F_{0a}^\pm[\perp]F_{0b}$ . Поскольку  $R(P_\gamma) = \text{Lin}\{L_{\lambda_i}(A), i = 1, 2, \dots, m\}$ ,  $R(P_\gamma^c) = \text{Lin}\{L_{\lambda_i}(A^c), i = 1, 2, \dots, m\}$  и  $F_{0a}^\pm \subset R(P_\gamma) \cap R(P_\gamma^c)$ , имеем  $P_\gamma f = P_\gamma^c f$  для каждого  $f \in F_{0a}^\pm$ . Тогда

$$[x, y]_0 = [P_\gamma^c x, y]_0 = [P_\gamma^c x, (I - P_\gamma)y]_0 = 0,$$

где  $x \in F_{0a}^\pm$  и  $y \in F_{0b}$ . Таким образом,  $F_{0a}^\pm[\perp]F_{0b}$ . Этот факт гарантирует, что подпространства

$$F^+ = F_{0b}^+ + F_{0a}^+, \quad F^- = F_{0b}^- + F_{0a}^-$$

суть максимальные неположительное и неотрицательное подпространства, инвариантные относительно  $A$ . Доказательство завершено.

**Лемма 7.** При выполнении (7) операторы  $V^+ = E^+$ ,  $V^- = E^-$  осуществляют изоморфное отображение подпространств  $F^+$ ,  $F^-$  на подпространства  $F_0^+$ ,  $F_0^-$  соответственно.

Утверждение вытекает из теорем 4.1 и 4.5 в [18, гл. 1, § 2].

**Замечание 2.** Пусть выполнено (7) и можно построить подпространства  $F^\pm$  так, что  $F^+ \cap F^- = \{0\}$ . Тогда оператор  $V = E^+P_0^+ + E^-P_0^-$ , где  $P_0^\pm$  — проекторы, отвечающие разложению  $F_0 = F^+ + F^-$  в прямую сумму, осуществляет изоморфизм  $F_0$  на себя и  $(V^\pm)^{-1} = V^{-1}|_{F_0^\pm}$ . В теории переноса и кинетической теории оператор  $V^{-1}$  называется оператором альбедро (см., например, [5]).

## 2. Теоремы существования и единственности

Пусть  $u$  — решение уравнения (1), заданное на интервале  $(0, \infty)$ , из пространства  $W_{\text{loc}} = \{u \in L_2(0, T; H_1) : (Bu)_t \in L_2(0, T; H_1') \text{ для любого } T > 0\}$ . Применяя проекторы  $\tilde{S}^*$ ,  $I - \tilde{S}^*$  к уравнению (1), приходим к системе

$$LSu = \tilde{S}f, \quad \text{т. е. } Su = L^{-1}\tilde{S}^*f, \quad B \frac{d}{dt}(I - S)u - L(I - S)u = (I - \tilde{S}^*)f.$$

В силу свойств проектора  $\tilde{S}$  найдется  $g \in F_{-1}$  такое, что  $(I - \tilde{S}^*)f = Bg$ . Таким образом, уравнение (1) сведется к системе

$$Su = L^{-1}\tilde{S}^*f, \quad \frac{d}{dt}v - Av = g, \quad v = (I - S)u. \quad (24)$$

Рассмотрим граничное условие

$$E^+u(0) = u_0^+. \quad (25)$$

Используя лемму 5 и теорию полугрупп (см. [23]), ограниченную на  $\infty$  компоненту решения уравнения (24) (она убывает на  $\infty$ ) из подпространства  $F_{0b}$

можно записать в виде (при условии, что  $g \in L_2(0, T; F_{-1})$ , а это выполнено, если  $f \in L_2(0, \infty; H_1')$ )

$$u_1 = e^{A^+t} P^+(I - P_\gamma)u(0) + g_1(t), \tag{26}$$

$$g_1(t) = \int_0^t e^{(t-\xi)A^+} P^+(I - P_\gamma)g(\xi) d\xi - \int_t^\infty e^{(t-\xi)A^-} P^-(I - P_\gamma)g(\xi) d\xi.$$

Пусть  $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s\} = \sigma(A) \cap i\mathbb{R}$  и  $u_{i,j}^r$  ( $r = 1, 2, \dots, s; i = 1, \dots, N_r; j = 0, 1, \dots, p_i^r - 1$ ) — базис в  $L_{\lambda_r}(A)$ , состоящий из цепочек с.п.э. оператора  $A$ , отвечающих собственному значению  $\lambda_r \in \sigma(A) \cap i\mathbb{R}$ . Без ограничения общности можем считать, что  $u_{i,j}^r \in F_{0a}^+$  при  $i < [(p_i^r - 2)/2]$ ,  $u_{i,j}^r \in F_{0a}^+$  или  $u_{i,j}^r \in F_{0a}^-$  при  $i = [(p_i^r - 1)/2]$  и  $p_i^r$  нечетно, где  $F_{0a}^\pm$  — подпространства, построенные в конце доказательства леммы 6. Тогда компонента решения (24) из подпространства  $F_{0a}$  [26] записывается в виде

$$u_2 = \sum_{r,k,j} c_{k,j}^r \tilde{u}_{k,j}^r(t) + g_2(t) = \tilde{u}_2 + g_2(t), \tag{27}$$

где

$$\tilde{u}_{k,j}^r = \sum_{l=0}^j e^{\lambda_r t} u_{k,j-l}^r \frac{t^l}{l!}, \quad k = 1, 2, \dots, N_r, \quad j = 0, 1, \dots, p_k^r - 1,$$

$$g_2(t) = - \sum_{r=1}^s \sum_{i=1}^{N_r} \sum_{k=0}^{p_i^r-1} \left( \int_t^\infty \sum_{j=k}^{p_i^r-1} e^{\lambda_r(t-\tau)} g_{i,j}^r(\tau) \frac{(t-\tau)^{j-k}}{(j-k)!} d\tau \right) u_{i,k}^r$$

и  $g_{i,j}^r(\tau)$  — коэффициенты разложения  $P_\gamma g(t)$  по базису  $u_{i,j}^r$ .

Исследуем свойства решений  $u_1(t), u_2(t)$ , предполагая, что условие (7) выполнено. Теория полугрупп, вообще говоря, не дает точных результатов. Мы будем использовать результаты Гривара (см. [27] и библиографию в ней). Рассмотрим оператор  $A : F_0 \rightarrow F_0$  и положим  $D(A^k) = W_{2k}$  ( $k = 0, 1, \dots$ ). При целых  $k < 0$  определим пространства  $W_{2k}$  как пополнение  $F_0$  по нормам  $\|u\|_{W_{2k}} = \|(A - \lambda I)^{-k} u\|_{F_0}$  ( $\lambda \in \rho(A)$ ). Рассмотрим оператор  $A$  как неограниченный оператор в  $F_{-1}$  со значениями в  $F_{-1}$  и областью определения  $F_1$ . Аналогично определим пространства  $W_{2k-1}$  для целых  $k$ . В частности, при  $k > 0$

$$W_{2k-1} = D(A^k) = \{u \in F_{-1} : A^l u \in F_{-1} \text{ для всех } l \leq k\}.$$

Фиксируем целое  $k > 0$  и положим  $\tilde{B}^s = (W_{2k}, W_{-2k})_{\theta,2}$  ( $(1 - \theta)2k - 2k\theta = s, -2k < s < 2k$ ). Аналогично положим  $B^s = (W_{2k-1}, W_{-2k+1})_{\theta,2}$  ( $(1 - \theta)(2k - 1) - (2k - 1)\theta = s, -2k + 1 < s < 2k - 1$ ). Эти пространства и их свойства приведены в [28, § 5]. Определение Гривара немного отличается от нашего, но в результате получим те же пространства.

Доказательство следующей леммы использует свойства пространств  $B^s$  и  $\tilde{B}^s$ , приведенные в [28, § 5]. Мы его опустим.

**Лемма 8.** При выполнении (7) интерполяционные шкалы  $B^s$  и  $\tilde{B}^s$  совпадают. Тогда  $B^s = W_s$  при четных  $s$ . Если дополнительно

$$(D(A), F_0)_{1/2,2} = F_1, \tag{28}$$

то  $B^s = W_s$  при нечетных  $s$ .

Отметим, что (28) всегда выполнено, если оператор  $A$   $J$ -самосопряжен в  $F_0$ .

**Лемма 9.** Пусть выполнено условие (7),  $g(t) \in L_2(0, \infty; B^s)$  ( $s \in \mathbb{R}$ ),  $P^+(I - P_\gamma)u(0) \in B^{s+1}$ . Тогда компонента решения  $u_1(t)$  обладает свойством

$$u_1(t) \in L_2(0, \infty; B^{s+2}), \quad u_{1t} \in L_2(0, \infty; B^s), \quad u_1(t) \in C([0, \infty); B^{s+1}).$$

Доказательство вытекает из результатов работы [27] и леммы 7.

Будем искать решение задачи (1), (25) из пространства  $W_{\text{loc}}$ , убывающее на  $\infty$  или ограниченное на  $\infty$ . Поясним, что мы имеем в виду. Из вышеприведенных рассуждений вытекает, что решение представимо в виде трех компонент  $u = u_1(t) + u_2(t) + Su(t)$ . Если  $f(t) \in L_2(0, \infty; H'_1)$ , легко увидеть, что  $g(t) \in L_2(0, \infty; F_{-1})$ . Если также  $P^+(I - P_\gamma)u(0) \in F_0$ , то из леммы 9 при  $s = -1$ , получим вложение  $u_1(t) \in L_2(0, \infty; F_1)$  (и, следовательно,  $u_1(t) \in L_2(0, \infty; H_1)$ ) и  $u_{1t} \in L_2(0, \infty; F_{-1})$ . Из теорем о следах (см., например, [21, пп 1.8.3, 1.8.5]) имеем  $u_1(t) \in C([0, \infty); F_0)$ , т. е.  $|B|^{1/2}u_1 \in C([0, \infty); E)$ . Более того, из формулы Ньютона — Лейбница, примененной к функции  $\| |B|^{1/2}u_1(t) \|^2$ , вытекает, что существует

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \| |B|^{1/2}u_1(t) \| = 0.$$

Кроме того, ограниченная на  $\infty$  (в том смысле, что  $\| |B|^{1/2}u_1(t) \| \in L_\infty(0, \infty)$ ) компонента решения  $u_1$  из подпространства  $F_{0b}$  всегда представима в виде (26). Компонента решения  $Su(t)$  принадлежит  $\ker B$  при почти всех  $t \in (0, \infty)$  и обладает свойствами: если  $f(t) \in L_\infty(0, \infty; H'_1)$  (или хотя бы  $\tilde{S}^*f(t) \in L_\infty(0, \infty; H'_1)$ ), то  $Su(t) \in L_\infty(0, \infty; H_1)$ ; если  $f(t) \in L_2(0, \infty; H'_1)$  (или хотя бы  $\tilde{S}^*f(t) \in L_2(0, \infty; H'_1)$ ), то  $Su(t) \in L_2(0, \infty; H_1)$ . Компонента решения  $u_2(t)$  растет полиномиальным образом при  $t \rightarrow \infty$  и представима в виде суммы функций, первая из которых принадлежит  $C^\infty([0, \infty); H_1)$ , дифференциальные свойства второй определяются свойствами функции  $f(t)$ : если  $f(t) \in L_2(0, \infty; H'_1)$  и  $P_\gamma g(t)(1+t)^l \in L_1(0, \infty; H'_1)$  ( $l = \max_{i,r} p_i^r - 1$ ), то функция  $g_2(t)$  в (27) принадлежит  $C([0, \infty); H_1)$ ,  $\max_{t>0} \|g_2(t)\|_{H_1} < \infty$ ,  $g_2 \in L_{2,\text{loc}}(0, \infty; H_1)$  и  $g_{2t} \in L_2(0, \infty; H_1)$ ; если дополнительно  $P_\gamma g(t)(1+t)^{l+\varepsilon} \in L_1(0, \infty; H'_1)$  ( $\varepsilon > 1/2$ ), то  $\|g_2(t)\|_{H_1} \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow \infty$  и  $g_2 \in L_2(0, \infty; H_1)$ ; если  $\varepsilon > 0$ , то  $\|g_2(t)\|_{H_1} \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow \infty$ .

Под убывающим на  $\infty$  решением задачи (1), (25) мы понимаем решение  $u(t) = u_1 + u_2 + Su$  из класса  $W_{\text{loc}}$  такое, что функция  $Su(t) \in L_2(0, \infty; H_1)$  и существует  $\lim_{t \rightarrow \infty} \| |B|^{1/2}(u_1(t) + u_2(t)) \| = 0$ .

Под ограниченным на  $\infty$  решением задачи (1), (25) мы понимаем решение  $u(t) = u_1 + u_2 + Su$  из класса  $W_{\text{loc}}$  такое, что  $Su(t) \in L_\infty(0, \infty; H_1)$  и  $\overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \| |B|^{1/2}(u_1(t) + u_2(t)) \| < \infty$ .

Положим  $M_0 = \text{Lin}\{\ker(A - \lambda_i I), i = 1, \dots, s\}$ ,  $l_0 = \dim M_0$ ,  $l_1 = \dim F_{0a}^+$ ,  $g_0(t) = g_1(t) + g_2(t)$ .

**Теорема.** Пусть выполнены (7) и (28). Для того чтобы для данного элемента  $u_0^+ \in F_0^+$  и данной правой части  $f$  такой, что  $f \in L_2(0, \infty; H'_1)$ ,  $P_\gamma g(t)(1+t)^{l+\varepsilon} \in L_1(0, \infty; H'_1)$  ( $(I - \tilde{S}^*)f = Bg$ ,  $l = \max_{1 \leq r \leq s, 1 \leq i \leq N_r} (p_i^r - 1)$ ,  $\varepsilon > 0$ ) существовало решение задачи (1), (25) из пространства  $W_{\text{loc}}$ , убывающее на  $\infty$ , необходимо и достаточно, чтобы

$$P_\gamma(V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0)) = 0.$$

В этом случае  $\tilde{u}_2(t) = 0$ .

Для того чтобы для данного элемента  $u_0^+ \in F_0^+$  и данной правой части  $f$  такой, что  $(I - \tilde{S}^*)f \in L_2(0, \infty; H'_1)$ ,  $P_\gamma g(t)(1+t)^l \in L_1(0, \infty; H'_1)$  ( $(I - \tilde{S}^*)f =$

$Bg$ ,  $l = \max_{1 \leq r \leq s, 1 \leq i \leq N_r} (p_i^r - 1)$  и  $\tilde{S}^* f \in L_\infty(0, \infty; H_1^l)$  существовало решение задачи (1), (25) из пространства  $W_{\text{loc}}$ , ограниченное на  $\infty$ , необходимо и достаточно, чтобы

$$P_\gamma(V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0)) \in P_\gamma(V^+)^{-1}E^+M_0. \quad (29)$$

Задача о существовании ограниченного решения безусловно разрешима тогда и только тогда, когда отображение  $P_\gamma(V^+)^{-1}E^+ : M_0 \rightarrow F_{0a}^+$  — отображение «на». Ограниченное решение единственно тогда и только тогда, когда  $\ker P_\gamma(V^+)^{-1}E^+ = \{0\}$ . В частности, решение всегда существует для любых данных задачи, если длины цепочек с.п.э., соответствующих мнимым собственным значениям, не превышают 2. Единственность этого решения имеет место, например, в случае  $M_0 = F_{0a}^+$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $u(t)$  — убывающее на  $\infty$  решение задачи (1), (25). Имеем  $u(t) = u_1(t) + u_2(t) + Su$ , где свойства функций  $u_i$  ( $i = 1, 2$ ) описаны выше, перед теоремой. По условию  $E^+(u(0)) = E^+(u_1(0) + u_2(0)) = u_0^+$ . Запишем элемент  $u^0 = u_1(0) + u_2(0)$  в виде

$$u^0 = u_2^+ + u_2^- + u_1^+ + g_0(0), \quad u_2^+ \in F_{0a}^+, \quad u_2^- \in (F_{0a}^+)^{\perp} \cap F_{0a}, \quad u_1^+ \in F_{0b}^+.$$

Тогда начальное условие запишется в виде  $E^+(u_2^+ + u_1^+) = E^+(u_0^+ - g_0(0) - u_2^-)$  или в виде

$$u_2^+ + u_1^+ = (V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0) - u_2^-).$$

Применяя операторы  $P_\gamma$ ,  $(I - P_\gamma)$  к этому равенству, придем к соотношениям

$$u_1^+ = (I - P_\gamma)(V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0) - u_2^-), \quad (30)$$

$$P_\gamma(V^+)^{-1}E^+(u_2^+ + u_2^-) = P_\gamma(V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0)). \quad (31)$$

Из убывания решения  $u$  и линейной независимости полиномов  $\tilde{u}_{i,j}^t(t)$  вытекает, что  $\tilde{u}_2(t) = 0$ . Тогда из (31) получим  $P_\gamma(V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0)) = 0$ . Если это условие выполнено, то, полагая  $\tilde{u}_2 = 0$  и определяя затем элемент  $u_1^+$  из (30), найдем и функцию  $u_1(t)$  в соответствии с (26).

Пусть  $u(t)$  — ограниченное на  $\infty$  решение. Аналогично придем к соотношениям (30), (31). Однако решение  $u_2(t)$  будет ограниченным на  $\infty$  тогда и только тогда, когда  $u_2^+ + u_2^- \in M_0$ . Это вместе соотношениями (30), (31) и рассуждениями, приведенными перед теоремой, гарантирует вторую часть утверждения.

Если длина цепочек с.п.э., соответствующих мнимым собственным значениям, не превышает 2, то  $F_{0a}^+ \subset M_0$  (по построению). В этом случае, взяв произвольный элемент  $u_2^-$  с вышеуказанными свойствами, определяя элемент  $u_2^+ = P_\gamma(V^+)^{-1}E^+(u_0^+ - g_0(0) - u_2^-)$  и пользуясь первым из соотношений (30), мы полностью находим решение из (26), (27). В случае  $M_0 = F_{0a}^+$  элемент  $u_2^-$  всегда равен нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. В силу максимальности различные подпространства  $F_{0a}^+$  имеют одинаковую размерность [18, гл. 1, § 4] и возникающие в теореме условия ортогональности на самом деле не зависят от способа построения подпространства  $F_{0a}^+$  и соответственно оператора  $V^+$ . Это вытекает из утверждения теоремы. Отметим также, что мера неединственности ограниченного решения задачи (1), (25) равна величине  $l_0 - l_1$ .

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Аналогично исследуются и другие возможные постановки краевых задач для уравнения (1). Представления решений, приведенные

выше, позволяют исследовать также вопрос о гладкости решений краевых задач. Однако отметим, операторы  $V^+$  и  $V^-$  (соответственно оператор альбеда  $V^{-1}$ ), являющиеся изоморфизмами соответствующих подпространств пространства  $B^0 = F_0$  (пространства  $F_0$ ), не являются изоморфизмами соответствующих подпространств пространств  $B^s$  при всех  $s$ . В общем случае это выполнено лишь в некоторой окрестности точки  $s = 0$ .

ПРИМЕР. Система уравнений, описывающих многогрупповой перенос нейтронов, при некоторых предположениях имеет вид [29]

$$x u_t(x, t) = -A u(x, t) + \frac{1}{2} C \int_{-1}^1 u(y, t) dy + f(x, t), \quad x \in (-1, 1), \quad t \in (0, \infty),$$

где  $u(x, t) = (u_1(x, t), \dots, u_n(x, t))^T$ , матрица  $A = \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\}$  с  $a_i > 0$   $i = 1, \dots, n$ , а матрица  $(A - C)$  обладает свойством  $(A - C) + (A - C)^* \geq 0$  (причем  $\ker(A - C) \neq \{0\}$ ). Пусть

$$E = \bigotimes_{i=1}^n L_2(-1, 1).$$

Определим операторы

$$B u(x) = x u(x), \quad L u(x) = -A u(x) + \frac{1}{2} C \int_{-1}^1 u(y) dy.$$

Тогда  $\ker B = \{0\}$  и

$$\ker L = \{u(x) = v \mid (A - C)v = 0\},$$

$$L_0 = \{u(x) = v - x A^{-1} w \mid (A - C)v = (A - C)w = 0\}.$$

Все необходимые предположения выполнены, причем в этом случае длины цепочек с.п.э., соответствующих  $\lambda = 0$ , равны 2.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Beals R. An abstract treatment of some forward-backward problems of transport and scattering // J. Funct. Anal. 1979. V. 34, N 1. P. 1–20.
2. Case K. M., Zweifel P. F. Linear transport theory. Mass.: Addison-Wesley, 1969.
3. Cercignani C. Mathematical methods in kinetic theory. New York: Pergamon Press, 1969.
4. Cercignani C. Theory and Applications of the Boltzmann Equation. New York: Elsevier, 1975.
5. Greenberg W., Van der Mee C. V. M., Zweifel P. F. Generalized kinetic equations // Integral Equations Operator Theory. 1984. V. 7, N 1. P. 60–95.
6. Greenberg W., Van der Mee C. V. M., Protopopescu V. Boundary value problems in abstract kinetic theory. Basel: Birkhäuser, 1987.
7. Kaper H. G., Lekkerkerker C. G., Hejtmanek J. Spectral methods in linear transport theory. Basel; Boston; Stuttgart: Birkhauser Verl., 1982.
8. Latrach K., Mokhtar-Kharroubi M. Spectral analysis and generation results for streaming operator with multiplying boundary conditions // Positivity. 1999. V. 3, N 2. P. 273–296.
9. Van der Mee C. V. M. Semigroups and factorization methods in transport theory. Amsterdam: Math. Centre Tract., 1981. V. 146.
10. Latrach K. Compactness properties for linear transport operator with abstract boundary conditions in slab geometry // Transport Theory Statist. Phys. 1993. V. 22. P. 39–65.
11. Latrach K., Mokhtar-Kharroubi M. On an unbounded linear operator arising in the theory of growing cell population // J. Math. Anal. Appl. 1997. V. 211. P. 273–294.

12. *Webb G.* A model of proliferating cell population with inherited cycle length // *J. Math. Biol.* 1986. V. 23. P. 269–282.
13. *Кислов Н. В.* Неоднородные краевые задачи для дифференциально-операторного уравнения смешанного типа и их приложения // *Мат. сб.* 1984. Т. 125, № 1. С. 19–37.
14. *Пятков С. Г.* Свойства собственных функций одной спектральной задачи и некоторые их приложения // *Некоторые приложения функционального анализа к задачам математической физики: Сб. науч. тр. / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики. Новосибирск, 1986.* С. 65–84.
15. *Egorov I. E.* On smoothness of a solution to a nonlocal boundary value problem for an operator-differential equation with variable time direction // *Мат. заметки ЯГУ.* 1995. V. 2, N 1. P. 98–104.
16. *Egorov I. E.* Solvability of a nonlocal boundary value problem for an operator-differential equation of mixed type // *Мат. заметки ЯГУ.* 1995. V. 2, N 2. P. 61–72.
17. *Пятков С. Г., Абашеева Н. Л.* Разрешимость краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений смешанного типа // *Сиб. мат. журн.* 2000. Т. 41, № 6. С. 1419–1435.
18. *Азизов Т. Я., Иохвидов И. С.* Основы теории линейных операторов в пространствах с индефинитной метрикой. М.: Наука, 1986.
19. *Гохберг И. Ц., Крейн М. Г.* Основные положения о дефектных числах, корневых числах и индексах линейных операторов // *Успехи мат. наук.* 1957. Т. 12, № 2. С. 43–118.
20. *Далецкий Ю. Л., Крейн М. Г.* Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. М.: Наука, 1970.
21. *Трибель Х.* Теория интерполяции. Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. М.: Мир, 1980.
22. *Красносельский М. А., Забрейко П. П., Пустыльник Е. И., Соболевский П. Е.* Интегральные операторы в пространствах суммируемых функций. М.: Наука, 1966.
23. *Grisvard P.* An approach to the singular solutions of elliptic equations via the theory of differential equations in Banach spaces. // *Differential Equations in Banach Spaces. Lect. Notes in Math.* 1986. V. 1223. P. 131–155.
24. *Пятков С. Г.* Базисность по Риссу собственных и присоединенных элементов линейных самосопряженных пучков // *Мат. сб.* 1994. Т. 185, № 3. С. 93–116.
25. *Dore G., Venni A.* Separation of two (possibly unbounded) components of the spectrum of a linear operator // *Integral Equations Operator theory.* 1989. V. 12, N 4. P. 470–485.
26. *Гантмахер Ф. Р.* Теория матриц. М.: Наука, 1988.
27. *Da Prato G., Grisvard P.* Sommes d'opérateurs linéaires et équations différentielles opérationnelles // *J. Math. Pures Appl. Ser IX.* 1975. V. 54, N 3. P. 305–387.
28. *Grisvard P.* Commutative de deux foncteurs d'interpolation et applications // *J. Math. Pures et Appliq.* 1966. V. 45, N 2. P. 144–206.
29. *Greenberg W.* Functional calculus for the symmetric multigroup transport operator // *J. Math. Phys.* 1976. V. 17. P. 159–162.

*Статья поступила 18 февраля 2000 г.*

*Пятков Сергей Григорьевич, Абашеева Нина Леонидовна  
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск 630090  
pyatkov@math.nsc.ru, anl@math.nsc.ru*