

УДК 510.67

## ОДНОРОДНЫЕ МОДЕЛИ И СТАБИЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ

К. Ж. Кудайбергенов

**Аннотация:** Изучен некоторый фрагмент теории стабильности в категории  $D$ -множеств. Приведены условия существования  $D$ -однородных моделей сколь угодно больших мощностей. Доказана теорема категоричности для класса  $(D, \lambda)$ -однородных моделей.

**Ключевые слова:** теория стабильности, теорема категоричности

### Введение

В работе изучается некоторый фрагмент теории стабильности в категории  $D$ -множеств, т. е. подмножеств моделей некоторой фиксированной теории  $T$ , в которых реализуются только типы из данного семейства  $D$ . Такого рода деятельность начата и глубоко развита в работах С. Шелаха [1, 2]. В работах [3–7] автор изучал  $(D, \lambda)$ -однородные модели стабильных теорий, используя методы и результаты из [1, 2]. Стабильность теории нужна была, чтобы можно было использовать средства теории стабильности типа рангов и форкинга. Но уже после работы [1] стало ясно, что если подобные средства имеются внутри категории  $D$ -множеств, то стабильность теории не нужна. В 1994 г. автор попробовал переизложить (или, точнее, распространить на новую ситуацию) с помощью одного из вариантов ранга Морли часть работы [3], не выходя за пределы категории  $D$ -множеств. Полученная теория почти дословно повторяла (для более общего случая) классическую теорию тотальной трансцендентности (см. [8]) и изложение в [3], так что автор отложил свои наброски на неопределенное время. Но недавно Б. И. Зильбер, которому автор искренне благодарен, сообщил о возросшем интересе к однородным моделям и о большом числе новых работ по теории стабильности для классов подмоделей достаточно большой однородной модели. Осознав опасность, что его результаты могут быть перекрыты, автор решил опубликовать полученные к этому времени результаты.

В § 1 содержатся предварительные сведения о категории, в которой мы работаем: определения  $D$ -множества,  $D$ -модели,  $D$ -типа и т. п. В § 2 дается определение ранга  $D$ -типа и перечисляются некоторые его простейшие свойства. В следующих параграфах предполагается, что ранг любого  $D$ -типа меньше  $\infty$ . В § 5, 6 некоторые результаты работы [3] распространяются на новую ситуацию: приводятся условия существования  $D$ -однородных моделей сколь угодно больших мощностей и доказывается теорема категоричности для класса  $(D, \lambda)$ -однородных моделей. В § 3, 4 доказываются необходимые для этого технические утверждения о существовании и свойствах неразличимых множеств в  $D$ -моделях и утверждения о существовании  $(D, \lambda)$ -простых моделей.

Заметим, что мы не предполагаем заранее существования большой  $D$ -однородной модели.

Изложение вполне замкнуто, все утверждения приводятся с полными доказательствами.

### § 1. Предварительные сведения

Пусть  $T$  — полная теория языка  $L$ , имеющая бесконечные модели. Мы будем работать в некоторой достаточно насыщенной модели теории  $T$ . Все элементы (множества) будут элементами (подмножествами) этой модели. Модели обозначаем через  $M, N$ . Мы не делаем различий в обозначениях между моделью и ее универсумом. Через  $L(A)$  обозначим обогащение языка  $L$  именами элементов множества  $A$ .

Мы используем обозначения из [1]. Пусть  $D(A)$  — множество всех типов над  $\emptyset$ , реализуемых конечными последовательностями элементов множества  $A$ , и пусть  $D$  — множество вида  $D(M)$ , где  $M$  — модель. Множество  $A$  называется  $D$ -множеством, если  $D(A) \subseteq D$ , модель  $N$  —  $D$ -моделью, если  $D(N) = D$ . Множество  $D$  называется *конечной диаграммой*; для краткости будем называть его *диаграммой*. Через  $D(T)$  обозначается диаграмма  $\omega$ -насыщенной модели теории  $T$ .

Мы будем рассматривать только полные типы. Будем говорить, что  $p$  — *тип над  $A$* , и писать  $\text{dom}(p) = A$ , если  $p$  — максимальное совместное множество формул с параметрами из  $A$ . Через  $p|B$  будем обозначать ограничение  $p$  на  $B$ , т. е. тип над  $B$ , содержащийся в  $p$ .

Тип  $p$  над  $A$  называется  $D$ -*типом над  $A$* , если для некоторого (эквивалентно, любого) элемента  $a$ , реализующего  $p$ , множество  $A \cup \{a\}$  является  $D$ -множеством.

Элементарные отображения называем *морфизмами* (это действительно морфизмы в категории  $D$ -множеств). Морфизмы естественным образом действуют на множестве  $D$ -типов.

Следующий очевидный факт очень важен.

**Лемма 1.0.** (1) Семейство всех  $D$ -типов замкнуто относительно подтипов и объединений цепей.

(2) Тип  $p$  является  $D$ -типом тогда и только тогда, когда для любого конечного  $B \subseteq \text{dom}(p)$  тип  $p|B$  будет  $D$ -типом.

Множество всех  $D$ -типов над  $A$  обозначим через  $S_D(A)$ , мощность множества  $A$  — через  $|A|$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** (i) Диаграмма  $D$  называется  $\lambda$ -стабильной, если  $|S_D(A)| \leq \lambda$  для любого  $A$  мощности  $|A| \leq \lambda$ .

(ii) Диаграмма  $D$  называется *стабильной*, если она  $\lambda$ -стабильна для некоторого  $\lambda$ .

Напомним определение однородной модели.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** (1) Модель  $M$  называется  $\lambda$ -однородной, если для любого  $A \subseteq M$  мощности  $|A| < \lambda$  и любого  $a \in M$  каждый морфизм из  $A$  в  $M$  продолжается до морфизма из  $A \cup \{a\}$  в  $M$ .

(2) Модель  $M$  называется *однородной*, если она  $|M|$ -однородна.

(3) Модель  $M$  называется  $(D, \lambda)$ -однородной, если  $D(M) = D$  и  $M$   $\lambda$ -однородна.

(4) Модель  $M$  называется  $D$ -однородной, если  $D(M) = D$  и  $M$  однородна.

Следующий результат Кейслера и Морли [9] играет фундаментальную роль при изучении однородных моделей.

**Лемма 1.1.** *Если модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна и  $D$ -множества  $A \subseteq B$  таковы, что  $|A| < \lambda$  и  $|B| \leq \lambda$ , то любой морфизм из  $A$  в  $M$  продолжается до морфизма из  $B$  в  $M$ .*

Отсюда вытекает следующая

**Лемма 1.2.** *Модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна тогда и только тогда, когда  $D(M) \subseteq D$  и для любого  $A \subseteq M$  мощности  $|A| < \lambda$  каждый  $D$ -тип над  $A$  реализуется в  $M$ .*

## § 2. Ранг

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** *Ранг  $D$ -типа  $p$  над конечным множеством определим следующим образом.*

- (1)  $R_D(p) \geq 0$  для любого такого  $p$ ;
- (2)  $R_D(p) \geq \delta$ , где  $\delta$  — предельный ординал, если  $R_D(p) \geq \alpha$  для всех  $\alpha < \delta$ ;
- (3)  $R_D(p) \geq \alpha + 1$ , если существуют несовместимые  $D$ -типы  $p_0, p_1$  над конечными множествами такие, что  $R_D(p_i) \geq \alpha$  и  $p \subseteq p_i$ ,  $i < 2$ .

Если  $R_D(p) \geq \alpha$  и неверно, что  $R_D(p) \geq \alpha + 1$ , то пишем  $R_D(p) = \alpha$ . Если  $R_D(p) \geq \alpha$  для всех  $\alpha$ , то пишем  $R_D(p) = \infty$ .

В общем случае полагаем

$$R_D(p) = \min\{R_D(p|B) : B \subseteq \text{dom}(p), |B| < \omega\}.$$

**Лемма 2.1.** (i)  $R_D(p) = 0 \iff$  в любой  $D$ -модели тип  $p$  реализуется единственным элементом.

- (ii) Если  $p \subseteq q$ , то  $R_D(q) \leq R_D(p)$ .
- (iii) Если существует тип ранга  $\alpha$  и  $\beta < \alpha$ , то существует тип ранга  $\beta$ .
- (iv) Если  $p \in S_D(A)$  и  $f$  — морфизм с  $\text{dom}(f) = A$ , то  $R_D(p) = R_D(f(p))$ .
- (v) Если  $p \subseteq q \subseteq p'$  и  $R_D(p) = R_D(p')$ , то  $R_D(p) = R_D(q)$ .
- (vi) Существует ординал  $\alpha$  такой, что  $R_D(p) \geq \alpha$  влечет  $R_D(p) = \infty$  для любого  $D$ -типа  $p$ . (Наименьший такой ординал  $\alpha$  обозначим через  $\alpha_D$ .)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО легко следует из определений.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Тип  $p \in S_D(A)$ , где  $|A| < \omega$ , назовем  $(D, \lambda)$ -стабильным, если для любого  $B \supseteq \text{dom}(p)$  мощности  $|B| \leq \lambda$  имеет место соотношение  $|\{q \in S_D(B) : p \subseteq q\}| \leq \lambda$ .

Ясно, что диаграмма  $D$   $\lambda$ -стабильна тогда и только тогда, когда каждый  $D$ -тип над конечным множеством  $(D, \lambda)$ -стабилен.

**Предложение 2.2.** Пусть  $p \in S_D(A)$ ,  $|A| < \omega$ .

(1) Пусть тип  $p$   $(D, \mu)$ -стабилен,  $\mu < 2^\omega$ , и предположим, что выполняется любое из следующих условий:

(а) если  $A \subseteq B \subseteq C$ ,  $D(C) \subseteq D$ ,  $|C| \leq \omega$  и  $p \subseteq q \in S_D(B)$ , то  $q$  содержится в  $D$ -типе над  $C$ ;

(б) если  $A \subseteq B \subseteq C$ ,  $D(C) \subseteq D$ ,  $|C| < \omega$ ,  $p \subseteq q \in S_D(B)$  и  $R_D(q) = \infty$ , то  $q$  содержится в  $D$ -типе над  $C$  ранга  $\infty$ .

Тогда  $R_D(p) < \infty$ .

(2) Если  $R_D(p) < \infty$ , то тип  $p$   $(D, \mu)$ -стабилен для любого  $\mu \geq |D|$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) Допустим противное. Построим  $D$ -типы  $p_s$ ,  $s \in {}^{\omega>}2$ , над конечными множествами такие, что

- (i) если  $s \subseteq t$ , то  $p_s \subseteq p_t$ ;
- (ii)  $p_{s_0}$  и  $p_{s_1}$  несовместимы;
- (iii)  $R_D(p_s) = \infty$ .

Полагаем  $p_\emptyset = p$ . Пусть тип  $p_s$  определен и  $R_D(p) \geq \alpha_D + 1$ . Тогда по определению существуют несовместимые типы  $p_{s_0}$  и  $p_{s_1}$  такие, что  $p_s \subseteq p_{s_i}$  и  $R_D(p_{s_i}) \geq \alpha_D$ ,  $i < 2$ . (Если выполняется условие (b), то можно считать, что  $\text{dom}(p_{s_0}) = \text{dom}(p_{s_1})$ .)

Полагая  $p_\eta = \bigcup_{n < \omega} p_{\eta|n}$ ,  $\eta \in {}^{\omega>}2$  (и расширяя  $p_\eta$ , если выполняется (a)), получим  $2^\omega$   $D$ -типов над счетным множеством  $\cup\{\text{dom}(p_s) : s \in {}^{\omega>}2\}$ , расширяющих  $p$ , что противоречит  $\mu$ -стабильности.

(2) Для каждого  $q \in S_D(B)$  ранга  $< \infty$  выберем конечное  $B_q \subseteq B$  такое, что  $R_D(q) = R_D(q|B_q)$ . По лемме 2.3 отображение  $q \mapsto q|B_q$  инъективно, поэтому

$$|\{q \in S_D(B) : p \subseteq q\}| \leq |\cup\{S_D(B_q) : R_D(q) < \infty\}| \leq |D| \cdot |B|,$$

откуда вытекает требуемое утверждение.

Предложение 2.2 доказано.

**Лемма 2.3.** Пусть  $q$  —  $D$ -тип ранга  $\alpha$ . Если  $p_0, p_1 \in S_D(A)$  — расширения  $q$  того же ранга, то  $p_0 = p_1$ . В частности, если  $q \subseteq p_i \in S_D(A_i)$  и  $R_D(q) = R_D(p_i)$ ,  $i < 2$ , а  $f : A_0 \rightarrow A_1$  — биективный морфизм, тождественный на  $\text{dom}(q)$ , то  $f(p_0) = p_1$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим противное. Можно считать, что множество  $\text{dom}(q)$  конечно. Тогда оно содержится в конечном  $B \subseteq A$  таком, что  $p_0|B \neq p_1|B$ . Так как  $q \subseteq p_i|B \subseteq p_i$ , то по лемме 2.1(v)  $R_D(q) = R_D(p_i|B) = \alpha$ , откуда по определению  $R_D(q) \geq \alpha + 1$ ; противоречие.

Лемма 2.3 доказана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Назовем диаграмму  $D$  почти тотально трансцендентной, если  $R_D(p) < \infty$  для любого  $D$ -типа  $p$ . Если  $D = D(T)$ , то теорию  $T$  тоже можно назвать почти тотально трансцендентной.

Заметим, что если  $T$  — теория счетного числа независимых унарных предикатов, то  $T$  почти тотально трансцендентна, но не тотально трансцендентна. Легко построить пример нестабильной теории  $T$  такой, что некоторая диаграмма  $D \subseteq D(T)$  почти тотально трансцендентна.

**Следствие 2.4.** (1) Если диаграмма  $D$   $\mu$ -стабильна,  $\mu < 2^\omega$  и для любого  $D$ -типа  $p$  над конечным множеством выполняется любое из условий (a) или (b) предложения 2.2, то  $D$  почти тотально трансцендентна.

(2) Если диаграмма  $D$  почти тотально трансцендентна, то  $D$   $\mu$ -стабильна для любого  $\mu \geq |D|$ .

СОГЛАШЕНИЕ. В дальнейшем  $D$  — почти тотально трансцендентная диаграмма.

### § 3. Неразличимые множества

**Лемма 3.1.** Если  $I$  — бесконечная неразличимая  $D$ -последовательность над  $A$ , то  $I$  — неразличимое множество над  $A$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Допустим противное. С помощью теоремы компактности Мальцева найдем плотно упорядоченную неразличимую  $D$ -последовательность большой мощности, имеющую еще большее число сечений, которые можно расширить до попарно различных  $D$ -типов. Это противоречит стабильности диаграммы  $D$ .

Лемма 3.1 доказана.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Пусть  $p \in S_D(A)$ . Последовательность  $I = \{a_i : i < \alpha\}$  называется *последовательностью Морли типа  $p$*  над  $A$ , если для любого  $i < \alpha$  тип  $p_i = \text{tr}(a_i/A \cup \{a_j : j < i\})$  является расширением типа  $p$  того же ранга.

**Предложение 3.2.** Если  $I = \{a_i : i < \alpha\}$  — бесконечная последовательность Морли над  $A$ , то  $I$  — неразличимое множество над  $A$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** В силу леммы 3.1 достаточно доказать, что  $(a_{i_k} : k \leq n)$  и  $(a_{j_k} : k \leq n)$  реализуют один и тот же тип над  $A$  для любых  $i_0 < \dots < i_n < \alpha$  и  $j_0 < \dots < j_n < \alpha$ . Это делается индукцией по  $n$ . При  $n = 0$  утверждение очевидно. По индуктивному предположению существует морфизм  $f : A \cup \{a_{i_k} : k < n\} \rightarrow A \cup \{a_{j_k} : k < n\}$ , тождественный на  $A$  и переводящий  $a_{i_k}$  в  $a_{j_k}$ . Пусть  $q_{s_n} = \text{tr}(a_{s_n}/A \cup \{a_{s_k} : k < n\})$ ,  $s \in \{i, j\}$ . Достаточно показать, что  $f(q_{i_n}) = q_{j_n}$ .

Так как  $p_0 \subseteq q_{s_n} \subseteq p_{s_n}$  и  $I$  — последовательность Морли, то по лемме 2.1(v)  $R_D(q_{s_n}) = R_D(p_0)$ ,  $s \in \{i, j\}$ . Тогда по лемме 2.3  $f(q_{i_n}) = q_{j_n}$ .

Предложение 3.2 доказано.

**Предложение 3.3.** Пусть  $I$  — неразличимое множество над  $A$ ,  $\bar{b}$  — конечный набор элементов такой, что  $\text{tr}(\bar{b}/A \cup I)$  —  $D$ -тип. Тогда существует конечное  $J \subseteq I$  такое, что  $I - J$  неразличимо над  $A \cup \bar{b} \cup J$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Выберем конечное  $J \subseteq I$  такое, что ранг типа  $p_J = \text{tr}(\bar{b}/A \cup J)$  равен рангу типа  $p_I = \text{tr}(\bar{b}/A \cup I)$ . Пусть  $I_0, I_1$  — конечные подмножества одинаковой мощности в  $I - J$ . Так как  $I$  неразличимо над  $A$ , то существует морфизм  $f : A \cup J \cup I_0 \rightarrow A \cup J \cup I_1$ , тождественный на  $A \cup J$ . Пусть  $p_i = \text{tr}(\bar{b}/A \cup J \cup I_i)$ ,  $i < 2$ . Достаточно доказать, что  $f(p_0) = p_1$ .

Поскольку  $p_J \subseteq p_i \subseteq p_I$ , в силу выбора  $J$  и по лемме 2.1(v)  $R_D(p_i) = R_D(p_J)$ . Тогда по лемме 2.3  $f(p_0) = p_1$ .

Предложение 3.3 доказано.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Если  $I$  — бесконечное неразличимое множество, то пусть

$$Av(I/A) = \{\varphi(x, \bar{a}) \in L(A) : |\neg\varphi(I, \bar{a})| < \omega\}.$$

**Следствие 3.4.**  $Av(I/A) \in S_D(A)$  для любого бесконечного неразличимого множества  $I$  и любого  $A$  такого, что  $I \cup A$  —  $D$ -множество.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** По предложению 3.3 для любого конечного  $B \subseteq A$  почти все элементы из  $I$  реализуют  $Av(I/B)$  и, следовательно,  $Av(I/B) \in S_D(B)$ .

Следствие 3.4 доказано.

**Предложение 3.5.** Пусть  $M$  —  $(D, \omega)$ -однородная модель,  $p \in S_D(M)$ . Тогда для любого  $D$ -множества  $B \supseteq M$  тип  $p$  имеет расширение в  $S_D(B)$  того же ранга.

**Доказательство.** Выберем конечное  $A \subseteq M$  такое, что  $R_D(p|A) = R_D(p)$ . Пусть  $\bar{b} \in B$ . По лемме 1.1 существует морфизм  $f : A \cup \bar{b} \rightarrow M$ , тождественный на  $A$ . Положим  $p_{\bar{b}} = f^{-1}(p|A \cup f(\bar{b}))$ . По лемме 2.1(v),(iv)  $R_D(p_{\bar{b}}) = R_D(p)$ . Если еще  $\bar{c} \in B$ , то  $p_{\bar{b}}, p_{\bar{c}} \subseteq p_{\bar{b}\bar{c}}$ , поскольку  $p_{\bar{b}}$  и  $p_{\bar{c}}|A \cup \bar{b}$  совпадают как расширения  $p|A$  того же ранга (лемма 2.3). Следовательно,  $\cup\{p_{\bar{b}} : \bar{b} \in B\}$  — искомое расширение  $p$  того же ранга.

Предложение 3.5 доказано.

**Предложение 3.6.** Пусть  $M$  —  $(D, \omega)$ -однородная модель и тип  $p \in S_D(M)$  не реализуется в  $M$ . Тогда  $p = Av(I/M)$  для некоторого бесконечного неразличимого множества  $I \subseteq M$ .

**Доказательство.** Выберем конечное  $A \subseteq M$  такое, что  $R_D(p) = R_D(p|A)$ . Индукцией по  $n < \omega$  найдем попарно различные элементы  $a_n \in M$  такие, что  $a_n$  реализует  $p|A \cup \{a_i : i < n\}$ . Тогда  $I = \{a_n : n < \omega\}$  — последовательность Морли над  $A$ . По предложению 3.2  $I$  — неразличимое множество над  $A$ . Для завершения доказательства достаточно показать, что для любого конечного  $B \subseteq M$  почти все элементы из  $I$  реализуют  $p|B$ .

Итак, пусть  $B \subseteq M$  конечно. С помощью предложения 3.5 расширим  $I$  до последовательности Морли  $I^* = \{a_n : n < \omega_1\}$  над  $A$  такой, что  $I^* - I$  — последовательность Морли типа  $p$ . По предложению 3.2  $I^*$  — неразличимое множество. По предложению 3.3 существует конечное  $J \subseteq I^*$  такое, что  $I^* - J$  неразличимо над  $B$ . Пусть  $a \in I - J$  и  $a^* \in (I^* - I) - J$ . Тогда  $\text{tp}(a/B) = \text{tp}(a^*/B) = p|B$ .

Предложение 3.6 доказано.

**Предложение 3.7.** Пусть  $A$  —  $D$ -множество регулярной мощности  $\lambda$ ,  $Z \subseteq A$ ,  $|D| + |Z| < \lambda$ . Тогда существует неразличимое над  $Z$  множество  $I \subseteq A$  мощности  $\lambda$ .

**Доказательство.** Пусть  $Y \subseteq A$ ,  $|Y| < \lambda$ . Назовем тип  $p \in S_D(Y)$  максимальным, если множество  $p(A)$  элементов из  $A$ , реализующих  $p$ , имеет мощность  $\lambda$ . Такой тип существует, поскольку кардинал  $\lambda$  регулярен и в силу следствия 2.4  $|S_D(Y)| \leq |Y| + |D| < \lambda$ .

В множестве  $\cup\{S_D(Y) : Z \subseteq Y, |Y| < \lambda\}$  выберем максимальный тип  $p^*$  наименьшего ранга. Пусть  $p^* \in S_D(Y^*)$ .

Если  $Y^* \subseteq Y \subseteq A$  и  $|Y| < \lambda$ , то  $p^*$  имеет максимальное расширение  $q \in S_D(Y)$ , поскольку  $p^*$  максимален,  $\lambda$  регулярен и  $|S_D(Y)| < \lambda$ . Так как  $p^* \subseteq q$ , то  $R_D(q) \leq R_D(p^*)$ , поэтому в силу выбора  $p^*$  имеем  $R_D(p^*) = R_D(q)$ . Отсюда и из леммы 2.3 следует, что  $p^*$  имеет единственное максимальное расширение в  $S_D(Y)$ .

Индукцией по  $i < \lambda$  определим элементы  $a_i \in A$  и типы  $p_i \in S_D(Y_i)$ ,  $Y_i = Y^* \cup \{a_j : j < i\}$  такие, что

- (i)  $p_0 = p^*$ ;
- (ii)  $a_i$  реализует  $p_i$ ;
- (iii)  $p_i$  — максимальное расширение типа  $p_0$ ;
- (iv)  $p_i \subseteq p_{i+1}$ ;
- (v)  $p_i = \bigcup_{j < i} p_j$  для предельных  $i$ .

Проверим (iii) для предельного  $i$ . Пусть  $b \in p_0(A) - p_i(A)$ . Тогда  $b \notin p_j(A)$  для некоторого  $j < i$ , поэтому тип  $\text{tr}(b/Y_j)$  не максимален вследствие того, что  $p_j$  — единственное максимальное расширение  $p_0$  в  $S_D(Y_j)$ . Значит, тип  $\text{tr}(b/Y_i)$  не максимален. Так как  $|S_D(Y_i)| < \lambda$  и  $\lambda$  регулярен, то  $|p_0(A) - p_i(A)| < \lambda$ . Поскольку  $p_i(A) \subseteq p_0(A)$  и  $|p_0(A)| = \lambda$ , то  $|p_i(A)| = \lambda$ .

Таким образом,  $I = \{a_i : i < \lambda\}$  — последовательность Морли. По предложению 3.2  $I$  — неразличимое множество.

Предложение 3.7 доказано.

#### § 4. $(D, \lambda)$ -простые модели

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** (1) Модель  $M$  называется  $(D, \lambda)$ -простой над множеством  $A \subseteq M$ , если  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна и для любой  $(D, \lambda)$ -однородной модели  $N$  любой морфизм из  $A$  в  $N$  продолжается до морфизма из  $M$  в  $N$ .

(2) Тип  $p \in S_D(A)$  называется  $(D, \lambda)$ -изолированным, если существует  $B \subseteq A$  мощности  $|B| < \lambda$  такое, что тип  $p|B$  имеет единственное расширение в  $S_D(A)$  (в этом случае говорим, что тип  $p$   $D$ -изолирован над  $B$ ).

(3)  $D$ -множество  $B$  назовем  $(D, \lambda)$ -конструкцией над  $A$ , если  $B = A \cup \{a_i : i < \delta\}$ , где для любого  $i < \delta$  тип  $\text{tr}(a_i/A \cup \{a_j : j < i\})$   $(D, \lambda)$ -изолирован.

(4) Модель  $M$  называется  $(D, \lambda, 1)$ -простой над  $A$ , если  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна и ее универсум является  $(D, \lambda)$ -конструкцией над  $A$ .

**Лемма 4.1.** Если  $B$  —  $(D, \lambda)$ -конструкция над  $A$ , то для любой  $(D, \lambda)$ -однородной модели  $N$  любой морфизм из  $A$  в  $N$  продолжается до морфизма из  $B$  в  $N$ . В частности, если модель  $M$   $(D, \lambda, 1)$ -проста над  $A$ , то  $M$   $(D, \lambda)$ -проста над  $A$ .

Доказательство очевидно.

**Теорема 4.2.** Если существует  $(D, \lambda)$ -однородная модель, то для любого  $D$ -множества  $A$  существует  $(D, \lambda, 1)$ -простая модель над  $A$ . В частности, для любого  $D$ -множества  $A$  существует модель,  $(D, \lambda)$ -простая над  $A$ .

Доказательство. Пусть  $N$  —  $(D, \lambda)$ -однородная модель. Пусть  $M$  — максимальная  $(D, \lambda)$ -конструкция над  $A$ . Достаточно показать, что  $M$  является  $(D, \lambda)$ -однородной моделью.

Пусть  $B \subseteq M$ ,  $|B| < \lambda$ ,  $p \in S_D(B)$ . Покажем, что  $p$  реализуется элементом из  $M$ . В силу лемм 1.1 и 4.1 можно считать, что  $M \subseteq N$ . По лемме 1.2 некоторый элемент  $a \in N$  реализует тип  $p$ , поэтому  $p$  содержится в  $D$ -типе над  $M$  (например, в  $\text{tr}(a/M)$ ). Выберем такой  $D$ -тип  $q$  наименьшего ранга. Выберем конечное  $C \subseteq M$  такое, что  $R_D(q) = R_D(q|C)$ . Если  $q|C \cup B \subseteq q' \in S_D(M)$ , то  $R_D(q') \leq R_D(q|C \cup B) \leq R_D(q|C) = R_D(q)$ , поэтому  $R_D(q') = R_D(q)$  в силу выбора  $q$ , откуда по лемме 2.3  $q' = q$ . Следовательно, тип  $q$   $(D, \lambda)$ -изолирован. Отсюда ввиду максимальнойности  $M$  следует, что  $q$  (а потому и  $p$ ) реализуется элементом из  $M$ .

Осталось показать, что  $M$  — модель. Пусть формула  $\varphi(x, \bar{a})$  из  $L(M)$  реализуется элементом  $b \in N$ . Тогда  $\text{tr}(b/\bar{a})$  является  $D$ -типом и согласно только что доказанному он, а вместе с ним и формула  $\varphi(x, \bar{a})$  реализуется элементом из  $M$ . По тесту Тарского — Воота  $M$  является моделью.

Теорема 4.2 доказана.

**Следствие 4.3.** Пусть  $A \subseteq B$  —  $D$ -множества,  $|A| < \lambda$ ,  $p \in S_D(A)$ . Допустим, что существует  $(D, \lambda)$ -однородная модель. Тогда  $p$  расширяется до  $D$ -типа над  $B$ .

**Доказательство.** По теореме 4.2 существует  $(D, \lambda)$ -простая над  $B$  модель  $M$ . По лемме 1.2 некоторый элемент  $a \in M$  реализует  $p$ . Тогда  $\text{tp}(a/B)$  — искомое расширение типа  $p$ .

Следствие 4.3 доказано.

**Следствие 4.4.** Пусть  $\lambda \geq |D| + |T|$ . Допустим, что существуют  $D$ -множество  $A$  мощности  $\lambda$  и  $(D, \omega)$ -однородная модель  $N$ . Тогда существует  $D$ -модель мощности  $\lambda$ , содержащая  $A$ . В частности, если  $N$  содержит бесконечное неразличимое множество, то существует  $D$ -модель мощности  $\lambda$ .

**Доказательство.** Если есть бесконечное неразличимое  $D$ -множество, то по теореме компактности существует такое множество мощности  $\lambda$ . По теореме 4.2 существует  $(D, \lambda)$ -простая над  $A$  модель  $M$ . Остается взять элементарную подмодель в  $M$  мощности  $\lambda$ , содержащую  $A$ .

Следствие 4.4 доказано.

## § 5. Однородные модели

**Предложение 5.1.** Следующие условия эквивалентны:

- (1) модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна;
- (2) модель  $M$   $(D, \omega)$ -однородна, и  $I \geq \lambda$  для любого максимального бесконечного неразличимого множества  $I \subseteq M$ .

**Доказательство.** (1) $\Rightarrow$ (2). Допустим противное. Пусть  $I$  — контрпример,  $a \in I$ ,  $f : I - \{a\} \rightarrow I - \{a\}$  — биекция. Так как множество  $I$  неразлично, а модель  $M$   $\lambda$ -однородна, то  $f$  продолжается до морфизма  $g : I \rightarrow M$ . Тогда  $g(I)$  — неразличимое множество в  $M$ , собственным образом расширяющее  $I$ , что противоречит максимальнойности  $I$ .

(2) $\Rightarrow$ (1). Пусть  $A \subseteq M$ ,  $|A| < \lambda$ ,  $a \in M$ ,  $p = \text{tp}(a/A)$ ,  $f : A \rightarrow M$  — морфизм. Нужно доказать, что  $f(p)$  реализуется в  $M$ .

По теореме 4.2 существует  $(D, \omega)$ -простая над  $A$  модель  $N$ . В силу  $(D, \omega)$ -простоты можно считать, что  $N \prec M$ , и  $f$  можно продолжить до морфизма  $h : N \rightarrow M$ . Если  $a \in N$ , то  $h(a)$  реализует  $f(p)$ .

Допустим, что  $a \notin N$ . Тогда тип  $q = \text{tp}(a/N) \in S_D(N)$  не реализуется в  $(D, \omega)$ -однородной модели  $N$ . По предложению 3.6  $q = \text{Av}(I/N)$  для некоторого бесконечного неразличимого множества  $I \subseteq N$ . Тогда  $h(q) = \text{Av}(h(I)/h(N))$ . Расширим  $h(I)$  до максимального неразличимого множества  $I_1 \subseteq M$ . В силу (2)  $|I_1| \geq \lambda$ . По предложению 3.4 существует  $I_2 \subseteq I_1$  такое, что  $|I_2| \leq |h(A)| < \lambda$  и  $I_1 - I_2$  неразлично над  $h(A)$ . Так как  $\text{Av}(I_1 - I_2/h(A)) = \text{Av}(I_1/h(A)) = \text{Av}(h(I)/h(A)) = h(q|A) = f(p)$ , любой элемент из  $I_1 - I_2$  реализует  $f(p)$ .

Предложение 5.1 доказано.

**Теорема 5.2.** Следующие условия эквивалентны:

- (1) для любого  $\lambda \geq |D| + |T|$  существует  $D$ -однородная модель мощности  $\lambda$ ;
- (2) существует  $(D, \omega)$ -однородная модель мощности, большей чем  $|D|$ ;
- (3) существует  $(D, \omega)$ -однородная модель, содержащая бесконечное неразличимое множество;
- (4) существуют  $D$ -модели  $M \prec N$  такие, что  $M \neq N$  и  $M$   $(D, \omega)$ -однородна;

(5) существуют  $D$ -множество мощности, большей чем  $|D|$ , и  $(D, \omega)$ -однородная модель.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2) очевидно.

(2) $\Rightarrow$ (3) следует из предложения 3.7.

(1) $\Rightarrow$ (4). Пусть  $M, N$  —  $D$ -однородные модели,  $|M| < |N|$ . Тогда  $M \neq N$  и в силу леммы 1.1 можно считать, что  $M \prec N$ .

(4) $\Rightarrow$ (3). Пусть  $a \in N - M$ . Тогда тип  $tp(a/M) \in S_D(M)$  опускается в  $M$ . По предложению 3.6 модель  $M$  содержит бесконечное неразличимое множество.

(3) $\Rightarrow$ (1). Пусть  $\lambda \geq |D| + |T|$ . Индукцией по  $i$  построим элементарную цепь  $\{M_i : i \leq \lambda\}$  такую, что

(i)  $M_i$  является моделью мощности  $\lambda$ ;

(ii) все типы из  $S_D(M_i)$  реализуются в  $M_{i+1}$ ;

(iii)  $M_i = \bigcup_{j < i} M_j$  для предельных  $j$ .

В качестве  $M_0$  возьмем  $D$ -модель мощности  $\lambda$ , которая существует по следствию 4.4. Допустим, что модель  $M_i$  построена. По следствию 2.4(2)  $|S_D(M_i)| = \lambda$ . Пусть  $S_D(M_i) = \{p_j : j < \lambda\}$ . Индукцией по  $j$  построим цепь  $D$ -моделей  $\{M_j^i : j \leq \lambda\}$  следующим образом. Пусть  $M_0^i = M_i$ . На предельных шагах берем объединения. Допустим, что модель  $M_j^i$  построена. По предложению 3.5 тип  $p_j$  расширяется до типа  $p_j^* \in S_D(M_j^i)$ . Пусть  $a_j$  реализует  $p_j^*$ . По следствию 4.4 существует  $D$ -модель  $M_{j+1}^i$  мощности  $\lambda$ , содержащая  $M_j^i \cup \{a_j\}$ . Полагаем  $M_{i+1} = M_\lambda^i$ .

Пусть  $M = M_\lambda$ . В силу (i)  $|M| = \lambda$ . Модель  $M$   $(D, \omega)$ -однородна. Действительно, пусть  $p$  —  $D$ -тип над конечным множеством  $A \subseteq M$ . Тогда  $A \subseteq M_i$  для некоторого  $i < \lambda$ . По следствию 4.3 тип  $p$  расширяется до  $D$ -типа над  $M_i$ , который по построению реализуется в модели  $M_{i+1} \prec M$ . По лемме 1.2 модель  $M$   $(D, \omega)$ -однородна. Покажем, что  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна. Пусть  $I$  — максимальное бесконечное неразличимое множество в  $M$ . В силу предложения 5.1 достаточно доказать, что  $|I| \geq \lambda$ . Допустим, что  $|I| < \lambda$ . Пусть  $p = Av(I/M)$ . По следствию 3.4  $p \in S_D(M)$ . Выберем конечное  $A \subseteq M$  такое, что  $R_D(p) = R_D(p|A)$ . Без ограничения общности считаем  $A \subseteq M_0$ . В силу (ii) для каждого  $i < \lambda$  существует элемент  $b_i \in M_{i+1} - M_i$ , реализующий  $p|_{M_i}$ . Тогда множество  $J = \{b_i : i < \lambda\}$  является последовательностью Морли типа  $p|A$  и потому неразличимо (предложение 3.2). Из доказательства предложения 3.6 следует, что  $p = Av(J/M)$ . По предложению 3.3 существует  $J' \subseteq J$  такое, что  $|J'| \leq |I| < \lambda$  и  $J - J'$  неразличимо над  $I$ . Пусть  $a \in J - J'$ . Тогда  $tp(a/I) = Av(J - J'/I) = Av(J/I) = p|I = Av(I/I)$ . Следовательно,  $I \cup \{a\}$  — неразличимое множество в  $M$ , собственным образом содержащее  $I$ , что противоречит максимальнойности  $I$ .

(2) $\Rightarrow$ (5) очевидно.

(5) $\Rightarrow$ (2) вытекает из теоремы 4.2.

Теорема 5.2 доказана.

**Следствие 5.3.** Если модель  $M$   $(D, \lambda)$ -проста над  $A$ , то  $|M| \leq |A| + |D| + |T| + \lambda$ .

Доказательство. Пусть  $\nu = |A| + |D| + |T| + \lambda$ . По теореме 5.2 существует  $D$ -однородная модель  $N$  мощности  $\nu$ . По лемме 1.1 существует морфизм  $f : A \rightarrow N$ . Так как модель  $M$   $(D, \lambda)$ -проста над  $A$ , то  $f$  продолжается до морфизма отображения  $g : M \rightarrow N$ . Значит,  $|M| \leq |N|$ .

Следствие 5.3 доказано.

Рассуждая, как в последнем абзаце доказательства теоремы 5.2, можно доказать следующее утверждение.

**Теорема 5.4.** Пусть  $M = \bigcup_{i < \delta} M_i$  — объединение элементарной цепи  $(D, \lambda)$ -однородных моделей. Тогда модель  $M$  тоже  $(D, \lambda)$ -однородна.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $I$  — максимальное бесконечное неразличимое множество в  $M$ . В силу предложения 5.1 достаточно доказать, что  $|I| \geq \lambda$ . Допустим, что  $|I| < \lambda$ . Пусть  $p = Av(I/M)$ . По следствию 3.4  $p \in S_D(M)$ . Выберем конечное  $A \subseteq M$  такое, что  $R_D(p) = R_D(p|A)$ . Тогда  $A \subseteq M_n$  для некоторого  $n < \delta$ . В силу  $(D, \lambda)$ -однородности в модели  $M_n$  можно построить последовательность Морли  $J = \{b_i : i < \lambda\}$  типа  $p|A$ . По предложению 3.2  $J$  — неразличимое множество. Из доказательства предложения 3.6 следует, что  $p = Av(J/M)$ . По предложению 3.3 существует  $J' \subseteq J$  такое, что  $|J'| \leq |I| < \lambda$  и  $J - J'$  неразлично над  $I$ . Пусть  $a \in J - J'$ . Тогда  $\text{tp}(a/I) = Av(J - J'/I) = Av(J/I) = p|I = Av(I/I)$ . Следовательно,  $I \cup \{a\}$  — неразличимое множество в  $M$ , собственным образом содержащее  $I$ , что противоречит максимальнойности  $I$ .

Теорема 5.4 доказана.

## § 6. Категоричность

Напомним, что некоторый класс моделей называется  $\mu$ -категоричным, если любые две модели мощности  $\mu$  из этого класса изоморфны.

Обозначим через  $\mathcal{H}(D, \lambda)$  класс всех  $(D, \lambda)$ -однородных моделей. Для этого класса будет доказана теорема категоричности.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** (1) Зафиксируем  $D$ -тип вида  $p^* = Av(I^*/A^*)$ , где  $I^*$  — бесконечное неразличимое множество и  $|A^*| < \omega$ , наименьшего возможного ранга. Тип  $p$  назовем  $D$ -минимальным, если  $p = f(p^*)$  для некоторого морфизма  $f$ .

(2) Если тип  $p \in S_D(A)$   $D$ -минимален и  $A \subseteq M$ , то  $p$ -базисом модели  $M$  назовем максимальную последовательность Морли типа  $p$  в  $M$ .

**Лемма 6.1.** Если модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна, то существует конечное множество  $A \subseteq M$  и  $D$ -минимальный тип  $p \in S_D(A)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО** следует из леммы 1.1.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Тип  $p$  назовем  $(D, \lambda)$ -недвукардинальным, если для любых  $(D, \lambda)$ -однородных моделей  $M \prec N$ ,  $N \neq M$ ,  $|M| > |D| + |T|$ , условие  $\text{dom}(p) \subseteq M$  влечет реализуемость  $p$  в  $N - M$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Модель  $M$  назовем  $(D, \lambda)$ -минимальной над множеством  $A \subseteq M$ , если из условий:  $A \subseteq N \prec M$  и  $N$   $(D, \lambda)$ -однородна, следует, что  $M = N$ .

**Предложение 6.3.** Пусть  $M$  —  $(D, \lambda)$ -однородная модель мощности  $|M| > |D| + |T|$ , тип  $p \in S_D(A)$   $D$ -минимален и  $(D, \lambda)$ -недвукардинален,  $A \subseteq M$ ,  $I$  —  $p$ -базис модели  $M$ . Тогда модель  $M$   $(D, \lambda)$ -проста и  $(D, \lambda)$ -минимальна над  $A \cup I$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $A \cup I \subseteq N \prec M$  и модель  $N$   $(D, \lambda)$ -однородна. Если  $N \neq M$ , то в силу недвукардинальности тип  $p$  реализуется некоторым элементом  $a \in N - M$ . По предложению 3.6  $\text{tp}(a/M) = Av(J/M)$  для некоторого бесконечного неразличимого множества  $J \subseteq M$ . Тогда  $R_D(\text{tp}(a/M)) = R_D(p)$  ввиду  $D$ -минимальности типа  $p$ . Следовательно,  $I \cup \{a\}$  — последовательность

Морли типа  $p$ , что противоречит максимальнойности  $I$ . Значит,  $N = M$  и модель  $M$   $(D, \lambda)$ -минимальна над  $A \cup I$ .

По теореме 4.2 существует модель  $N \prec M$ ,  $(D, \lambda)$ -простая над  $A \cup I$ . В силу  $(D, \lambda)$ -минимальности имеем  $N = M$ , т. е. модель  $M$   $(D, \lambda)$ -проста над  $A \cup I$ .

Предложение 6.3 доказано.

**Следствие 6.4.** Допустим, что  $D$ -минимальный тип  $p^*$   $(D, \lambda)$ -недвукардинален. Пусть  $\kappa > |D| + |T|$ . Тогда любая  $(D, \lambda)$ -однородная модель  $M_0$  мощности  $\kappa$  является однородной и класс  $\mathcal{H}(D, \lambda)$   $\kappa$ -категоричен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По теореме 5.2 существует  $D$ -однородная модель  $M_1$  мощности  $\kappa$ . Пусть  $p_i \in S_D(A_i)$  —  $D$ -минимальный тип,  $A_i \subseteq M_i$ ,  $I_i$  —  $p_i$ -базис модели  $M_i$ ,  $i < 2$ . По следствию 5.3 и предложению 6.3  $|I_i| = \kappa$ , поэтому существует сюръективный морфизм  $f : A_0 \cup I_0 \rightarrow A_1 \cup I_1$ . Продолжив  $f$  до морфизма  $g : M_0 \rightarrow M_1$ , по предложению 6.3 получим  $g(M_0) = M_1$ .

**Предложение 6.5.** Пусть  $\kappa \geq |D| + |T| + \lambda$ ,  $N$  —  $(D, \lambda)$ -однородная модель мощности  $|N| > \kappa$ , содержащая бесконечное неразличимое над  $A$  множество,  $A \subseteq N$ ,  $p \in S_D(A)$ . Если тип  $p$  опускается в  $N$ , то существует  $(D, \lambda)$ -однородная модель  $M \prec N$  мощности  $\kappa$  такая, что тип  $p|_{A \cap M}$  опускается в  $M$  и  $M$  содержит бесконечное неразличимое над  $A \cap M$  множество.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Индукцией по  $i$  построим элементарную цепь  $\{M_i : i \leq \omega\}$  следующим образом. Выберем  $D$ -множество  $B \subseteq N$  мощности  $\kappa$ , содержащее бесконечное неразличимое над  $A$  множество. По теореме 4.2 существует  $(D, \lambda)$ -простая над  $B$  модель  $M_0 \prec N$ . По следствию 5.3  $|M_0| = \kappa$ . Пусть модель  $M_i$  построена,  $M_i \prec N$ ,  $|M_i| = \kappa$ . Так как  $p$  опускается в  $N$ , для каждого элемента  $a \in M_i$  существует формула  $\varphi_a(x, \bar{b}_a) \in p$  такая, что  $\models \neg \varphi(a, \bar{b}_a)$ . По теореме 4.2 существует  $(D, \lambda)$ -простая над  $M_i \cup \{\bar{b}_a : a \in M_i\}$  модель  $M_{i+1} \prec N$ . По следствию 5.3  $|M_{i+1}| = \kappa$ . Ясно, что никакой элемент из  $M_i$  не реализует  $p|_{A \cap M_{i+1}}$ .

Пусть  $M = M_\omega$ . По теореме 5.4 модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна. Ясно, что  $|M| = \kappa$ . Никакой элемент  $a \in M$  не реализует  $p|_{A \cap M}$ , потому что  $a \in M_i$  для некоторого  $i$  и по построению  $a$  не реализует  $p|_{A \cap M_{i+1}}$ .

Предложение 6.5 доказано.

В следующем предложении (это теорема 9.6 из [3])  $D$  — произвольная диаграмма (не обязательно стабильная).

**Предложение 6.6.** Пусть  $p \in S_D(A)$ ,  $I$  — неразличимая последовательность над  $A$ ,  $I_0 \subseteq I$ ,  $|I_0| \geq \lambda$ , модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна,  $A \cup I_0 \subseteq M$ , модель  $N$   $(D, \lambda, 1)$ -проста над  $A \cup I$ . Тогда если  $p$  реализуется в  $N$ , то  $p$  реализуется и в  $M$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $N = A \cup I \cup \{a_i : i < \delta\}$  —  $(D, \lambda)$ -конструкция,  $p_i = \text{tp}(a_i/A \cup I \cup \{a_j : j < i\})$ . Пусть элемент  $a \in N$  реализует  $p$ . Ясно, что если  $a \in A \cup I$ , то  $p$  реализуется в  $M$ . Допустим, что  $a = a_{i'}$  для некоторого  $i' < \delta$ . Индукцией по  $n < \omega$  определим множества  $A_n \subseteq N$  следующим образом. Выберем  $A_0 \subseteq \text{dom}(p_{i'})$  такое, что  $|A_0| < \lambda$  и тип  $p_{i'}$   $D$ -изолирован над  $A_0$ . Допустим, что  $A_n$  определено и  $|A_n| \leq \lambda$ . Для каждого  $a_i \in A_n$  выберем  $A_n^i \subseteq \text{dom}(p_i)$  такое, что  $|A_n^i| < \lambda$  и тип  $p_i$   $D$ -изолирован над  $A_n^i$ . Полагаем  $A_{n+1} = \cup \{A_n^i : a_i \in A_n\}$ . Ясно, что  $|A_{n+1}| \leq \lambda$ .

Пусть  $I_1 = I \cap \bigcup_{n < \omega} A_n$  и  $\{a_{s(i)} : i < \delta_1\} = \{a_i : i < \delta\} \cap \bigcup_{n < \omega} A_n$ , где  $s(i) < s(j) < i'$  для всех  $i < j < \delta_1$ . Положим  $s(\delta_1) = i'$ . По построению для

любого  $i \leq \delta_1$  тип  $q_i = \text{tr}(a_{s(i)}/A \cup I \cup \{a_{s(j)} : j < i\})$   $(D, \lambda)$ -изолирован. Так как  $I$  — неразличимая последовательность над  $A$  и  $|I_1| \leq \lambda \leq |I_0|$ , существует морфизм  $f : A \cup I_1 \rightarrow A \cup I_0$ , тождественный на  $A$ . Поскольку тип  $q_i$   $(D, \lambda)$ -изолирован для любого  $i \leq \delta_1$  и модель  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна, индукцией по  $i \leq \delta_1 + 1$  можно определить морфизмы  $f_i : A \cup I_1 \cup \{a_{s(j)} : j < i\} \rightarrow M$  такие, что  $f_0 = f$  и  $f_j \subseteq f_i$  для всех  $j < i$ . Так как элемент  $a_{s(\delta_1)} = a_{i'}$  реализует  $p$ , то  $f_{\delta_1+1}(a_{s(\delta_1)})$  реализует  $p$  в  $M$ .

Предложение 6.6 доказано.

**Теорема 6.7.** Следующие условия эквивалентны:

- (1) класс  $\mathcal{H}(D, \lambda)$   $\kappa$ -категоричен для любого  $\kappa > |D| + |T|$ ;
- (2) класс  $\mathcal{H}(D, \lambda)$   $\kappa$ -категоричен для некоторого  $\kappa > |D| + |T| + \lambda$ ;
- (3) для любого  $\kappa > |D| + |T|$  каждая  $(D, \lambda)$ -однородная модель мощности  $\kappa$  однородна;
- (4) для некоторого  $\kappa > |D| + |T| + \lambda$  каждая  $(D, \lambda)$ -однородная модель мощности  $\kappa$  однородна;
- (5) если  $M$  и  $N$  —  $(D, \lambda)$ -однородные модели,  $|M| > |D| + |T|$ ,  $M \prec N$ ,  $M \neq N$ , и  $p = \text{Av}(I/A)$  для некоторого  $A \subseteq M$  мощности  $|A| < |M|$  и бесконечного неразличимого множества  $I \subseteq M$ , то  $p$  реализуется в  $N - M$ ;
- (6) существует  $(D, \lambda)$ -недвукардинальный  $D$ -минимальный тип.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) $\Rightarrow$ (2) очевидно.

(2) $\Rightarrow$ (4) следует из теоремы 5.2.

(4) $\Rightarrow$ (3). Допустим противное. Пусть  $N$  — контрпример к (3). Тогда существуют  $A \subseteq N$ ,  $|A| < |N|$ , и тип  $p \in S_D(A)$ , который опускается в  $N$ . По предложению 3.7 существует бесконечное неразличимое над  $A$  множество в  $N$ . По предложению 6.5 существует  $(D, \lambda)$ -однородная модель  $M \prec N$  мощности  $|D| + |T| + \lambda$  такая, что тип  $p|B$  опускается в  $M$  и  $M$  содержит бесконечное неразличимое над  $B$  множество  $I_0$ , где  $B = A \cap M$ . Так как  $M$   $(D, \lambda)$ -однородна, то  $|I_0| \geq \lambda$ . По теореме компактности существует неразличимое над  $B$   $D$ -множество  $I \supseteq I_0$  мощности  $\kappa$ , по теореме 4.2 —  $(D, \lambda, 1)$ -простая над  $B \subseteq I$  модель  $N_0$ . По следствию 5.3  $|N_0| = \kappa$ . Так как  $|B| \leq |M| < |N_0|$  и  $D$ -тип  $p|B$  опускается в  $N_0$  по предложению 6.6, то  $N_0$  не однородна, что противоречит (4).

(3) $\Rightarrow$ (1) очевидно.

(3) $\Rightarrow$ (5). Пусть  $M, N, p, A, I$  такие, как в (5). Нужно доказать, что  $p$  реализуется в  $N - M$ . Пусть  $\kappa = |M|^+$ . Индукцией по  $i$  построим элементарную цепь  $\{M_i : i \leq \kappa\}$  следующим образом. Пусть  $M_0 = M$ ,  $a \in N - M$ . По теореме 4.2 существует  $(D, \lambda)$ -простая над  $M \cup \{a\}$  модель  $M_1 \prec N$ . По лемме 5.3  $|M_0| = |M|$ . В силу (3) модели  $M$  и  $M_1$  изоморфны.

Допустим, что модель  $M_i$ ,  $1 \leq i < \kappa$ , построена и изоморфна  $M$ . Так как модель  $M$  однородна и  $|A| < |M|$ , существует изоморфизм  $f_i$  модели  $M$  на  $M_i$ , тождественный на  $A$ . Продолжим  $f_i$  до морфизма  $g_i$  с областью определения  $M_1$ . Полагаем  $M_{i+1} = g_i(M_1)$ . Тогда  $M_i \prec M_{i+1}$  и  $M_i \neq M_{i+1}$ .

Для предельного  $\delta \leq \kappa$  положим  $M_\delta = \bigcup_{i < \delta} M_i$ . По индуктивному предположению модель  $M_i$  изоморфна  $M$  для любого  $i < \delta$ , поэтому при  $\delta < \kappa$  модель  $M_\delta$   $(D, \lambda)$ -однородна по теореме 5.4 и  $|M_\delta| = |M|$ . В силу (3)  $M$  и  $M_\delta$  изоморфны.

Расширим  $I$  до максимального неразличимого множества  $I_0 \subseteq M_\kappa$ . В силу (3) модель  $M_\kappa$  однородна и  $|M_\kappa| \geq \kappa$  (поскольку  $M_i \neq M_{i+1}$  для всех  $i < \kappa$ ), тем самым  $|I_0| \geq \kappa$ . По предложению 3.3 существует  $I_1 \subseteq I_0$  такое, что  $|I_1| \leq \omega + |A| < \kappa$  и  $I_0 - I_1$  неразличимо над  $A$ . Имеем  $\text{Av}(I_0 - I_1/A) = \text{Av}(I_0/A) =$

$Av(I/A) = p$ . Так как  $|I_0 - I_1| \geq \kappa > |M_0|$ , существуют  $i < \kappa$  и элемент  $b \in M_{i+1} - M_i$  такой, что  $b$  принадлежит  $I_0 - I_1$  и, значит, реализует  $p$ . Так как  $g_i$  — морфизм, тождественный на  $A$ , то  $g_i^{-1}(b)$  реализует  $p$ . Так как  $g_i(M) = M_i$  и  $g_i(M_1) = M_{i+1}$ , то  $g_i^{-1}(b) \in M_1 - M \subseteq N - M$ .

(5) $\Rightarrow$ (6) очевидно.

(6) $\Rightarrow$ (1) вытекает из следствия 6.4.

Теорема 6.7 доказана.

**Примечание.** При чтении корректуры автор сделал неверные сокращения в правильном доказательстве импликации (3) $\Rightarrow$ (1) теоремы 5.2, из-за чего в доказательстве возникли пробелы. Заполнить их можно так. Модели  $M_i$  должны быть  $(D, \omega)$ -однородными. Полагаем  $M_0 = M^\omega$ , где  $\{M^i : i \leq \omega\}$  — элементарная цепь  $D$ -моделей мощности  $\lambda$ ,  $M^0$  выбирается произвольно, на предельных шагах берутся объединения, а в  $M^{i+1}$  реализуются все  $D$ -типы над конечными подмножествами модели  $M^i$  (это делается аналогично описанному в статье построению  $M_{i+1}$  с использованием следствия 4.3). Если модель  $M_i$  построена, то строим, как описано в статье,  $D$ -модель  $M'_{i+1}$  мощности  $\lambda$ , в которой реализуются все типы из  $S_D(M_i)$ , а затем аналогично построению  $M_0$  строим  $(D, \omega)$ -однородную модель  $M_{i+1} \succ M'_{i+1}$  мощности  $\lambda$ . Далее как в статье.

Автор благодарен Б. И. Зильберу за интерес к работе и полезные обсуждения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Shelah S. Finite diagrams stable in power // Ann. Math. Logic. 1970. V. 2. P. 69–118.
2. Shelah S. Classification theory and the number of non-isomorphic models. Amsterdam: North-Holland, 1978.
3. Kudaibergenov K. Zh. Homogeneous models of stable theories // Siberian Adv. Math. 1993. V. 3, N 3. P. 1–33.
4. Кудайбергенов К. Ж. Об однородных моделях одномерностных теорий // Алгебра и логика. 1995. Т. 34, № 1. С. 61–78.
5. Кудайбергенов К. Ж. Об однородных моделях некоторых слабо минимальных теорий // Сиб. мат. журн. 1999. Т. 40, № 6. С. 1253–1259.
6. Кудайбергенов К. Ж. Об однородных моделях локально модулярных теорий конечного ранга // Мат. труды. 2002. Т. 5, № 1. С. 74–83.
7. Кудайбергенов К. Ж. Об однородных моделях totally трансцендентных немультиметрических теорий // Алгебра и логика. 1991. Т. 30, № 1. С. 48–73.
8. Сакс Дж. Теория насыщенных моделей. М.: Мир, 1976.
9. Keisler H. J., Morley M. D. On the number of homogeneous models of a given power // Israel J. Math. 1967. V. 5, N 2. P. 73–78.

Статья поступила 23 февраля 2001 г.

Кудайбергенов Канат Жанзакович  
Институт математики МОиН РК, ул. Пушкина, 125, Алматы 480100, Казахстан  
kanat@math.kz