

УДК 517.957

КОММУТАТИВНЫЕ КОЛЬЦА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ,
ОТВЕЧАЮЩИЕ МНОГОМЕРНЫМ
АЛГЕБРАИЧЕСКИМ МНОГООБРАЗИЯМ

А. Е. Миронов

Аннотация: Построены новые примеры многомерных матричных коммутирующих дифференциальных операторов, а также построен многомерный аналог иерархии Кадомцева — Петвиашвили.

Ключевые слова: коммутирующие дифференциальные операторы

1. Введение

В статье мы построим коммутативные кольца многомерных $N \times N$ -матричных дифференциальных операторов, чьи совместные собственные вектор-функции и собственные числа параметризуются точками спектрального многообразия Y^k , которое является пересечением гладких гиперповерхностей $Y_{a_1} \cap \dots \cap Y_{a_k}$ в главно поляризованном абелевом многообразии X^g размерности g , $k < g - 1$. Гиперповерхность Y_{a_j} является сдвигом на элемент $a_j \in X^g$ тэта-дивизора $Y \subset X^g$. Число N равно rd_g , где d_g — индекс g -кратного самопересечения гиперповерхности Y . Через Q^j обозначим многообразие $Y^j \cap Y$. Далее будем предполагать, что многообразии Y^j трансверсально пересекается с $Y_{a_{j+s}}$ и с Y , $j + s \leq k$. Пусть Y^j и Q^j являются гладкими, неприводимыми, и пусть также набор a_1, \dots, a_k находится в общем положении (т. е. принадлежит некоторому открытому всюду плотному множеству в $X^g \times \dots \times X^g$).

С этими коммутативными кольцами связан аналог иерархии Кадомцева — Петвиашвили, который мы укажем в этой работе.

Основной результат — это следующая

Теорема 1. Существует вложение L_k кольца мероморфных функций на многообразии Y^k с полюсом на Q^k в кольцо $N \times N$ -матричных дифференциальных операторов по $g - k$ переменным с аналитическими в окрестности 0 коэффициентами

$$L_k : \mathcal{A}_k \rightarrow \text{Mat}(N, g - k).$$

Образом вложения является коммутативное кольцо $(g - k)$ -мерных матричных дифференциальных операторов.

Используя теорему Римана — Роха — Хирцебруха, можно показать, что число d_g , а значит, и N , кратно $g!$.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 00-01-00915, 00-15-99252 и 01-01-06017).

Операторы $L_k(\mathcal{A}_k)$ являются операторами ранга r . Это означает, что каждой точке многообразия Y^k отвечает r линейно независимых собственных вектор-функций.

Двумерные операторы $L_k(\mathcal{A}_k)$ с двоякопериодическими коэффициентами являются конечнозонными на любом уровне энергии E , т. е. блоховские вектор-функции (собственные одновременно для оператора $L_k(\lambda)$, $\lambda \in \mathcal{A}_k$, и для операторов сдвига на периоды) параметризуются римановой поверхностью конечного рода, заданной в спектральной поверхности уравнением $\lambda = E$.

Если размерность Y^k равна 2, то, используя формулу присоединения и теорему Лефшеца о вложении, можно показать, что размерность Кодaira спектральной поверхности Y^k равна 2, т. е. эта поверхность является поверхностью общего типа.

Теорему 1 докажем, учитывая результаты Накаяшики [1] (см. также [2]), который построил вложение кольца мероморфных функций на X^g с полюсом на Y в кольцо g -мерных $N \times N$ -матричных дифференциальных операторов. Двумерные 2×2 -матричные такие операторы (операторы Накаяшики) изучались в работах автора [3, 4]. В частности, в [4] доказано, что не существует двумерных вещественных операторов Накаяшики, конечнозонных на любом уровне энергии, с гладкими двоякопериодическими коэффициентами, но существуют двумерные вещественные конечнозонные на любом уровне энергии операторы Накаяшики с сингулярными двоякопериодическими коэффициентами. В [4] также указаны гладкие вещественные операторы Накаяшики, среди которых имеется оператор второго порядка H , по диагонали которого стоят операторы Шредингера в двоякопериодических магнитных полях и с двоякопериодическими потенциалами вида

$$(\partial_{y_1} - A_1)^2 + (\partial_{y_2} - A_2)^2 + u(y), \quad y = (y_1, y_2).$$

Магнитно-блоховские вектор-функции оператора H (собственные одновременно для H и для операторов магнитных трансляций T_j^* , $T_j^* \varphi(y) = \varphi(y + e_j) \exp(2\pi y_j)$, $j = 1, 2$, e_j — периоды) на каждом уровне энергии параметризуются римановой поверхностью конечного рода. Это свойство является аналогом конечнозонности на любом уровне энергии для операторов с двоякопериодическими коэффициентами.

В частном случае, когда $g = 3$, $r = 1$, а в качестве спектральной поверхности служит тэта-дивизор, теорема 1 была доказана А. Накаяшики [1].

М. Ротштейн в [5] построил другой пример коммутирующих матричных дифференциальных операторов. В этом примере $g = 5$, $r = 1$, размерность матриц N равна 5, а в качестве спектральной поверхности служит поверхность Фано.

Напомним конструкцию И. М. Кричевера [6] построения коммутирующих обыкновенных дифференциальных операторов ранга 1. Пусть Γ — риманова поверхность рода g , $P = p_1 + \dots + p_g$ — неспециальный положительный дивизор на Γ , ∞ — точка на Γ , отличная от точек дивизора P , k^{-1} — локальный параметр в ∞ , $k^{-1}(\infty) = 0$. Существует функция Бейкера — Ахиезера $\psi(p, x)$, $p \in \Gamma$, которая мероморфна на $\Gamma \setminus \infty$, множество ее полюсов совпадает с P и не зависит от x , в окрестности ∞ функция $\psi \exp(-kx)$ аналитична. Для любой мероморфной функции $f(p)$ на Γ с единственным полюсом в ∞ существует единственный дифференциальный оператор $L(f)$ такой, что

$$L(f)\psi = f\psi.$$

Для различных f операторы $L(f)$ попарно коммутируют. Отсюда вытекает сопоставление спектральных данных коммутирующих операторов Берчналла — Чаунди — Кричевера и спектральных данных операторов $L_k(\mathcal{A}_k)$:

$$\{\Gamma, \infty, P, f\} \longleftrightarrow \{Y^k, Q^k, Q_c^k, \lambda\},$$

где $Q_c^k = Y^k \cap Y_c$, $c \in X^g$, — некоторый ненулевой элемент.

Как и в одномерном случае, можно построить операторы L_α , коэффициенты которых зависят от времени и удовлетворяют эволюционным уравнениям. Справедлива

Теорема 2. *Существует многомерный аналог иерархии Кадомцева — Петвиашвили*

$$[\partial_{t_\alpha} - L_\alpha, \partial_{t_\beta} - L_\beta] = 0,$$

где L_α и L_β — $N \times N$ -матричные дифференциальные операторы по $g-k$ переменным, коэффициенты которых зависят от t_α и t_β , α и β принадлежат счетному множеству индексов.

Как уже отмечалось в [4], коэффициенты операторов Накаяшики не могут удовлетворять эволюционным уравнениям типа иерархии Кадомцева — Петвиашвили.

В разд. 2 мы введем векторные тэта-функции, которые задают сечения голоморфных векторных расслоений ранга r над абелевым многообразием X^g . При $r = 1$ векторные тэта-функции совпадают с классическими тэта-функциями Римана. С помощью векторных тэта-функций можно выписывать в явном виде сечения голоморфных векторных расслоений над римановыми поверхностями. Если X^g является многообразием Якоби римановой поверхности $\Gamma \subset X^g$, то ограничение векторной тэта-функции на Γ будет сечением векторного расслоения над Γ ранга r степени rs , где s — некоторое натуральное число, g — род Γ .

В разд. 3, используя преобразование Фурье — Мукаи [7], мы введем модуль Бейкера — Ахиезера над кольцом дифференциальных операторов, элементы которого выражаются через векторные тэта-функции. Теоремы 1 и 2 вытекают из теоремы 3 о свободности модуля Бейкера — Ахиезера.

Автор благодарит И. А. Тайманова за полезные обсуждения и замечания.

2. Векторные тэта-функции

В этом разделе мы укажем коэффициенты разложения в ряд Фурье векторных тэта-функций. В лемме 1 будет найдена размерность пространства векторных тэта-функций.

Обозначим через $X^g = \mathbb{C}^g / \{\mathbb{Z}^g + \Omega\mathbb{Z}^g\}$ главно поляризованное комплексное абелево многообразие, где Ω — симметричная $g \times g$ -матрица с $\text{Im } \Omega > 0$. Для невырожденных попарно коммутирующих матриц A_j , $j = 1, \dots, g$, размера $r \times r$ введем множество матричных функций (мультипликаторов) на \mathbb{C}^g :

$$e_{n+\Omega m}(z) = \exp(-s\pi i \langle m, \Omega m \rangle - 2s\pi i \langle m, z \rangle) A_1^{m_1} \dots A_g^{m_g},$$

где $m, n \in \mathbb{Z}^g$, $\langle m, z \rangle = m_1 z_1 + \dots + m_g z_g$, s — некоторое натуральное число. Нетрудно убедиться, что эти функции удовлетворяют равенствам

$$e_\lambda(z + \lambda') e_{\lambda'}(z) = e_{\lambda'}(z + \lambda) e_\lambda(z) = e_{\lambda + \lambda'}(z), \quad \lambda, \lambda' \in \mathbb{Z}^g + \Omega\mathbb{Z}^g.$$

Любой набор матричных функций, удовлетворяющий этим равенствам, задает векторное расслоение ранга r на X^g , которое получается факторизацией $\mathbb{C}^g \times \mathbb{C}^r$ по действию решетки $\mathbb{Z}^g + \Omega\mathbb{Z}^g$:

$$(z, v) \sim (z + \lambda, e_\lambda(z)v), \quad v \in \mathbb{C}^r.$$

Глобальные сечения задаются вектор-функциями на \mathbb{C}^g со свойствами периодичности

$$f(z + \lambda) = e_\lambda f(z).$$

Векторной тэта-функцией ранга r степени s назовем вектор-функцию

$$\theta^{r,s}(z) = (\theta_1^s(z), \dots, \theta_r^s(z))^T, \quad z \in \mathbb{C}^g,$$

с целыми компонентами, обладающую свойством

$$\theta^{r,s}(z + \Omega m + n) = \exp(-s\pi i \langle m, \Omega m \rangle - 2s\pi i \langle m, z \rangle) A_1^{m_1} \dots A_g^{m_g} \theta^{r,s}(z).$$

В силу периодичности $\theta^{r,s}$ разлагается в ряд

$$\theta^{r,s} = \sum_{l \in \mathbb{Z}^g} \exp(2\pi i \langle l, z \rangle) a_l, \quad a_l = (a_l^1, \dots, a_l^r)^T \in \mathbb{C}^r.$$

Найдем рекуррентные соотношения на коэффициенты a_l :

$$\begin{aligned} \theta^{r,s}(z + \Omega e_j) &= \sum_{l \in \mathbb{Z}^g} \exp(2\pi i \langle l, \Omega e_j \rangle) \exp(2\pi i \langle l, z \rangle) a_l \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}^g} \exp(-s\pi i \Omega_{jj}) \exp(2\pi i \langle l - se_j, z \rangle) A_j a_l, \end{aligned}$$

следовательно,

$$a_{l+se_j} = \exp(s\pi i \Omega_{jj} + 2\pi i \langle l, \Omega e_j \rangle) A_j^{-1} a_l,$$

$e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T$ (1 на j -м месте). Из последней формулы вытекает, что $\theta^{r,s}$ определяется заданием коэффициентов a_l , где компоненты l находятся в пределах $0 \leq l_\alpha \leq s-1$, стало быть, размерность пространства векторных тэта-функций не превышает $r s^g$. Покажем, что при любом выборе a_l , $0 \leq l_\alpha \leq s-1$, ряд для векторной тэта-функции $\theta^{r,s}$ сходится. Для этого перепишем его в следующем виде:

$$\theta^{r,s}(z) = \sum_{l_0} \sum_{l \in \mathbb{Z}^g} \exp(2\pi i \langle l_0 + sl, z \rangle) a_{l_0+sl},$$

где компоненты l_0 находятся в пределах от 0 до $s-1$. Полученные выше рекуррентные соотношения разрешимы в явном виде

$$a_{l_0+sl} = \exp(s\pi i \langle l, \Omega l \rangle + 2\pi i \langle l_0, \Omega l \rangle) A_1^{-l_1} \dots A_g^{-l_g} a_{l_0}.$$

Пусть

$$\theta_{a_{l_0}}^{r,s} = \sum_{l \in \mathbb{Z}^g} \exp(s\pi i \langle l, \Omega l \rangle + 2\pi i \langle l_0, \Omega l \rangle + 2\pi i \langle l_0 + sl, z \rangle) A_1^{-l_1} \dots A_g^{-l_g} a_{l_0},$$

тогда

$$\theta^{r,s} = \sum_{l_0} \theta_{a_{l_0}}^{r,s}.$$

Обозначим через C_j наибольшее из двух чисел $\|A_j^{-1}\|$ и $\|A_j\|$, тогда норма каждого слагаемого в ряде для $\theta_{a_{l_0}}^{r,s}$ не превосходит

$$|\exp(s\pi i \langle l, \Omega l \rangle + 2\pi i \langle l_0, \Omega l \rangle + 2\pi i \langle l_0 + sl, z \rangle)| C_1^{|l_1|} \dots C_g^{|l_g|} \|a_{l_0}\|,$$

следовательно, в силу положительной определенности $\text{Im} \Omega$ этот ряд сходится абсолютно. Мы получили следующий результат.

Лемма 1. *Размерность пространства векторных тэта-функций степени s ранга r равна rs^g .*

Укажем пример матриц A_j . В качестве A_1 возьмем матрицу с недиагональной жордановой формой, в качестве остальных A_j можно взять многочлены от A_1 . Если же жордановы формы матриц A_j диагональны, то расслоение, отвечающее набору A_j , является прямой суммой линейных расслоений.

3. Коммутирующие операторы

В этом разделе сформулируем теорему Накаяшики [1] в нужном для нас частном случае голоморфных векторных расслоений ранга $r \geq 1$, инвариантных относительно сдвигов на элементы X^g . Используя преобразование Фурье — Мукаи этих расслоений, введем модули Бейкера — Ахиезера M_c^j над кольцами дифференциальных операторов \mathcal{D}_j . В следствии 2 будет показано, что отображение ограничения функций из M_c^j на подмногообразии $Y^{j+1} \subset Y^j$ задает эпиморфизм $M_c^j \rightarrow M_c^{j+1}$. В теореме 3 будет доказана свобода \mathcal{D}_j -модуля M_c^j . В следствии 3 покажем, что коэффициенты операторов $L_k(\mathcal{A}_k)$ удовлетворяют эволюционным уравнениям.

Через $\text{Pic}^0(X^g)$ обозначим многообразие Пикара X^g . В нашем случае X^g и $\text{Pic}^0(X^g)$ изоморфны. Обозначим через \mathcal{P} расслоение Пуанкаре над $X^g \times \text{Pic}^0(X^g)$. Сечения \mathcal{P} при подъеме на $\mathbb{C}^g \times \mathbb{C}^g$ задаются функциями $f(z, x)$ такими, что

$$f(z + \Omega m_1 + n_1, x + \Omega m_2 + n_2) = \exp(-2\pi i(\langle m_1, x \rangle + \langle m_2, z \rangle))f(z, x),$$

где $m_j, n_j \in \mathbb{Z}^g$.

Пусть Y является нулями некоторой тэта-функции ϑ (ранга 1) степени s ,

$$\vartheta(z + \Omega m + n) = \exp(-s\pi i\langle m, \Omega m \rangle - 2s\pi i\langle m, z \rangle)\vartheta(z).$$

Через \mathcal{L}_c обозначим голоморфное векторное расслоение над X^g , сечения которого задаются вектор-функциями $f(z)$ ранга r на \mathbb{C}^g со свойством

$$f(z + \Omega m + n) = \exp(-2\pi i\langle m, c \rangle)A_1^{m_1} \dots A_g^{m_g} f(z), \quad m, n \in \mathbb{Z}^g, c \in \mathbb{C}^g. \quad (1)$$

Отметим, что расслоение \mathcal{L}_c инвариантно относительно сдвигов на элементы X^g . Пусть \mathcal{L} — пространство глобальных сечений расслоения \mathcal{L}_0 с полюсом на Y , π — проекция $X^g \times \text{Pic}^0(X^g) \rightarrow X^g$. Обозначим через $F(Y, \mathcal{L}_0)(U)$ пространство мероморфных сечений расслоения $\pi^*\mathcal{L}_0 \otimes \mathcal{P}$ над $X^g \times U$ с полюсом на $Y \times U$, где U — открытое подмножество в $\text{Pic}^0(X^g)$. При фиксированном $x \in U$ пространство $F(Y, \mathcal{L}_0)(U)$ совпадает с пространством

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} H^0(X^g, \mathcal{L}_x(jY)).$$

Через $\mathcal{L}_x(jY)$ будем иногда обозначать расслоение $\mathcal{L}_x \otimes [jY]$, где $[jY]$ — линейное расслоение, ассоциированное с дивизором jY . Векторные расслоения и соответствующие им пучки аналитических сечений мы для простоты обозначаем одним и тем же символом. Пространство $H^0(X^g, \mathcal{L}_x(jY))$ можно отождествить с пространством глобальных сечений расслоения \mathcal{L}_x с полюсом на Y , причем порядок полюса не превышает j .

Пространство $F(Y, \mathcal{L}_0)(U)$ называется *преобразованием Фурье — Мукаи над U пространства \mathcal{L}* .

На $F(Y, \mathcal{L}_0)(U)$ действуют операторы ковариантного дифференцирования

$$\nabla_j = \partial_{x_j} - \frac{1}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z) : F(Y, \mathcal{L}_0)(U) \rightarrow F(Y, \mathcal{L}_0)(U),$$

$$\nabla_k \nabla_j = \nabla_j \nabla_k, \quad k, j = 1, \dots, g,$$

которые снабжают $F(Y, \mathcal{L}_0)(U)$ структурой модуля над кольцом $\mathcal{O}_U[\nabla_1, \dots, \nabla_g]$, где \mathcal{O}_U — кольцо аналитических функций на U . Из построения следует, что $F(Y, \mathcal{L}_0)(U)$ является также модулем над кольцом мероморфных функций \mathcal{A}_0 на X^g с полюсом на Y .

Обозначим через \mathcal{D}_g кольцо дифференциальных операторов $\mathcal{O}_g[\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_g}]$, где \mathcal{O}_g — кольцо аналитических функций по переменным x_1, \dots, x_g , определенных в окрестности $0 \in \mathbb{C}^g$. В [1] введен модуль Бейкера — Ахиезера

$$M_c = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_c(n)$$

над кольцом дифференциальных операторов \mathcal{D}_g , где

$$M_c(n) = \left\{ f(z, x) \exp\left(-\sum_{j=1}^g \frac{x_j}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z)\right), f(z, x) \in \mathbb{H}^0(X, \mathcal{L}_{c+x}(nY)) \right\}.$$

Нам понадобится еще один \mathcal{D}_g -модуль

$$\mathcal{D}_g M_c(n) = \left\{ \sum d\varphi, d \in \mathcal{D}_g, \varphi \in M_c(n) \right\}.$$

Элементы M_c можно выразить через векторные тэта-функции. Любая вектор-функция из M_c представляется в виде суммы вектор-функций вида

$$g(x) \frac{\theta^{r,sn}(z + \frac{x+c}{sn})}{\vartheta^n(z)} \exp\left(-\sum_{j=1}^g \frac{x_j}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z)\right),$$

где $g(x) \in \mathcal{O}_g$, $\theta^{r,sn}$ — некоторая векторная тэта-функция.

В [1] доказана

Теорема Накаяшики. Для c общего положения M_c — свободный \mathcal{D}_g -модуль ранга N . Справедливо равенство $M_c = \mathcal{D}_g M_c(g)$.

Равенство $M_c = \mathcal{D}_g M_c(g)$ означает, что \mathcal{D}_g -модуль M_c порождается элементами из $M_c(g)$.

Зафиксируем базис $\Phi_c = (\phi_{1,c}(z, x), \dots, \phi_{N,c}(z, x))^T$ в \mathcal{D}_g -модуле M_c . Иногда, как и в следующем следствии, мы под Φ_c будем понимать матричную функцию, в которой N строк и r столбцов, поскольку каждая компонента $\phi_{j,c}(z, x)$ сама является вектор-функцией размера r .

Следствие 1 [1]. Существует кольцевое вложение

$$L_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow \text{Mat}(N, g),$$

определенное равенством

$$L_0(\lambda)\Phi_c = \lambda\Phi_c, \quad \lambda \in \mathcal{A}_0.$$

Образом вложения является коммутативное кольцо g -мерных матричных дифференциальных операторов.

Перейдем к нашей конструкции. На самом деле мы докажем теорему 1 в более сильном варианте. Будем считать, что гиперповерхность Y_{a_j} может

быть не только сдвигом Y , но и сдвигом некоторой гладкой гиперповерхности, линейно эквивалентной Y , т. е. Y_{a_j} является нулями некоторой тэта-функции степени s со сдвигом

$$Y_{a_j} = \{z \in X^g, \vartheta_j(z - a_j) = 0\}.$$

Через \mathcal{L}_c^k обозначим линейное расслоение над Y^k , сечения которого задаются функциями $f(z)$ на $Y^k \subset \mathbb{C}^g$ со свойством (1).

Введем модуль Бейкера – Ахиезера

$$M_c^k = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_c^k(n)$$

над \mathcal{D}_{g-k} , где

$$M_c^k(n) = \left\{ f(z, x) \exp\left(-\sum_{j=1}^g \frac{x_j}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z)\right), f(z, x) \in H^0(Y^k, \mathcal{L}_{c+x}^k(nQ^k)) \right\}.$$

Справедлива

Теорема 3. Для s общего положения M_c^k является свободным \mathcal{D}_{g-k} -модулем ранга N .

Для доказательства этой теоремы нам понадобится

Лемма 2. *Отображение ограничения*

$$\begin{aligned} \pi_j : H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j)) &\rightarrow H^0(Y^{j+1}, \mathcal{L}_{c+x}^{j+1}(nQ^{j+1})), \\ \pi_j(\varphi) &= \varphi|_{Y^{j+1}}, \quad n \geq 1, j \geq 0, \end{aligned}$$

является эпиморфизмом для x в общем положении.

Через Y^0 , \mathcal{L}_c^0 и Q^0 мы обозначаем соответственно X^g , \mathcal{L}_c и Y .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть F – расслоение ранга r над X^g , инвариантное относительно сдвигов. Через F_c обозначим расслоение $F \otimes \mathcal{P}_c$, где \mathcal{P}_c – ограничение расслоения Пуанкаре на $X^g \times \{c\}$. В [1] (см. пример 5.8 и предложение 5.10) доказано, что

$$H^i(X^g, F_c(nY)) = 0, \quad i \geq 1, n \geq 1, \quad (2)$$

$$H^i(X^g, F_c(nY)) = 0, \quad i \neq g, n \leq -1, \quad (3)$$

и для точки c в общем положении при $i \geq 0$ выполнено равенство

$$H^i(X^g, F_c) = 0. \quad (4)$$

Отметим, что расслоение

$$\mathcal{L}_c \otimes [sY] \otimes [-Y_{a_1}] \otimes \cdots \otimes [-Y_{a_s}]$$

инвариантно относительно сдвигов, где $1 \leq s \leq k$, поскольку таковыми являются \mathcal{L}_c и $[Y] \otimes [-Y_{a_j}]$. Значит,

$$H^i(X^g, \mathcal{L}_c \otimes [nY] \otimes [-Y_{a_1}] \otimes \cdots \otimes [-Y_{a_s}]) = 0, \quad (5)$$

где $1 \leq i < g$, $n \in \mathbb{Z}$. Имеется точная последовательность пучков

$$0 \rightarrow \mathcal{L}_c^j \otimes [nQ^j] \otimes [-Y^{j+1}] \rightarrow \mathcal{L}_c^j \otimes [nQ^j] \rightarrow \mathcal{L}_c^{j+1} \otimes [nQ^{j+1}] \rightarrow 0. \quad (6)$$

Из длинной точной когомологической последовательности, отвечающей этой последовательности пучков, следует, что для доказательства сюръективности π_j достаточно установить равенство

$$H^i(Y^j, \mathcal{L}_c^j \otimes [nQ^j] \otimes [-Y^{j+1}]) = 0. \quad (7)$$

Из (5) немедленно вытекает сюръективность π_0 . Для доказательства (7) рассмотрим следующую точную последовательность:

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \mathcal{L}_c^j \otimes [nQ^j] \otimes [-(Y^j \cap Y_{a_{j+1}})] \otimes \cdots \otimes [-(Y^j \cap Y_{a_{j+s}})] \\ \rightarrow \mathcal{L}_c^j \otimes [nQ^j] \otimes [-(Y^j \cap Y_{a_{j+2}})] \otimes \cdots \otimes [-(Y^j \cap Y_{a_{j+s}})] \\ \rightarrow \mathcal{L}_c^{j+1} \otimes [nQ^{j+1}] \otimes [-(Y^{j+1} \cap Y_{a_{j+2}})] \otimes \cdots \otimes [-(Y^{j+1} \cap Y_{a_{j+s}})] \rightarrow 0, \end{aligned} \quad (8)$$

где $j + s \leq k$. Из длинных точных когомологических последовательностей, отвечающих (6) и (8), используя (2)–(4), индукцией по j получаем

$$H^i(Y^j, \mathcal{L}_c^j \otimes [nQ^j] \otimes [-(Y^j \cap Y_{a_{j+1}})] \otimes \cdots \otimes [-(Y^j \cap Y_{a_{j+s}})]) = 0, \quad (9)$$

где $1 \leq i < g - j$, $j + s \leq k$. Следовательно, отображение π_j сюръективно. Лемма доказана.

Отметим также, что, если $n > g$, то равенство (9) выполнено при $i \geq 1$.

Из леммы 2 выводим

Следствие 2. *Отображение ограничения*

$$\pi_j : M_c^j \rightarrow M_c^{j+1}, \quad \pi_j(\varphi) = \varphi|_{Y^{j+1}},$$

является эпиморфизмом для c в общем положении.

Нам также понадобится

Лемма 3. *Линейная оболочка множества*

$$\left\{ \bigcup_{b, \varphi} \frac{\vartheta_{j+1}(z-b)}{\vartheta(z)} \varphi, \varphi \in H^0(X^g, \mathcal{L}_{c+sb}((n-1)Y)), b \in \mathbb{C}^g \right\},$$

где $n > g$ и объединение берется по всем b и φ , совпадает с $H^0(X^g, \mathcal{L}_c(nY))$.

Доказательство. Рассмотрим последовательность отображений

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(X^g, \mathcal{L}_c(nY)) \xrightarrow{\pi_0} H^0(Y^1, \mathcal{L}_c^1(nQ^1)) \xrightarrow{\pi_1} \dots \\ \dots \xrightarrow{\pi_{g-2}} H^0(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1})) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Через Y^{g-1} мы обозначили риманову поверхность $Y^{g-2} \cap Y_{a_{g-1}}$, где a_{g-1} — некоторый элемент X^g . Отображения π_0, \dots, π_{g-3} являются сюръективными по лемме 2. Так как (9) выполнено при $n > g$, то π_{g-2} является также сюръективным. Следовательно, для доказательства леммы достаточно показать, что линейная оболочка ограничения вектор-функций, указанных в лемме, на Y^{g-1} совпадает с $H^0(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1}))$. Выберем b_1 и $b_2 \in \mathbb{C}^g$ так, чтобы дивизоры $B_1 = Y_{b_1} \cap Y^{g-1}$ и $B_2 = Y_{b_2} \cap Y^{g-1}$ не пересекались. Заметим, что из (6), (8) и (9) следуют равенства

$$H^1(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}]) = 0,$$

$$H^1(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_i]) = 0,$$

$$H^1(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_1] \otimes [-B_2]) = 0.$$

Тогда по теореме Римана – Роха имеем

$$\begin{aligned} h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}]) &= \deg(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}]) - (g(Y^{g-1}) - 1)r, \\ h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_i]) &= \deg(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_i]) - (g(Y^{g-1}) - 1)r, \\ h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_1] \otimes [-B_2]) &= \deg(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_1] \otimes [-B_2]) - (g(Y^{g-1}) - 1)r, \end{aligned}$$

где h^0 — размерность H^0 , $g(Y^{g-1})$ — род Y^{g-1} . Так как дивизоры B_1 и B_2 не пересекаются, то

$$\begin{aligned} \dim(H^0(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1}) \otimes [-B_1]) \cap H^0(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1}) \otimes [-B_2])) \\ = h^0(\mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1}) \otimes [-B_1] \otimes [-B_2]). \end{aligned}$$

Напомним, что $H^0(Y^{g-1}, \mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1}) \otimes [-B_j])$ мы отождествляем с пространством глобальных сечений $\mathcal{L}_c^{g-1}(nQ^{g-1})$, имеющих нули в точках дивизора B_j . Отсюда следует равенство

$$\begin{aligned} h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}]) &= h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_1]) \\ &+ h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_2]) - h^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}] \otimes [-B_1] \otimes [-B_2]), \end{aligned}$$

которое означает, что линейная оболочка ограничения $W(b_1) \cup W(b_2)$ на Y^{g-1} совпадает с $H^0(\mathcal{L}_c^{g-1} \otimes [nQ^{g-1}])$, где

$$W(b) = \left\{ \frac{\vartheta_{j+1}(z-b)}{\vartheta(z)} \varphi, \varphi \in H^0(X^g, \mathcal{L}_{c+sb}((n-1)Y)) \right\}.$$

Это завершает доказательство леммы.

Заметим, что мы доказали даже большее. В условии леммы 3 можно брать объединение не по всем b , а достаточно взять множество

$$W(a_1) \cup \dots \cup W(a_{g-2}) \cup W(b_1) \cup W(b_2).$$

Обозначим через S_n^g размерность пространства дифференциальных операторов по g переменным с постоянными коэффициентами, степень которых не превышает $n-1$. Нетрудно проверить, что

$$S_n^g = C_{n+g-1}^{n-1} = \frac{n(n+1)\dots(n+g-1)}{g!}.$$

Введем еще одно обозначение

$$\mathcal{F}_j(n) = \dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_c^j(nQ^j)), \quad 0 \leq j < g-1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. Выберем однородный базис Φ_c в \mathcal{D}_g -модуле M_c так, чтобы его ограничение на подмногообразии Y^j порождало \mathcal{D}_j -модуль M_c^j , т. е.

$$M_c^j = \{d_1\phi_{1,c}|_{Y^j} + \dots + d_N\phi_{N,c}|_{Y^j}, d_i \in \mathcal{D}_g\}.$$

Это возможно сделать в силу следствия 2. Под однородностью базиса мы понимаем следующее. Во-первых, все элементы базиса Φ_c содержатся в $M_c(g)$ (это требование выполнимо по теореме Накаяшики). И, во-вторых, если $\phi_{1,c}, \dots, \phi_{1,K}$

— элементы базиса, которые принадлежат $M_c(n)$, $n \leq g$, то они порождают $M_c(n)$. Иными словами,

$$\{d_1\phi_{1,c} + \dots + d_K\phi_{K,c}, d_j \in \mathcal{D}_g\} \cap M_c(n) = M_c(n).$$

Обозначим через a_n^g число элементов базиса Φ_c , принадлежащих $M_c(n)$, но не принадлежащих $M_c(n-1)$. В силу однородности базиса и свободности \mathcal{D}_g -модуля M_c справедливо равенство

$$a_1^g S_n^g + \dots + a_g^g S_{n-g+1}^g = \mathcal{F}_0(n), \quad n > g.$$

Через $\mathcal{D}_{g-j}\Phi_c^j \subset M_c^j$ обозначим \mathcal{D}_{g-j} -модуль

$$\{\varphi|_{Y^j}, \varphi = d_1\phi_{1,c} + \dots + d_N\phi_{N,c}, d_s \in \mathcal{D}_{g-j}\}.$$

Докажем индукцией по k , что $\mathcal{D}_{g-k}\Phi_c^k$ является свободным \mathcal{D}_{g-k} -модулем ранга N . Затем, вычислив размерности пространств $M_c^j(n)$ и $\mathcal{D}_{g-j}\Phi_c^j \cap M_c^j(n)$ (при фиксированном x), мы установим, что эти \mathcal{D}_{g-k} -модули совпадают.

Начальный шаг индукции — это теорема Накаяшики. Пусть при $k = j$ утверждение доказано. Из свободности \mathcal{D}_{g-j} -модуля M_c^j вытекает равенство

$$a_1^g S_n^{g-j} + \dots + a_g^g S_{n-g+1}^{g-j} = \mathcal{F}_j(n), \quad n > g. \quad (10)$$

Предположим, что \mathcal{D}_{g-j-1} -модуль $\mathcal{D}_{g-j-1}\Phi_c^{j+1}$ не является свободным при $k = j+1 < g$. Тогда существуют операторы $\tilde{d}_i \in \mathcal{D}_{g-j-1}$ такие, что

$$\phi = \tilde{d}_1\phi_{1,c} + \dots + \tilde{d}_N\phi_{N,c}, \quad \phi|_{Y^{j+1}} = 0.$$

Это эквивалентно тому, что найдется элемент из $M_c^j(n)$ (можно считать, что $n > g$) вида

$$\frac{\vartheta_j(z - a_{j+1})}{\vartheta(z)}\varphi, \quad \varphi \in M_{c-a_{j+1}}^j(n-1),$$

для которого справедливо равенство

$$\tilde{d}_1\phi_{1,c} + \dots + \tilde{d}_N\phi_{N,c} = \frac{\vartheta_{j+1}(z - a_{j+1})}{\vartheta(z)}\varphi, \quad z \in Y^j. \quad (11)$$

Введем подпространство в $H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j))$:

$$V_{c+x}^j(n) = \left\{ \frac{\psi}{e} \Big|_{Y^j}, \psi = d_1\phi_{1,c} + \dots + d_{N,c}\phi_N, d_i \in \mathcal{D}_{g-j-1} \right\} \cap H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j)),$$

где

$$e = \exp\left(-\sum_{j=1}^g \frac{x_j}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z)\right).$$

Найдем размерность пространства $V_{c+x}^j(n)$. Из (10) вытекают равенства

$$\begin{aligned} a_1^g (S_n^{g-j} - S_{n-1}^{g-j}) + \dots + a_g^g (S_{n-g+1}^{g-j} - S_{n-g}^{g-j}) &= a_1^g S_n^{g-j-1} + \dots + a_g^g S_{n-g+1}^{g-j-1} \\ &= \mathcal{F}_j(n) - \mathcal{F}_j(n-1) = \mathcal{F}_{j+1}(n), \end{aligned}$$

следовательно,

$$\dim V_{c+x}^j(n) = \mathcal{F}_j(n) - \mathcal{F}_j(n-1). \quad (12)$$

Введем еще одно подпространство в $H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j))$, зависящее от элемента a_{j+1} :

$$W_{c+x}^j(n) = \left\{ \frac{\vartheta_{j+1}(z - a_{j+1})}{\vartheta(z)} \varphi, \varphi \in H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x+sa_{j+1}}^j((n-1)Q^j)), z \in Y^j \right\}.$$

Ясно, что

$$\dim W_{c+x}^j(n) = \mathcal{F}_j(n-1),$$

так как $\dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x+sa_{j+1}}^j((n-1)Q^j)) = \mathcal{F}_j(n-1)$.

Из лемм 2 и 3 вытекает, что существует элемент a_{j+1} , для которого равенство вида (11) невозможно. Поскольку

$$\dim V_{c+x}^j(n) + \dim W_{c+x}^j(n) = \dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j)),$$

равенство вида (11) невозможно для элементов из некоторой малой окрестности a_{j+1} . В силу аналитической зависимости пространства $W_{c+x}^j(n)$ от a_{j+1} равенство вида (11) не выполняется для открытого всюду плотного множества таких a_{j+1} . Следовательно, так как по нашему предположению набор a_1, \dots, a_k находится в общем положении, \mathcal{D}_{g-j-1} -модуль $\mathcal{D}_{g-j-1}\Phi_c^{j+1}$ является свободным ранга N .

Докажем, что \mathcal{D}_{g-j-1} -модули $\mathcal{D}_{g-j-1}\Phi_c^{j+1}$ и M_c^{j+1} совпадают.

Из того, что $\frac{\vartheta_j(z)}{\vartheta(z)}$ является мероморфной функцией, и из точности последовательности (6) вытекают равенства

$$\begin{aligned} & \dim H^0(Y^{j+1}, \mathcal{L}_{c+x}^{j+1}(nQ^{j+1})) \\ &= \dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j)) - \dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j((n)Q^j) \otimes [-Y^{j+1}]) \\ &= \dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j(nQ^j)) - \dim H^0(Y^j, \mathcal{L}_{c+x}^j((n-1)Q^j)) = \mathcal{F}_j(n) - \mathcal{F}_j(n-1). \end{aligned}$$

Так как справедливо включение $\mathcal{D}_{g-j-1}\Phi_c^{j+1} \subset M_c^{j+1}$ и из (12) следует, что

$$\dim H^0(Y^{j+1}, \mathcal{L}_{c+x}^{j+1}(nQ^{j+1})) = \dim V_{c+x}^j(n) = \mathcal{F}_{j+1}(n),$$

то \mathcal{D}_{g-j-1} -модули $\mathcal{D}_{g-j-1}\Phi_c^{j+1}$ и M_c^{j+1} совпадают. Теорема 3 доказана.

Покажем, как из теоремы 3 вывести теоремы 1 и 2. Обозначим через

$$\Phi_c = (\phi_{1,c}(z, x), \dots, \phi_{N,c}(z, x))^T$$

базис в \mathcal{D}_{g-k} -модуле M_c^k . Тогда по теореме 3 для $\lambda \in \mathcal{A}_k$ существует единственный оператор $L_k(\lambda) \in \text{Mat}(N, g-k)$ такой, что

$$L_k(\lambda)\Phi_c = \lambda\Phi_c.$$

Для различных λ операторы $L_k(\lambda)$ попарно коммутируют. Теорема 1 доказана.

Обозначим через $T_j \in \text{Mat}(N, g-k)$ оператор порядка g , определенный равенством

$$T_j\Phi_c = \partial_{t_j}\Phi_c,$$

время t_j , $1 \leq j \leq k$, мы отождествляем с переменной x_{g-k} . Справедливы равенства

$$[L_k(\lambda), T_j - \partial_{t_j}]\Phi = 0, \quad [T_m - \partial_{t_m}, T_n - \partial_{t_n}]\Phi = 0.$$

Тогда из теоремы 3 вытекает

Следствие 3. *Справедливы эволюционные уравнения*

$$\frac{\partial L_k(\lambda)}{\partial t_j} = [L_k(\lambda), T_j], \quad \lambda \in \mathcal{A}_k,$$

$$\frac{\partial T_m}{\partial t_n} - \frac{\partial T_n}{\partial t_m} = [T_n, T_m].$$

Перейдем к доказательству теоремы 2. Разделим каждую вектор-функцию $\phi_{j,c}(z, x)$ на

$$\exp\left(-\sum_{j=g-k+1}^g \frac{x_j}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z)\right),$$

затем заменим $x = (x_1, \dots, x_g)$ на

$$(x, t) = \left(x_1, \dots, x_{g-k}, \sum_m t_{1,m}, \dots, \sum_m t_{k,m}\right),$$

где $m = (m_1, \dots, m_g) \in \mathbb{Z}^g$, $m_1 + \dots + m_g \geq 2$, $m_i \geq 0$, и, наконец, умножим на

$$\exp\left(-\sum_{j=1}^k \sum_m \frac{t_{j,m}}{s} (\partial_{z_{g-k+j}} \log \vartheta(z) + \partial_z^m \log \vartheta(z))\right),$$

где

$$\partial_z^m \log \vartheta(z) = \partial_{z_1}^{m_1} \dots \partial_{z_g}^{m_g} \log \vartheta(z).$$

Получим вектор-функцию $\psi_{j,c}(z, x, t)$, которая представляется в виде суммы вектор-функций:

$$g(x, t) \frac{\theta^{r,sn}\left(z + \frac{(x,t)+c}{sn}\right)}{\vartheta^n(z)} \exp\left(-\sum_{j=1}^{g-k} \frac{x_j}{s} \partial_{z_j} \log \vartheta(z) - \sum_{j=1}^k \sum_m \frac{t_{j,m}}{s} (\partial_{z_{g-k+j}} \log \vartheta(z) + \partial_z^m \log \vartheta(z))\right).$$

Тогда для

$$\Psi = (\psi_{1,c}(z, x, t), \dots, \psi_{N,c}(z, x, t))^T$$

справедливо равенство

$$L_{j,m} \Psi = \partial_{t_{j,m}} \Psi.$$

По теореме 3 имеет место равенство

$$[\partial_{t_{j,m}} - L_{j,m}, \partial_{t_{i,n}} - L_{i,n}] = 0.$$

Теорема 2 доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Nakayashiki A. Commuting partial differential operators and vector bundles over Abelian varieties // Amer. J. Math. 1994. V. 116. P. 65–100.
2. Nakayashiki A. Structure of Baker — Akhiezer modules of principally polarized Abelian varieties, commuting partial differential operators and associated integrable systems // Duke Math. J. 1991. V. 42, N 2. P. 315–358.
3. Миронов А. Е. Коммутативные кольца дифференциальных операторов, связанные с двумерными абелевыми многообразиями // Сиб. мат. журн. 2000. Т. 41, № 6. С. 1389–1403.

4. Миронов А. Е. Вещественные коммутирующие дифференциальные операторы, связанные с двумерными абелевыми многообразиями // Сиб. мат. журн. 2002. Т. 43, № 1. С. 126–143.
5. Rothstein M. Sheaves with connection on abelian varieties // Duke Math. J. 1996. V. 84, N 3. P. 565–598.
6. Кричевер И. М. Методы алгебраической геометрии в теории нелинейных уравнений // Успехи мат. наук. 1977. Т. 32, № 6. С. 183–208.
7. Mukai S. Duality between $D(X)$ and $D(\widehat{X})$ with its application to Picard sheaves // Nagoya Math. J. 1981. V. 81. P. 153–175.

Статья поступила 6 декабря 2001 г.

Миронов Андрей Евгеньевич

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск 630090

`mironov@math.nsc.ru`