

ОБ ОТНОШЕНИИ Σ -СВОДИМОСТИ МЕЖДУ ДОПУСТИМЫМИ МНОЖЕСТВАМИ

А. С. Морозов

Аннотация: Изучается сводимость на допустимых множествах, являющаяся усилением обычной Σ -представимости моделей, неформальным прообразом которой может служить интерпретируемость одних вычислительных устройств в других. Получены критерии сводимости для рекурсивно развернутых и чистых множеств, введено понятие скачка и получены наилучшие оценки для ординалов скачков, показана переносимость сводимости на НУР-надстройки. Приведены некоторые результаты о соотношении этой сводимости с уже известными сводимостями.

Ключевые слова: определимость, вычислимость, сводимость, допустимое множество.

1. Введение

Один из многочисленных способов неформального понимания допустимых множеств — это представление о них как о некоторых вычислительных устройствах, для которых Σ -формулы являются программами. Стоит отметить, что из этой идеи возникло целое направление, называемое семантическим программированием или Σ -программированием (см., например, [1–3]).

В практике программирования очень часто используется интерпретация одной вычислительной модели в другой. Например, можно считать, что это происходит на некоторых этапах трансляции программ, написанной на алгоритмическом языке высокого уровня, в язык машинных команд. К подобным примерам можно, видимо, также отнести и эмуляцию одной операционной системы в другой, позволяющей запускать программы, написанные для одной системы, на компьютерах с установленной другой системой (примером может служить возможность запуска некоторых программ, написанных для MS DOS, на компьютерах с операционной системой Linux).

Идейно это очень похоже на алгоритмические сводимости [4], когда один компьютер, снабженный более мощным оракулом, позволяет решать проблемы, решаемые тем же самым компьютером с подсоединенным более слабым оракулом. Однако обычно, когда говорят о сводимости, имеют в виду все-таки сводимость алгоритмических проблем, т. е. некоторых множеств. Мы же попытаемся в данной работе рассмотреть сводимость одних вычислительных устройств к другим в рамках теории допустимых множеств. Эта сводимость уже ранее рассматривалась в работе автора [5]. Близкими по духу являются $T\Sigma$ -сводимость на подмножествах допустимых множеств, введенная Ю. Л. Ершовым в [6], и

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 02–01–00593) и международным Российско-Германским грантом РФФИ–ННИО (N 01–01–04003 ННИОа).

сводимость на счетных алгебраических системах конечной сигнатуры, рассмотренная А. Н. Хисамиевым в [7].

Перейдем к определениям.

Основные понятия и результаты теории допустимых множеств можно найти в [6, 8].

Мы будем различать обозначения $f(x)$ (которое будет, как обычно, употребляться для результата применения функции f к аргументу x) и $f[x]$ (обозначающее множество $\{f(y) \mid y \in x\}$). Транзитивное замыкание элемента a будем обозначать, как обычно, через $TC(a)$. Допустимое множество называется *рекурсивно развернутым*, если существует Σ -отображение из его ординала на него самого.

Основным определением, используемым в данной работе, является следующее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 [5]. Будем говорить, что допустимое множество \mathbb{A}_0 Σ -сводимо к допустимому множеству \mathbb{A}_1 , и обозначать этот факт как $\mathbb{A}_0 \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{A}_1$, если существует разнзначное отображение $i : \mathbb{A}_0 \rightarrow \mathbb{A}_1$ такое, что

1) $i[\mathbb{A}_0]$ является Σ -подмножеством \mathbb{A}_1 ;

2) для любого сигнатурного предиката P множества \mathbb{A}_0 (включая предикаты принадлежности \in и предикат U , выделяющий праэлементы) множества

$$\{\langle i(x_1), \dots, i(x_n) \rangle \mid \mathbb{A}_0 \models P(x_1, \dots, x_n)\},$$

$$\{\langle i(x_1), \dots, i(x_n) \rangle \mid \mathbb{A}_0 \models \neg P(x_1, \dots, x_n)\}$$

являются Σ -подмножествами в \mathbb{A}_1 ;

3) над \mathbb{A}_1 существует Σ -функция σ такая, что $\text{dom}(\sigma) = i[\mathbb{A}_0]$ и для любого $x \in \mathbb{A}_0$ выполнено $\sigma(i(x)) = i[x]$.

Будем называть допустимые множества \mathbb{A} и \mathbb{B} Σ -эквивалентными, если $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B}$ и $\mathbb{B} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{A}$.

Как заметил В. Г. Пузаренко, условие 3 в определении Σ -сводимости играет существенную роль и не следует из остальных условий. Действительно, рассмотрим вложение допустимых множеств $i : \mathbb{HYP}_{\omega} \rightarrow \mathbb{HF}_{\mathbb{HYP}_{\omega}}$ (здесь $i(x)$ равно праэлементу $x \in \mathbb{HF}_{\mathbb{HYP}_{\omega}}$). Оно удовлетворяет условиям 1 и 2 определения сводимости, но не удовлетворяет условию 3, поскольку в этом случае по предложению 1 было бы $\omega_1^{\text{CK}} = o(\mathbb{HYP}_{\omega}) \leq o(\mathbb{HF}_{\mathbb{HYP}_{\omega}}) = \omega$, что, очевидно, не так. Поэтому допустимое множество \mathbb{HYP}_{ω} Σ -определимо в $\mathbb{HF}_{\mathbb{HYP}_{\omega}}$ в смысле определения Ершова [6], но не Σ -сводимо к нему в смысле определения из данной работы.

Определение Σ -сводимости почти напоминает следующее определение Σ -определимости для моделей над допустимыми множествами, данное Ю. Л. Ершовым в [6]. (Исключение составляет только п. 3.) Мы приводим здесь эквивалентную формулировку.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Алгебраическая система $\mathfrak{A} = \langle A; P_0^{n_0}, \dots, P_k^{n_k} \rangle$ называется Σ -определимой в допустимом множестве \mathbb{A} , если существуют Σ -формулы (с параметрами в \mathbb{A})

$$S(x), E^+(x, y), E^-(x, y), \Psi_i^+(x_1, \dots, x_{n_i}), \Psi_i^-(x_1, \dots, x_{n_i}), \quad i = 1, \dots, k,$$

такие, что

1) $S^* = \{x \in \mathbb{A} \mid \mathbb{A} \models S(x)\} \neq \emptyset$;

2) формула $E^+(x, y)$ определяет отношение конгруэнтности η на модели

$$\mathfrak{A}^* = \langle S^*; P_1^*, \dots, P_k^* \rangle,$$

где $P_i^* = \{ \langle x_1, \dots, x_{n_i} \rangle \mid \mathbb{A} \models \Psi_i^+(x_1, \dots, x_{n_i}) \}$;

3) множества, определяемые формулами E^+ и E^- , не пересекаются и дают в объединении все $(S^*)^2$;

4) множества, определяемые формулами Ψ_i^+ и Ψ_i^- , не пересекаются и дают в объединении все $(S^*)^{n_i}$;

5) $\mathfrak{A}^*/\eta \cong \mathfrak{A}$.

Мы в своем определении Σ -сводимости для допустимых множеств не приводим дополнительного условия, касающегося конгруэнций, поскольку основным объектом нашего внимания будут рекурсивно развернутые множества, для которых этот пункт является излишним.

Образ предиката \in относительно вложения i из определения Σ -сводимости будем обозначать через E , т. е. $E = \{ \langle i(x), i(y) \rangle \mid x, y \in \mathbb{A}_0 \ \& \ x \in y \}$.

Следующая лемма доказана в [5, с. 336] индукцией по сложности построения Σ -формулы.

Лемма 1 (основное свойство). Пусть $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B}$, i — соответствующее вложение из определения Σ -сводимости и S — произвольное Σ -подмножество в \mathbb{A}^n , $n \in \omega$. Тогда $\{ \langle i(x_1), \dots, i(x_n) \rangle \mid \langle x_1, \dots, x_n \rangle \in S \}$ — Σ -подмножество в \mathbb{B} . \square

Отношение Σ -сводимости на допустимых множествах, очевидно, рефлексивно. В доказательстве транзитивности Σ -сводимости единственным не совсем тривиальным пунктом является, пожалуй, п. 3, в котором утверждается существование функции σ . Проверим его. Пусть $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}$, и пусть $\sigma_{\mathbb{B}}$ и $\sigma_{\mathbb{C}}$ — соответствующие функции для первой и второй из этих сводимостей соответственно. Пусть $i_{\mathbb{B}} : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ и $i_{\mathbb{C}} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{C}$ — вложения, упомянутые в определении. Пусть

$$\sigma_{\mathbb{B}}^* = \{ \langle i_{\mathbb{C}}(x), i_{\mathbb{C}}(y) \rangle \mid \langle x, y \rangle \in \sigma_{\mathbb{B}} \}.$$

По лемме 1 это Σ -функция на \mathbb{C} . Непосредственная проверка показывает, что Σ -функция

$$\sigma(x) = \sigma_{\mathbb{C}}(\sigma_{\mathbb{B}}^*(x))$$

удовлетворяет свойству

$$\sigma((i_{\mathbb{B}} \circ i_{\mathbb{C}})(x)) = \sigma(i_{\mathbb{C}}(i_{\mathbb{B}}(x))) = (i_{\mathbb{B}} \circ i_{\mathbb{C}})[x],$$

т. е. годится в качестве соответствующей функции из п. 3 определения Σ -сводимости. Транзитивность отношения Σ -сводимости доказана.

В доказательствах нам понадобится теорема Ганди. Приведем ее формулировку. Пусть $\varphi(x_1, \dots, x_n, R)$ — Σ -формула в языке, расширенном дополнительным n -местным предикатом R , все вхождения которого в эту формулу позитивны. С каждой такой формулой φ свяжем оператор, который переводит каждое подмножество $X \subseteq \mathbb{A}^n$ в множество $\Gamma^{\varphi}(X) \doteq \{ \bar{x} \in \mathbb{A}^n \mid \mathbb{A} \models \varphi(\bar{x}, X) \}$. Теперь для каждого ординала α определим

$$\Gamma_{\alpha}^{\varphi} \doteq \Gamma^{\varphi} \left(\bigcup_{\gamma < \alpha} \Gamma_{\gamma}^{\varphi} \right).$$

Легко проверить, что множества $\Gamma_{\alpha}^{\varphi}$ образуют возрастающую цепочку: $\Gamma_0^{\varphi} \subseteq \Gamma_1^{\varphi} \subseteq \dots$. Из теоретико-множественных соображений существует наименьший ординал, обычно обозначаемый через $|\Gamma^{\varphi}|$, такой, что $\Gamma_{|\Gamma^{\varphi}|+1}^{\varphi} = \Gamma_{|\Gamma^{\varphi}|}^{\varphi}$. Множество $\Gamma_{|\Gamma^{\varphi}|}^{\varphi}$ называется *наименьшей неподвижной точкой* оператора Γ^{φ} .

Теорема 1 (Р. Ганди, см. [6] или [8]). Пусть предикат R имеет только позитивные вхождения в формулу $\varphi(\bar{x}, R)$. Тогда

- 1) $|\Gamma^\varphi| \leq o(\mathbb{A})$;
- 2) каждое множество Γ_α^φ является Σ -подмножеством в \mathbb{A} ;
- 3) наименьшая неподвижная точка оператора Γ^φ является Σ -подмножеством в \mathbb{A} .

Следующее утверждение доказано в [5]. Мы приводим его доказательство для полноты изложения.

Предложение 1 [5]. Пусть $\mathbb{A} \sqsubseteq_\Sigma \mathbb{B}$. Тогда $o(\mathbb{A}) \leq o(\mathbb{B})$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что существует взаимно однозначное отображение из начального сегмента ординала $o(\mathbb{B})$ на ординал $o(\mathbb{A})$, сохраняющее порядок. В силу существования вложения i для этого достаточно построить взаимно однозначное отображение f из начального сегмента ординала $o(\mathbb{B})$ на множество $i[o(\mathbb{A})]$, сохраняющее порядок по типу $o(\mathbb{A})$, заданный отношением $x \in \sigma(y)$.

Это отображение f может быть определено как наименьшая неподвижная точка Σ -оператора

$$\Gamma(f) = f \cup \{ \langle \alpha, b \rangle \mid \forall x \in \sigma(b) \exists \beta \in \alpha (\langle \beta, x \rangle \in f \ \& \ \forall \beta \in \alpha \exists x \in \sigma(b) (\langle \beta, x \rangle \in f)) \}.$$

Нетрудно установить, что область определения f — начальный сегмент $o(\mathbb{B})$, а область значений — все множество $i[o(\mathbb{A})]$. Действительно, если бы область определения и область значений f были бы собственными начальными сегментами в $o(\mathbb{B})$ и $i[o(\mathbb{A})]$ (упорядоченного отношением E) соответственно, то f не была бы наименьшей неподвижной точкой оператора Γ . Если бы область значений f была начальным сегментом $i[o(\mathbb{A})]$, а область определения равнялась всему множеству $o(\mathbb{B})$, то по Σ -выборке мы получили бы одно из хорошо известных противоречий в теории допустимых множеств: $o(\mathbb{B}) \in \mathbb{B}$. \square

2. Критерии Σ -сводимости для рекурсивно развернутых допустимых множеств

Напомним, что через $\mathbb{V}_{\mathfrak{M}}$ обозначается класс всех множеств, которые можно получить из элементов множества \mathfrak{M} как из праэлементов (см. [8]).

Допустимые множества, существование которых утверждается в следующем предложении, играют важную роль в дальнейшем.

Предложение 2. Пусть $\mathbb{A} \leq_{\text{end}} \mathbb{V}_{\mathfrak{M}}$ — допустимое множество. Для любого одноместного Δ -предиката $R \subseteq o(\mathbb{A})$ над \mathbb{A} существует наименьшее по включению множество $G[R]$ такое, что модель $\mathbb{G}[R] = \langle G[R]; \in, R \rangle$ является чистым допустимым множеством, $\mathbb{G}[R] \leq_{\text{end}} \mathbb{A}$ и $R \subseteq G[R]$. Носитель $G[R]$ этого допустимого множества не зависит от выбора \mathbb{A} и совпадает с пересечением всех допустимых множеств произвольной сигнатуры, в которых R является Δ -подмножеством. Допустимое множество $\mathbb{G}[R]$ является рекурсивно развернутым. Оно же является пересечением всех допустимых множеств \mathbb{B} , содержащих R как подмножество, для которых $\langle \mathbb{B}, R \rangle$ — допустимое множество. Кроме того, выполнено $\mathbb{G}[R] \sqsubseteq_\Sigma \mathbb{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО почти дословно повторяет известные доказательства существования \mathbb{HYP} над моделями (см., например, [6, 8]). Разница только в том, что для построения нам потребуется выполнение дополнительного условия $R \subseteq$

$\mathbb{G}[R]$. Поскольку некоторые идеи и определения из доказательства нам потребуются в дальнейшем, мы приводим схему доказательства.

Расширим сигнатуру допустимого множества \mathbb{A} новым предикатным символом \widehat{R} , интерпретируемым как R . Хорошо известно [8], что в расширенной сигнатуре множество \mathbb{A} остается допустимым множеством. Зафиксируем две различные переменные x и p , а также некоторую Σ -формулу, задающую во всех допустимых множествах отображение $n \mapsto \psi_n(x, p)$ из ω на множество всех формул первого порядка сигнатуры $\langle \in, \widehat{R} \rangle$, все свободные переменные которых содержатся в множестве $\{x, p\}$.

Определим индукцией по α функцию $L_\alpha[R]$ следующим образом:

$$\begin{aligned} L_0[R] &= \emptyset; \\ L_{\alpha+1}[R] &= L_\alpha[R] \cup \{L_\alpha[R]\} \cup \text{Def}^\alpha(L_\alpha[R] \cup \{L_\alpha[R]\}); \\ L_\lambda[R] &= \bigcup_{\alpha < \lambda} L_\alpha[R], \quad \text{если } \lambda \text{ — предельный ординал,} \end{aligned}$$

где Σ -функция $\text{Def}^\alpha(S)$ определена, как множество всех множеств, определенных как показано ниже, исходя из параметров из множества S и формул с номерами, не превосходящими α . Более точно,

$$\text{Def}^\alpha(S) = \text{Def}_d^\alpha(S) \cup \text{Def}_u^\alpha(S) \cup \text{Def}_p^\alpha(S),$$

где

$$\text{Def}_d^\alpha(S) = \{t \mid \exists n < \alpha \exists p \in S (t = \{x \in S \mid \langle S; \in, R \rangle \models \psi_n(x, p)\})\};$$

$$\text{Def}_u^\alpha(S) = \{\cup x \mid x \in S\}; \quad \text{Def}_p^\alpha(S) = \{\{x, y\} \mid x, y \in S\}.$$

Далее доказывается следующая

Лемма 2. *Для любого допустимого множества \mathbb{A} , в котором R является Δ -подмножеством в $o(\mathbb{A})$, семейство $\widehat{\mathbb{A}}[R] = \bigcup_{\alpha < o(\mathbb{A})} L_\alpha[R]$ — допустимое множество в сигнатуре $\langle \in, R \rangle$.*

Таким образом, существует хотя бы один ординал $\alpha \leq o(\mathbb{A})$, для которого $L_\alpha[R]$ — допустимое множество в сигнатуре, расширенной предикатом для R , и R является подмножеством в $L_\alpha[R]$. Возьмем теперь наименьший ординал γ такой, что множество $L_\gamma[R]$ является допустимым множеством в расширенной сигнатуре и $R \subseteq L_\gamma[R]$. Допустимое множество $L_\gamma[R]$ (в сигнатуре $\langle \in, R \rangle$) будет искомым.

Заметим также, что допустимое множество $\mathbb{G}[R]$ является рекурсивно развернутым. Соответствующее Σ -отображение из его ординала на него самого строится стандартным образом точно так же, как и для конструктивных множеств в [8]. \square

Отметим, что для любого $R \in \mathbb{V}_{\mathfrak{M}}$ существует хотя бы одно допустимое множество \mathbb{A} , в котором R — Δ -предикат. Достаточно взять кардинал $\kappa = (|\text{TC}(R)|)^+$ и рассмотреть допустимое множество $\mathbb{H}_\kappa(\mathfrak{M}) = \{a \in \mathbb{V}_{\mathfrak{M}} \mid |\text{TC}(a)| < \kappa\}$. Поэтому в силу предложения 2 допустимое множество $\mathbb{G}[R]$ однозначно определено для любого множества $R \in \mathbb{V}_{\mathfrak{M}}$, состоящего из ординалов, и, стало быть, условие существования \mathbb{A} в предложении 2 является излишним.

Теорема 2. Любое рекурсивно развернутое допустимое множество Σ -эквивалентно некоторому чистому рекурсивно развернутому допустимому множеству.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала введем понятие правильного перечисления и диаграммы допустимого множества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Пусть \mathbb{A} — рекурсивно развернутое допустимое множество и Σ -отображение $e : o(\mathbb{A}) \xrightarrow{\text{на}} \mathbb{A}$ перечисляет его с помощью ординалов. Назовем e *правильным перечислением*, если для любых x, y из \mathbb{A} выполняется условие $x \in y \rightarrow e^{-1}(x) < e^{-1}(y)$.

Другими словами, перечисление e правильное, если оно перечисляет любой элемент a не ранее, чем будут перечислены все элементы $x \in a$.

Лемма 3 (о правильном перечислении). У каждого рекурсивно развернутого допустимого множества существует взаимно однозначное правильное перечисление.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $e_0 : o(\mathbb{A}) \rightarrow \mathbb{A}$ — некоторое перечисление допустимого множества \mathbb{A} . Определим отображение e индукцией по транзитивному замыканию следующим образом:

$$e(\alpha) = e_0(\min\{\beta \mid \forall x \in e_0(\beta)(x \in \text{range}(e \upharpoonright \alpha)) \ \& \ e_0(\beta) \notin \text{range}(e \upharpoonright \alpha)\}).$$

В силу своего определения e — разнзначная взаимно однозначная Σ -функция. Нетрудно также убедиться, что ее область определения есть начальный сегмент $o(\mathbb{A})$.

Сначала покажем, что область значений функции e есть все \mathbb{A} . Предположим, что это не так. Тогда по фундированности существуют элементы x , не попавшие в $\text{range}(e)$, но все элементы y , удовлетворяющие условию $y \in x$, содержатся в $\text{range}(e)$. Среди всех таких элементов возьмем элемент a , имеющий наименьший e_0 -номер. По Σ -выборке найдется ординал α_0 такой, что $e \upharpoonright \alpha_0 \supseteq a$. Тогда в силу определения $e(\alpha_0) = a$; противоречие.

Далее, область определения этой функции совпадает с $o(\mathbb{A})$, поскольку в противном случае мы получаем Σ -отображение e^{-1} из ординала $o(\mathbb{A})$ в свой начальный сегмент.

Осталось заметить, что функция e правильно перечисляет \mathbb{A} , ибо каждый раз, когда новое значение попадает в $\text{range}(e)$, все его элементы к этому моменту уже находятся там. Лемма доказана.

Зафиксируем для дальнейшего некоторое правильное перечисление e для \mathbb{A} .

Определим теперь понятие *диаграммы*. Сначала заметим, что существует Σ -формула $\pi(x, y, z)$ без параметров, задающая на любом допустимом множестве \mathbb{A} взаимно однозначное отображение

$$c : o(\mathbb{A}) \times o(\mathbb{A}) \rightarrow o(\mathbb{A}); \quad c(x, y) = z \stackrel{\text{df}}{\iff} \pi(x, y, z),$$

т. е. кодирующая пары ординалов. При этом отображения c , определенные для разных допустимых ординалов, продолжают друг друга. Это можно доказать, сначала рассмотрев на семействе конструктивных элементов $L(\mathbb{A})$ множества \mathbb{A} стандартное перечисление $e : o(L(\mathbb{A})) \rightarrow L(\mathbb{A})$ ($o(L(\mathbb{A})) = o(\mathbb{A})$), заданное во всех таких множествах одной и той же Σ -формулой без параметров (см. [8]), потом выделив из него Σ -перечисление множества всех пар ординалов (соответствующим образом преобразовав эту формулу). Искомая формула

$\pi(x, y, z)$ получается из последней формулы релятивизацией всех неограниченных кванторов существования относительно Σ -предиката $x \in L$ (т. е. « x — конструктивный элемент»). Функции раскодирования $(z)_0 = x \leftrightarrow \exists yc(x, y) = z$ и $(z)_1 = y \leftrightarrow \exists yc(x, y) = z$ также задаются во всех допустимых множествах Σ -формулами без параметров. Мы будем использовать также функции для кодирования n -ок ординалов. Они определяются, как обычно:

$$c^2(x_0, x_1) = c(x_0, x_1); \quad c^{n+1}(x_0, \dots, x_n) = c(x_0, c^n(x_1, \dots, x_n)).$$

Нетрудно показать, что для любого $n \geq 2$ существуют также Σ -функции $(\cdot)_0^n, \dots, (\cdot)_{n-1}^n$ для раскодирования n -ок, удовлетворяющие условиям:

$$(c^n(x_0, \dots, x_{n-1}))_k^n = x_k \quad \text{для всех } k = 0, \dots, n-1;$$

$$c^n((x)_0^n, \dots, (x)_{n-1}^n) = x.$$

Легко видеть, что все эти Σ -функции могут быть определены Σ -формулами без параметров, поскольку они выразимы через c , $(\cdot)_0$ и $(\cdot)_1$. Так, например, $(x)_0^n = (x)_0$, $(x)_1^n = ((x)_1)_0$ и т. д.

Если A и B — два множества ординалов, то под $A \oplus B$ будем понимать множество $\{c(\alpha, 0) \mid \alpha \in A\} \cup \{c(\alpha, 1) \mid \alpha \in B\}$. Зафиксируем какой-нибудь способ расстановки скобок, например, считаем, что $A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$.

Теперь мы можем определить понятие *диаграммы* рекурсивно развернутого допустимого множества \mathbb{A} . Пусть $Q(x_1, \dots, x_n)$ — произвольный сигнатурный предикат допустимого множества \mathbb{A} . Определим

$$D_Q^e(\mathbb{A}) = \{c^n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \mid \mathbb{A} \models Q(e(\alpha_1), \dots, e(\alpha_n))\} \\ \oplus \{c^n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \mid \mathbb{A} \models \neg Q(e(\alpha_1), \dots, e(\alpha_n))\}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Назовем *диаграммой допустимого множества \mathbb{A} относительно его правильного перечисления e* множество ординалов

$$D^e(\mathbb{A}) = D_U^e(\mathbb{A}) \oplus D_\varepsilon^e(\mathbb{A}) \oplus D_{P_1}^e(\mathbb{A}) \oplus \dots \oplus D_{P_k}^e(\mathbb{A});$$

здесь суммирование берется по всем сигнатурным предикатам из \mathbb{A} . В дальнейшем индекс e будет опускаться.

Нам будут важны следующие свойства диаграмм:

- 1) $D(\mathbb{A})$ есть Δ -подмножество \mathbb{A} ;
- 2) если $D(\mathbb{A})$ — Σ -подмножество некоторого допустимого множества \mathbb{B} , то $D(\mathbb{A})$ — Δ -подмножество \mathbb{B} .

Последнее свойство следует из того, что для любого предиката $P_i^{n_i}$ и для любых ординалов $\alpha_1, \dots, \alpha_{n_i}$ выполнено либо $\langle c^{n_i}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n_i}), 0 \rangle \in D_{P_i}(\mathbb{A})$, либо $\langle c^{n_i}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n_i}), 1 \rangle \in D_{P_i}(\mathbb{A})$.

Докажем, что каждое рекурсивно развернутое множество \mathbb{A} эквивалентно чистому множеству $\mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$, откуда и будет следовать утверждение теоремы. Поскольку, как легко видеть, $\sup D(\mathbb{A}) = o(\mathbb{A})$, имеем $o(\mathbb{G}[D(\mathbb{A})]) \geq o(\mathbb{A})$. Определим вложение $i : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$ следующим образом: $i(x) = e^{-1}(x)$. Образ этого вложения является начальным отрезком ординала $o(\mathbb{G}[D(\mathbb{A})])$ и поэтому является Σ -подмножеством. Свойство 2 определения Σ -сводимости вытекает из того, что $D(\mathbb{A})$ — Δ -подмножество в $\mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$. Докажем справедливость свойства 3. При определении функции σ существенно используется правильность

перечисления e . Поскольку e — правильное перечисление, функция σ может быть определена так:

$$\sigma(\alpha) = \{\beta < \alpha \mid D(\mathbb{A}) \text{ утверждает, что } e(\beta) \in e(\alpha)\}.$$

Таким образом, $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$.

Сводимость $\mathbb{G}[D(\mathbb{A})] \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{A}$ следует из описания построения семейства $\mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$. \square

Учитывая введенные в доказательстве обозначения, можно уточнить теорему 2 следующим образом.

Теорема 3. Пусть \mathbb{A} — рекурсивно развернутое допустимое множество. Тогда $\mathbb{G}[D(\mathbb{A})] \equiv_{\Sigma} \mathbb{A}$.

Теорема 4 (критерий Σ -сводимости для рекурсивно развернутых множеств). Пусть \mathbb{A} — рекурсивно развернутое допустимое множество и \mathbb{B} — произвольное допустимое множество. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B}$;
- (2) любое Σ -подмножество $S \subseteq o(\mathbb{A})$ в \mathbb{A} является Σ -подмножеством в \mathbb{B} ;
- (3) любое Δ -подмножество $S \subseteq o(\mathbb{A})$ в \mathbb{A} является Δ -подмножеством в \mathbb{B} ;
- (4) $D(\mathbb{A})$ является Δ -подмножеством \mathbb{B} ;
- (5) $D(\mathbb{A})$ является Σ -подмножеством \mathbb{B} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) \rightarrow (2). Пусть $\mathbb{A} \sqsubseteq \mathbb{B}$ и $C \subseteq o(\mathbb{A})$ — Σ -подмножество в \mathbb{A} . Пусть также i — соответствующее вложение из определения Σ -сводимости. По лемме 1 множество $i[S]$ будет Σ -подмножеством \mathbb{B} . Для доказательства достаточно построить Σ -функцию g из начального отрезка ординалов допустимого множества \mathbb{B} на множество $i[o(\mathbb{A})]$ такую, что для любых $\alpha, \beta < o(\mathbb{A})$ будет справедливо $\alpha \in \beta \Leftrightarrow g(\alpha) \in g(\beta)$. Такая функция может быть определена индукцией по транзитивному замыканию для всех $\alpha < o(\mathbb{A})$ следующим образом:

$$g(\alpha) = y \Leftrightarrow \sigma(y) = \{g(\beta) \mid \beta \in \alpha\}.$$

Область определения функции g есть $o(\mathbb{A}) \subseteq o(\mathbb{B})$, а область ее значений — все $i[o(\mathbb{A})]$. Теперь можно определить S внутри \mathbb{B} как $g^{-1}[i[S]]$, откуда и получим, что S — Σ -подмножество \mathbb{B} .

(2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (5) очевидно.

(5) \rightarrow (4) \rightarrow (1) вытекает из определения $D(\mathbb{A})$. \square

Следующая теорема показывает, что на чистых рекурсивно развернутых множествах отношение Σ -сводимости фактически сводится к включению в качестве начального сегмента, являющегося Σ -подмножеством.

Теорема 5 (критерий Σ -определимости для чистых множеств).

(1) Пусть \mathbb{A} — чистое допустимое множество, \mathbb{B} — произвольное допустимое множество и $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B}$. Тогда множество элементов \mathbb{A} есть Σ -подмножество в \mathbb{B} и все сигнатурные предикаты \mathbb{A} , а также их дополнения относительно \mathbb{A} являются Σ -определимыми в \mathbb{B} . При этом универсум допустимого множества \mathbb{A} будет начальным сегментом допустимого множества \mathbb{B} .

(2) Пусть \mathbb{A} и \mathbb{B} — допустимые множества, \mathbb{A} — начальный сегмент в \mathbb{B} и одновременно Σ -подмножество в \mathbb{B} . Пусть при этом все сигнатурные предикаты в \mathbb{A} а также их дополнения относительно \mathbb{A} являются Σ -предикатами в \mathbb{B} . Тогда $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) Пусть $i : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ — вложение из \mathbb{A} в \mathbb{B} , как в определении Σ -сводимости, и пусть σ — Σ -функция из определения Σ -сводимости.

Используя теорему Ганди, определим однозначную Σ -функцию $h : i[\mathbb{A}] \rightarrow \mathbb{B}$ как наименьшую неподвижную точку оператора

$$\Gamma(X) = X \cup \{ \langle a, b \rangle \mid \forall x \in \sigma(a) \exists y \in b (\langle x, y \rangle \in X) \ \& \ \forall y \in b \exists x \in \sigma(a) (\langle x, y \rangle \in X) \}.$$

Проверка по индукции показывает, что эта функция однозначна и задает изоморфизм из структуры $\langle i[\mathbb{A}], E \rangle$ на начальный сегмент допустимого множества \mathbb{B} . Отсюда следует, что композиция $i \circ h : x \mapsto h(i(x))$ является изоморфизмом из \mathbb{A} на начальный сегмент \mathbb{B} . В силу того, что по лемме о корректности образ любого Σ -подмножества в \mathbb{A} относительно i является Σ -подмножеством в \mathbb{B} и h — Σ -отображение, образ любого Σ -предиката относительно $i \circ h$ является Σ -предикатом над \mathbb{B} . Отсюда получаем Σ -определимость всех сигнатурных предикатов допустимого множества \mathbb{A} и их дополнений относительно \mathbb{A} .

(2) Очевидно. \square

Следствие 1. Пусть \mathbb{A} и \mathbb{B} — Σ -эквивалентные рекурсивно развернутые чистые допустимые множества. Тогда носители этих допустимых множеств совпадают и предикаты каждого из них Δ -определимы в другом. \square

Следствие 2. Пусть \mathbb{A} — чистое рекурсивно развернутое допустимое множество. Тогда имеет место равенство множеств $\mathbb{A} = \mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$. (Заметим, что при этом дополнительный предикат в $\mathbb{G}[D(\mathbb{A})]$, выделяющий $D(\mathbb{A})$, Δ -определим, исходя из остальных предикатов этого множества.) \square

Таким образом, у каждого рекурсивно развернутого допустимого множества имеется Σ -эквивалентный ему представитель, являющийся чистым допустимым множеством, и Σ -сводимость на этих представителях выглядит как включение в виде начального Σ -сегмента плюс Σ -определимость всех предикатов и их отрицаний.

3. Дальнейшие свойства Σ -сводимости

Теперь можно перейти к доказательству существования точных верхних граней для отношения Σ -сводимости по модулю Σ -эквивалентности для рекурсивно развернутых допустимых множеств.

Теорема 6. Для любых двух рекурсивно развернутых множеств \mathbb{A} и \mathbb{B} существует рекурсивно развернутое допустимое множество \mathbb{C} такое, что $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}$, $\mathbb{B} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}$, и для любого допустимого множества \mathbb{C}' такого, что $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}'$ и $\mathbb{B} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}'$, выполнено $\mathbb{C} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}'$.

Доказательство. Покажем, что множество $\mathbb{C} = \mathbb{G}[D(\mathbb{A}) \oplus D(\mathbb{B})]$ годится в качестве искомого. В самом деле, по предложению 2 и теореме 4 имеем $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}$, $\mathbb{B} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}$. С другой стороны, если рекурсивно развернутое множество \mathbb{C}' таково, что $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}'$ и $\mathbb{B} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}'$, то по теореме 4 $D(\mathbb{A})$ и $D(\mathbb{B})$ являются Δ -подмножествами \mathbb{C}' . Заметим, что в силу предложения 2 выполнено $\mathbb{C} = \mathbb{G}[D(\mathbb{A}) \oplus D(\mathbb{B})] \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{C}'$. \square

Не рекурсивно развернутое допустимое множество может оказаться эквивалентным рекурсивно развернутому. Простым примером является пара допустимых множеств $\mathbb{H}\mathbb{F}_{\omega}$ и $\mathbb{H}\mathbb{F}_S$, где S — счетное множество. Таким образом, из эквивалентности некоторого допустимого множества рекурсивно развернутому множеству не следует, что оно рекурсивно развернуто, а из эквивалентности некоторого допустимого множества нерекурсивно развернутому множеству еще не следует отсутствие в нем свойства рекурсивной развернутости.

Нетрудно также доказать следующую теорему.

Теорема 7. *Существует допустимое множество, не эквивалентное никакому чистому допустимому множеству и никакому рекурсивно развернутому допустимому множеству.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Напомним, что согласно предложению 1 эквивалентные допустимые множества имеют одинаковые ординалы.

Рассмотрим множество $\mathbb{H}\mathbb{F}_X$, где X — множество праэлементов мощности ω_1 . Если оно Σ -эквивалентно какому-нибудь чистому допустимому множеству, то ординал этого множества равен ω , откуда легко получить, что это множество равно $\mathbb{H}\mathbb{F}_\emptyset$, т. е. счетно. Если же $\mathbb{H}\mathbb{F}_X$ эквивалентно некоторому рекурсивно развернутому допустимому множеству, то ординал такого допустимого множества равен ω , откуда опять получается счетность этого допустимого множества. Но допустимое множество $\mathbb{H}\mathbb{F}_X$ не может быть Σ -эквивалентно никакому счетному допустимому множеству из мощностных соображений. \square

Теорема 8. *Пусть \mathbb{A} и \mathbb{B} — допустимые множества. Тогда*

- 1) *если $\mathbb{A} \sqsubseteq_\Sigma \mathbb{B}$, то $\mathbb{H}\mathbb{Y}\mathbb{P}(\mathbb{A}) \sqsubseteq_\Sigma \mathbb{H}\mathbb{Y}\mathbb{P}(\mathbb{B})$;*
- 2) *если $\mathbb{A} \equiv_\Sigma \mathbb{B}$, то $\mathbb{H}\mathbb{Y}\mathbb{P}(\mathbb{A}) \equiv_\Sigma \mathbb{H}\mathbb{Y}\mathbb{P}(\mathbb{B})$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Заметим, что второй пункт теоремы есть следствие первого. Поэтому мы докажем первый пункт.

Напомним один из методов построения $\mathbb{H}\mathbb{Y}\mathbb{P}$ над \mathbb{A} . (Мы дадим это определение в духе соответствующего определения из [6], от которого оно отличается лишь непринципиальными вариациями. Данная конструкция фактически использовалась при доказательстве предложения 2.) Сначала фиксируется некоторое Σ -перечисление $\varphi_i(x, p)$, $i \in \omega$, всех формул первого порядка исходной сигнатуры $\langle \in, U, P_0^{n_0}, \dots, P_k^{n_k} \rangle$ допустимого множества \mathbb{A} со свободными переменными из множества $\{x, p\}$ ($x \neq p$), определяемое во всех допустимых множествах некоторой формулой без параметров. Потом предполагается, что универсум множества \mathbb{A} (обозначаемый здесь через $|\mathbb{A}|$) — транзитивный элемент некоторого допустимого множества \mathbb{C} (такие множества существуют; таково, например, допустимое множество, состоящее из всех множеств, у которых носитель есть подмножество $|\mathbb{A}|$, а транзитивное замыкание имеет мощность меньше, чем $\text{card}(\mathbb{A})^+$ [8]). Затем на ординалах множества \mathbb{C} определяется Σ -функция L_α :

$$\begin{aligned} L_0 &= |\mathbb{A}|; \\ L_{\alpha+1} &= L_\alpha \cup \{L_\alpha\} \cup \text{Def}_\alpha(L_\alpha \cup \{L_\alpha\}); \\ L_\gamma &= \bigcup_{\delta < \gamma} L_\delta, \end{aligned}$$

где Σ -функция $\text{Def}_\alpha(S)$ определена как множество всех множеств, определенных, как показано ниже, исходя из параметров из множества S и формул с номерами, не превосходящими α . Более точно,

$$\text{Def}_\alpha(S) = \text{Def } D_\alpha(S) \cup \text{Def } U_\alpha(S) \cup \text{Def } P_\alpha(S),$$

где

$$\text{Def } D_\alpha(S) = \{t \mid \exists n < \alpha \exists p \in S (t = \{x \in S \mid \langle S; \in, U, P_0^{n_0}, \dots, P_k^{n_k} \rangle \models \varphi_n(x, p)\})\};$$

$$\text{Def } U_\alpha(S) = \{ux \mid x \in S\}; \quad \text{Def } P_\alpha(S) = \{\{x, y\} \mid x, y \in S\}.$$

Потом доказывается, что $L_{o(\mathbb{C})}$ образует допустимое множество. Наконец, берется наименьший ординал α_0 такой, что L_{α_0} образует допустимое множество,

и для него получается $\text{НУР}(\mathbb{A}) = L_{\alpha_0}$. При этом оказывается, что $\text{НУР}(\mathbb{A})$ не зависит от выбора \mathbb{C} .

Возьмем вложение $i : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ из определения Σ -сводимости для допустимых множеств и по нему определим другое вложение $i^* : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$, которое тоже будет годиться для определения Σ -сводимости и обладать рядом полезных свойств, указанных ниже в доказательстве, главным из которых будет возможность по шагам естественно расширять образ этого отображения в процессе построения $\text{НУР}(\mathbb{A})$. Мы получим $i^* : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ как композицию $j \circ i$, где j — отображение из $i[\mathbb{A}]$ в \mathbb{B} , заданное следующим образом:

$$\begin{aligned} j(p) &= \langle p, 0 \rangle, \quad \text{если } p \text{ — образ праэлемента относительно } i; \\ j(a) &= \{ \langle j(x), 1 \rangle \mid x \in \sigma(a) \} \quad \text{в противном случае.} \end{aligned}$$

Отображение j Σ -определимо, поскольку является наименьшей неподвижной точкой Σ -оператора Γ , определенного как

$$\begin{aligned} \Gamma(f) &= f \cup \{ \langle i(p), 0 \rangle \mid \mathbb{A} \models U(p) \} \cup \{ \langle x, y \rangle \mid x \in i[\mathbb{A}] \\ &\quad \&\mathbb{A} \models U(i^{-1}(x)) \&\forall t \in \sigma(x) (\langle f(t), 1 \rangle \in y) \&\forall t \in y \exists u \in \sigma(x) (t = \langle f(u), 1 \rangle) \}. \end{aligned}$$

Покажем, что j — однозначное отображение. Пусть $j(a_0) = j(b_0)$ для некоторых $a_0, b_0 \in i[\mathbb{A}]$, $a_0 \neq b_0$. Если оба элемента $i^{-1}(a_0)$ и $i^{-1}(b_0)$ — праэлементы, то из определения j следует, что $a_0 = b_0$. Значит, этот случай невозможен.

Рассмотрим теперь случай, когда $i^{-1}(a_0)$ — праэлемент в \mathbb{A} , а $i^{-1}(b_0)$ — нет. Это предположение приводит к равенствам вида

$$\{ \{x, \emptyset\}, \{ \emptyset \} \} = \langle x, 0 \rangle = \{ \langle \xi, 1 \rangle, \langle \zeta, 1 \rangle \dots \} = \{ \{ \{ \xi, 1 \}, \{ 1 \} \}, \{ \{ \zeta, 1 \}, \{ 1 \} \} \dots \}.$$

Но тогда, несмотря на то, что $\langle x, 0 \rangle$ включает в себя элемент, содержащий \emptyset , это не выполнено для последней части цепочки равенств. Значит, этот случай тоже невозможен.

Единственно возможный случай: $i^{-1}(a_0)$ и $i^{-1}(b_0)$ не праэлементы в \mathbb{A} . Рассмотрим

$$c_0 = \{ \langle j(x), 1 \rangle \mid x \in \sigma(a_0) \} = j(a_0) = j(b_0) = \{ \langle j(x), 1 \rangle \mid x \in \sigma(b_0) \}.$$

Среди элементов множества $\{z \mid \langle z, 1 \rangle \in c_0\}$ есть элемент c_1 такой, что $j(a_1) = j(b_1) = c_1$ для некоторых $a_1, b_1 \in i[\mathbb{A}]$, $a_1 \neq b_1$ (иначе бы было $\sigma(a_0) = \sigma(b_0)$, откуда $a_0 = b_0$). Продолжая этот процесс, получим бесконечную убывающую цепочку:

$$c_0 \ni \langle c_1, 1 \rangle \ni \{c_1, 1\} \ni c_1 \ni \langle c_2, 1 \rangle \ni \{c_2, 1\} \ni c_2 \ni \dots,$$

что противоречит фундированности отношения \in .

Композиция $i^* = i \circ j$ является, таким образом, вложением из \mathbb{A} в \mathbb{B} . В силу того, что j — Σ -определимая функция, отображение i^* тоже годится в качестве вложения из определения Σ -сводимости. Обозначим образ отношения принадлежности относительно i^* через E^* , образ предиката U через U^* , а образы остальных сигнатурных предикатов P_0, \dots, P_k — через P_0^*, \dots, P_k^* соответственно. Достоинствами этого отображения i^* являются единообразные определения основных отношений:

- 1) $\forall x, y \in i^*[\mathbb{A}] (x E^* y \Leftrightarrow \langle x, 1 \rangle \in y)$;
- 2) $\forall x \in i^*[\mathbb{A}] (U^*(x) \Leftrightarrow \exists y (x = \langle y, 0 \rangle))$;
- 3) функция $\sigma^*(x)$ из определения Σ -сводимости, выдающая по x множество $\{y \in i^*[\mathbb{A}] \mid y E^* x\}$, определяется как $\sigma^*(x) = \{y \mid \langle y, 1 \rangle \in x\}$;

4) если $\langle x, 1 \rangle \in y \in i^*[\mathbb{A}]$, то $x \in i^*[\mathbb{A}]$.

Эти свойства, в частности, позволяют некоторым единым способом расширять множество $i^*[\mathbb{A}]$ на шагах построения НУР.

Определим на всем \mathbb{B}

$$x \in^* y \Leftrightarrow \langle x, 1 \rangle \in y.$$

Очевидно, что $E^* \subseteq \in^*$.

Теперь мы будем строить Σ -функцию L^* из $o(\text{НУР}(\mathbb{B}))$ в $\text{НУР}(\mathbb{B})$ одновременно с семейством изоморфизмов

$$\delta_\alpha : \langle L_\alpha, \in, U, P_0, \dots, P_k \rangle \rightarrow \langle L_\alpha^*, \in^*, U^*, P_0^*, \dots, P_k^* \rangle, \quad \alpha < o(\text{НУР}(\mathbb{B})),$$

которые будут удовлетворять условиям

$$\delta_0 = i^*,$$

$$\delta_\alpha \subseteq \delta_\beta \quad \text{при } \alpha \leq \beta < o(\text{НУР}(\mathbb{B})).$$

Пусть формула $\varphi_i^*(x, p)$ в упомянутом выше перечислении получается заменой всех вхождений \in на \in^* , U на U^* , P_i на P_i^* , $i = 0, \dots, k$. Определим Σ -функцию $\alpha \mapsto L_\alpha^*$, $\alpha : o(\text{НУР}(\mathbb{B})) \rightarrow \text{НУР}(\mathbb{B})$, таким образом:

$$\begin{aligned} L_0^* &= i^*[\mathbb{A}]; \\ L_{\alpha+1}^* &= L_\alpha^* \cup (L_\alpha^* \times \{1\}) \cup \text{Def}_\alpha^*(L_\alpha^* \cup (L_\alpha^* \times \{1\})); \\ L_\lambda^* &= \bigcup_{\alpha < \lambda} L_\alpha^*, \quad \text{если } \lambda \text{ — предельный ординал,} \end{aligned}$$

где $\text{Def}_\alpha^*(S)$ — это аналог функции L_α для отношения \in^* из доказательства предложения 2. А именно,

$$\text{Def}_\alpha^*(S) = \text{Def } D_\alpha^*(S) \cup \text{Def } U_\alpha^*(S) \cup \text{Def } P_\alpha^*(S),$$

где отображения $\text{Def } D_\alpha^*(S)$, $\text{Def } U_\alpha^*(S)$ и $\text{Def } P_\alpha^*(S)$ заданы следующим образом.

$\text{Def } D_\alpha^*(S)$ задает семейство всех «подмножеств» (в смысле отношения \in^*), формульно определимых в модели $\langle S; \in^*, U^*, P_0^* \upharpoonright S, \dots, P_k^* \upharpoonright S \rangle$ с параметром $p \in S$ формулами $\varphi_i^*(x, p)$, $i < \alpha$, т. е.

$$\text{Def } D_\alpha^*(S) = \{ \{ \langle x, 1 \rangle \mid \langle S; U^*, \in^*, P_0^*, \dots, P_k^* \rangle \models \varphi_i^*(x, p) \} \mid i < \alpha, p \in S \}.$$

Ясно, что в нашем случае функция $\text{Def } D_\alpha^*(S)$ Σ -определима.

$\text{Def } U_\alpha^*(S)$ задает семейство всех «объединений» (относительно модифицированного отношения принадлежности \in^*) элементов из S . Точнее, определим операцию $\cup^* x$ так же, как определяется операция обычного объединения, но с заменой \in на \in^* :

$$\forall t (t \in^* \cup^* x \Leftrightarrow \exists y \in^* x (t \in^* y)).$$

Операция \cup^* является Σ -отображением на \mathbb{B} , поскольку может быть задана следующим способом:

$$\cup^* x = \{ t \in \text{TC}(x) \times \{1\} \mid \exists y \in \text{TC}(x) (\langle y, 1 \rangle \in x \& \langle t, 1 \rangle \in y) \}.$$

Функция $\text{Def } U_\alpha^*(S)$ тоже, очевидно, Σ -определима.

$\text{Def } P_\alpha^*(S)$ задает множество всех «пар» элементов $x, y \in S$ относительно отношения \in^* , т. е.

$$\text{Def } P_\alpha^*(S) = \{ \{ \langle x, 1 \rangle, \langle y, 1 \rangle \} \mid x, y \in S \}.$$

Ясно, что и функция $\text{Def } P_\alpha^*(S)$ в нашем случае Σ -определима.

Вложение δ_α расширяется до вложения $\delta_{\alpha+1}$ естественным единственным образом.

Теперь если мы докажем, что модель $\mathbb{L}^* = \langle L^*, \in^*, U^*, P_o^*, \dots, P_k^* \rangle$, где $L^* = \bigcup_{\alpha < o(\text{HYP}(\mathbb{B}))} L_\alpha^*$, удовлетворяет всем аксиомам КРУ, то это будет означать, что вложение $\delta_{o(\text{HYP}(\mathbb{A}))}$ вкладывает $\text{HYP}(\mathbb{A})$ в $\text{HYP}(\mathbb{B})$, при этом выполнение всех остальных условий определения Σ -сводимости для этого вложения достаточно очевидно, т. е. теорема будет доказана.

Видимо, самая сложная аксиома КРУ для проверки в данном случае — это Δ_0 -выборка. Проверим ее истинность. Предположим, что

$$\mathbb{L}^* \models \forall x \in^* a \exists y \varphi^*(x, y, p).$$

Заменим в формуле φ все вхождения подформулы вида $u \in^* v$ на $\langle u, 1 \rangle \in v$ и все вхождения остальных предикатов на их Σ - или Π -определения (в зависимости от того, положительно или отрицательно данное вхождение предиката), ограниченные кванторы $\exists u \in^* v(\dots)$ на $\exists u \in \text{TC}(a)(\langle u, 1 \rangle \in v \& (\dots))$, ограниченные кванторы $\forall u \in^* v(\dots)$ на $\forall u \in \text{TC}(a)(\langle u, 1 \rangle \in v \Rightarrow (\dots))$. В результате получится Σ -формула $\varphi(x, y, p)$ такая, что для любых $x, y \in L^* \mathbb{B} \models \varphi(x, y, p)$ эквивалентно $\mathbb{L}^* \models \varphi^*(x, y, p)$. Тогда

$$\mathbb{B} \models \forall x \in \text{TC}(a)(\langle x, 1 \rangle \in a \rightarrow \exists \alpha \exists y \in L_\alpha^* \varphi(x, y, p)).$$

По Σ -выборке найдется ординал $\alpha_0 < o(\mathbb{B})$ такой, что

$$\mathbb{B} \models \forall x \in \text{TC}(a)(\langle x, 1 \rangle \in a \rightarrow \exists y \in L_{\alpha_0}^* \varphi(x, y, p)).$$

Отсюда следует, что

$$\mathbb{L}^* \models \forall x \in^* a \exists y \in L_{\alpha_0}^* \varphi^*(x, y, p),$$

откуда, в свою очередь, получаем

$$\mathbb{L}^* \models \forall x \in^* a \exists y \in^* L_{\alpha_0+1}^* \varphi^*(x, y, p),$$

что доказывает теорему. \square

4. Σ -сводимость как сводимость на множествах ординалов

Изучаемая нами Σ -сводимость на чистых рекурсивно развернутых допустимых множествах находится в тесной естественной связи со следующей сводимостью на множествах ординалов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Пусть A и B — множества ординалов. Будем говорить, что A слабо Σ -сводится к B (и обозначать через $A \sqsubseteq_\Sigma B$), если A есть Δ -подмножество в $\mathbb{G}[B]$. Будем говорить, что A Σ -эквивалентно B (и обозначать через $A \equiv_\Sigma B$), если $A \sqsubseteq_\Sigma B$ и $B \sqsubseteq_\Sigma A$.

Следующие утверждения легко вытекают из рассуждений, приведенных выше.

Теорема 9. Пусть A и B — множества ординалов. Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $A \sqsubseteq_\Sigma B$;
- 2) $\mathbb{G}[A] \sqsubseteq_\Sigma \mathbb{G}[B]$. \square

Теорема 10. Пусть \mathbb{A} и \mathbb{B} — рекурсивно развернутые допустимые множества. Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B}$;
- 2) $D(\mathbb{A}) \sqsubseteq_{\Sigma} D(\mathbb{B})$. \square

Далее, как обычно, факторизуя отношения \equiv_{Σ} сводимости на множествах ординалов и на допустимых множествах, обозначая класс эквивалентности объекта S (т. е. его степень) через S/\equiv и, наконец, перенося отношения сводимости \sqsubseteq_{Σ} на соответствующие степени, получим следующую теорему.

Теорема 11. Отображение $A/\equiv \mapsto \mathbb{G}[A]/\equiv$ является корректно определенным изоморфным отображением из класса всех степеней множеств ординалов по слабой Σ -сводимости на класс всех степеней рекурсивно развернутых множеств по Σ -сводимости.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Корректность и сохранение отношения сводимости следуют из теоремы 9, а сюръективность — из теоремы 3. \square

5. Скачки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Пусть \mathbb{A} — рекурсивно развернутое допустимое множество и $W_{\mathbb{A}}$ — универсальный Σ -предикат над \mathbb{A} для подмножеств из $o(\mathbb{A})$. Назовем допустимое множество $\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}]$ скачком для \mathbb{A} и будем обозначать его через $J(\mathbb{A})$.

Предложение 3. Пусть \mathbb{A} и \mathbb{B} — рекурсивно развернутые допустимые множества. Тогда справедливы следующие утверждения:

- (1) $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} J(\mathbb{A})$;
- (2) $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{B} \Rightarrow J(\mathbb{A}) \sqsubseteq_{\Sigma} J(\mathbb{B})$;
- (3) $\mathbb{A} \equiv_{\Sigma} \mathbb{B} \Rightarrow J(\mathbb{A}) \equiv_{\Sigma} J(\mathbb{B})$;
- (4) $J(\mathbb{A}) \not\sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{A}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) Поскольку $W_{\mathbb{A}}$ — универсальный Σ -предикат над \mathbb{A} и $D[\mathbb{A}]$ — Σ -подмножество (даже Δ -подмножество) ординалов в \mathbb{A} , найдется $i < o(\mathbb{A})$ такое, что

$$D[\mathbb{A}] = \{x \mid c(x, i) \in W_{\mathbb{A}}\}.$$

Так как $W_{\mathbb{A}}$ — Δ -подмножество в $\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}]$, получаем, что $D[\mathbb{A}]$ — Δ -подмножество в $\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}]$, откуда ввиду теоремы 4 выводим (1).

(2) Поскольку множество $W_{\mathbb{A}} \subseteq o(\mathbb{A})$ Σ -определимо над \mathbb{A} , по теореме 4 оно же Σ -определимо и над \mathbb{B} . Значит, существует i такое, что

$$W_{\mathbb{A}} = \{x \mid c(x, i) \in W_{\mathbb{B}}\}.$$

Отсюда, в свою очередь, вытекает Δ -определимость множества $W_{\mathbb{A}}$ над $\mathbb{G}[W_{\mathbb{B}}] = J(\mathbb{B})$. Наконец, из этого по теореме 9 получаем требуемое.

(3) Следует из (2).

(4) Следует из того, что если (4) неверно, то $W_{\mathbb{A}}$ Δ -определимо в \mathbb{A} . Отсюда следует Δ -определимость множества $\{x \mid c(x, x) \notin W_{\mathbb{A}}\}$. Это влечет равенство

$$\{x \mid c(x, a) \in W_{\mathbb{A}}\} = \{x \mid c(x, x) \notin W_{\mathbb{A}}\}$$

для подходящего $a < o(\mathbb{A})$, т. е. $\forall x \in \mathbb{A} (c(x, a) \in W_{\mathbb{A}} \Leftrightarrow c(x, x) \notin W_{\mathbb{A}})$. При $x = a$ получаем противоречие: $c(a, a) \in W_{\mathbb{A}} \Leftrightarrow c(a, a) \notin W_{\mathbb{A}}$. \square

Напомним, что допустимое множество \mathbb{A} называется *проектируемым в свое Σ -подмножество* $C \subseteq \mathbb{A}$, если над ним существует Σ -отображение τ такое, что

при любых $x \neq y$ значениями $\tau(x)$ и $\tau(y)$ являются непустые непересекающиеся подмножества множества C [8].

Назовем допустимое множество \mathbb{A} *проектируемым в себя*, если оно проектируемо в некоторый свой элемент a .

Известно, что НУР_ω проектируемо в себя [8].

Теорема 12. Пусть \mathbb{A} — рекурсивно развернутое чистое допустимое множество. Тогда

- (1) $o(\mathbb{A}) \leq o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) \leq o(\text{НУР}(\mathbb{A}))$;
- (2) если \mathbb{A} проектируемо в себя, то $o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) = o(\text{НУР}(\mathbb{A}))$;
- (3) если $o(\mathbb{A})$ — регулярный кардинал, то $o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) = o(\mathbb{A})$.

Доказательство. (1) Сначала докажем левое неравенство. Покажем, что $D(\mathbb{A})$ является Δ -подмножеством в $\mathbb{J}(\mathbb{A})$. В самом деле, $\mathbb{J}(\mathbb{A})$ содержит $D(\mathbb{A})$ как подмножество, поскольку $W_{\mathbb{A}}$ есть Δ -подмножество в $\mathbb{J}(\mathbb{A})$, и для подходящего $i \in \mathbb{J}(\mathbb{A})$ выполнено

$$D(\mathbb{A}) = \{(x)_0 \mid x \in W_{\mathbb{A}} \& (x)_1 = i\}.$$

Σ -функции $(\cdot)_0$ и $(\cdot)_1$ не зависят от выбора допустимого множества, и, кроме того, любое допустимое множество замкнуто относительно них. Далее, $D(\mathbb{A})$ является Δ -подмножеством в $\mathbb{J}(\mathbb{A})$, поскольку для любого ординала выполнено

$$x \in D(\mathbb{A}) \Leftrightarrow c(x, i) \in W_{\mathbb{A}}.$$

Отсюда по теореме 4 получим $\mathbb{A} \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{J}(\mathbb{A})$. По теореме 5 \mathbb{A} — начальный сегмент $\mathbb{J}(\mathbb{A})$, откуда $o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) \geq o(\mathbb{A})$.

Второе неравенство $o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) \leq o(\text{НУР}(\mathbb{A}))$ следует из того, что $W_{\mathbb{A}}$ является элементом и, в частности, Δ -подмножеством в $\text{НУР}(\mathbb{A})$. Тем самым процесс построения множества $\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}]$, описанный в предложении 2, приведет к успеху не более чем за $o(\text{НУР}(\mathbb{A}))$ ординальных шагов. При этом будет выполнено $\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}] \sqsubseteq_{\Sigma} \text{НУР}(\mathbb{A})$, откуда по предложению 1 получаем $o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) = o(\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}]) \leq o(\text{НУР}(\mathbb{A}))$.

(2) Из условия проектируемости и аксиомы Δ -выборки вытекает, что $\mathbb{A} \in \mathbb{J}(\mathbb{A})$. Из стандартного способа построения НУР «изнутри» (см. [6] или [8]) следует, что $\text{НУР}(\mathbb{A}) \sqsubseteq_{\Sigma} \mathbb{J}(\mathbb{A})$. Поэтому $o(\text{НУР}(\mathbb{A})) \leq o(\mathbb{J}(\mathbb{A}))$. Отсюда и из первого условия получим, что $o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) = o(\text{НУР}(\mathbb{A}))$.

(3) В [8] доказывается, что для любого кардинала \varkappa семейство \mathbb{H}_{\varkappa} , состоящее из всех чистых множеств, у которых транзитивное замыкание имеет мощность менее \varkappa , является допустимым множеством. В случае, когда $o(\mathbb{A})$ — регулярный кардинал, имеем $W_{\mathbb{A}} \subseteq \mathbb{H}_{o(\mathbb{A})}$ и $\langle \mathbb{H}_{o(\mathbb{A})}, W_{\mathbb{A}} \rangle$ образует допустимое множество, ординал которого равен $o(\mathbb{A})$. Отсюда $\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}] \sqsubseteq_{\Sigma} \langle \mathbb{H}_{o(\mathbb{A})}, W_{\mathbb{A}} \rangle$. Следовательно,

$$o(\mathbb{J}(\mathbb{A})) = o(\mathbb{G}[W_{\mathbb{A}}]) \leq o(\mathbb{A}).$$

Осталось применить п. 1. \square

Напомним, что допустимый ординал α называется *проектируемым*, если допустимое множество $L(\alpha)$ проектируемо в некоторый ординал $\beta < \alpha$.

Следствие 3. Пусть α — допустимый проектируемый ординал. Тогда ординал $o(\mathbb{J}(L(\alpha)))$ равен наименьшему допустимому ординалу, большему α .

Доказательство. Достаточно заметить, что наименьший допустимый ординал, больший α , совпадает с $o(\text{НУР}(L(\alpha)))$, и применить теорему 12. \square

6. Сравнение с некоторыми другими сводимостями

Теорема 13. *Полурешетка тьюринговых степеней изоморфна полурешетке классов Σ -эквивалентных рекурсивно развернутых допустимых множеств высоты ω . Последняя является подполурешеткой в структуре Σ -степеней допустимых множеств.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Определим естественное вложение j верхней полурешетки тьюринговых степеней в структуру, образуемую классами Σ -эквивалентных рекурсивно развернутых допустимых множеств, как указано ниже. Для каждого множества натуральных чисел X пусть $\mathbb{A}(X)$ будет допустимым множеством $\langle \mathbb{H}\mathbb{F}_\emptyset, X \rangle$, т. е. множеством $\mathbb{H}\mathbb{F}_\emptyset$, расширенным сигнатурным предикатом, выделяющим X . Легко проверить, что $X \leq_T Y$ эквивалентно $\mathbb{A}(X) \sqsubseteq_\Sigma \mathbb{A}(Y)$. Пусть теперь $j(\text{deg}(X))$ будет равным классу Σ -эквивалентности всех рекурсивно развернутых допустимых множеств высоты ω , эквивалентных $\mathbb{A}(X)$. Легко проверить, что это вложение сохраняет точные верхние грани. На самом деле j является отображением «на». Это следует из того, что любое рекурсивно развернутое допустимое множество \mathbb{B} высоты ω Σ -эквивалентно допустимому множеству $\mathbb{A}(D(\mathbb{B}))$. Мы опускаем достаточно простое доказательство этого факта. \square

ЗАМЕЧАНИЕ. Образ упомянутого вложения не замкнут вниз относительно \sqsubseteq_Σ . Например, рассмотрим счетную модель \mathfrak{M} такую, что для нее не существует наименьшей тьюринговой степени \mathbf{d} , в которой модель \mathfrak{M} имеет \mathbf{d} -вычислимую изоморфную копию. Такие модели существуют (см., например, [9] или [10]). Очевидно, что $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \sqsubseteq_\Sigma \langle \mathbb{H}\mathbb{F}_0, X \rangle$ для подходящего $X \subseteq \omega$, т. е. $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ сводится к некоторому рекурсивно развернутому допустимому множеству высоты ω . Предположим, что допустимое множество $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ Σ -эквивалентно некоторому рекурсивно развернутому множеству \mathbb{A} . Ввиду теоремы 3 можно считать, что \mathbb{A} — чистое рекурсивно развернутое множество. Докажем, что для любого $H \subseteq \omega$ выполнено утверждение

$$(\mathfrak{M} \text{ изоморфна некоторой } H\text{-рекурсивной модели}) \Leftrightarrow D(\mathbb{A}) \leq_T H.$$

Мы дадим набросок доказательства этого факта.

Возьмем произвольное множество $H \subseteq \omega$. Поскольку \mathfrak{M} изоморфна H -рекурсивной модели, ввиду Σ -эквивалентности $D(\mathbb{A})$ есть Δ -подмножество в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$, это множество $D(\mathbb{A})$ является рекурсивным в H . Предположим теперь, что $D(\mathbb{A}) \leq_T H$. Тогда существует H -рекурсивная изоморфная копия для \mathbb{A} , в которой можно по номеру любого элемента $a \in \mathbb{A}$ эффективно относительно H вычислить индекс конечного множества, состоящего из всех номеров элементов, принадлежащих a . Так как модель \mathfrak{M} Σ -определима над \mathbb{A} , отсюда следует, что она изоморфна некоторой H -рекурсивной модели.

Можно привести и другие примеры к замечанию, сделанному выше. Достаточно заметить, что если \mathbb{A} — чистое допустимое множество, то для произвольного $X \subseteq \omega$ выполнено

$$X \text{ } \Sigma\text{-определимо над } \mathbb{A} \Leftrightarrow X \text{ перечислимо в } D(\mathbb{A}).$$

Теперь остается упомянуть следующий результат.

Теорема 14 (Морозов, Пузаренко [11]). *Для любого непустого семейства I множеств натуральных чисел, замкнутых вниз относительно e -сводимости и*

операции \oplus , найдется модель \mathfrak{M} такая, что I есть в точности семейство всех Σ -подмножеств ω в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$.

Таким образом, можно взять любое семейство I , как в теореме 14, не совпадающее ни с каким семейством вида $\{X \subseteq \omega \mid X \text{ перечислимо в } S\}$, и рассмотреть соответствующее допустимое множество вида $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$, как в теореме 14. Оно Σ -сводится к некоторому рекурсивно развернутому допустимому множеству, но не Σ -эквивалентно никакому рекурсивно развернутому допустимому множеству, поскольку, как нетрудно убедиться, Σ -эквивалентные допустимые множества имеют одни и те же Σ -подмножества ординалов.

Теперь докажем один факт о соотношении слабой Σ -сводимости и $T\Sigma$ -сводимости, введенной Ю. Л. Ершовым. Напомним определение этой сводимости из [6] (там же можно найти дополнительную информацию об этой сводимости и ее обсуждение).

Сначала нам понадобятся некоторые вспомогательные определения. Обозначим через $\mathcal{P}(A)$ множество всех подмножеств A .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7. Пусть \mathbb{A} — допустимое множество. Оператор $F : \mathcal{P}(\mathbb{A})^n \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{A})$ называется *сильно непрерывным в точке* $\langle S_1, \dots, S_n \rangle$, если

$$\forall a \in \mathbb{A} [a \subseteq F(S_1, \dots, S_n) \rightarrow \exists b_1 \subseteq S_1 \dots \exists b_n \subseteq S_n (a \subseteq F(b_1, \dots, b_n))].$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8. Оператор $F : \mathcal{P}(\mathbb{A})^n \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{A})$ называется Σ -оператором, если существует Σ -формула $\Phi(a_1, \dots, a_n, x)$ с параметрами такая, что для любых $x \in \mathbb{A}$, $S_1, \dots, S_n \in \mathcal{P}(\mathbb{A})$ выполнено

$$x \in F(S_1, \dots, S_n) \Leftrightarrow \exists a_1 \dots \exists a_n \left[\bigwedge_{i=1}^n \neg U(a_i) \& \bigwedge_{i=1}^n a_i \subseteq S_i \& \mathbb{A} \models \Phi(a_1, \dots, a_n, x) \right].$$

При этом говорят, что оператор F задается формулой Φ с соответствующими параметрами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9. Пусть \mathbb{A} — допустимое множество, и пусть $B, C \subseteq \mathbb{A}$. Будем говорить, что B $T\Sigma$ -сводится к C над допустимым множеством \mathbb{A} , если существуют двухместные Σ -операторы F_0 и F_1 , сильно непрерывные в точке $\langle C, \mathbb{A} \setminus C \rangle$, такие, что $B = F_0(C, \mathbb{A} \setminus C)$ и $\mathbb{A} \setminus B = F_1(C, \mathbb{A} \setminus C)$. Этот факт обозначается так: $B \leq_{T\Sigma}^{\mathbb{A}} C$.

Теорема 15. Пусть B и C — множества ординалов. Тогда следующие условия эквивалентны:

(1) множество B $T\Sigma$ -сводится к C над допустимым множеством $\mathbb{G}[C]$, рассматриваемым без дополнительного предиката, выделяющего C ;

(2) $B \subseteq_{\Sigma} C$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Импликация (1) \Rightarrow (2) достаточно очевидна.

Докажем (2) \Rightarrow (1). Из условия (2) следует, что множества B и $\mathbb{G}[C] \setminus B$ определимы Σ -формулами с параметрами над $\langle \mathbb{G}[C], \in \rangle$. Искомая импликация вытекает из следующего общего факта.

Лемма 4. Пусть \mathbb{A} — допустимое множество, и пусть $Y \subseteq \mathbb{A}$ таково, что $\langle \mathbb{A}, Y \rangle$ — допустимое множество. Пусть также множество $X \subseteq \mathbb{A}$ определимо над $\langle \mathbb{A}, Y \rangle$ Σ -формулой с параметрами. Тогда

1) существует двухместный Σ -оператор, переводящий $\langle Y, \mathbb{A} \setminus Y \rangle$ в X ;

2) любой двухместный Σ -оператор сильно непрерывен в точке $\langle Y, \mathbb{A} \setminus Y \rangle$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ. П. 2 легко следует из Σ -выборки. Докажем п. 1.

Предположим, что для подходящей Σ -формулы $\varphi(Y, x, p)$ с параметром p выполнено $x \in X \Leftrightarrow \mathbb{A} \models \varphi(Y, x, p)$ (можно считать, что параметр всего один). Без ограничения общности можно считать, что $\varphi(Y, x, p)$ имеет вид $\exists u \psi(Y, x, p, u)$, где ψ — Δ_0 -формула. Пусть $\text{Trans}(w)$ служит обозначением для формулы, утверждающей, что w транзитивно. Определим формулу $\Phi(a_1, a_2, x, p)$ как

$$\exists w \exists u (\text{Trans}(w) \& x, p, u \in w \& a_1 \cap a_2 = \emptyset \& a_1 \cup a_2 = w \& \psi^*(a_1, a_2, x, p, u)),$$

где формула $\psi^*(a_1, a_2, x, p, u)$ получается из $\psi(Y, x, p, u)$ заменой всех позитивных вхождений подформулы вида $Y(v)$ на $v \in a_1$ и всех негативных вхождений подформулы вида $Y(v)$ на $v \in a_2$. По п. 2 этой леммы оператор, заданный формулой Φ с параметром p , будет непрерывен в точке $\langle Y, \mathbb{A} \setminus Y \rangle$. Осталось только проверить, что для любого $x \in \mathbb{A}$ выполнено

$$x \in X \Leftrightarrow \exists a_1 \exists a_2 \in \mathbb{A} (a_1 \subseteq Y \& a_2 \subseteq \mathbb{A} \setminus Y \& \Phi(a_1, a_2, x, p)). \quad (1)$$

Сначала предположим, что $x \in X$. Это означает, что $\mathbb{A} \models \exists u \psi(Y, x, p, u)$. Зафиксируем u такое, что $\mathbb{A} \models \psi(Y, x, p, u)$. Пусть $w = \text{TC}(\{x, p, u\})$. Положим $a_1 = w \cap Y$, $a_2 = w \setminus Y$. Тогда ввиду того, что $\psi(Y, x, p, u)$ — Δ_0 -формула, она будет истинна на ограничении допустимого множества \mathbb{A} на w . Тем самым на этой же модели будет истинна Δ_0 -формула $\psi^*(a_1, a_2, x, p, u)$. Значит, на \mathbb{A} будет истинно

$$\text{Trans}(w) \& x, p, u \in w \& a_1 \cap a_2 = \emptyset \& a_1 \cup a_2 = w \& \psi^*(a_1, a_2, x, p, u),$$

откуда следует правая часть (1).

Предположим теперь, что справедлива правая часть (1). Возьмем a_1 и a_2 , существование которых в ней утверждается. Возьмем также w и u , существование которых утверждается формулой $\Phi(a_1, a_2, x, p)$. Из этой формулы и из того, что a_1 и a_2 не пересекаются и в объединении дают все w , а также из того, что $a_1 \subseteq Y$, $a_2 \subseteq \mathbb{A} \setminus Y$, следует, что на ограничении допустимого множества \mathbb{A} на w с дополнительным предикатом a_1 (здесь этот элемент рассматривается как множество) выполнено $\psi(Y, x, p, u)$. Ввиду транзитивности w получаем $\mathbb{A} \models \psi(Y, x, p, u)$. Отсюда $x \in X$. Лемма, а вместе с ней и теорема доказаны. \square

Из этой теоремы нетрудно получить, что для любых $A, B \subseteq \omega$ условие $A \sqsubseteq_{\Sigma} B$ эквивалентно $A \leq_T B$.

В заключение автор благодарит рецензента за исправление неточностей и за ряд ценных замечаний, существенно улучшивших изложение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гончаров С. С., Свириденко Д. И. Логическое программирование в широком смысле // Теория алгоритмов и ее применения (Вычислительные системы). 1989. Т. 129. С. 3–48.
2. Гончаров С. С., Свириденко Д. И. Математические основы семантического программирования // Докл. АН СССР. 1986. Т. 289, № 6. С. 1324–1328.
3. Sviridenko D. I. Goncharov S. S., Ershov Yu. L. Semantic programming // Information processing: Proc. IFIP 10th World Comput. Congr., Dublin (Ireland), 1986. P. 1113–1120.
4. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость. М.: Мир, 1972.
5. Morozov A. S. Σ -Definability of admissible sets // Proc. of Logic Colloquium-98. Praha., 2000. P. 334–351.

6. Ершов Ю. Л. Вычислимость и определимость. Новосибирск: Научная книга, 1996.
7. *Khismiev A. N.* Degrees of algebraic structures and Σ -definability // Logic Colloquium'2002: Abstr. of contributed papers. Münster (Germany), 2002. P. 39.
8. *Barwise J.* Admissible sets and structures. Berlin; Göttingen; Heidelberg: Springer-Verl., 1975.
9. *Richter L. J.* Degrees of structures // J. Symbolic Logic. 1981. V. 46, N 4. P. 723–731.
10. *Slaman T. A.* Relative to any nonrecursive set // Proc. Amer. Math. Soc. 1998. V. 126, N 7. P. 2117–2122.
11. Морозов А. С., Пузаренко В. Г. О Σ -подмножествах натуральных чисел // Алгебра и логика. (В печати).

Статья поступила 24 июня 2003 г.

*Морозов Андрей Сергеевич
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
morozov@math.nsc.ru*