

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ КОШИ
ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ПЛОСКОСТИ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ
ПО ВРЕМЕНИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Р. К. Романовский, М. В. Мендзив

Аннотация: Для гиперболической системы на плоскости с периодическими по времени коэффициентами построен вариант прямого метода Ляпунова с ослабленным за счет периодичности коэффициентов условием на производную функционала Ляпунова вдоль траекторий системы. Приведен иллюстрирующий пример.

Ключевые слова: функционал Ляпунова, оператор сдвига вдоль характеристик.

Введение

В работах [1–4] изучалось поведение при большом времени решений задачи Коши для гиперболической системы с одной пространственной переменной — устойчивость, дихотомия, экспоненциальное расщепление — на основе построенного в [1, 5] аппарата матриц Римана первого и второго рода, представляющих собой соответственно сингулярную и регулярную компоненты фундаментальной матрицы гиперболической системы. В частности, в [3] на этом пути получены спектральные признаки экспоненциальной устойчивости и дихотомии в C -норме для систем указанного класса с периодическими по времени коэффициентами; в пространственно-однородном случае эффективно вычислены резольвента и спектр оператора монодромии.

В работах [6, 7] исследовалась в рамках первого метода Ляпунова устойчивость решений смешанной задачи для автономных почти линейных гиперболических систем с одной пространственной переменной, возникающей при моделировании процессов в химических реакторах [8–11]. Получен спектральный признак экспоненциальной устойчивости в C^1 -норме. В [12] доказана теорема об устойчивости по первому приближению решений задачи Коши для таких систем. В [13] рассмотрена задача Коши для квазилинейной гиперболической системы с несколькими пространственными переменными и малым параметром при нелинейном члене, получено достаточное условие асимптотической устойчивости в терминах спектра символа невозмущенной системы.

В работах [14–16] к анализу устойчивости решений задачи Коши и смешанной задачи указанного выше типа для гиперболической системы с одной пространственной переменной применен прямой метод Ляпунова. Установлены достаточные условия асимптотической устойчивости в различных нормах; в [15, 16] получены приложения к задаче об устойчивости стационарных режимов в химических реакторах.

Данная работа является продолжением исследований по прямому методу Ляпунова для систем этого класса. Как и в [3], рассматривается задача Коши для гиперболической системы с периодическими по времени коэффициентами. Построен вариант прямого метода с ослабленным условием на производную \dot{v} функционала Ляпунова вдоль траекторий системы по сравнению со случаем любых гладких коэффициентов. Полученный признак устойчивости проиллюстрирован на примере задачи Коши для телеграфной системы с периодически подключаемым трением: здесь $\dot{v} = 0$ при всех $t \in \mathbb{R}$, за исключением отдельных периодически повторяющихся островков, где производная отрицательна, тем не менее L_2 -норма решения убывает к нулю по экспоненте при $t \rightarrow +\infty$.

Введенный ранее в [14] оператор сдвига вдоль характеристик системы, позволивший привести задачу Коши для гиперболической системы к задаче Коши для обыкновенного дифференциального уравнения в гильбертовом пространстве с ограниченным операторным коэффициентом, используется здесь в несколько ином варианте. Ниже в п. 1 изложены используемые далее сведения из [14] об этом операторе в удобном для последующего виде.

Отметим, что из общих результатов по анализу притягивающих множеств эволюционных уравнений [17–19] следуют достаточные условия асимптотической устойчивости решений задачи Коши для некоторых классов нелинейных гиперболических уравнений, в том числе с использованием функционалов Ляпунова.

1. Оператор сдвига вдоль характеристик

Рассмотрим гиперболический оператор с кратными характеристиками

$$L = \frac{\partial}{\partial t} + A(x, t) \frac{\partial}{\partial x} + B(x, t). \quad (1)$$

Здесь A, B — матрицы порядка N , $A = \text{diag}(a_1 I_1, \dots, a_n I_n)$, I_k — единичная матрица порядка N_k , $\sum N_k = N$, $a_1 > a_2 > \dots > a_n$, $A \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $B \in C(\mathbb{R}^2)$, A, A'_x, A'_t, B ограничены в \mathbb{R}^2 , $|a_k| \geq \text{const} > 0$. В частности, при указанных условиях проходящие через каждую точку (x, t) характеристики

$$l_k(x, \tau) = \{(s, t) : s = x_k(t; x, \tau), x'_{kt} = a_k(x_k, t), x_k(t; x, t) = x\},$$

$k = \overline{1, n}$, определены глобально и пересекают каждую горизонталь и каждую вертикаль один раз. Далее будем представлять векторы $h \in \mathbb{C}^N$ в виде $h = (h_1, \dots, h_n)$, где h_k имеет размер N_k .

Обозначим через H гильбертово пространство функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^N$ со скалярным произведением $\langle g, h \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} h^* g \, dx$.

Лемма 1 [14]. 1°. При каждых $t, \tau \in \mathbb{R}$ формула

$$\Gamma(t, \tau)h = [h_1(x_1(t; x, \tau)), \dots, h_n(x_n(t; x, \tau))] \quad (2)$$

определяет линейный ограниченный обратимый оператор $H \rightarrow H$, верны равенства

$$\Gamma(t, t) = I, \quad \Gamma^{-1}(t, \tau) = \Gamma(\tau, t), \quad \Gamma^* \Gamma = E,$$

где E — оператор умножения на матрицу

$$E(x, t, \tau) = \text{diag}(e_1 I_1, \dots, e_n I_n), \quad e_k = \exp \left\{ \int_{\gamma_k} a'_{kx} \, d\tau \right\}, \quad (3)$$

γ_k — отрезок характеристики $l_k(x, t)$ от точки (x, t) до точки с ординатой τ .

2°. Если \mathcal{A} — оператор умножения на матрицу $\mathcal{A} = \text{diag}(\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n)$, где \mathcal{A}_k — блок порядка N_k , то верно равенство $\Gamma\mathcal{A} = \Gamma\mathcal{A}\Gamma$.

Будем называть $\Gamma(t, \tau)$ оператором сдвига вдоль характеристик системы $Lu = 0$. Далее $\|\cdot\|$ — норма в H , $|\cdot|$ — эрмитова норма матрицы.

2. Разрешающий оператор задачи Коши для периодической системы $Lu = 0$

Будем в (1) предполагать

$$A(x, t + T) = A(x, t), \quad B(x, t + T) = B(x, t), \quad T > 0. \quad (4)$$

Рассмотрим задачу Коши в фазовом пространстве H :

$$Lu = 0, \quad u|_{t=\tau} = h, \quad \tau \in \mathbb{R}, \quad h \in H. \quad (5)$$

В частном случае $h \in H_0 = C_0^1(\mathbb{R})$ задача Коши (5) однозначно разрешима в классе гладких функций $u(x, t) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}^N$, при этом $u(x, t) \in H_0$ при каждом $t \in \mathbb{R}$. Обозначим через $U(t, \tau)$ разрешающий оператор задачи Коши в H_0 :

$$u(t) = U(t, \tau)h, \quad (6)$$

где $h \in H_0$, $u(t)$ — функция $\mathbb{R} \rightarrow H_0$, удовлетворяющая (5). Простые вычисления дают:

- 1) $U(t, \tau)$ при любых $t, \tau \in \mathbb{R}$ — ограниченный линейный оператор $H_0 \rightarrow H_0$;
- 2) верно равенство

$$\frac{d}{dt}[\Gamma(t, \tau)U(t, \tau)h] = -\Gamma(t, \tau)B(t)U(t, \tau)h, \quad h \in H_0, \quad (7)$$

где производная понимается в топологии H , $B(t)$ — оператор умножения на $B(x, t)$.

В силу 1 оператор $U(t, \tau)$ продолжается по непрерывности из H_0 в H . Далее под решением задачи Коши (5) при любой $h \in H$ будем понимать функцию (6).

Лемма 2. При условиях (4) для разрешающего оператора задачи Коши (5) имеет место свойство стационарности на периоде:

$$U(t + T, \tau + T) = U(t, \tau), \quad t, \tau \in \mathbb{R}. \quad (8)$$

Доказательство. При условиях (4) функции $u = U(t, \tau)h$, $\tilde{u} = U(t + T, \tau + T)h$, $h \in H_0$, удовлетворяют одним и тем же условиям (5). В силу единственности решения задачи Коши (5) отсюда следует (8).

3. Признак экспоненциальной устойчивости

Будем говорить, что решение $u = 0$ задачи Коши (5) экспоненциально устойчиво, если для любого решения (6) имеет место оценка

$$\|U(t, \tau)h\| \leq \mu e^{-\nu(t-\tau)}\|h\| \quad (t \geq \tau) \quad (9)$$

при некоторых $\mu, \nu = \text{const} > 0$. Очевидно, достаточно потребовать выполнения оценки (9) на элементах $h \in H_0$. Далее будем рассматривать задачу Коши (5) в фазовом пространстве H_0 .

Зафиксируем матрицу $F(x, t) = \text{diag}(f_1, \dots, f_n)$ с диагональными блоками порядков N_1, \dots, N_n со свойствами

$$\begin{aligned} F(x, t + T) &= F(x, t), \quad F^* = F, \quad m_1 I \leq F \leq m_2 I \quad (m_i > 0), \\ F &\in C^1(\mathbb{R}^2), \quad |F'_x|, |F'_t| \leq \text{const}. \end{aligned} \tag{10}$$

Рассмотрим эрмитову форму

$$v(t, h) = \langle Fh, h \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} h^*(x)F(x, t)h(x) dx, \quad h \in H_0. \tag{11}$$

Лемма 3. Производная формы (11) вдоль траекторий системы $Lu = 0$ в H_0 дается формулой

$$\dot{v}(t, h) = \langle Gh, h \rangle, \quad G = F'_t + (FA)'_x - FB - B^*F. \tag{12}$$

Доказательство. Подставляя в (11) вместо h решение (6) и учитывая вытекающие из свойств 1°, 2° оператора сдвига вдоль характеристик равенства $\Gamma^* \Gamma E^{-1} = I$, $\Gamma E^{-1} F = \Gamma E^{-1} F \Gamma$, найдем

$$\langle Fu, u \rangle = \langle \Gamma^* \Gamma E^{-1} Fu, u \rangle = \langle [\Gamma E^{-1} F] \Gamma u, \Gamma u \rangle,$$

где $[\Gamma E^{-1} F] = \text{diag}(e_1 f_1|_{x=x_1}, \dots, e_n f_n|_{x=x_n})$, $x_k = x_k(t; x, \tau)$. С учетом формул (3) для e_k нетрудно получить

$$\frac{d}{dt} [\Gamma E^{-1} F] = \Gamma E^{-1} (F'_t + (FA)'_x).$$

Из (7) имеем $(\Gamma u)'_t = -\Gamma B u$. Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle Fu, u \rangle &= \langle \Gamma E^{-1} (F'_t + (FA)'_x) \Gamma u, \Gamma u \rangle - \langle \Gamma E^{-1} F \Gamma B u, \Gamma u \rangle \\ &\quad - \langle \Gamma E^{-1} F \Gamma u, \Gamma B u \rangle = \langle (F'_t + (FA)'_x - FB) u, u \rangle - \langle Fu, Bu \rangle = \langle Gu, u \rangle. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Теорема. Пусть существует матрица $F(x, t)$ со свойствами (10) такая, что выполняются неравенства

- (i) $G \leq 0$ при $t \geq \tau$,
 - (ii) $G \leq -mI$ ($m = \text{const} > 0$) хотя бы на одном отрезке $[t_0, t_1]$, $t_0 \geq \tau$.
- Тогда решение $u = 0$ задачи Коши (5) экспоненциально устойчиво.

Доказательство. 1. Обозначим через $\mathcal{F} = F^{1/2}$ эрмитово-положительный корень из F . Имеют место соотношения

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(x, t + T) &= \mathcal{F}(x, t), \quad \sqrt{m_1} I \leq \mathcal{F} \leq \sqrt{m_2} I, \\ \mathcal{F}, \mathcal{F}^{-1} &\in C^1(\mathbb{R}^2), \quad |\mathcal{F}'_x|, |\mathcal{F}'_t| \leq \text{const}. \end{aligned} \tag{13}$$

Первые два соотношения очевидны, остальные следуют из представления матриц $\mathcal{F}, \mathcal{F}^{-1}$ формулой Коши – Рисса

$$\mathcal{F}^{\pm 1} = (2\pi i)^{-1} \oint_{\gamma} \lambda^{\pm \frac{1}{2}} (\lambda I - F)^{-1} d\lambda,$$

где $\lambda^{\frac{1}{2}}$ — ветвь $\sqrt{\lambda}$, положительная на положительной полуоси, γ — обходимая в положительном направлении окружность в полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda > 0$, охватывающая отрезок $[m_1, m_2]$.

Выполняя в (5) замену неизвестной функции по формуле

$$w(t) = \mathcal{F}(t)u(t),$$

где $\mathcal{F}(t)$ — оператор умножения на матрицу $\mathcal{F}(x, t)$, получим задачу Коши для гиперболического оператора с той же матрицей A , T -периодической, непрерывной, ограниченной в \mathbb{R}^2 матрицей $\tilde{B} = \mathcal{F}B\mathcal{F}^{-1} - \mathcal{F}'_t\mathcal{F}^{-1} - A\mathcal{F}'_x\mathcal{F}^{-1}$ и разрешающим оператором

$$W(t, \tau) = \mathcal{F}(t)U(t, \tau)\mathcal{F}^{-1}(\tau).$$

Ввиду T -периодичности $\mathcal{F}(t)$ для оператора W сохраняется свойство (8) оператора $U(t, \tau)$:

$$W(t+T, \tau+T) = W(t, \tau), \quad t, \tau \in \mathbb{R}. \quad (14)$$

В силу оценок (13) для доказательства теоремы достаточно доказать оценку (9) для решений

$$w(t) = W(t, \tau)h \quad (h \in H_0) \quad (15)$$

новой задачи Коши.

2. Покажем существование такого $q \in (0, 1)$, что

$$\|w(t)\| \leq q\|h\| \quad \text{при } t \geq t_1, \quad (16)$$

где t_1 — постоянная из условия (ii) теоремы. Обозначим

$$\varphi(t) = \langle w(t), w(t) \rangle = \|w(t)\|^2.$$

Имеем $\varphi(t) = \langle \mathcal{F}u, \mathcal{F}u \rangle = \langle Fu, u \rangle$, где $u = \mathcal{F}^{-1}w$ — решение задачи Коши (5) с начальной функцией $\mathcal{F}^{-1}(\tau)h$, откуда в силу леммы 3 следует, что

$$\dot{\varphi}(t) = \langle Gu, u \rangle = \langle \mathcal{F}^{-1}G\mathcal{F}^{-1}w, w \rangle, \quad (17)$$

где G — матрица (12). Ввиду условия (ii) теоремы при $t \in [t_0, t_1]$ имеет место оценка

$$\mathcal{F}^{-1}G\mathcal{F}^{-1} \leq -mF^{-1} \leq -cI, \quad c = mm_2^{-1}$$

(учтено, что $F^{-1} \geq m_2^{-1}I$), поэтому справедливо неравенство

$$\dot{\varphi}(t) \leq -c\varphi(t), \quad t \in [t_0, t_1],$$

интегрируя которое по $[t_0, t_1]$, получим

$$\varphi(t_1) \leq q^2\varphi(t_0), \quad q = e^{-\frac{c(t_1-t_0)}{2}} < 1. \quad (18)$$

Согласно условию (i) теоремы и равенству (17)

$$\dot{\varphi}(t) \leq 0, \quad t \geq \tau. \quad (19)$$

Из (18), (19) с учетом $\varphi(\tau) = \|h\|^2$ следует (16).

3. Можно считать период T в (14) столь большим, что $\tau + T \geq t_1$. Из (15), (16) получаем

$$\|W(\tau + T, \tau)\| \leq q.$$

Из (14) вытекает равенство

$$W(\tau + nT, \tau) = [W(\tau + T, \tau)]^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Тем самым для решения (15) новой задачи Коши верна оценка

$$\|w(\tau + nT)\| \leq q^n \|h\|, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Пусть $t \geq \tau$, $n = [(t - \tau)/T]$. Так как ввиду оценки (16) $\|w(t)\|$ не возрастает, имеем

$$\|w(t)\| \leq \|w(\tau + nT)\| \leq q^n \|h\| \leq q^{T^{-1}(t-\tau)-1} \|h\| = \mu e^{-\nu(t-\tau)} \|h\|,$$

где обозначено $\mu = q^{-1}$, $\nu = T^{-1} \ln q^{-1}$.

Теорема доказана.

4. Пример

Рассмотрим задачу Коши для телеграфной системы

$$\frac{\partial i}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} + \varepsilon_1(t)i = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \frac{\partial i}{\partial x} + \varepsilon_2(t)\mathbf{v} = 0, \quad (i, \mathbf{v})_{t=0} = (\varphi, \psi) \in H_0. \quad (20)$$

Здесь $\varepsilon_k(t)$ — неотрицательные непрерывные периодические функции с периодом $T = 1$ и малыми носителями на периоде $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} \varepsilon_k(t+1) &= \varepsilon_k(t), \quad \varepsilon_k > 0 \quad \text{при } t \in (\alpha_k, \beta_k) \in [0, 1], \quad \beta_k - \alpha_k \ll 1, \\ \varepsilon_k &= 0 \quad \text{при } t \in [0, 1] \setminus (\alpha_k, \beta_k), \quad k = 1, 2. \end{aligned} \quad (21)$$

Замена $(i, \mathbf{v}) \rightarrow (u_1, u_2)$ по формулам $i = \frac{u_1 + u_2}{2}$, $\mathbf{v} = \frac{u_1 - u_2}{2}$ приводит задачу (20) к виду (5), где $\tau = 0$, $h \in H_0$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 + \varepsilon_2 & \varepsilon_1 - \varepsilon_2 \\ \varepsilon_1 - \varepsilon_2 & \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \end{pmatrix}.$$

Положим в (12) $F = I$, тогда $G = -2B$. При условии

$$(\alpha_1, \beta_1) \cap (\alpha_2, \beta_2) \neq \emptyset$$

выполняются условия теоремы, и тем самым решение $(i, \mathbf{v}) = (0, 0)$ задачи Коши (20) экспоненциально устойчиво.

Здесь не выполняется условие Ляпунова $\dot{v} < 0$: имеет место равенство $\det G = 0$ на множестве $[0, 1] \setminus \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$ и его сдвигах на периоды $n \in \mathbb{Z}$.

5. Класс решений неравенства $G \leq -mI$

В общем случае, когда матрицы A , B не являются периодическими, экспоненциальная устойчивость имеет место при более жестком условии

$$F'_t + (FA)'_x - FB - B^*F \leq -mI \quad (m = \text{const} > 0, t \geq \tau). \quad (22)$$

Укажем возможный подход к поиску матрицы F , удовлетворяющей (22). Для упрощения записей будем считать, что оператор (1) строго гиперболичен ($n = N$) и матрица B вещественна. Тогда

$$F = \text{diag}(f_1, \dots, f_n), \quad f_i \in C^1(\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}), \quad m_1 \leq f_i \leq m_2 \quad (23)$$

($m_k = \text{const} > 0$), элементы матрицы (22) имеют вид

$$g_{ij} = -(b_{ij}f_i + b_{ji}f_j) \quad (i \neq j), \quad g_{ii} = [D_i + (a'_{ix} - 2b_{ii})]f_i,$$

где b_{ij} — элементы матрицы B , D_i — оператор дифференцирования по t вдоль характеристики l_i . Обозначим через $\Delta_i(x, t)$ часть характеристики $l_i(x, t)$ с ординатами $s \in [t, \infty)$, через $\delta_i(x, t, s)$ — часть Δ_i с ординатами $\sigma \in [t, s]$. Будем предполагать, что при $t \geq \tau$

$$\beta_i(x, t) = \int_{\Delta_i} \exp \left\{ \int_{\delta_i} (a'_{ix} - 2b_{ii}) d\sigma \right\} ds \leq \text{const}. \quad (24)$$

Будем искать элементы матрицы F в виде

$$f_i = c_i \beta_i(x, t) \quad (c_i = \text{const} > 0). \quad (25)$$

Нетрудно убедиться в том, что функции (25) удовлетворяют условиям (23), при этом

$$-g_{ii} = c_i, \quad -g_{ij} = c_i \beta_i b_{ij} + c_j \beta_j b_{ji} \quad (i \neq j). \quad (26)$$

В этой ситуации задача построения матрицы F , удовлетворяющей (22), (23), приводится к задаче отыскания чисел $c_i > 0$, $m > 0$, удовлетворяющих неравенству

$$-G(x, t, c_1, \dots, c_n) - mI > 0, \quad (27)$$

где $-G$ — матрица с элементами (26). При достаточно малых $|\beta_i b_{ij}|$, $i \neq j$, эта задача разрешима, и при ее решении может быть использован критерий положительной определенности Сильвестра. В частном случае $n = 2$ неравенство (27) принимает вид

$$(c_1 - m)(c_2 - m) - (c_1 \beta_1 b_{12} + c_2 \beta_2 b_{21})^2 > 0 \quad (28)$$

и заведомо выполняется при условиях

$$\beta_0 = \sup |\beta_1 b_{12} + \beta_2 b_{21}| < 1, \quad c_1 = c_2 = 1, \quad 0 < m < 1 - \beta_0.$$

Если матрицы A , B удовлетворяют (4), то такому же условию удовлетворяют функции (25).

В рассмотренном выше примере требование (24) выполняется, решение неравенства (28) требует дополнительных сведений о функциях $\varepsilon_k(t)$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Романовский Р. К. О матрицах Римана первого и второго рода // Докл. АН СССР. 1982. Т. 267, № 3. С. 577–580.
2. Романовский Р. К. Экспоненциально расщепляемые гиперболические системы с двумя независимыми переменными // Мат. сб. 1987. Т. 133, № 3. С. 341–355.
3. Романовский Р. К. Об операторе монодромии гиперболической системы с периодическими коэффициентами // Применение методов функционального анализа в задачах математической физики. Киев: Изд-во ИМ АН УССР, 1987. С. 47–52.
4. Романовский Р. К. Усреднение гиперболических уравнений // Докл. АН СССР. 1989. Т. 306, № 2. С. 286–289.
5. Романовский Р. К. О матрицах Римана первого и второго рода // Мат. сб. 1985. Т. 127, № 4. С. 494–501.
6. Елгышева Н. А. О качественных свойствах решений некоторых гиперболических систем на плоскости // Мат. сб. 1988. Т. 135, № 2. С. 186–209.

7. Елгышева Н. А. К вопросу об устойчивости стационарных решений некоторых гиперболических систем // Докл. АН СССР. 1986. Т. 289, № 1. С. 30–32.
8. Зеленьяк Т. И. О стационарных решениях смешанных задач, возникающих при изучении некоторых химических процессов // Дифференц. уравнения. 1966. Т. 2, № 2. С. 205–213.
9. Зеленьяк Т. И. К вопросу об устойчивости решений смешанных задач для одного квазилинейного уравнения // Дифференц. уравнения. 1967. Т. 3, № 1. С. 19–29.
10. Годунов С. К. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1979.
11. Лаврентьев М. М. (мл.), Люлько Н. А. Повышение гладкости решений некоторых гиперболических задач // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 1. С. 109–124.
12. Xu Cheng-Zhong, Feng De-Xing. Linearization method to stability analysis for nonlinear hyperbolic systems // C. R. Acad. Sci. Ser. 1. 2001. V. 332, N 9. P. 809–814.
13. Kreiss H-O., Ortiz O. E., Reula O. A. Stability of quasi-linear hyperbolic dissipative systems // Differential Equations. 1998. V. 142, N 1. P. 78–96.
14. Воробьева Е. В., Романовский Р. К. Об устойчивости решений задачи Коши для гиперболических систем с двумя независимыми переменными // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 6. С. 1290–1292.
15. Акрамов Т. А. О поведении решений одной гиперболической задачи // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 1. С. 3–19.
16. Романовский Р. К., Воробьева Е. В., Макарова И. Д. Об устойчивости решений смешанной задачи для почти линейной системы на плоскости // Сиб. журн. индустриальной математики. 2003. Т. 6, № 1. С. 118–124.
17. Бабин А. В., Вишик М. И. Аттракторы эволюционных уравнений. М.: Наука, 1989.
18. Vishik M. I. Asymptotic behaviour of solutions of evolutionary equations. Lezioni Lincee. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992.
19. Chepyzhov V. V., Vishik M. I. Attractors for non-autonomous evolution equations with almost periodic symbols // C. R. Acad. Sci. Ser. 1. 1993. V. 316, N 4. P. 357–361.

Статья поступила 20 апреля 2005 г., окончательный вариант — 6 сентября 2006 г.

*Романовский Рэм Константинович, Мендзиев Марьяна Вирославовна
Омский гос. технический университет, кафедра высшей математики,
пр. Мира, 11, Омск 644050
mmvmath@mail.ru, menmar@mail.ru*