

УДК 517.953+517.983

## КВАЗИЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ И УРАВНЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА. II

Г. В. Демиденко

**Аннотация.** Рассмотрены матричные квазиэллиптические операторы во всем пространстве. При условии квазиоднородности символов доказана теорема об изоморфизме этих операторов в специальных шкалах весовых соболевских пространств. Из этой теоремы, в частности, вытекают ряд известных теорем об изоморфизме эллиптических операторов, а также теоремы об однозначной разрешимости начальной задачи для широкого класса систем соболевского типа.

**Ключевые слова:** квазиэллиптический оператор, весовое соболевское пространство, изоморфизм, уравнение соболевского типа.

### § 1. Введение

Посвящается Ю. Г. Решетняку в честь его 80-летия

Мы продолжаем изучение *матричных квазиэллиптических операторов*

$$\mathcal{L}(D_x) = (l_{j,r}(D_x)) \quad (1.1)$$

во всем пространстве  $\mathbb{R}^n$ . Рассматриваемый класс операторов входит в класс квазиэллиптических операторов, введенных Л. Р. Волевицем [1], и содержит, в частности, однородные эллиптические операторы, эллиптические и параболические операторы по Петровскому, эллиптические операторы по Дуглису — Ниренбергу и др. Для этих операторов устанавливается теорема об изоморфизме в специальных шкалах весовых соболевских пространств  $W_{p,\sigma}^l(\mathbb{R}^n)$ . Из этого результата вытекают ряд известных теорем об изоморфизме для эллиптических операторов, а также ряд новых теорем об изоморфизме для эллиптических и параболических операторов в  $\mathbb{R}^n$ . Из теоремы об изоморфизме следует однозначная разрешимость начальной задачи для широкого класса систем соболевского типа:

$$\mathcal{L}(D_x)D_t^m U + \sum_{k=0}^{m-1} \mathcal{L}_{m-k}(D_x)D_t^k U = F(t, x).$$

В первой части работы [2] уже отмечалось, что теоремы об изоморфизме имеют многочисленные приложения в теории уравнений с частными производными. Однако даже в случае скалярных дифференциальных операторов формулировки таких теорем далеко не очевидны. В случае матричных дифференциальных операторов формулировки значительно сложнее. Особенно это касается операторов, эллиптических по Дуглису — Ниренбергу. В формулировках теорем об

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 07-01-00289) и Сибирского отделения Российской академии наук (№ 85).

изоморфизме для таких операторов используются специальные шкалы весовых соболевских пространств с разными показателями гладкости и веса (см. [2–5]).

В работе продолжают исследования [2–6]. Близкие вопросы о свойствах дифференциальных операторов содержатся в [7–12].

**§ 2. Формулировка основных результатов**

Укажем условия на класс матричных дифференциальных операторов (1.1).

УСЛОВИЕ 1<sup>0</sup>. Будем предполагать, что матричный  $\nu \times \nu$ -дифференциальный оператор  $\mathcal{L}(D_x)$  имеет постоянные коэффициенты и его символ  $\mathcal{L}(i\xi) = (l_{j,r}(i\xi))$  удовлетворяет следующим условиям.

УСЛОВИЕ 2<sup>0</sup>. Существуют векторы

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_\nu), \quad t_k > 0, \quad t_k/\alpha_i \in \mathbb{N},$$

$$\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_\nu), \quad s_j \leq 0, \quad \max\{s_j\} = 0, \quad s_j/\alpha_i \in \mathbb{Z},$$

такие, что для любого  $c > 0$  справедливо равенство

$$\mathcal{L}(c^\alpha i\xi) = \begin{pmatrix} c^{s_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & c^{s_\nu} \end{pmatrix} \mathcal{L}(i\xi) \begin{pmatrix} c^{t_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & c^{t_\nu} \end{pmatrix}, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Полагаем, что  $l_{j,r}(i\xi) \equiv 0$  при  $s_j + t_r < 0$ .

УСЛОВИЕ 3<sup>0</sup>. Равенство

$$\det \mathcal{L}(i\xi) = 0, \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

имеет место тогда и только тогда, когда  $\xi = 0$ .

Отметим, что класс дифференциальных операторов, удовлетворяющих перечисленным условиям в случае  $s_1 = \dots = s_\nu = 0$ , рассмотрен в [2]. Этот класс содержит, в частности, однородные квазиэллиптические операторы, эллиптические и параболические операторы по Петровскому. Здесь будем рассматривать общий случай  $s_j \leq 0$ . Этот класс операторов включает, в частности, операторы, эллиптические по Дуглису – Ниренбергу. Приведем два примера таких операторов.

ПРИМЕР 1. Рассмотрим матричный дифференциальный оператор

$$l_1(D_x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & D_{x_1} \\ 0 & 1 & 0 & D_{x_2} \\ 0 & 0 & 1 & D_{x_3} \\ D_{x_1} & D_{x_2} & D_{x_3} & 0 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}^3. \tag{2.1}$$

Очевидно, он удовлетворяет условиям 1<sup>0</sup>–3<sup>0</sup>, при этом

$$\alpha = (1/2, 1/2, 1/2), \quad \mathbf{t} = (1/2, 1/2, 1/2, 1), \quad \mathbf{s} = (-1/2, -1/2, -1/2, 0).$$

ПРИМЕР 2. Стационарный оператор Навье – Стокса:

$$l_2(D_x) = \begin{pmatrix} -\Delta & 0 & 0 & D_{x_1} \\ 0 & -\Delta & 0 & D_{x_2} \\ 0 & 0 & -\Delta & D_{x_3} \\ D_{x_1} & D_{x_2} & D_{x_3} & 0 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}^3. \tag{2.2}$$

Он также удовлетворяет условиям 1<sup>0</sup>-3<sup>0</sup>, при этом

$$\alpha = (1/2, 1/2, 1/2), \quad \mathbf{t} = (1, 1, 1, 1/2), \quad \mathbf{s} = (0, 0, 0, -1/2).$$

По аналогии с [2] установим свойства изоморфизма квазиэллиптических операторов (1.1), используя специальные весовые соболевские пространства, введенные в [13]:

$$W_{p,\sigma}^{\mathbf{k}/\alpha}(\mathbb{R}^n), \quad \mathbf{k}/\alpha = (k/\alpha_1, \dots, k/\alpha_n), \quad k/\alpha_i \in \mathbb{N}, \quad 1 < p < \infty, \quad \sigma \geq 0.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Будем говорить, что локально суммируемая функция  $u(x)$  принадлежит весовому соболевскому пространству  $W_{p,\sigma}^{\mathbf{k}/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , если  $u(x)$  имеет обобщенные производные  $D_x^\beta u(x)$  в  $\mathbb{R}^n$ ,  $\beta\alpha \leq k$  и

$$\|(1 + \langle x \rangle)^{-\sigma(k-\beta\alpha)} D_x^\beta u(x), L_p(\mathbb{R}^n)\| < \infty, \quad \langle x \rangle^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2/\alpha_i.$$

Норма в пространстве  $W_{p,\sigma}^{\mathbf{k}/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  определяется следующим образом:

$$\|u(x), W_{p,\sigma}^{\mathbf{k}/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| = \sum_{0 \leq \beta\alpha \leq k} \|(1 + \langle x \rangle)^{-\sigma(k-\beta\alpha)} D_x^\beta u(x), L_p(\mathbb{R}^n)\|. \quad (2.3)$$

Будем рассматривать общий случай, когда компоненты  $k/\alpha_i$  вектора гладкости могут быть различными. Отметим, что в изотропном случае, когда  $k/\alpha_1 = \dots = k/\alpha_n = \bar{l}$ , норма (2.3) эквивалентна следующей:

$$\sum_{0 \leq |\beta| \leq \bar{l}} \|(1 + |x|)^{-\sigma(\bar{l}-|\beta|)} D_x^\beta u(x), L_p(\mathbb{R}^n)\|.$$

Напомним, что множество функций из  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  всюду плотно в  $W_{p,\sigma}^{\mathbf{k}/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  при  $\sigma \leq 1$  (см. [13]).

Введем весовые соболевские пространства  $\mathbf{W}_{p,\sigma}^{\mathbf{t}/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ ,  $\mathbf{W}_{p,\sigma}^{\mathbf{s}/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  для вектор-функций, где параметры гладкости определяются векторами

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_\nu), \quad \mathbf{s} = (s_1, \dots, s_\nu)$$

из условия 2<sup>0</sup>.

Будем говорить, что вектор-функция  $U(x) = (U^1(x), \dots, U^\nu(x))^T$  принадлежит пространству

$$\mathbf{W}_{p,\sigma}^{\mathbf{t}/\alpha}(\mathbb{R}^n) = \prod_{r=1}^{\nu} W_{p,\sigma}^{\mathbf{t}_r/\alpha}(\mathbb{R}^n), \quad \mathbf{t}_r/\alpha = (t_r/\alpha_1, \dots, t_r/\alpha_n), \quad 1 < p < \infty, \quad \sigma \geq 0,$$

если каждая ее компонента  $U^r(x)$  принадлежит  $W_{p,\sigma}^{\mathbf{t}_r/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , и будем писать

$$\|U(x), \mathbf{W}_{p,\sigma}^{\mathbf{t}/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| = \sum_{r=1}^{\nu} \|U^r(x), W_{p,\sigma}^{\mathbf{t}_r/\alpha}(\mathbb{R}^n)\|.$$

Аналогично будем говорить, что вектор-функция  $F(x) = (F^1(x), \dots, F^\nu(x))^T$  принадлежит пространству

$$\mathbf{W}_{p,\sigma}^{\mathbf{s}/\alpha}(\mathbb{R}^n) = \prod_{j=1}^{\nu} W_{p,\sigma}^{|\mathbf{s}_j|/\alpha}(\mathbb{R}^n), \quad |\mathbf{s}_j|/\alpha = (|s_j|/\alpha_1, \dots, |s_j|/\alpha_n), \quad 1 < p < \infty, \quad \sigma \geq 0,$$

если каждая ее компонента  $F^j(x)$  принадлежит  $W_{p,\sigma}^{|\mathbf{s}_j|/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , при этом в случае  $s_j = 0$  полагаем, что пространство  $W_{p,\sigma}^{|\mathbf{s}_j|/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  совпадает с  $L_p(\mathbb{R}^n)$ . По определению будем писать

$$\|F(x), \mathbf{W}_{p,\sigma}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| = \sum_{j=1}^{\nu} \|F^j(x), W_{p,\sigma}^{|\mathbf{s}_j|/\alpha}(\mathbb{R}^n)\|.$$

Введем следующие обозначения:

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad t_{\max} = \max\{t_1, \dots, t_\nu\}.$$

Сформулируем теорему об изоморфизме.

**Теорема 1.** Пусть  $|\alpha|/p > t_{\max}$ , тогда оператор

$$\mathcal{L}(D_x) : \mathbf{W}_{p,\sigma}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbf{W}_{p,\sigma}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n), \quad p > 1, \sigma = 1,$$

устанавливает изоморфизм.

В качестве следствий из теоремы 1 сформулируем утверждения о свойствах изоморфизма дифференциальных операторов

$$\ell_j(D_x) : \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^3), \quad j = 1, 2,$$

рассмотренных в примерах 1, 2.

**Следствие 1.** Оператор (2.1) устанавливает изоморфизм

$$\ell_1(D_x) : \prod_1^3 W_{p,1}^1(\mathbb{R}^3) \times W_{p,1}^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow \prod_1^3 W_{p,1}^1(\mathbb{R}^3) \times L_p(\mathbb{R}^3)$$

при  $1 < p < 3/2$ .

**Следствие 2.** Оператор Навье – Стокса (2.2) устанавливает изоморфизм

$$\ell_2(D_x) : \prod_1^3 W_{p,1}^2(\mathbb{R}^3) \times W_{p,1}^1(\mathbb{R}^3) \rightarrow \prod_1^3 L_p(\mathbb{R}^3) \times W_{p,1}^1(\mathbb{R}^3)$$

при  $1 < p < 3/2$ .

По аналогии с [2] приведем пример использования теоремы 1 для изучения разрешимости задачи Коши для системы уравнений, не разрешенных относительно старшей производной по времени:

$$\mathcal{L}(D_x) D_t^m U + \sum_{k=0}^{m-1} \mathcal{L}_{m-k}(D_x) D_t^k U = F(t, x), \tag{2.4}$$

$$D_t^k U|_{t=0} = \varphi_{k+1}(x), \quad k = 0, \dots, m-1.$$

Уравнения такого вида называются *уравнениями соболевского типа*, поскольку именно работы С. Л. Соболева (см. [14, Т. I]) послужили началом систематического изучения таких уравнений.

Будем предполагать, что матричные  $\nu \times \nu$ -дифференциальные операторы  $\mathcal{L}_k(D_x)$ ,  $k = 1, \dots, m$ , имеют постоянные коэффициенты и удовлетворяют условию  $2^0$ , т. е. их символы  $\mathcal{L}_k(i\xi) = (l_{j,r}^k(i\xi))$  так же, как и символ оператора  $\mathcal{L}(D_x)$ , квазиоднородные.

Сформулируем теорему о безусловной разрешимости задачи Коши (2.4), для простоты предполагая, что начальные условия нулевые.

**Теорема 2.** Пусть  $|\alpha|/p > t_{\max}$ ,  $\varphi_k(x) \equiv 0$ ,  $k = 1, \dots, m$ . Тогда для любой вектор-функции  $F(t, x) \in C([0, T]; \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n))$  задача (2.4) имеет единственное решение  $U(t, x) \in C^m([0, T]; \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n))$  и справедлива оценка

$$\|U(t, x), C^m([0, T]; \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n))\| \leq c(T) \|F(t, x), C([0, T]; \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n))\|$$

с константой  $c(T)$ , не зависящей от  $F(t, x)$ .

### § 3. Доказательство основных результатов

При доказательстве теоремы 1 будем следовать схеме из [3, 4, 6]. Поэтому кратко укажем схему доказательства и остановимся на существенных отличиях.

Вначале покажем, что квазиэллиптический оператор  $\mathcal{L}(D_x)$  отображает пространство  $\mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  в пространство  $\mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  и ограничен.

Пусть  $U(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ . Тогда  $j$ -ю компоненту вектор-функции  $\mathcal{L}(D_x)U(x)$  можно записать в виде

$$(\mathcal{L}(D_x)U(x))_j = \sum_{r=1}^{\nu} l_{j,r}(D_x)U^r(x).$$

В силу условия  $2^0$  символ оператора  $l_{j,r}(D_x)$  однороден относительно вектора  $\alpha$  с показателем однородности  $s_j + t_r$ , т. е.

$$l_{j,r}(c^\alpha i\xi) = c^{s_j+t_r} l_{j,r}(i\xi), \quad c > 0.$$

Поэтому оператор  $l_{j,r}(D_x)$  представим в виде

$$l_{j,r}(D_x) = \sum_{\beta \alpha = s_j + t_r} a_{j,r,\beta} D_x^\beta.$$

Отсюда в силу определения нормы в пространстве  $W_{p,1}^{k/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  получаем, что

$$l_{j,r}(D_x)U^r(x) \in W_{p,1}^{|s_j|/\alpha}(\mathbb{R}^n).$$

Поэтому  $\mathcal{L}(D_x)U(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , а поскольку коэффициенты  $a_{j,r,\beta}$  постоянные, имеем также неравенство

$$\|\mathcal{L}(D_x)U(x), \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \leq c \|U(x), \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)\|,$$

где  $c > 0$  — константа, не зависящая от  $U(x)$ .

Следовательно, для доказательства теоремы 1 нужно установить, что при  $|\alpha|/p > t_{\max}$  система дифференциальных уравнений

$$\mathcal{L}(D_x)U(x) = F(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \tag{3.1}$$

имеет единственное решение  $U(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  для любой правой части  $F(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , при этом имеет место оценка

$$\|U(x), \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \leq C \|F(x), \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \tag{3.2}$$

с константой  $C > 0$ , не зависящей от  $F(x)$ .

Отметим основные моменты доказательства разрешимости системы (3.1) и получения оценки (3.2).

Для доказательства разрешимости системы (3.1), как и в работе [2], будем использовать метод построения приближенных решений, подробно описанный в монографии [15]. Этот метод основан на использовании интегрального представления С. В. Успенского [16] для суммируемых функций (см. также [15, гл. 1]):

$$\varphi(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2\pi)^{-n} \int_h^{h^{-1}} v^{-|\alpha|-1} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(i \frac{x-y}{v^\alpha} \xi\right) G(\xi) \varphi(y) d\xi dy dv, \quad (3.3)$$

где

$$G(\xi) = 2m \langle \xi \rangle^{2m} \exp(-\langle \xi \rangle^{2m}), \quad \langle \xi \rangle^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^{2/\alpha_i}, \quad m, 1/\alpha_i \in \mathbb{N}. \quad (3.4)$$

Вначале пусть компоненты вектор-функции  $F(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  имеют компактные носители. Рассмотрим семейство интегральных операторов  $P_{k,h}$ ,  $k = 1, \dots, \nu$ ,  $0 < h < 1$ , определенных следующим образом:

$$P_{k,h} F(x) = \sum_{r=1}^{\nu} (2\pi)^{-n} \times \int_h^{h^{-1}} v^{-|\alpha|-1+t_k+s_r} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(i \frac{x-y}{v^\alpha} \xi\right) G(\xi) l^{k,r}(\xi) F^r(y) d\xi dy dv, \quad (3.5)$$

где  $l^{k,r}(\xi)$  — элементы обратной матрицы  $(\mathcal{L}(i\xi))^{-1}$ . Будем предполагать, что число  $m \in \mathbb{N}$  в (3.4) достаточно большое (см. доказательство леммы 4.2).

Как и в [2], из определения (3.5), условий  $1^0 - 3^0$  и представления (3.3) следует, что вектор-функцию  $U_h(x)$  с компонентами  $U_h^k(x) = P_{k,h} F(x)$ ,  $k = 1, \dots, \nu$ , можно рассматривать в качестве приближенного решения системы (3.1). В дальнейшем вектор-функцию  $U_h(x)$  будем записывать в следующем виде:

$$U_h(x) = P_h F(x) = (P_{1,h} F(x), \dots, P_{\nu,h} F(x))^T. \quad (3.6)$$

В следующем параграфе будет доказано, что при условии  $|\alpha|/p > t_{\max}$  справедлива оценка

$$\|U_h(x), \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \leq C \|F(x), \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \quad (3.7)$$

с константой  $C > 0$ , не зависящей от  $F(x)$  и  $h$ , и имеет место сходимость

$$\|U_{h_1}(x) - U_{h_2}(x), \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \rightarrow 0, \quad h_1, h_2 \rightarrow 0. \quad (3.8)$$

Отметим, что в случае  $s_1 = \dots = s_\nu = 0$  оценка (3.7) и сходимость (3.8) установлены в [2], и это было ключевым моментом при доказательстве теоремы об изоморфизме. Точно такая же ситуация и в общем случае при  $s_j \leq 0$ . Действительно, в силу полноты пространства  $\mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  из (3.7), (3.8) следует, что существует линейный непрерывный оператор

$$P : \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n),$$

определенный на финитных вектор-функциях  $F(x)$  по формуле

$$PF(x) = \lim_{h \rightarrow 0} P_h F(x),$$

при этом вектор-функция  $U(x) = PF(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  является решением системы (3.1). Как отмечалось, множество финитных вектор-функций всюду плотно в  $\mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , поэтому оператор  $P$  можно единственным образом продолжить на все пространство  $\mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  с сохранением нормы. Теперь по аналогии с [2], учитывая оценку (3.7) и используя теорему Банаха — Штейнгауза, получим существование решения  $U(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{t/\alpha}(\mathbb{R}^n)$  системы (3.1) для любой правой части  $F(x) \in \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)$ , а также оценку (3.2).

Доказательство единственности решения в рассматриваемом пространстве проводится повторением соответствующих рассуждений из [6].

Следовательно, для полного доказательства теоремы 1 нужно получить оценку (3.7) и установить сходимость (3.8). Этот вопрос обсуждается в следующем параграфе.

Утверждение теоремы 2 является простым следствием теоремы об изоморфизме квазиэллиптического оператора (1.1) (см. [2]).

#### § 4. Оценки приближенных решений системы (3.1)

Доказательство неравенства (3.7) и сходимости (3.8) разобьем на две леммы. Вначале проведем  $L_p$ -оценки старших производных компонент вектор-функции (3.6).

**Лемма 4.1.** Пусть  $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ ,  $\beta\alpha = t_k$ . Тогда имеет место оценка

$$\|D_x^\beta U_h^k(x), L_p(\mathbb{R}^n)\| \leq C_\beta \|F(x), \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \tag{4.1}$$

с константой  $C_\beta > 0$ , не зависящей от  $F(x)$  и  $h$ , при этом

$$\|D_x^\beta U_{h_1}^k(x) - D_x^\beta U_{h_2}^k(x), L_p(\mathbb{R}^n)\| \rightarrow 0, \quad h_1, h_2 \rightarrow 0. \tag{4.2}$$

**Доказательство.** Очевидно, оценку (4.1) достаточно провести для вектор-функции  $F(x) \in \mathbf{C}_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Из определения (3.5) имеем

$$D_x^\beta U_h^k(x) = \sum_{r=1}^\nu (2\pi)^{-n} \int_h^{h^{-1}} v^{-|\alpha|-1+s_r} \times \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(i \frac{x-y}{v^\alpha} \xi\right) G(\xi) (i\xi)^\beta l^{k,r}(\xi) F^r(y) d\xi dy dv.$$

Используя свойства преобразования Фурье, эту формулу можно переписать в виде

$$D_x^\beta U_h^k(x) = (2\pi)^{-n} \int_h^{h^{-1}} v^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} \exp(i(x-y)s) G(sv^\alpha) ds \right) F_{k,\beta}(y) dy dv, \tag{4.3}$$

где

$$F_{k,\beta}(y) = \sum_{r=1}^\nu (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \exp(iy\xi) (i\xi)^\beta l^{k,r}(\xi) \widehat{F}^r(\xi) d\xi.$$

Мультииндекс  $\beta$  такой, что  $\beta\alpha = t_k$ , поэтому, учитывая условия  $2^0, 3^0$ , можно показать, что функции

$$\mu_{k,r,\beta}(\xi) = (i\xi)^\beta l^{k,r}(\xi) \langle \xi \rangle^{s_r}, \quad k, r = 1, \dots, \nu,$$

удовлетворяют условиям теоремы о мультипликаторах [17]. Тогда из этой теоремы вытекает неравенство

$$\|F_{k,\beta}(x), L_p(\mathbb{R}^n)\| \leq c_\beta \|F(x), \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\|$$

с константой  $c_\beta$ , не зависящей от  $F(x)$ . Следовательно, используя свойства интегрального представления (3.3) (см. [15, гл. 1]), из (4.3) получаем оценку (4.1).

Доказательство (4.2) проводится аналогичным образом.  
Лемма доказана.

Проведем теперь оценки производных

$$D_x^\beta U_h^k(x), \quad 0 \leq \beta\alpha < t_k, \quad k = 1, \dots, \nu,$$

в  $L_p$ -нормах с весами.

**Лемма 4.2.** Пусть  $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ ,  $\beta\alpha < t_k$  и  $|\alpha|/p > t_k$ . Тогда имеет место неравенство

$$\|\langle x \rangle^{-(t_k - \beta\alpha)} D_x^\beta U_h^k(x), L_p(\mathbb{R}^n)\| \leq c \|F(x), \mathbf{W}_{p,1}^{s/\alpha}(\mathbb{R}^n)\| \quad (4.4)$$

с константой  $c > 0$ , не зависящей от  $F(x)$  и  $h$ , при этом

$$\|\langle x \rangle^{-(t_k - \beta\alpha)} (D_x^\beta U_{h_1}^k(x) - D_x^\beta U_{h_2}^k(x)), L_p(\mathbb{R}^n)\| \rightarrow 0, \quad h_1, h_2 \rightarrow 0. \quad (4.5)$$

**Доказательство.** Очевидно, оценку (4.4) достаточно провести для вектор-функции  $F(x) \in \mathbf{C}_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ . Учитывая определения (3.4), (3.5) и используя свойства преобразования Фурье, имеем

$$\begin{aligned} D_x^\beta U_h^k(x) &= \sum_{r=1}^\nu (2\pi)^{-n} \int_h^{h^{-1}} v^{-|\alpha| - 1 + t_k + s_r - \beta\alpha} \\ &\quad \times \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(i \frac{x-y}{v^\alpha} \xi\right) G(\xi) (i\xi)^\beta l^{k,r}(\xi) F^r(y) d\xi dy dv \\ &= \sum_{r=1}^\nu (2\pi)^{-n/2} \int_h^{h^{-1}} v^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} \exp(ixs) G(sv^\alpha) (is)^\beta l^{k,r}(s) \widehat{F}^r(s) ds dv. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Введем следующие функции:

$$\mu_{\beta,j}^{k,r}(\xi) = (i\xi)^\beta l^{k,r}(\xi) \frac{(-i\xi_j)^{|s_r|/\alpha_j}}{\sum_{l=1}^n \xi_l^{2|s_r|/\alpha_l}}, \quad k, r = 1, \dots, \nu, \quad j = 1, \dots, n. \quad (4.7)$$

Тогда формулу (4.6) можно представить в виде

$$D_x^\beta U_h^k(x) = \sum_{r=1}^\nu \sum_{j=1}^n (2\pi)^{-n/2} \int_h^{h^{-1}} v^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} \exp(ix\xi) G(\xi v^\alpha) \mu_{\beta,j}^{k,r}(\xi) (\widehat{D_{y_j}^{|s_r|/\alpha_j}} F^r)(\xi) d\xi dv.$$

Следовательно,

$$D_x^\beta U_h^k(x) = \sum_{r=1}^\nu \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{K}_{\beta,j,h}^{k,r}(x-y) D_{y_j}^{|s_r|/\alpha_j} F^r(y) dy, \quad (4.8)$$



где

$$\mathcal{H}_{\beta,j,h}^{k,r}(x) = (2\pi)^{-n} \int_h^{h^{-1}} v^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} \exp(ix\xi) G(\xi v^\alpha) \mu_{\beta,j}^{k,r}(\xi) d\xi dv. \quad (4.9)$$

Из условий  $2^0$ ,  $3^0$  вытекает, что функции (4.7) однородны относительно вектора  $\alpha$  с показателями однородности  $(\beta\alpha - t_k)$ , т. е.

$$\mu_{\beta,j}^{k,r}(c^\alpha \xi) = c^{\beta\alpha - t_k} \mu_{\beta,j}^{k,r}(\xi), \quad c > 0.$$

Поэтому при  $t_k > \beta\alpha \geq 0$ , учитывая определение (4.7), нетрудно видеть, что интегралы (4.9) удовлетворяют условиям леммы 3.3 из работы [3]. Из этой леммы следует, что существует число  $m_0 \geq 1$  такое, что при любом  $m \geq m_0$  в (3.4) для интегралов выполняется оценка

$$\langle x \rangle^{|\alpha| + \beta\alpha - t_k} |\mathcal{H}_{\beta,j,h}^{k,r}(x)| \leq c, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

с константой  $c > 0$ , не зависящей от  $h$ . Используя эту оценку и учитывая формулу (4.8), получим

$$\begin{aligned} & \left\| \langle x \rangle^{-(t_k - \beta\alpha)} D_x^\beta U_h^k(x), L_p(\mathbb{R}^n) \right\| \\ & \leq \sum_{r=1}^{\nu} \sum_{j=1}^n c \left\| \langle x \rangle^{-(t_k - \beta\alpha)} \int_{\mathbb{R}^n} \langle x - y \rangle^{-(|\alpha| + \beta\alpha - t_k)} |D_{y_j}^{|\alpha_j|} F^r(y)| dy, L_p(\mathbb{R}^n) \right\|. \end{aligned}$$

По условию  $|\alpha|/p > t_k$ ,  $t_k - \beta\alpha > 0$ , поэтому  $|\alpha| + \beta\alpha - t_k > 0$ . Учитывая это, будем иметь

$$\begin{aligned} & \left\| \langle x \rangle^{-(t_k - \beta\alpha)} D_x^\beta U_h^k(x), L_p(\mathbb{R}^n) \right\| \\ & \leq \sum_{r=1}^{\nu} \sum_{j=1}^n c_1 \left\| \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^n |x_i|^{(\beta\alpha - t_k)/|\alpha|} |x_i - y_i|^{(t_k - \beta\alpha)/|\alpha| - 1} |D_{y_j}^{|\alpha_j|} F^r(y)| dy, L_p(\mathbb{R}^n) \right\|. \end{aligned}$$

Следовательно, применяя неравенство Харди — Литтлвуда [18], получаем оценку (4.4).

Доказательство сходимости (4.5) проводится точно так же.

Лемма доказана.

Из лемм 4.1, 4.2 непосредственно вытекают оценка (3.7) и сходимость (3.8) для приближенного решения (3.6) системы (3.1). Это и требовалось установить для полного доказательства теоремы 1.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Волевич Л. Р. Локальные свойства решений квазиэллиптических систем // Мат. сб. 1962. Т. 59, № 3. С. 3–52.
2. Демиденко Г. В. Квазиэллиптические операторы и уравнения соболевского типа // Сиб. мат. журн. 2008. Т. 49, № 5. С. 1064–1076.
3. Демиденко Г. В. Изоморфные свойства одного класса дифференциальных операторов и их приложения // Сиб. мат. журн. 2001. Т. 42, № 5. С. 1036–1056.
4. Демиденко Г. В. Об одном классе матричных дифференциальных операторов // Сиб. мат. журн. 2004. Т. 45, № 1. С. 103–118.
5. Demidenko G. V. Mapping properties of quasielliptic operators and applications // Int. J. Dyn. Syst. Differ. Equations. 2007. V. 1, N 1. P. 58–67.
6. Демиденко Г. В. О квазиэллиптических операторах в  $R_n$  // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 5. С. 1028–1037.

7. Багиров Л. А., Кондратьев В. А. Об эллиптических уравнениях в  $\mathbb{R}^n$  // Дифференц. уравнения. 1975. Т. 11, № 3. С. 498–504.
8. Cantor M. Some problems of global analysis on asymptotically simple manifolds // Compositio Math. 1979. V. 38, N 1. P. 3–35.
9. McOwen R. C. On elliptic operators in  $\mathbb{R}^n$  // Commun. Partial Differ. Equations. 1980. V. 5, N 9. P. 913–933.
10. Choquet-Bruhat Y., Christodoulou D. Elliptic systems in  $H_{s,\sigma}$  spaces on manifolds which are Euclidean at infinity // Acta Math. 1981. V. 146, N 1/2. P. 129–150.
11. Lockhart R. B., McOwen R. C. Elliptic differential operators on noncompact manifolds // Ann. Sc. Norm. Super. Pisa, Cl. Sci., IV. Ser. 1985. V. 12, N 3. P. 409–447.
12. Hile G. N. Fundamental solutions and mapping properties of semielliptic operators // Math. Nach. 2006. V. 279, N 13–14. P. 1538–1572.
13. Демиденко Г. В. О весовых соболевских пространствах и интегральных операторах, определяемых квазиэллиптическими уравнениями // Докл. РАН. 1994. Т. 334, № 4. С. 420–423.
14. Соболев С. Л. Избранные труды. Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, Филиал "Гео" Изд-ва СО РАН. Т. I, 2003. Т. II, 2006.
15. Демиденко Г. В., Успенский С. В. Уравнения и системы, не разрешенные относительно старшей производной. Новосибирск: Научная книга, 1998.
16. Успенский С. В. О представлении функций, определяемых одним классом гипоеллиптических операторов // Тр. Мат. ин-та АН СССР. 1972. Т. 117. С. 292–299.
17. Лизоркин П. И. Обобщенное ливиллевское дифференцирование и метод мультипликаторов в теории вложений классов дифференцируемых функций // Тр. Мат. ин-та АН СССР. 1969. Т. 105. С. 89–167.
18. Харди Г. Г., Литтлвуд Дж. Е., Полла Г. Неравенства. М.: Изд-во иностр. лит., 1948.

*Статья поступила 3 июня 2009 г.*

Демиденко Геннадий Владимирович  
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,  
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090  
demidenk@math.nsc.ru