

УДК 512.540+510.5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЧТИ c -ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ

А. Н. Хисамиев

Аннотация. Введено понятие почти c -простой модели и доказано существование универсальной Σ -функции в наследственно конечной надстройке над такой моделью. Построены семейства почти c -простых деревьев и эквивалентностей.

DOI 10.17377/smzh.2015.56.301

Ключевые слова: наследственно конечное допустимое множество, универсальная Σ -функция, почти c -простая модель, дерево, эквивалентность.

В настоящее время общепризнанно, что одним из важных обобщений понятия вычислимости является Σ -определимость (обобщенная вычислимость) в допустимых множествах. Это обобщение дало возможность исследовать проблемы вычислимости над произвольными алгебраическими системами, например, над полем вещественных чисел. В [1, 2] понятие Σ -определимости позволило сформулировать новую концепцию теоретического программирования, так называемое семантическое программирование, в которой программа является одновременно своей же спецификацией, а исполнение ее сводится к проверке истинности утверждения на алгебраической системе. Наиболее важные результаты по теории вычислимости в допустимых множествах и их применение в теоретической информатике (семантическое программирование, динамическая логика, теория эффективных f -пространств и т. д.) приведены в монографии Ю. Л. Ершова [3], в которой отмечена важность следующего направления дальнейших исследований: «для лучшего понимания общей природы вычислимости (конструктивной познаваемости) следует дальше развить (понять) вычислимость в допустимых множествах вида $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathcal{A})$ — наследственно конечной надстройке над системой \mathcal{A} , где \mathcal{A} является либо моделью достаточно простой теории, либо одним из классических объектов, таким, например, как поле \mathbb{R} вещественных чисел» [3, с. 12].

Одним из принципиальных результатов классической теории вычислимости является существование универсальной частично вычислимой функции. Как известно (см. [3]), в любом допустимом множестве конечной сигнатуры существует универсальный Σ -предикат, но это неверно для Σ -функций. В [4] построена модель \mathcal{M} такая, что в наследственно конечном допустимом множестве $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathcal{M})$ не существует универсальной Σ -функции. Поэтому представляет интерес нахождение условия на модель \mathcal{M} для существования универсальной Σ -функции в наследственно конечной надстройке $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathcal{M})$ над \mathcal{M} . Отметим,

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта АНФ_а 13–01–91001) и Совета по грантам президента РФ и государственной поддержке ведущих научных школ (код проекта НШ–860.2014.1).

что существование универсальной Σ -функции дает возможность в семантическом программировании получить универсальный язык программирования для Σ -функций на основе Σ -программ. В [3] доказано, что если \mathfrak{M} — модель разрешимой и модельно полной теории, то в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ существует универсальная Σ -функция. В [5–7] для одного класса K моделей найдены необходимые и достаточные условия для существования универсальной Σ -функции в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$, где $\mathfrak{M} \in K$. В [8] установлено, что наследственно конечная списочная надстройка $\mathbb{H}\mathbb{W}(\mathbb{R}_{\text{exp}})$ над полем вещественных чисел с экспонентой удовлетворяет свойству униформизации, и как следствие получено существование универсальной Σ -функции в такой надстройке. Справедливость свойства униформизации для наследственно конечных надстроек $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathbb{R})$ и $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathbb{Q}_p)$ над полями вещественных и p -адических показана в [9, 10]. В [11] построена абелева группа без кручения A такая, что в $\mathbb{H}\mathbb{F}(A)$ не существует универсальной Σ -функции. В [12, 13] введено понятие Σ -ограниченной модели и получено необходимое и достаточное условие для существования универсальной Σ -функции в наследственно конечной надстройке над такой моделью. Доказано, что любой линейный порядок, алгебра Ершова и абелева p -группа являются Σ -ограниченными моделями и в наследственно конечных надстройках над ними существуют универсальные Σ -функции. В [14, 15] введено понятие Σ -однородной модели, дано необходимое и достаточное условие для существования универсальной функции в наследственно конечных надстройках над такими моделями и приведены примеры Σ -однородных абелевых групп и колец. В [16] построено дерево T высоты 4 такое, что в $\mathbb{H}\mathbb{F}(T)$ не существует универсальной Σ -функции.

В [3] введено понятие простой теории, которая в [17] названа s -простой, т. е. разрешимая, модельно полная, ω -категоричная теория с разрешимым множеством полных формул называется s -простой.

В данной работе введено понятие почти s -простой модели и доказано существование универсальной Σ -функции в наследственно конечной надстройке над такой моделью. Построены семейства почти s -простых деревьев и эквивалентностей.

Рассматриваются модели конечных предикатных сигнатур. Заметим, что это ограничение не мешает рассматривать сигнатуры с операциями. Действительно, каждую сигнатурную операцию можно естественным способом заменить предикатом, который интерпретируется как график этой операции. Отметим, что при переходе от операциональных сигнатур к соответствующим чисто предикатным сигнатурам и обратно класс Σ -определимых отношений не изменяется.

Мы придерживаемся терминологии и обозначений по допустимым множествам из [3] и [12], по деревьям — из [18]. Напомним лишь некоторые из них.

Пусть $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ — модели сигнатуры σ_0 , основные множества которых обозначаются через M, N соответственно; $\mathfrak{M}_0 \leq \mathfrak{M}$ означает, что \mathfrak{M}_0 — подмодель \mathfrak{M} ; если $A \subseteq M$, то под A будем понимать подмодель $\langle A, \sigma_0 \upharpoonright A \rangle \leq \mathfrak{M}$; $M^{<\omega}$ — множество всех конечных последовательностей элементов из M ; $lh \vec{a}$ — длина последовательности \vec{a} ; если $\vec{a}_0, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{b}_0, \dots, \vec{b}_{k-1} \in M^{<\omega}$, то отношение « $\varphi : \langle \vec{a}_0, \dots, \vec{a}_{k-1} \rangle \rightarrow \langle \vec{b}_0, \dots, \vec{b}_{k-1} \rangle$ — изоморфизм» означает, что $\varphi : \bigcup \text{sp } \vec{a}_i \rightarrow \bigcup \text{sp } \vec{b}_i$ — изоморфизм относительно сигнатуры σ_0 , $\varphi \vec{a}_i = \vec{b}_i$, $i < k$, где $\varphi \langle a_i^0, \dots, a_i^{k-1} \rangle = \langle \varphi a_i^0, \dots, \varphi a_i^{k-1} \rangle$.

Под *допустимым множеством* \mathbb{A} будем понимать KPU-модель, у которой множество $\text{Ord } \mathbb{A}$ всех ординалов вполне упорядочено. Функция в \mathbb{A} , график

которой определяется некоторой Σ -формулой в \mathbb{A} , называется Σ -функцией.

Двухместная частичная Σ -функция $g(x, y) : A^2 \rightarrow A$ называется *универсальной* для семейства одноместных частичных Σ -функций в допустимом множестве \mathbb{A} , если семейство $\{\lambda y g(a, y) \mid a \in A\}$ состоит из всех одноместных частичных Σ -функций.

Важным классом допустимых множеств является класс наследственно конечных допустимых множеств вида $\mathbb{HFF}(\mathfrak{M})$ — наследственно конечная надстройка над моделью \mathfrak{M} . Пусть $\mathcal{P}_\omega(X)$ — множество всех конечных подмножеств множества X .

Наследственно конечная надстройка $\mathbb{HFF}(\mathfrak{M})$ над алгебраической системой $\mathfrak{M} = \langle M, \sigma_0 \rangle$ определяется как алгебраическая система $\langle M \cup HF(M), U, \in, \emptyset, \sigma_0 \rangle$ сигнатуры $\sigma_1 = \langle U, \in, \emptyset, \sigma_0 \rangle$, где

$$HF(M) = \bigcup_{n \in \omega} HF_n(M), \quad HF_0(M) = \emptyset,$$

$$HF_{n+1}(M) = \mathcal{P}_\omega(M \cup HF_n(M)),$$

и предикат U выделяет множество элементов модели \mathfrak{M} (*праэлементов*), а отношение \in и константа \emptyset имеют обычные теоретико-множественные смыслы.

Напомним, что носитель $\text{sp } u$ элемента $u \in \mathbb{HFF}(\mathfrak{M})$ определяется так: если $u \in M$, то $\text{sp } u = \{u\}$. Пусть $u = \{x_0, \dots, x_s\}$, тогда $\text{sp } u = \bigcup_{i=1}^s \text{sp } x_i$. Элементами множества ω в $\mathbb{HFF}(\mathfrak{M})$ являются ординалы.

Пусть S_m — множество всех подстановок множества $\{0, \dots, m-1\}$, если $m > 0$, и S_0 — множество, состоящее из тождественной подстановки множества $\{0\}$. Пусть дана последовательность $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_{m-1} \rangle$, $lh \vec{x} = m$, и $\sigma \in S_m$. Тогда $\vec{x}_\sigma = \langle x_{\sigma(0)}, \dots, x_{\sigma(m-1)} \rangle$, $\emptyset_\sigma = \emptyset$. Если $\varkappa(0, \dots, m-1) \in HF(\omega)$, то $S_\varkappa = \{\sigma \in S_m \mid \varkappa(0, \dots, m-1) = \varkappa(\sigma(0), \dots, \sigma(m-1))\}$. Слово «вложение» означает «изоморфное вложение».

§ 1. Почти c -простые модели

Здесь введено понятие почти c -простой модели и доказано существование универсальной Σ -функции в наследственно конечной надстройке над такой моделью.

Пусть дана модель \mathfrak{M} конечной сигнатуры σ_0 и для каждого конечного подмножества $M_0 \subseteq M$ существует однозначно определенное конечное подмножество $[M_0] \subseteq M$ такое, что $M_0 \subseteq [M_0]$ и $[[M_0]] = [M_0]$. Множество $[M_0]$ называется *замыканием множества* M_0 . Если $[M_0] = M_0$, то M_0 назовем *замкнутым множеством*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1. Пусть для модели \mathfrak{M} конечной сигнатуры σ_0 и ее подмодели $\mathfrak{N} \leq \mathfrak{M}$ справедливы следующие условия.

1. \mathfrak{N} — модель c -простой теории T , и ее носитель N является Σ -подмножеством в $\mathbb{HFF}(\mathfrak{M})$.
2. В $\mathbb{HFF}(\mathfrak{N})$ существуют Σ -формулы без параметров, определяющие Δ -предикат $\mathfrak{B} \subseteq \mathcal{P}_\omega(N) \times \mathcal{P}_\omega(N)$, для которого справедливо

$$\mathbb{HFF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(x, y \cup z) \ \& \ x \subseteq y, x \subseteq z \rightarrow \mathfrak{B}(x, y) \ \& \ \mathfrak{B}(x, z).$$

3. Модель \mathfrak{M} локально вложима в \mathfrak{N} .

Пусть $A \subseteq M$, $B \subseteq N$ и $\alpha : A \rightarrow B$ — изоморфизм. Тогда

(а) если A замкнуто, то для любого конечного $A^1 \supseteq A$ существует вложение $\psi : A^1 \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , такое, что $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, \psi A^1)$;

(б) если вложения $\varphi^\varepsilon : A^\varepsilon \rightarrow \mathfrak{N}$, $A^\varepsilon \supseteq A$, $\varepsilon < 2$, продолжают α и $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, \varphi^\varepsilon A^\varepsilon)$, то существует вложение $\psi : (A^0 \cup A^1) \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , для которого $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, \psi(A^0 \cup A^1))$;

(с) для любого $B^1 \supseteq B$ такого, что $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, B^1)$, существует вложение $\psi : B^1 \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее α^{-1} .

Тогда \mathfrak{M} назовем *почти c -простой моделью*.

Теорема 1.1. *В наследственно конечной надстройке $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ над почти c -простой моделью \mathfrak{M} существует универсальная Σ -функция.*

Для доказательства теоремы нам потребуются следующие леммы.

Для любой Σ -формулы $\Phi(\vec{b}, u, v) = \exists w \Phi_0^{(w)}(\vec{b}, u, v)$ введем формулу

$$\Phi^*(\vec{b}, u, v, e) = \Phi_0^{(e)}(\vec{b}, u, v) \ \& \ \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } e \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } u \cup \text{sp } v).$$

Лемма 1.1. *Пусть $\vec{a} \in M^{<\omega}$, $\vec{b} \in N^{<\omega}$, $\alpha : \vec{a} \rightarrow \vec{b}$ — изоморфизм и Σ -формула $\Phi(\vec{a}, x, z) = \exists d \Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x, z)$ с параметром \vec{a} определяет функцию f в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$. Тогда формула $\exists e \Phi^*(\vec{b}, u, v, e)$ с параметром \vec{b} определяет некоторую Σ -функцию $g_{\Phi, \alpha}$ в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$.*

Доказательство. Пусть $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Phi^*(\vec{b}, u^\varepsilon, v^\varepsilon, e^\varepsilon)$, $\varepsilon < 2$, и $u^0 = u^1$. Тогда существуют конечные подмножества $N^\varepsilon = \text{sp } e^\varepsilon \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } u^\varepsilon \cup \text{sp } v^\varepsilon$ такие, что

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(N^\varepsilon) \models \exists e^\varepsilon \Phi_0^{(e^\varepsilon)}(\vec{b}, u^\varepsilon, v^\varepsilon) \quad (1)$$

и $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, N^\varepsilon)$. По условию 3(b) существует вложение $\psi_1 : N^0 \cup N^1 \rightarrow \mathfrak{N}$ такое, что $\psi_1(\vec{b}) = \vec{b}$ и $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \psi_1(N^0 \cup N^1))$. Пусть $N_0 = \psi_1(N^0 \cup N^1)$. По условию 3(c) существует вложение $\psi : N_0 \rightarrow \mathfrak{M}$, для которого $\psi(\vec{b}) = \vec{a}$. Пусть ψ_1^* и ψ^* — естественное продолжение вложений ψ_1 и ψ в наследственно конечную надстройку над $N^0 \cup N^1$ и N_0 соответственно. Тогда из (1) вытекает $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models \Phi(\vec{a}, \psi^* \psi_1^* u^\varepsilon, \psi^* \psi_1^* v^\varepsilon)$. Так как $\psi^* \psi_1^* u^0 = \psi^* \psi_1^* u^1$ и формула Φ определяет функцию в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$, имеем $\psi^* \psi_1^* v^0 = \psi^* \psi_1^* v^1$, т. е. $v^0 = v^1$. Таким образом, формула $\exists e \Phi^*(\vec{b}, u, v, e)$ определяет некоторую функцию $g_{\Phi, \alpha}$ в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$. \square

Следующая лемма непосредственно вытекает из определения c -простой теории.

Лемма 1.2. *Пусть T — c -простая теория. Тогда существует сильно вычислимая последовательность $\{P_n\}_{n \in \omega}$, где P_n — множество номеров не T -эквивалентных полных \exists -формул от переменных $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle$, содержащее все с точностью до T -эквивалентности полные формулы от переменных \vec{x} .*

Пусть $\vec{a} = \langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle \in M^n$ и $D_{\vec{a}}(a_0, \dots, a_{n-1})$ — диаграмма подмодели $\langle \text{sp } \vec{a}, \sigma_0 \rangle$. Через $D_{\vec{a}}(\vec{x})$ обозначим формулу, полученную из $D_{\vec{a}}(\vec{a})$ заменой a_i на x_i . Пусть \mathfrak{N} — счетная модель c -простой теории с основным множеством N . Для любых кортежей $\vec{b}, \vec{u} \in N^{<\omega}$ и $m = \text{lh } \vec{b} + \text{lh } \vec{u}$ введем формулу

$$\begin{aligned} I(K, \vec{b}, \vec{u}) = & \forall \varphi \in K D_{\vec{b}, \vec{u}}(\vec{b}, \varphi \vec{u}) \ \& \ \forall s \in P_m (\exists \vec{u}^0 (D_{\vec{b}, \vec{u}}(\vec{b}, \vec{u}^0) \ \& \ \Phi_s(\vec{b}, \vec{u}^0)) \\ & \rightarrow \exists \varphi^0 \in K (\Phi_s(\vec{b}, \varphi^0 \vec{u}) \ \& \ \forall \varphi^1 \in K (\varphi^0 \neq \varphi^1 \rightarrow \neg \Phi_s(\vec{b}, \varphi^1 \vec{u}))). \end{aligned}$$

Легко проверить, что для любых $\vec{b}, \vec{u} \in N^{<\omega}$ предикат I определяет конечное множество изоморфизмов K , мощность которого равна мощности полных

формул, совместных с $D_{\vec{b}, \vec{u}}(\vec{x})$. Поскольку теория T модельно полна и разрешима, эффективно находится Σ -формула с параметрами \vec{b}, \vec{u} , определяющая предикат I .

Для любых Σ -формул $\Phi(\vec{a}, x, z) = \exists d \Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x, z)$, $\Psi(\vec{b}, u, v)$ и изоморфизма $\alpha : \vec{a} \rightarrow \vec{b}$ введем формулу

$$\begin{aligned} \Xi_{\Psi, \Phi, \alpha}(x, z) = & \exists d(\Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x, z) \ \& \ \exists \varkappa \exists \tau \exists \rho \exists \vec{x} \exists \vec{z} \exists \vec{d} \exists \vec{u} \exists \vec{v} \exists \vec{e} \exists \varphi(\varkappa, \tau, \rho \in HF(\omega) \\ & \ \& \ x = \varkappa(\vec{x}) \ \& \ z = \tau(\vec{z}) \ \& \ d = \rho(\vec{d}) \ \& \ \vec{x}, \vec{z}, \vec{d} \in M^{<\omega} \ \& \ \vec{u}, \vec{v}, \vec{e} \in N^{<\omega} \\ & \ \& \ D_{(\vec{a}, \vec{x}, \vec{z}, \vec{d})}(\langle \vec{b}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{e} \rangle) \ \& \ \mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models [\Phi^*(\vec{b}, \varkappa(\vec{u}), \tau(\vec{v}), \rho(\vec{e})) \ \& \ \Psi(\vec{b}, \varkappa(\vec{u}), \tau(\vec{v})) \\ & \ \& \ \exists K(I(K, \vec{b}, \langle \vec{u}, \vec{v}, \vec{e} \rangle) \ \& \ \forall \varphi \in K(\mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } \varphi \vec{e} \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } \varphi \vec{u} \cup \text{sp } \varphi \vec{v}) \\ & \ \rightarrow \Psi(\vec{b}, \varkappa(\varphi \vec{u}), \tau(\varphi \vec{v}))))]). \end{aligned}$$

Лемма 1.3. Пусть модели $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ удовлетворяют условиям определения 1.1. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Пусть Σ -формула $\Psi(\vec{b}, u, v)$ с параметром $\vec{b} \in N^{<\omega}$ определяет функцию g в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$. Тогда для любых $\vec{a} \in M^{<\omega}$, изоморфизма $\alpha : \vec{a} \rightarrow \vec{b}$ и Σ -формулы $\Phi(\vec{a}, x, z) = \exists d \Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x, z)$ формула $\Xi_{\Psi, \Phi, \alpha}(x, z)$ определяет некоторую Σ -функцию $f_{\Psi, \Phi, \alpha}$ в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$.

2. Пусть функция f определена Σ -формулой $\Phi(\vec{a}, x_1, x_2) = \exists d \Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x_1, x_2)$ в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ с параметром \vec{a} , $\text{sp } \vec{a}$ замкнуто, $\alpha : \vec{a} \rightarrow \vec{b}$ — изоморфизм, и функция $g_{\Psi, \alpha}(u, v)$, введенная в лемме 1.1 по функции f , определена формулой $\Psi(\vec{b}, u, v)$. Тогда функция $f_{\Psi, \Phi, \alpha}$, определенная по Ψ, Φ, α , как в п. (1), расширяет функцию f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем утверждение 1. Пусть

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models \Xi_{\Psi, \Phi, \alpha}(\varkappa^\varepsilon(\vec{x}^\varepsilon), \tau^\varepsilon(\vec{z}^\varepsilon)), \quad \varepsilon < 2, \quad (2)$$

и

$$\varkappa^0(\vec{x}^0) = \varkappa^1(\vec{x}^1), \quad (3)$$

т. е.

$$\varkappa^0 = \varkappa^1 \circ \sigma, \quad \vec{x}^1 = \vec{x}^0_\sigma \quad (4)$$

для некоторой подстановки $\sigma \in S_\varkappa$. Докажем, что $\tau^0(\vec{z}^0) = \tau^1(\vec{z}^1)$. Из (2) следует, что существуют изоморфизмы $\varphi_\varepsilon : \langle \vec{a}, \vec{x}^\varepsilon, \vec{z}^\varepsilon, \vec{d}^\varepsilon \rangle \rightarrow \langle \vec{b}, \vec{u}^\varepsilon, \vec{v}^\varepsilon, \vec{e}^\varepsilon \rangle$ такие, что

$$\begin{aligned} \mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models & \Phi^*(\vec{b}, \varkappa(\vec{u}^\varepsilon), \tau^\varepsilon(\vec{v}^\varepsilon), \rho^\varepsilon(\vec{e}^\varepsilon)) \ \& \ \Psi(\vec{b}, \varkappa(\vec{u}^\varepsilon), \tau^\varepsilon(\vec{v}^\varepsilon)) \\ & \ \& \ \exists K^\varepsilon(I(K^\varepsilon, \vec{b}, \langle \vec{u}^\varepsilon, \vec{v}^\varepsilon, \vec{e}^\varepsilon \rangle) \ \& \ \forall \varphi \in K^\varepsilon(\mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } \varphi \vec{e}^\varepsilon \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } \varphi \vec{u}^\varepsilon \cup \text{sp } \varphi \vec{v}^\varepsilon) \\ & \ \rightarrow \Psi(\vec{b}, \varkappa(\varphi \vec{u}^\varepsilon), \tau^\varepsilon(\varphi \vec{v}^\varepsilon))). \end{aligned} \quad (5)$$

Отсюда и из определения формулы Φ^* следует, что для φ_ε справедливы требования условия 3(b), а потому существует изоморфизм

$$\psi : \langle \vec{a}, \vec{x}^0, \vec{x}^1, \vec{z}^0, \vec{z}^1, \vec{d}^0, \vec{d}^1 \rangle \rightarrow \langle \vec{b}, \vec{u}_0^0, \vec{u}_0^1, \vec{v}_0^0, \vec{v}_0^1, \vec{e}_0^0, \vec{e}_0^1 \rangle \quad (6)$$

такой, что $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } \vec{e}_0^0 \cup \text{sp } \vec{e}_0^1 \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } \vec{u}_0^0 \cup \text{sp } \vec{u}_0^1 \cup \text{sp } \vec{v}_0^0 \cup \text{sp } \vec{v}_0^1)$. Отсюда и из условия 2 определения 1.1 вытекает, что

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } \vec{e}_0^\varepsilon \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } \vec{u}_0^\varepsilon \cup \text{sp } \vec{v}_0^\varepsilon). \quad (7)$$

Так как $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models D_{\vec{b}, \langle \vec{u}^0, \vec{v}^0, \vec{e}^0 \rangle}(\vec{b}, \psi \circ \varphi_0^{-1} \langle \vec{u}^0, \vec{v}^0, \vec{e}^0 \rangle)$, существуют $\varphi \in K^0$ и полная формула, истинная на элементах $\langle \vec{b}, \varphi \vec{u}^0, \varphi \vec{v}^0, \varphi \vec{e}^0 \rangle$ и $\langle \vec{b}, \vec{u}_0^0, \vec{v}_0^0, \vec{e}_0^0 \rangle$. Отсюда и из (7) получим

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } \varphi \vec{e}^0 \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } \varphi \vec{u}^0 \cup \text{sp } \varphi \vec{v}^0). \quad (8)$$

Из (8) и (5) имеем

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Psi(\vec{b}, \varkappa(\varphi \vec{u}^0), \tau^0(\varphi \vec{v}^0)).$$

Стало быть,

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Psi(\vec{b}, \varkappa(\vec{u}_0^0), \tau^0(\vec{v}_0^0)). \quad (9)$$

Из (4), (6) следует, что $\psi : \langle \vec{a}, \vec{x}^1, \vec{z}^0, \vec{z}^1, \vec{d}^0, \vec{d}^1 \rangle \rightarrow \langle \vec{b}, (\vec{u}_0^0)_\sigma, \vec{v}_0^0, \vec{v}_0^1, \vec{e}_0^0, \vec{e}_0^1 \rangle$ также изоморфизм. Поэтому аналогично (9)

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Psi(\vec{b}, \varkappa((\vec{u}_0^0)_\sigma), \tau^1(\vec{v}_0^1)). \quad (10)$$

Так как формула Ψ определяет функцию, из (3), (4), (9), (10) получим $\tau^0(\vec{v}_0^0) = \tau^1(\vec{v}_0^1)$. Отсюда согласно (6) вытекает требуемое равенство $\tau^0(\vec{z}^0) = \tau^1(\vec{z}^1)$, т. е. утверждение (1) доказано.

Докажем утверждение 2. Пусть $f(x) = z$. Достаточно доказать, что в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ выполнена формула $\Xi_{\Psi, \Phi, \alpha}(x, z)$. Так как f определяется формулой Φ , справедливо $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models \exists d \Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x, z)$. Пусть $x = \varkappa(\vec{x})$, $z = \tau(\vec{z})$, $d = \rho(\vec{d})$, $\varkappa, \tau, \rho \in HF(\omega)$, $\vec{x}, \vec{z}, \vec{d} \in M^{<\omega}$. Поскольку $\text{sp } \vec{a}$ замкнуто, по условию 3(а) существует вложение $\psi : \text{sp } \vec{a} \cup \text{sp } \vec{x} \cup \text{sp } \vec{z} \cup \text{sp } \vec{d} \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , для которого

$$\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Phi^*(\vec{b}, \varkappa(\psi \vec{x}), \tau(\psi \vec{z}), \rho(\psi \vec{d})). \quad (11)$$

Положим $\vec{u} = \psi \vec{x}$, $\vec{v} = \psi \vec{z}$, $\vec{e} = \psi \vec{d}$. Тогда из (11) следует $g_{\Phi, \alpha}(\varkappa(\vec{u})) = \tau(\vec{v})$, т. е. $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Psi(\vec{b}, \varkappa(\vec{u}), \tau(\vec{v}))$. Пусть множество K и изоморфизм $\varphi \in K$ такие, что $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models I(K, \vec{b}, \langle \vec{u}, \vec{v}, \vec{e} \rangle) \ \& \ \mathfrak{B}(\text{sp } \vec{b}, \text{sp } \varphi \vec{e} \cup \text{sp } \vec{b} \cup \text{sp } \varphi \vec{u} \cup \text{sp } \varphi \vec{v})$. Тогда $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Phi^*(\vec{b}, \varkappa(\varphi \vec{u}), \tau(\varphi \vec{v}), \rho(\varphi \vec{e}))$, поэтому $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \Psi(\vec{b}, \varkappa(\varphi \vec{u}), \tau(\varphi \vec{v}))$, следовательно, в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ истинна формула $\Xi_{\Psi, \Phi, \alpha}(x, z)$. \square

ЗАМЕЧАНИЕ 1.1. Пусть $\Phi_u(x_0, x_1)$ — универсальный Σ -предикат в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$, определенный теоремой 2.6.2 из [3]. Из доказательства этой теоремы вытекает, что для любой Σ -формулы $\Phi(\vec{a}, x)$, $\vec{a} \in M^{<\omega}$, справедлива эквивалентность $\Phi(\vec{a}, x) \equiv \Phi_u(\langle n, \vec{a} \rangle, x)$ для всех значений x в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ при некотором $n \in \omega$.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.2. Поскольку \mathfrak{N} — модель c -простой теории, а следовательно, регулярной теории, из доказательства теоремы 3.5.1 [3] и замечания 1.1 следует, что существует Σ -формула $\Psi_{\mathfrak{N}}(u_0, u_1, u_2)$ сигнатуры σ_1 , определяющая универсальную функцию в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$ и такая, что для любой Σ -функции, заданной Σ -формулой с параметром $\vec{b} \in N^{<\omega}$, формула $\Psi_{\mathfrak{N}}(\langle m, \vec{b} \rangle, u_1, u_2)$ также определяет эту функцию при некотором $m \in \omega$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ. Покажем, что следующая формула определяет универсальную Σ -функцию в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$:

$$\begin{aligned} \Phi_{\mathfrak{M}}(x_0, x_1, x_2) = & \exists s \exists m \exists n \exists \vec{a} \exists \vec{b} \exists \alpha (x_0 = \langle s, m, n, \alpha \rangle \ \& \ s, m, n \in \omega \ \& \ \vec{a} \in M^{<\omega} \\ & \ \& \ \vec{b} \in N^\omega \ \& \ D_{\vec{a}}(\vec{b}) \ \& \ \alpha(\vec{a}) = \vec{b} \ \& \ \Xi_{\Psi_{\mathfrak{N}}(\langle m, \vec{b} \rangle, u_1, u_2), \Phi_s, \alpha}(x_1, x_2) \ \& \ \Phi_u(\langle n, \vec{a} \rangle, x_1)), \end{aligned}$$

где $\Phi_s(\vec{a}, x, z)$ — Σ -формула номера s вида $\exists d\Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x, z)$, $\Psi_{\mathfrak{N}}(u_0, u_1, u_2)$ определена в замечании 1.2, а $\Phi_u(x_0, x_1)$ — в замечании 1.1.

Пусть дана произвольная Σ -функция f , которая в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ определяется Σ -формулой $\Phi(\vec{a}, x_1, x_2) = \exists d\Phi_0^{(d)}(\vec{a}, x_1, x_2)$ с параметром \vec{a} . Не умаляя общности рассуждений, можно считать, что $\text{sp } \vec{a}$ замкнуто. По условию 3 из определения 1.1 существуют \vec{b} и изоморфизм $\alpha : \vec{a} \rightarrow \vec{b}$. По лемме 1.1 формула $\exists e\Phi^*(\vec{b}, u_1, u_2, e)$ определяет Σ -функцию $g_{\Phi, \alpha}$ в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$. По замечанию 1.2 функция $g_{\Phi, \alpha}$ определяется формулой $\Psi_{\mathfrak{N}}(\langle m, \vec{b} \rangle, u_1, u_2)$ в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$ при некотором $m \in \omega$. Пусть формула $\Phi(\vec{a}, x_1, x_2)$ имеет номер s , а число n такое, что $x \in \delta f \Leftrightarrow \mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models \Phi_u(\langle n, \vec{a} \rangle, x)$. Тогда по лемме 1.3 формула $\Phi_{\mathfrak{M}}(\langle s, m, n, \alpha \rangle, x_1, x_2)$ определяет в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ функцию f .

Пусть дана произвольная последовательность $\langle s, m, n, \alpha \rangle$, где $s, m, n \in \omega$, $\alpha : \vec{a} \rightarrow \vec{b}$ — изоморфизм. Формула $\Psi_{\mathfrak{N}}(\langle m, \vec{b} \rangle, u_1, u_2)$ определяет некоторую функцию g в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$. По лемме 1.3 формула $\Phi_{\mathfrak{M}}(\langle s, m, n, \alpha \rangle, x_1, x_2)$ определяет некоторую Σ -функцию в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$. Теорема доказана. \square

Приведем пример модели \mathfrak{M} теории эквивалентности такой, что в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ отсутствует универсальная Σ -функция и в то же время для \mathfrak{M} справедливы все условия определения почти c -простой модели, кроме условия 3(c). В качестве такого примера возьмем модель $\mathfrak{M} = \langle M, Q_0, Q_1 \rangle$, построенную в [4] (см. также [3, с. 149]). Она определена следующими условиями:

- а) Q_0, Q_1 — отношения эквивалентности на M и $Q_1 \subseteq Q_0$;
- б) для любого $[x]_{Q_0}$ эквивалентных $x \in M$ элементов справедлива одна из следующих альтернатив:

[x] $_{Q_0}$ есть объединение бесконечного числа Q_1 -классов эквивалентных элементов, которые состоят точно из двух (трех) элементов;

с) существует бесконечно много попарно не Q_0 -эквивалентных элементов $x \in M$ таких, что $[x]_{Q_0}$ содержит Q_1 -классы точно с двумя элементами; существует бесконечно много попарно не Q_0 -эквивалентных элементов $x \in M$ таких, что $[x]_{Q_0}$ содержит Q_1 -классы точно с тремя элементами.

Пусть \mathfrak{N} — подмодель \mathfrak{M} , которая получена объединением всех Q_0 -классов таких, что они состоят из Q_1 -классов, содержащих точно три элемента.

Тогда справедливо

Предложение 1.1. Для моделей $\mathfrak{N} \leq \mathfrak{M}$ справедливы все условия определения почти c -простой модели, кроме условия 3(c).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО состоит в проверке справедливости условий 1–3(b) определения 1.1 почти c -простой модели.

1. Легко проверить, что Σ -формула

$$N(x) = \exists y_0 \exists y_1 \exists y_2 \left(\bigwedge_{i < 3} (x Q_1 y_i) \ \& \ \bigwedge_{i < j < 3} (y_i \neq y_j) \right)$$

определяет N в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$.

2. Для определения формулы \mathfrak{B} введем предикат $\mathfrak{B}_0(X, Z)$ в модели $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N})$, положив

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_0(X, Z) \Leftrightarrow X \subseteq Z \subseteq N \ \& \ \forall z \in Z \exists x \in X (x Q_1 z) \\ \& \ \forall x \in X \exists z_0 \exists z_1 \exists z_2 \left(\bigwedge_i (z_i \in Z \ \& \ x Q_1 z_i) \ \& \ \bigwedge_{i < j < 3} (z_i \neq z_j) \right). \end{aligned}$$

Искомый предикат $\mathfrak{B}(X, Y)$ в $\mathbb{HF}(\mathfrak{N})$ определим формулой

$$\mathfrak{B}(X, Y) \equiv Y \subseteq N \ \& \ \exists Z(\mathfrak{B}_0(X, Z) \ \& \ Y \cap Z = X),$$

т. е. Y — конечное подмножество N такое, что любой элемент $y \in Y \setminus X$ не Q_1 -эквивалентен любому элементу $x \in X$.

Пусть $X \subseteq M$, $|X| < \omega$. Тогда замыкание $[X]$ определим равенством

$$[X] = \bigcup \{y \mid \exists x \in X(xQ_1y)\}.$$

Легко проверить, что при таких определениях предиката \mathfrak{B} и операции замыкания справедливы условия 1, 2, 3(a), 3(b), но нарушается условие 3(c) определения 1.1 почти c -простой модели. \square

§ 2. Почти ограничено ветвящиеся деревья

Здесь приведено семейство почти c -простых моделей теории деревьев, в наследственно конечных надстройках над которыми существуют универсальные Σ -функции.

Приведем некоторые часто используемые определения и обозначения, связанные с понятием дерева.

Частично упорядоченное множество T называется *деревом*, если для любого $x \in T$ множество всех элементов, меньших x (*предшественников* x в T), вполне упорядоченно и T содержит наименьший элемент r , который называется *корнем*. Для каждой вершины $x \in T$ через $\text{level}_T(x)$ будет обозначаться порядковый тип множества всех предшественников x в T , называемый *уровнем* вершины x в дереве T . *Высота* дерева T определяется следующим образом:

$$ht(T) = \sup_{x \in T} (\text{level}_T(x)) + 1.$$

Если $a, b \in T$ и $a < b$ ($a \neq b$) и между ними нет элементов из T , то b называется *непосредственным последователем* a .

Пусть T — дерево и $a \in T$. Если мощность множества всех непосредственных последователей элемента a , $a \neq r$, равна α , то будем говорить, что a α -ветвится. Если α — конечный кардинал, то будем говорить, что a *конечно ветвится*. Пусть β — некоторый кардинал. Будем говорить, что элемент a *ветвится не более* β , если a α -ветвится и $\alpha \leq \beta$.

Пусть $a \in T \setminus \{r\}$. Поддерево

$$[a]_T = \{y \mid \exists z(z \leq a \ \& \ \text{level}_T(z) = 1) \ \& \ y \geq z\} \cup \{r\} \quad (12)$$

называется *элементарным* поддеревом, содержащим a .

Пусть T — дерево высоты $h + 1$.

Если любой элемент уровня $i < h_0$ элементарного дерева $E \subseteq T$ высоты $h_0 + 1$, $h_0 \leq h$, ветвится не более $N \in \omega$, то будем говорить, что E *ветвится не более* N .

Если существует число $N \in \omega$ такое, что любое элементарное дерево из T ветвится не более N , то T называется *ограниченно ветвящимся деревом*.

Пусть T_0 и T_1 — деревья с корнями r_0 и r_1 соответственно, $T_0 \cap T_1 = \emptyset$. Тогда через $T_0 \cup T_1$ обозначим дерево, полученное объединением $T_0 \setminus \{r_0\}$ и $T_1 \setminus \{r_1\}$ и соотношением $r_0 = r_1 = r$.

Если дерево T_0 изоморфно вложимо в дерево T_1 и $T_0 \not\cong T_1$, то будем говорить, что T_0 *собственно изоморфно вложимо* в T_1 .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Дерево T высоты $h + 1$, $h \in \omega$, назовем *почти ограниченно ветвящимся*, если

$$T = F \cup I, \tag{13}$$

где F — ограниченно ветвящееся дерево, а I — объединение конечного числа элементарных деревьев таких, что в них имеются бесконечно ветвящиеся элементы и любой последователь таких элементов не имеет последователя.

Теорема 2.1. Пусть T — почти ограниченно ветвящееся дерево конечной высоты $h + 1$. Тогда существует его конечное константное обогащение T' такое, что T' — почти c -простая модель.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ предпошлем следующие леммы.

Лемма 2.1. Пусть F — ограниченно ветвящееся дерево высоты $h + 1$. Тогда существуют элементарные деревья E_i , $i < \alpha < \omega$, высоты не более $h + 1$ такие, что

$$F = T_1 \cup T_0, \tag{14}$$

$$T_1 = \bigcup_{i < \alpha} T_{1i}, \tag{15}$$

где T_{1i} — объединение всех элементарных деревьев в F , изоморфных E_i , E_i не вложимо в E_j при $i \neq j$, $i, j < \alpha$, и любое элементарное дерево из T_0 собственно изоморфно вложимо в некоторое E_i .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как F ограниченно ветвится, существует такое число $N \in \omega$, что любое элементарное дерево E из F ветвится не более N . Пусть E_N — элементарное дерево высоты $h + 1$ такое, что любой элемент $x \neq r$ уровня $i < h$ имеет точно N последователей. Пусть мощность $|E_N|$ равна γ . Тогда любое элементарное дерево, ветвящееся не более N , изоморфно вложимо в E_N . Поэтому любое элементарное дерево E из F изоморфно вложимо в E_N . Отсюда следует, что существует конечное число элементарных деревьев $E_0, \dots, E_{\alpha-1}$ таких, что любое элементарное дерево E из F либо изоморфно некоторому E_i , либо собственно вложимо в некоторое E_j , а E_i не вложимо в E_j при $i \neq j < \alpha$. Если обозначить через T_{1i} объединение всех элементарных деревьев из F , изоморфных E_i , а $T_0 = F \setminus \{\cup T_{1i} \mid i < \alpha\} \cup \{r\}$, то получим справедливость (14), (15). \square

Из леммы 2.1 следует, что любое почти ограниченно ветвящееся дерево T высоты $h + 1$, $h \in \omega$, можно представить в виде

$$T = T_0 \cup T_1 \cup T_2,$$

где $T_1 = T_{10} \cup \dots \cup T_{1\alpha-1}$, $\alpha \in \omega$, и существует конечное число элементарных деревьев E_i высоты не более $h + 1$, $ht(E_0) = h + 1$, E_i не вложимо в E_j при $i \neq j$, $i, j < \alpha$, а T_{1j} — объединение конечного или бесконечного числа копий E_i . Если T_{1i} конечно, то все элементы можно включить в сигнатуру модели T . Поэтому будем считать, что все T_{1i} бесконечны; T_0 — объединение всех элементарных деревьев из T , собственно вложимых в некоторое E_i ; $T_2 = T \setminus (T_0 \cup T_1) \cup \{r\}$, т. е. T_2 — объединение конечного числа элементарных деревьев, где имеются бесконечно ветвящиеся элементы, но любой последователь такого элемента не имеет последователя.

В T выделим некоторые элементарные поддеревья: $E_0, \dots, E_{\alpha-1}$, $E_i \subseteq T_{1i}$, и введем множества

$$A = \bigcup_{i < \alpha} E_i, \quad C = \{c \in T_2 \mid c \text{ бесконечно ветвится}\},$$

$$B = \{b \in T_2 \mid b \text{ конечно ветвится } \forall c \in C (\neg c < b)\}.$$

Пусть

$$A = \{r, a_{i0}, \dots, a_{i\lambda_i-1} \mid i < \alpha\}, \quad B = \{b_0, \dots, b_{\beta-1}\}, \quad C = \{r, c_0, \dots, c_{\gamma-1}\},$$

$$\sigma_1 = \langle \leq, r, a_{00}, \dots, a_{0\lambda_0-1}, \dots, a_{\alpha-10}, \dots, a_{\alpha-1\lambda_{\alpha-1}-1} \rangle,$$

$$\sigma_2 = \langle \leq, r, b_0, \dots, b_{\beta-1}, c_0, \dots, c_{\gamma-1} \rangle,$$

$$\mathfrak{M} = \langle T, \sigma \rangle, \quad \mathfrak{N} = \langle T_1 \cup T_2, \sigma \rangle,$$

где $\sigma = \langle \leq, r, \langle a_{ij} \mid i < \alpha, j < \lambda_i \rangle, \langle b_i, c_j \mid i < \beta, j < \gamma \rangle \rangle$,

$$C_{\sigma_1} = A, \quad C_{\sigma_2} = B \cup C, \quad \lambda_i = |E_i| - 1.$$

Покажем, что модели \mathfrak{M} и \mathfrak{N} удовлетворяют условиям определения почти c -простой модели.

Введем следующие предикаты:

- а) $x \in T_2 \Leftrightarrow \mathfrak{M} \models \bigvee \{x = b \mid b \in B\} \vee \bigvee \{x \geq c \mid c \in C\} \vee x = r$,
 б) $x \in T_1 \Leftrightarrow \mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models x = r \vee (x \notin T_2 \ \& \ \exists F \exists y \in F (y > r \ \& \ \forall z \in F (z = r \vee z \geq y)) \ \& \ \exists i < \alpha \exists \varphi (\varphi : E_i \rightarrow F \text{ — изоморфизм}) \ \& \ x \in F)$.

Отсюда следует, что T_1, T_2 — Σ -подмножества в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ т. е. носитель модели \mathfrak{N} — Σ -подмножество в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$.

Лемма 2.2. Теория модели $T_1 = \langle T_1, \sigma_1 \rangle$ разрешима и счетно категорична.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Введем следующие аксиомы, истинные в T_1 .

1. Аксиомы дерева.
2. Высота любого элемента не более $h + 1$, т. е.

$$\forall x_0 \dots \forall x_h (r \leq x_0 \leq \dots \leq x_h \rightarrow \exists i \leq h \exists j \leq h (x_i = r \vee (i \neq j \ \& \ x_i = x_j))).$$

$3_{i < \alpha}$. Диаграмма элементарного дерева $E_i = \{r, \{a_{ij} \mid j < \lambda_i\}\}$, где $r < a_{i0} \leq a_{ij}$ для любого $j < \lambda_i$, и высота E_i равна $h_i + 1$, $h = h_0 \geq h_i$, $0 < i < \alpha$.

Пусть $\lambda = \max\{\lambda_i \mid i < \alpha\} + 1$.

$4_{k \leq \lambda}$. Любое подмножество $S \subseteq T_1$, имеющее наименьший элемент, отличный от r , мощности k изоморфно вложимо в некоторое E_i , т. е.

$$\forall x_0 \dots \forall x_{k-1} \left(\bigwedge_{1 \leq s < k} x_s \geq x_0 > r \rightarrow \bigvee_{i < \alpha} \exists \varphi_i (\varphi_i : \{x_0, \dots, x_{k-1}\} \rightarrow E_i \text{ — изоморфное вложение}) \right).$$

$5_{k \leq \lambda}$. Любое подмножество T_1 , имеющее наименьший элемент, отличный от r , содержится в некотором подмножестве мощности не более λ , имеющем наименьший элемент, отличный от r , в которое вложимо некоторое E_i , т. е.

$$\forall x_0 \dots \forall x_{k-1} \left(\bigwedge_{1 \leq i < k} x_i \geq x_0 > r \rightarrow \left(\bigvee_{i < \alpha} \exists y_{i0} \dots \exists y_{i\lambda_i-1} \left(\bigwedge_{j < \lambda_i} (y_{ij} \geq y_{j0} > r) \ \& \ x_0 \geq y_{i0} \ \& \ \forall p < k \exists j < \lambda_i (x_p = y_{ij}) \ \& \ \exists \varphi_i (\varphi_i : E_i \rightarrow \{r, y_{i0}, \dots, y_{i\lambda_i-1}\} \text{ — изоморфизм}) \right) \right) \right).$$

$\delta_{i < \alpha, n < \omega}$. Существует n элементарных деревьев, изоморфных E_i , с корнем r .

Докажем, что любое счетное дерево D , на котором истинны аксиомы 1–6 изоморфно T_1 . Сначала покажем, что любое элементарное дерево $D_0 \subseteq D$ изоморфно некоторому E_k , $k < \alpha$. По аксиоме 2 высота D_0 не более $h + 1$. Докажем, что $|D_0| < \lambda$. Допустим противное, т. е. $|D_0| \geq \lambda$, $\lambda = \max\{\lambda_i \mid i < \alpha\} + 1$, $\lambda_i = |E_i| - 1$. Пусть $X \subseteq D_0$, $X = \{x_0, \dots, x_{\lambda-1}\}$, $x_k \geq x_0 > r$. Тогда по аксиоме 4 λ существует вложение $\varphi : X \rightarrow E_i$ для некоторого i . Так как $|E_i| = \lambda_i < \lambda$, то $|X| \leq \lambda_i < \lambda$. Таким образом, $|D_0| < \lambda$. Поэтому существует вложение

$$\varphi : D_0 \rightarrow E_k, \quad k < \alpha. \quad (16)$$

В силу максимальности элементарного дерева D_0 и аксиомы 5 существуют $s < \alpha$ и вложение

$$\psi : E_s \rightarrow D_0. \quad (17)$$

Отсюда и из (16) получим вложимость E_s в E_k . Если $s \neq k$, то это невозможно, т. е. $s = k$. Отсюда и из (16), (17) следует $D_0 \simeq E_k$, т. е. любое элементарное дерево D_0 в D изоморфно некоторому E_k .

По аксиоме 6 в D содержится счетное число копий элементарного дерева E_i для любого $i < \alpha$. Следовательно, $D \simeq T_1$, т. е. теория $\text{Th}(T_1)$ счетно категорична, поэтому полна. Отсюда и из вычислимо перечислимой аксиоматизируемости теории $\text{Th}(T_1)$ получим ее разрешимость. \square

Следствие 2.1. Теория модели $\mathfrak{M} = \langle T_1 \cup T_2, \sigma \rangle$ разрешима и счетно категорична.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Добавим к аксиомам 1–6 теории $\text{Th}(T_1)$ следующие.

7. Для любого элемента $x \neq r$ найдутся либо подмножество $S \subseteq \mathfrak{M}$, имеющее наименьший элемент $x_0 > r$, и число $i < \alpha$ такие, что $x \in S$, $|S| \leq \lambda_i$ и существует изоморфное вложение $\varphi : E_i \rightarrow S$, либо $x = b_k$, либо $x \geq c_l$, $k < \beta$, $l < \gamma$.

$\delta_{k < \gamma, n < \omega}$. Элемент c_k имеет n непосредственных последователей.

9. $OD(C_{\sigma_2})$ — открытая диаграмма модели $\langle C_{\sigma_2}, \leq, r \rangle$.

$10_{k < \gamma}$. Если $x > c_k$, то x не имеет последователя.

Используя лемму 2.2, легко проверить, что аксиомы 1–10 определяют счетно категоричную теорию и $\mathfrak{M} = \langle T_1 \cup T_2, \sigma \rangle$ является ее счетной моделью. \square

Для описания полных формул теории $\text{Th}(\mathfrak{M})$ приведем некоторые свойства теории $\text{Th}(T_1)$. Пусть $x \in (T_1 \setminus A)$ и $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_{m-1} \rangle$, $\text{sp } \vec{x} = [x]_{T_1}$.

Через $D_{\vec{x}}(\vec{x})$ обозначим диаграмму модели $X = \langle A \cup [x]_{T_1}, \sigma_1 \rangle$, т. е. конъюнкцию формул либо вида $y_i \leq y_j$, либо вида $\neg(y_i \leq y_j)$, $y_i \in A \cup [x]_{T_1}$, истинных на модели X . Легко проверить, что справедлива

Лемма 2.3. Пусть $\vec{x}^\varepsilon \in [c^\varepsilon]_{T_1}^{<\omega}$, $\vec{x}^\varepsilon = \langle x_0^\varepsilon, \dots, x_{m-1}^\varepsilon \rangle$, $\varepsilon < 2$, и

$$T_1 \models D_{\vec{x}^0}(\vec{x}^0) \ \& \ D_{\vec{x}^1}(\vec{x}^1).$$

Тогда существует автоморфизм φ модели $\langle T_1, \sigma_1 \rangle$ такой, что $\varphi(\vec{x}^0) = \vec{x}^1$, $\varphi(\vec{x}^1) = \vec{x}^0$.

Для любой последовательности $\vec{x} \in T_2^{<\omega}$ обозначим через $E_{\vec{x}}(\vec{x})$ открытую диаграмму модели $\text{sp } \vec{x} \cup C_{\sigma_2}$ сигнатуры σ_2 . Легко проверить, что справедлива

Лемма 2.4. Пусть $\vec{x}^\varepsilon \in \mathfrak{N}^{<\omega}$, $\vec{x}^\varepsilon = \langle x_0^\varepsilon, \dots, x_{r-1}^\varepsilon \rangle$, $\varepsilon < 2$, и

$$\mathfrak{N} \models E_{\vec{x}^0}(\vec{x}^0) \ \& \ E_{\vec{x}^1}(\vec{x}^1).$$

Тогда $\vec{x}^0, \vec{x}^1 \in T_2^{<\omega}$ и любой изоморфизм $\varphi : T_1 \rightarrow T_1$ можно продолжить до такого изоморфизма $\psi : \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{N}$, что справедливо

$$\psi x = \begin{cases} x_i^1, & \text{если } x = x_i^0, \\ x_i^0, & \text{если } x = x_i^1, \\ x, & \text{если } x \in T_2 \setminus (\text{sp } \vec{x}^0 \cup \text{sp } \vec{x}^1), \\ \varphi x, & \text{если } x \in T_1. \end{cases}$$

Пусть дана последовательность $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle \in \mathfrak{N}^{<\omega}$, для которой существуют число $e < n$ и множество последовательностей $S = \{ \langle k_{i,0}, \dots, k_{i,l_i-1} \rangle \mid i < e, l_i > 0, \sum l_i = n, \{k_{i,j} \mid i < e, j < l_i\} = \{0, \dots, n-1\} \}$ такие, что для подпоследовательностей $\vec{x}_i = \langle x_{k_{i,0}}, \dots, x_{k_{i,l_i-1}} \rangle$, $i < e$, справедливы условия

а) если $i \leq j < e-1$, то $\text{sp } \vec{x}_i = \text{sp } \vec{x}_j = [a_i]_{T_1}$, $a_i \in T_1 \setminus \{r\}$ тогда и только тогда, когда $i = j$;

б) $\vec{x}_{e-1} \in T_2^{<\omega}$.

Введем формулу

$$\Phi_{n,S}(\vec{x}) = \bigwedge_{i < e-1} D_{\vec{x}_i}(\vec{x}_i) \ \& \ E_{\vec{x}_{e-1}}(\vec{x}_{e-1}). \quad (18)$$

Из лемм 2.3 и 2.4 вытекает

Следствие 2.2. Пусть для последовательностей $\vec{x}^\varepsilon = \langle x_0^\varepsilon, \dots, x_{n-1}^\varepsilon \rangle \in \mathfrak{N}^{<\omega}$, $\varepsilon < 2$, справедливо

$$\mathfrak{N} \models \Phi_{n,S^0}(\vec{x}^0) \ \& \ \Phi_{n,S^0}(\vec{x}^1),$$

где формула Φ_{n,S^0} определена по последовательности \vec{x}^0 так же, как в (18). Тогда существует изоморфизм $\varphi : \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{N}$ такой, что $\varphi(\vec{x}^0) = \vec{x}^1$.

Следствие 2.3. Любая полная формула $\Phi(\vec{x}_1)$, $\vec{x}_1 = \langle x_0, \dots, x_{k-1} \rangle$, совместная с теорией $\text{Th}(\mathfrak{N})$, эквивалентна некоторой формуле вида

$$\exists x_k \dots \exists x_{n-1} \Phi_{n,S}(x_0, \dots, x_{n-1}) \Leftrightarrow \Phi_{n,S}^0(\vec{x}_1).$$

Доказательство. Докажем, что $\Phi_{n,S}^0(\vec{x}_1)$ — полная формула. Пусть существуют формула $\Psi(\vec{x}_1)$ сигнатуры σ и последовательности \vec{a}_1, \vec{b}_1 такие, что

$$\mathfrak{N} \models \Phi_{n,S}(\vec{a}, \vec{a}_1) \ \& \ \Psi(\vec{a}), \quad (19)$$

$$\mathfrak{N} \models \Phi_{n,S}(\vec{b}, \vec{b}_1) \ \& \ \neg \Psi(\vec{b}). \quad (20)$$

Тогда существует изоморфизм $\varphi : \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{N}$ такой, что $\varphi \vec{a} = \vec{b}$, $\varphi \vec{a}_1 = \vec{b}_1$. Отсюда и из (19) имеем

$$\mathfrak{N} \models \Phi_{n,S}(\vec{b}, \vec{b}_1) \ \& \ \Psi(\vec{b}),$$

что противоречит (20). \square

Пусть F_k — множество всех полных формул вида $\Phi_{n,S}^0(x_0, \dots, x_{k-1})$. Легко проверить, что из определений модели \mathfrak{N} и формулы $\Phi_{n,S}^0$ вытекает, что последовательность $\langle F_k \mid n \in \omega \rangle$ сильно вычислима. Отсюда и из следствия 2.3 получаем

Следствие 2.4. Существует сильно вычислимая последовательность $F = \langle F_k \mid k \in \omega \rangle$ конечных множеств всех полных формул от переменных x_0, \dots, x_{k-1} , совместных с теорией $\text{Th}(\mathfrak{N})$.

Лемма 2.5. Теория $\text{Th}(\mathfrak{N})$ модельно полна.

Доказательство. Согласно критерию А. Робинсона [19] для доказательства леммы достаточно проверить справедливость следующего предложения. Если $\mathfrak{N}^0 \subseteq \mathfrak{N}^1$ — две модели теории $\text{Th}(\mathfrak{N})$ и $A \subseteq \mathfrak{N}^1$ — конечное подмножество, то существует изоморфное вложение $\varphi : A \rightarrow \mathfrak{N}^0$ такое, что $\varphi \upharpoonright A \cap \mathfrak{N}^0 = \text{id}$.

Пусть $N^\varepsilon = \langle T_1^\varepsilon \cup T_2^\varepsilon, \sigma \rangle$, где $T_1^\varepsilon \subseteq T_1$, $T_2^\varepsilon \subseteq T_2$. Так как $\mathfrak{N}^0 \subseteq \mathfrak{N}^1$, то $T_1^0 \subseteq T_1^1$, $T_2^0 \subseteq T_2^1$. Пусть $B^\varepsilon = T_1^\varepsilon \cap A$. Тогда $B^0 \subseteq B^1$ и $B^1 = B^0 \cup E$ для некоторого $E \subseteq T_1^1 \setminus T_1^0$. Не умаляя общности рассуждения, можно считать, что $E = [e_0]_{T_1^1} \cup \dots \cup [e_{m-1}]_{T_1^1}$, $[e_s]_{T_1^1} \simeq E_{k_s}$ для некоторого $s < m$, $k_s < \alpha$. Так как в T_1^0 имеется счетное число копий элементарного дерева E_{k_s} , в T_1^0 существует поддерево $F = [f_0]_{T_1^0} \cup \dots \cup [f_{m-1}]_{T_1^0}$ такое, что $F \cap B^0 = \{r\}$. Отсюда легко следует, что существует изоморфизм $\varphi_0 : B^1 \rightarrow B^0 \cup F$, где $\varphi_0 \upharpoonright B^0 = \text{id}$.

Пусть теперь $G = T_2^1 \cap A$ и $G_k = \{x > c_k \mid x \in G, k < \gamma\}$. Тогда любой элемент $x \in G$ равен либо r , либо b_i , $i < \beta$, либо c_i , либо $x \in G_k$, $k < \gamma$. Пусть $G_k^0 = G_k \cap T_2^0$. Тогда $|G_k^0| \leq |G_k|$. Так как множества $D_k^0 = \{x > c_k \mid x \in T_2^0\}$ бесконечны, существуют изоморфные вложения $\psi_k : G_k \rightarrow D_k^0$, где $\psi_k \upharpoonright G_k^0 = \text{id}$, $k < \gamma$, которые однозначно определяют изоморфное вложение $\varphi_1 : G \rightarrow T_2^0$, $\varphi_1 \upharpoonright G \cap T_2^0 = \text{id}$.

Легко проверить, что изоморфные вложения φ_0 и φ_1 однозначно определяют требуемое вложение $\varphi : A \rightarrow \mathfrak{N}^0$, $\varphi \upharpoonright A \cap \mathfrak{N}^0 = \text{id}$. \square

Из следствий 2.1, 2.4 и леммы 2.5 следует, что \mathfrak{N} — модель c -простой теории, т. е. справедливо условие 1 определения 1.1 почти c -простой модели.

2. Определим предикат $\mathfrak{B}(x, y)$ эквивалентностью

$$\begin{aligned} \text{HF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(x, y) \Leftrightarrow x, y \subseteq T_1 \cup T_2 \ \& \ y \supseteq C_\sigma \cup x \\ \& \ y \cap \left(\bigcup \{[z]_{T_1} \mid z \in x \cap T_1\} \right) \subseteq x. \end{aligned} \quad (21)$$

Так как справедливы следующие эквивалентности:

$$\begin{aligned} F = [z]_{T_1} \Leftrightarrow \text{HF}(T_1) \models \exists y (r < y \ \& \ z \geq y \ \& \ \forall z \in F ((z = r \vee z \geq y) \\ \& \ \exists \varphi \exists i < \alpha (\varphi : E_i \rightarrow F - \text{вложение})), \end{aligned}$$

$$x \in [z]_{T_1} \Leftrightarrow \text{HF}(T_1) \models \exists F (F = [z]_{T_1} \ \& \ x \in F),$$

$$x \notin [z]_{T_1} \Leftrightarrow \text{HF}(T_1) \models \exists F (F = [z]_{T_1} \ \& \ x \notin F),$$

отношение $x \in [z]_{T_1}$ является двуместным Δ -предикатом.

Подмножества C_σ, T_1, T_2 также являются Δ -подмножествами в $\text{HF}(\mathfrak{N})$. Отсюда и из (21) следует, что отношение \mathfrak{B} является Σ -предикатом.

Так как справедлива

$$\begin{aligned} \text{HF}(\mathfrak{N}) \models \neg \mathfrak{B}(x, y) \Leftrightarrow \text{HF}(\mathfrak{N}) \models \exists c \in C_\sigma (c \notin y) \vee x \not\subseteq y \\ \vee \exists z \in (x \cap T_1) \setminus \{r\} \exists F \exists u (F = [z]_{T_1} \ \& \ u \in y \cap F \ \& \ u \notin x), \end{aligned}$$

\mathfrak{B} является Δ -предикатом в $\text{HF}(\mathfrak{N})$.

Легко проверить, что для предиката \mathfrak{B} справедлива формула из условия 2 определения 1.1 почти c -простой модели. Таким образом, справедливость условия 2 для модели \mathfrak{N} доказана.

3. Пусть X — конечное подмножество \mathfrak{M} . Тогда замыкание $[X]$ определим равенством

$$[X] = C_\sigma \cup \left(\bigcup \{[x]_T \mid x \in X \cap (T_0 \cup T_1)\} \right) \cup (X \cap T_2).$$

Легко заметить, что $[X]$ конечно. Если $X = [X]$, то X называется *замкнутым подмножеством* в \mathfrak{M} .

Для любого подмножества $X \subseteq \mathfrak{M}$ обозначим

$$L_1(X) = \{z_x \mid x \in X \cap (T_0 \cup T_1), z_x \leq x, \text{level}(z_x) = 1\},$$

$$X^i = \{x \in X \mid x > c_i\}, i < \gamma.$$

Для доказательства справедливости условия 3 для \mathfrak{M} нам потребуются следующие леммы.

Лемма 2.6. Пусть даны конечные подмножества $X, Y \subseteq \mathfrak{M}$. Тогда существует вложение $\varphi : [X] \rightarrow \mathfrak{N}$ такое, что $\varphi[X] \cap Y \subseteq C_\sigma$.

Доказательство. Пусть $L_1(X) = \{x_0, \dots, x_{k-1}\}$. Так как для любого $s < \alpha$ число элементарных деревьев, изоморфных E_s , бесконечно много, существуют различные элементы z_0, \dots, z_{k-1} уровня 1 в T_1 , не содержащие элементов из $L_1(Y)$, такие, что существуют изоморфные вложения $\varphi_i : [x_i]_T \rightarrow [z_i]_{T_1}$.

Поскольку c_k бесконечно ветвится, существует изоморфное вложение $\psi_k : X^k \rightarrow T^k \setminus Y^k$. Тогда изоморфное вложение $\varphi : [A] \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее φ_i и ψ_k , будет требуемым. \square

Подмножества X^0 и X^1 модели \mathfrak{M} назовем *несравнимыми*, если для любых элементов $x^0 \in X^0 \setminus C_\sigma$ и $x^1 \in X^1 \setminus C_\sigma$ верно $x^0 \not\leq x^1$ и $x^1 \not\leq x^0$.

Лемма 2.7. Пусть даны конечные подмодели $M^0 \leq M^1 \leq \mathfrak{M}$ такие, что M^0 и $M^1 \setminus M^0$ несравнимы. Тогда для любого вложения $\varphi : M^0 \rightarrow \mathfrak{M}(\mathfrak{N})$ существует вложение $\psi : M^1 \rightarrow \mathfrak{M}(\mathfrak{N})$, продолжающее φ . Кроме того, для вложений φ, ψ в \mathfrak{N} справедливо $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\varphi M^0, \psi M^1)$.

Доказательство. Из леммы 2.6 следует, что существует изоморфизм $\varphi^0 : [M^1] \rightarrow \mathfrak{M}$ такой, что $\varphi^0[M^1] \cap [\varphi M^0] = C_\sigma$. Пусть $\varphi^1 \cong \varphi^0 \upharpoonright M^1 \setminus M^0$. Так как M^0 и $M^1 \setminus M^0$ несравнимы, вложение $\psi : M^1 \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее φ и φ^1 , будет требуемым. \square

Продолжим доказательство справедливости условия 3. Для любого $X \subseteq \mathfrak{M}$ существование вложения $\alpha : X \rightarrow \mathfrak{N}$ непосредственно следует из леммы 2.6 при условии $Y = C_\sigma$. Пусть $\alpha : X \rightarrow Y$ — изоморфизм, где $X \leq \mathfrak{M}$, $Y \leq \mathfrak{N}$.

3(a). Допустим, что множество X замкнуто и $X^1 \supseteq X$. Из замкнутости X следует, что множества X и $X^1 \setminus X$ несравнимы. По лемме 2.7 существует вложение $\psi : X^1 \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , для которого $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(Y, \psi X^1)$.

3(b). Пусть $\varphi^\varepsilon : X^\varepsilon \rightarrow \mathfrak{N}$ — изоморфизм, $\varepsilon < 2$, $X \leq X^\varepsilon \leq \mathfrak{M}$ и

$$\varphi^\varepsilon \upharpoonright X = \alpha, \quad \mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(Y, \varphi^\varepsilon X^\varepsilon). \quad (22)$$

Из (22) следует, что множества X и $(X^0 \cup X^1) \setminus X$ несравнимы. Действительно, допустим противное, т. е. существуют $e \in (X^0 \cup X^1) \setminus X$ и $f \in X \setminus C_\sigma$ такие, что либо $e \leq f$, либо $f \leq e$. Пусть для определенности $e \in X^0$. Тогда $\varphi^0 e \in \cup\{[z]_{T_1} \mid z \in Y \cap T_1\}$, но $\varphi^0 e \notin Y$. Следовательно, $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \neg \mathfrak{B}(Y, \varphi^0 X^0)$, что противоречит (22). Отсюда множества X и $(X^0 \cup X^1) \setminus X$ несравнимы. Тогда по лемме 2.7 существует вложение $\psi : X^0 \cup X^1 \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , для которого справедливо $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(Y, \psi(X^0 \cup X^1))$.

3(c). Пусть $Y^1 \supseteq Y$ и $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M}) \models \mathfrak{B}(Y, Y^1)$.

Докажем, что существует вложение $\psi : Y^1 \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее α^{-1} . Так же, как в доказательстве условия 3(b), можно показать, что множества $Y^1 \setminus Y$ и Y несравнимы. Тогда по лемме 2.7 существует вложение $\psi : Y^1 \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее α^{-1} .

Таким образом, условие 3 справедливо для \mathfrak{M} , т. е. \mathfrak{M} — почти c -простая модель. \square

Из теорем 2.1 и 1.1 вытекает

Следствие 2.5. Пусть T — почти ограниченно ветвящееся дерево. Тогда в наследственно конечном допустимом множестве $\mathbb{H}\mathbb{F}(T)$ существует универсальная Σ -функция.

§ 3. Эквивалентности

В данном параграфе приведено семейство почти c -простых моделей теории эквивалентности, в наследственно конечных надстройках над которыми существуют универсальные функции.

Пусть даны модель $\mathfrak{M} = \langle M, E_0, E_1, \dots, E_n \rangle$, где E_i — отношения эквивалентности на множестве M , и последовательность чисел $\langle \pi_1, \dots, \pi_n \rangle$, $\pi_k > 1$, $0 < k \leq n$, такие, что справедливы следующие утверждения.

1. $x E_0 y \Leftrightarrow x = y$.
2. $E_0 \subseteq E_1 \subseteq \dots \subseteq E_n$.
3. Каждый E_k -класс состоит не более чем из π_k E_{k-1} -классов, $0 < k \leq n$.
4. Существует бесконечно много E_n -классов таких, что каждый его E_k -класс состоит точно из π_k E_{k-1} -классов для любого k , $0 < k \leq n$.

Теорема 3.1. Модель \mathfrak{M} почти c -проста.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть основным множеством \mathfrak{M} является объединением всех E_n -классов таких, что каждый его E_k -класс состоит точно из π_k E_{k-1} -классов для любого k , $0 < k \leq n$. Докажем справедливость условий 1–3 определения 1.1 почти c -простой модели.

1. Легко проверить, что формула

$$N(x) \Leftrightarrow \exists x_0 \dots \exists x_{\bar{\pi}-1} \left(\bigwedge_{i \leq j < \bar{\pi}} E_n(x_i, x_j) \ \& \ \bigwedge_{i < j < \bar{\pi}} (x_i \neq x_j) \ \& \ \bigvee_{i < \bar{\pi}_k} (x = x_i) \right),$$

где $\bar{\pi} = \pi_0 \dots \pi_n$, определяет основное множество N модели \mathfrak{M} в $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$.

Для доказательства c -простоты теории модели \mathfrak{M} докажем следующие леммы.

Лемма 3.1. Теория $\text{Th}(\mathfrak{M})$ модели \mathfrak{M} разрешима, счетно категорична и модельно полна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Аксиомами теории $\text{Th}(\mathfrak{M})$ будут следующие предложения.

1. $1_{k \leq n}$. E_k — отношение эквивалентности.
2. $\forall x \forall y (x E_0 y \rightarrow x = y)$.
3. $\exists_{0 < k \leq n}$. Любой E_k -класс состоит точно из π_k E_{k-1} классов.
4. $k < \omega$. $\exists x_0 \dots \exists x_{k-1} (\&\neg x_i E_n x_j)$.

Легко проверить, что эти аксиомы определяют счетную модель \mathfrak{M} с точности до изоморфизма, т. е. теория $\text{Th}(\mathfrak{M})$ счетно категорична. Отсюда и из

вычислимо перечислимой аксиоматизируемости теории $\text{Th}(\mathfrak{N})$ следует, что она разрешима.

Докажем модельную полноту теории $\text{Th}(\mathfrak{N})$. Для этого, как и в лемме 2.4, воспользуемся приведенным там критерием А. Робинсона. Пусть даны две модели $\mathfrak{N}^0 \leq \mathfrak{N}^1$ теории $\text{Th}(\mathfrak{N})$ и $A \subseteq N^1$. Пусть $A_\varepsilon = A \cap N^\varepsilon$, $A_1 = A_0 \cup B$, где $B = A_1 \setminus A_0$. Не умаляя общности рассуждения, можно считать, что B состоит из m E_n -классов. Так как в \mathfrak{N}^0 существует бесконечно много E_n -классов, в \mathfrak{N}^0 найдутся E_n -классы C_0, \dots, C_{m-1} такие, что $C \cap A_0 = \emptyset$, где $C = C_0 \cup \dots \cup C_{m-1}$. Легко проверить, что существует изоморфное вложение $\varphi : A_1 \rightarrow \mathfrak{N}^0$ такое, что $\varphi B = C$, $\varphi \upharpoonright A_0 = \text{id}$. \square

Пусть даны $m \in \omega$ и последовательность $\Xi = \langle S_0, \dots, S_{n-1} \rangle$ семейств непустых подмножеств множества $\bar{m} = \{0, \dots, m-1\}$ таких, что для любого $k < n$ выполнены

$$S_0 = \left\{ A_{i_0} \mid i_0 < \alpha_0, \bigsqcup \{ A_{i_0} \mid i_0 < \alpha_0 \} = \bar{m}, |A_{i_0}| \leq \pi_n \right\},$$

$$S_{k+1} = \left\{ A_{i_0, \dots, i_{k+1}} \mid i_0 < \alpha_0, \dots, i_{k+1} < \alpha_{k+1}, \right. \\ \left. \bigsqcup \{ A_{i_0, \dots, i_{k+1}} \mid i_{k+1} < \alpha_{k+1} \} = A_{i_0, \dots, i_k}, |A_{i_0, \dots, i_{k+1}}| \leq \pi_{n-(k+1)} \right\},$$

где символ \sqcup означает объединение попарно не пересекающихся множеств.

Пусть дана последовательность $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_{m-1} \rangle$ переменных x_i . По любому семейству Ξ определим формулу $\Phi_\Xi(\vec{x})$ сигнатуры $\sigma = \langle E_0, \dots, E_n \rangle$, положив

$$\Phi_\Xi(\vec{x}) = \bigwedge \{ E_{n-k}(x_r, x_s) \mid r, s \in A_{i_0, \dots, i_k}, i_0 < \alpha_0, \dots, i_k < \alpha_k, k < n \} \\ \& \bigwedge \{ \neg E_{n-k}(x_r, x_s) \mid r \in A_{i_0, \dots, i_k^r}, s \in A_{i_0, \dots, i_k^s}, \\ i_0 < \alpha_0, \dots, i_k^r < i_k^s < \alpha_k, k < n \}.$$

Лемма 3.2. Пусть для последовательностей $\vec{x}^\varepsilon = \langle x_0^\varepsilon, \dots, x_{m-1}^\varepsilon \rangle \in \mathfrak{N}^{<\omega}$, $\varepsilon < 2$, справедливо

$$\mathfrak{N} \models \Phi_\Xi(\vec{x}^0) \& \Phi_\Xi(\vec{x}^1). \quad (23)$$

Тогда существует изоморфизм $\psi : \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{N}$ такой, что $\psi(\vec{x}^0) = \vec{x}^1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что отображение $x_r^0 \rightarrow x_r^1$, $r < m$, есть изоморфизм $\varphi : \langle \text{sp } \vec{x}^0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{sp } \vec{x}^1, \sigma \rangle$, где $\sigma = \langle E_0, \dots, E_n \rangle$. Пусть

$$\mathfrak{N} \models E_{n-k}(x_r^0, x_s^0), \quad k \leq n.$$

Тогда в силу (23) найдутся $i_0 < \alpha_0, \dots, i_k < \alpha_k$ такие, что $r, s \in A_{i_0, \dots, i_k}$, а потому $\mathfrak{N} \models E_{n-k}(x_r^1, x_s^1)$.

Если $\mathfrak{N} \models \neg E_{n-k}(x_r^0, x_s^0)$, то снова из (23) следует $r, s \notin A_{i_0, \dots, i_k}$ для любых i_0, \dots, i_k , а потому $\mathfrak{N} \models \neg E_{n-k}(x_r^1, x_s^1)$. Таким образом, φ — требуемый изоморфизм.

Пусть $[x_r^\varepsilon]_{E_k}$ обозначает E_k -класс, содержащий x_r^ε , $r < m$, $k \leq n$, и $X_k^\varepsilon = \bigcup_{r < m} [x_r^\varepsilon]_{E_k} = [x_{r_0}^\varepsilon]_{E_k} \sqcup \dots \sqcup [x_{r_k}^\varepsilon]_{E_k}$.

Индукцией по k докажем, что φ можно продолжить до изоморфизма $\varphi_k : X_k^0 \rightarrow X_k^1$. Если $k = 0$, то $\varphi_0 = \varphi$. Пусть изоморфизм φ_k определен. Класс $[x_{r_s}^\varepsilon]_{E_{k+1}}$, $s < k$, является дизъюнктивным объединением классов $[y_i^\varepsilon]_{E_k}$, $i <$

π_{k+1} . Тогда существует изоморфизм $\varphi_{k+1,s} : [x_{rs}^0]_{E_{k+1}} \rightarrow [x_{rs}^1]_{E_{k+1}}$ такой, что $\varphi_{k+1,s}(y_i^0) = y_i^1$ и $\varphi_{k+1,s}$ продолжает φ_k . Множество изоморфизмов $\varphi_{k+1,s}$, $s < r_k$, однозначно определяет изоморфизм $\varphi_{k+1} : X_{k+1}^0 \rightarrow X_{k+1}^1$. Из определения модели \mathfrak{M} легко следует, что φ_n можно продолжить до требуемого изоморфизма $\psi : \mathfrak{N} \rightarrow \mathfrak{N}$. \square

Из этой леммы аналогично следствиям 2.3 и 2.4 выводятся

Следствие 3.1. Любая полная формула $\Phi(\vec{x})$, $\vec{x} = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle$, совместная с теорией $\text{Th}(\mathfrak{M})$, эквивалентна некоторой формуле вида $\Phi_{\Xi}(\vec{x})$ из леммы 3.2.

Следствие 3.2. Существует сильно вычислимая последовательность $F = \langle F_n \mid n \in \omega \rangle$ конечных множеств всех полных формул от переменных x_0, \dots, x_{n-1} , совместных с теорией $\text{Th}(\mathfrak{M})$.

Из леммы 3.1 и следствия 3.2 следует, что \mathfrak{M} — модель c -простой теории, т. е. условие 1 определения 1.1 почти c -простой модели справедливо.

2. Определим предикат $\mathfrak{B}(x, y)$ эквивалентностью

$$\text{HF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(x, y) \Leftrightarrow x, y \subseteq N \ \& \ y \cap (\cup\{[z]_{E_n} \mid z \in x\}) \subseteq x.$$

Так как $x \in [y]_{E_n}$ — Δ -отношение в $\text{HF}(\mathfrak{N})$, то \mathfrak{B} — Δ -предикат. Легко проверить, что для предиката \mathfrak{B} справедлива формула из условия 2 определения 1.1 почти c -простой модели.

Пусть A — конечное подмножество M . Тогда замыкание $[A]$ определим равенством $[A] = \cup\{[a]_{E_n} \mid a \in A\}$.

Для любого конечного подмножества $X \subseteq M$ введем множество $X^* = \{x_0, \dots, x_{l-1}\}$ такое, что $x_i \in X$, $\neg x_i E_n x_j$, $i < j < n$, $[X] = \cup_{i < l} [x_i]_{E_n}$.

Пусть $A^* = \{a_0, \dots, a_{l-1}\}$ и C_0, \dots, C_{l-1} — различные E_n -классы в \mathfrak{N} . Легко заметить, что существует вложение $\alpha : [A] \rightarrow \bigcup_{i < l} C_i$.

В дальнейшем нам потребуется

Лемма 3.3. Пусть даны конечные подмодели $A^0 \leq A^1 \leq \mathfrak{M}$ такие, что $[A^0] \cap (A^1 \setminus A^0) = \emptyset$. Тогда для любого вложения $\varphi : A^0 \rightarrow \mathfrak{M}(\mathfrak{N})$ существует вложение $\psi : A^1 \rightarrow \mathfrak{M}(\mathfrak{N})$, продолжающее φ . Кроме того, для вложений φ, ψ в \mathfrak{N} справедливо $\text{HF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\varphi A^0, \psi A^1)$.

Действительно, пусть $(A^1 \setminus A^0)^* = \{a_0, \dots, a_{l-1}\}$ и C_0, \dots, C_{l-1} — различные E_n -классы из \mathfrak{N} такие, что $B \cap \bigcup_{i < l} C_i = \emptyset$, где $\varphi A^0 = B$.

Легко заметить, что существует вложение $\psi : A^1 \rightarrow B \cup \bigcup_{i < l} C_i$, продолжающее φ , для которого справедливо $\text{HF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(\varphi A^0, \psi A^1)$. \square

Пусть $\alpha : A \rightarrow B$ — изоморфизм, где $A \leq \mathfrak{M}$, $B \leq \mathfrak{N}$.

3(a). Допустим, что множество A замкнуто и $A^1 \supseteq A$. Из замкнутости A следует, что $[A^0] \cap (A^1 \setminus A^0) = \emptyset$. По лемме 3.3 существует вложение $\psi : A^1 \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , для которого $\text{HF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, \psi A^1)$.

3(b). Пусть даны $\varphi^\varepsilon : A^\varepsilon \rightarrow \mathfrak{N}$, $\varepsilon < 2$, — изоморфизм, $A \leq A^\varepsilon \leq \mathfrak{M}$ и

$$\varphi^\varepsilon \upharpoonright A = \alpha, \quad \text{HF}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, \varphi^\varepsilon A^\varepsilon). \quad (24)$$

Из (24) следует, что $[A] \cap ((A^0 \cup A^1) \setminus A) = \emptyset$. Действительно, допустим противное, т. е. существует $e \in [A] \cap ((A^0 \cup A^1) \setminus A)$. Пусть для определенности $e \in A^0$. Тогда $\varphi^0 e \in \cup\{[z]_{E_n} \mid z \in B\}$, но $\varphi^0 e \notin B$. Следовательно, $\text{HF}(\mathfrak{N}) \models$

$\neg \mathfrak{B}(B, \varphi^0 A^0)$; противоречие. Тогда по лемме 3.3 существует вложение $\psi : A^0 \cup A^1 \rightarrow \mathfrak{N}$, продолжающее α , для которого $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, \psi(A^0 \cup A^1))$.

3(c). Пусть $B^1 \supseteq B$ и $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{N}) \models \mathfrak{B}(B, B^1)$.

Докажем, что существует вложение $\psi : B^1 \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее α^{-1} . Так же, как в доказательстве условия 3(b), можно показать, что $[B] \cap (B^1 \setminus B) = \emptyset$. Тогда по лемме 3.3 существует вложение $\psi : B^1 \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее α^{-1} .

Таким образом, \mathfrak{M} — почти s -простая модель. Теорема доказана. \square

Из теорем 3.1 и 1.1 вытекает

Следствие 3.3. *В наследственно конечном допустимом множестве $\mathbb{H}\mathbb{F}(\mathfrak{M})$ существует универсальная Σ -функция.*

В заключение автор выражает сердечную благодарность С. С. Гончарову за постановку задачи и полезные советы, а также рецензенту за замечания, которые помогли улучшить изложение работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гончаров С. С., Свириденко Д. И. Математические основы семантического программирования // Докл. АН СССР. 1986. Т. 289, № 6. С. 1324–1328.
2. Ershov Yu. L., Goncharov S. S., Sviridenko D. I. Semantic programming. Information processing // Proc. IFIP 10th World comput. congress, Dublin. Dublin: Elsevier Sci., 1986. P. 1093–1100.
3. Ершов Ю. Л. Определимость и вычислимость. Изд. 2-е. Новосибирск: Науч. книга; М.: Экономика. (Сибирская школа алгебры и логики), 2000.
4. Руднев В. А. Об универсальной рекурсивной функции на допустимых множествах // Алгебра и логика. 1986. Т. 25, № 4. С. 425–436.
5. Морозов А. С., Пузаренко В. Г. О Σ -подмножествах натуральных чисел // Алгебра и логика. 2004. Т. 43, № 3. С. 291–320.
6. Калимулин И. Ш., Пузаренко В. Г. О вычислимости на структурах // Мат. тр. 2004. Т. 7, № 2. С. 35–72.
7. Пузаренко В. Г. К вычислимости на специальных моделях // Сиб. мат. журн. 2005. Т. 46, № 1. С. 185–208.
8. Александрова С. А. Проблема униформизации для Σ -предикатов в наследственно конечной списочной надстройке над полем действительных чисел с экспонентой // Алгебра и логика. 2014. Т. 53, № 1. С. 3–14.
9. Коровина М. В. Об универсальной рекурсивной функции и абстрактных машинах на вещественных числах со списочной надстройкой. Структурные алгоритмические свойства вычислимости // Вычисл. системы. Новосибирск, 1996. С. 24–43.
10. Стукачев А. И. Теорема об униформизации в наследственно конечных надстройках, Обобщенная вычислимость и определимость // Вычисл. системы. Новосибирск, 1998. С. 3–14.
11. Хисамиев А. Н. О Σ -подмножествах натуральных чисел над абелевыми группами // Сиб. мат. журн. 2006. Т. 47, № 3. С. 695–706.
12. Хисамиев А. Н. Σ -ограниченные алгебраические системы и универсальные функции. I // Сиб. мат. журн. 2010. Т. 51, № 1. С. 217–235.
13. Хисамиев А. Н. Σ -ограниченные алгебраические системы и универсальные функции. II // Сиб. мат. журн. 2010. Т. 51, № 3. С. 676–693.
14. Хисамиев А. Н. Σ -однородные алгебраические системы и Σ -функции. I // Алгебра и логика. 2011. Т. 50, № 5. С. 659–684.
15. Хисамиев А. Н. Σ -однородные алгебраические системы и Σ -функции. II // Алгебра и логика. 2012. Т. 51, № 1. С. 129–147.
16. Хисамиев А. Н. Об универсальной Σ -функции над деревом // Сиб. мат. журн. 2012. Т. 53, № 3. С. 687–690.
17. Ershov Yu. L., Puzarenko V. G., Stukachev A. I. $\mathbb{H}\mathbb{F}$ -computability // Computability in context. Computation and logic in the real world (ed. S. B. Cooper and A. Sorbi). London: World Sci., 2011. P. 169–242.

-
18. Когабаев Н. Т., Кудинов О. В., Миллер Р. Вычислимая размерность I -деревьев бесконечной высоты // Алгебра и логика. 2004. Т. 43, № 6. С. 702–729.
 19. Кейслер Г., Чэн Ч. Ч. Теория моделей. М.: Мир, 1977.

Статья поступила 27 мая 2013 г., окончательный вариант — 18 сентября 2014 г.

Хисамиев Асылхан Назифович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
hisamiev@math.nsc.ru