

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ ПРОБЛЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ ЯКОБИ НА РИМАНОВОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ С КРАЕМ, ЕГО  
ОБОБЩЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Э. И. Зверович, О. Б. Долгополова,  
Е. А. Крушевский

**Аннотация.** На конечной римановой поверхности рода  $h \geq 1$  с краем, состоящим из  $m+1$  связных компонент, рассматривается система из  $m+h$  вещественных сравнений, аналогичная классической проблеме обращения Якоби. Дается решение этой системы, а также приложения этого решения к краевым задачам.

DOI 10.17377/smzh.2016.57.207

**Ключевые слова:** риманова поверхность, проблема обращения Якоби, абелевы дифференциалы, задача сопряжения (Римана), задача Гильберта, тэта-функция Римана, дубль, аналог ядра Коши.

§ 1. Предварительные сведения

Пусть  $\mathcal{M} = \mathcal{M}^\circ \sqcup \partial\mathcal{M}$  — конечная ориентируемая (двусторонняя) риманова поверхность рода  $h \geq 1$  с краем  $\partial\mathcal{M} = \mathfrak{b}_0 \sqcup \mathfrak{b}_1 \cdots \sqcup \mathfrak{b}_m$ , состоящим из  $m+1$  связных компонент  $\mathfrak{b}_\nu$ , каждая из которых гомеоморфна окружности. Краю  $\partial\mathcal{M}$  припишем стандартную ориентацию, т. е. такую, что если точка движется вдоль  $\partial\mathcal{M}$  согласно этой ориентации, то при этом выбранная сторона поверхности остается слева. На рис. 1 показана пространственная модель одной из простейших поверхностей такого типа ( $m = h = 1$ ). Выберем на поверхности  $\mathcal{M}$  удобную для дальнейшего систему локальных координат (униформизацию).




Рис. 1. Поверхность  $\mathcal{M}$   
при  $m = h = 1$ .

С этой целью проведем и зафиксируем на  $\mathcal{M}$  простые достаточно гладкие замкнутые не гомологичные нулю, а также кривым  $\mathfrak{b}_0, \mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_m$  и друг другу замкнутые кривые  $\mathfrak{b}_{m+1}, \dots, \mathfrak{b}_{m+h}$ . Произвольно зафиксировав на них ориентацию, разрежем по ним поверхность  $\mathcal{M}$  и будем различать берега разрезов:  $\mathfrak{b}_\nu^+$  (левый) и  $\mathfrak{b}_\nu^-$  (правый). Разрезанная поверхность подобна однолистным

и  $(2h + m + 1)$ -связна. Возьмем функцию  $z = f(p)$ , реализующую конформный гомеоморфизм разрезанной поверхности на  $(2h + m + 1)$ -связную область с достаточно гладким краем, лежащую в верхней полуплоскости  $\text{Im } z \geq 0$ . Потребуем, чтобы при этом гомеоморфизме образом кривой  $\mathfrak{b}_0$  была вещественная ось  $\text{Im } z = 0$ . В результате в плоскости переменного  $z$  получим картину, которая при  $m = h = 1$  изображена на рис. 2. Область плоскости  $z$ , заштрихованную на

рис. 2, будем использовать в качестве основной системы локальных координат римановой поверхности  $\mathfrak{M}$ . В связи с этим для образов кривых

$$\mathfrak{b}_0, \mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_m, \mathfrak{b}_{m+1}^\pm, \dots, \mathfrak{b}_{m+h}^\pm \quad (1)$$

в плоскости переменного  $z$  будем использовать те же обозначения, что и на самой поверхности  $\mathfrak{M}$ . Пары кривых  $\mathfrak{b}_{m+\nu}$  и  $\mathfrak{b}_{m+\nu}^{-1}$ , лежащие в полуплоскости  $\text{Im } z > 0$  и рассматриваемые как различные кривые, связаны гомеоморфизмом

$$\alpha : \mathfrak{b}_{m+\nu} \rightarrow \mathfrak{b}_{m+\nu}^{-1},$$

полученным исключением точки  $p \in \mathfrak{b}_{m+\nu} \subset \mathfrak{M}$  из уравнений

$$t = f^+(p), \quad \alpha(t) = f^-(p).$$

Обозначив обратный гомеоморфизм  $\alpha^{-1} : \mathfrak{b}_{m+\nu}^{-1} \rightarrow \mathfrak{b}_{m+\nu}$  снова через  $\alpha$ , получим, что для любого  $t \in \mathfrak{b}_{m+\nu} \sqcup \mathfrak{b}_{m+\nu}^{-1}$  выполняется «тождество Карлемана»  $\alpha(\alpha(t)) \equiv t$ . Приписав краю области, изображенной на рис. 2, стандартную ориентацию (оставляющую область слева), заключаем, что гомеоморфизм  $\alpha(t)$  изменяет ориентацию. Соединим вещественную ось  $\mathfrak{b}_0$  с линиями  $\mathfrak{b}_\nu$  ( $\nu = 1, \dots, m$ ) попарно не пересекающимися гладкими разомкнутыми кривыми  $\mathfrak{a}_\nu$ , причем кривая  $\mathfrak{a}_\nu$  начинается в точке  $t_{0\nu} \in \mathfrak{b}_0$  и оканчивается в точке  $t_\nu \in \mathfrak{b}_\nu$ . Соединим каждую кривую  $\mathfrak{b}_{m+\nu}^+$  с кривой  $\mathfrak{b}_{m+\nu}^-$  ( $\nu = 1, \dots, h$ ) гладкой (замкнутой) кривой  $\mathfrak{a}_{m+\nu}$ , причем кривая  $\mathfrak{a}_{m+\nu}$  начинается в точке  $t_{m+\nu} \in \mathfrak{b}_{m+\nu}^-$  и оканчивается в эквивалентной точке  $\alpha(t_{m+\nu}) \in \mathfrak{b}_{m+\nu}^+$ . Эти кривые также считаем попарно не пересекающимися. Построенные таким образом ориентированные линии вместе с ориентированными линиями (1) образуют *каноническое рассечение римановой поверхности  $\mathfrak{M}$* , и будем считать его зафиксированным (рис. 3).




Рис. 2. Образ разрезанной поверхности  $\mathfrak{M}$  на плоскости переменного  $z$  при  $m = h = 1$ .




Рис. 3. Каноническое рассечение поверхности  $\mathfrak{M}$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** *Абелевыми дифференциалами 1-го рода на  $\mathfrak{M}$*  будем называть всюду конечные дифференциалы  $dw(z)$ , аналитические на  $\mathfrak{M}^\circ$  и чисто мнимые<sup>1)</sup> на  $\partial\mathfrak{M}$ .

Будем рассматривать соответствующие абелевы интегралы 1-го рода

$$w(z) = \int_{\infty}^z dw(t) \quad (2)$$

с фиксированным нижним пределом (в данном случае точкой  $\infty$ ), а штрих перед интегралом означает, что путь интегрирования лежит в  $\mathfrak{M}^\circ$  и не пересекает линий канонического рассечения (тогда интеграл не зависит от пути).

<sup>1)</sup> Дифференциал  $dw$  называется *чисто мнимым на  $\partial\mathfrak{M}$* , если чисто мнимыми являются все интегралы  $\int_l dw$ , где  $l \subseteq \partial\mathfrak{M}$ .

**Лемма 1.** *Линейное пространство  $\mathfrak{L}$  абелевых дифференциалов 1-го рода на  $\mathfrak{M}$  имеет размерность  $m + 2h$  над полем  $\mathbb{R}$ .*

**Доказательство.** Будем исходить из того, что классическая задача Дирихле о нахождении гармонической функции по заданным на краю непрерывным краевым условиям безусловно и однозначно разрешима. Возьмем решения следующих задач Дирихле (гармонические меры кривых  $\mathfrak{b}_\nu$ ):

$$\Delta\omega_\nu(z) = 0, \quad z \in \mathfrak{M}^\circ, \quad \omega_\nu(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t \in \mathfrak{b}_\nu, \\ 0 & \text{при } t \in \partial\mathfrak{M} \setminus \mathfrak{b}_\nu, \end{cases} \quad \nu = 1, 2, \dots, m. \quad (3)$$

Пусть  $\tilde{\omega}_\nu(z)$  — функция, гармонически сопряженная к  $\omega_\nu(z)$ . Тогда  $w_\nu(z) = \omega_\nu(z) + i\tilde{\omega}_\nu(z)$  — абелев интеграл, дифференциал которого

$$dw_\nu(z) = d\omega_\nu(z) + i d\tilde{\omega}_\nu(z)$$

аналитичен на  $\mathfrak{M}^\circ$  и чисто мнимый на  $\partial\mathfrak{M}$ . Значит,  $dw_1(z), \dots, dw_m(z)$  — абелевы дифференциалы 1-го рода на  $\mathfrak{M}$ . Они, очевидно, линейно независимы, но базиса не образуют, так как  $h \geq 1$ .




Рис. 4. Каноническое рассечение поверхности  $\mathfrak{R}$ .

Для нахождения остальных элементов этого базиса возьмем дубль [1, гл. 2, § 1]  $\mathfrak{R} := \mathfrak{M} \cup \tilde{\mathfrak{M}}$  римановой поверхности  $\mathfrak{M}$  и продолжим на него построенное выше каноническое рассечение. Дубль  $\mathfrak{R}$  — замкнутая риманова поверхность рода  $\rho = m + 2h$ . Она симметрична, а инволютивное отображение  $\sim: \mathfrak{M} \rightarrow \tilde{\mathfrak{M}}$  есть отображение симметрии. Используя построенную выше униформизацию римановой поверхности  $\mathfrak{M}$  (см. рис. 2) и беря отображение комплексного сопряжения в качестве отображения симметрии  $\sim$ , построим униформизацию римановой поверхности  $\mathfrak{R}$  (рис. 4). При такой интерпретации на поверхности  $\mathfrak{R}$  оказываются склеенными:

- каждая точка  $t \in \mathfrak{b}_\nu$  с точкой  $\bar{t} \in \bar{\mathfrak{b}}_\nu$  при  $\nu = 1, \dots, m$ ;
- каждая точка  $t \in \mathfrak{b}_\nu$  с точкой  $\alpha(t) \in \alpha(\mathfrak{b}_\nu)$  при  $\nu = m + 1, \dots, m + h$ ;
- каждая точка  $t \in \mathfrak{b}_\nu$  с точкой  $\alpha(t) \in \alpha(\mathfrak{b}_\nu)$  при  $\nu = m + h + 1, \dots, \rho$ .

Каноническое рассечение поверхности  $\mathfrak{M}$  продолжим до канонического рассечения поверхности  $\mathfrak{R}$

$$a_1, a_2, \dots, a_\rho, \quad b_1, b_2, \dots, b_\rho \quad (4)$$

следующим образом:

$$\begin{aligned} a_\nu &:= \mathfrak{a}_\nu \cup \bar{\mathfrak{a}}_\nu^{-1}, \quad \nu = 1, \dots, m, \\ a_\nu &:= \mathfrak{a}_\nu, \quad \nu = m + 1, \dots, m + h, \\ a_\nu &:= \bar{\mathfrak{a}}_{\nu-h}^{-1}, \quad \nu = m + h + 1, \dots, m + 2h = \rho, \\ b_\nu^+ &:= \mathfrak{b}_\nu, \quad b_\nu^- := \bar{\mathfrak{b}}_\nu^{-1}, \quad \nu = 1, \dots, m, \\ b_\nu^+ &:= \mathfrak{b}_\nu, \quad b_\nu^- := \alpha(\mathfrak{b}_\nu), \quad \nu = m + 1, \dots, m + h, \\ b_\nu &:= \bar{\mathfrak{b}}_{\nu-h}^{-1}, \quad \nu = m + h + 1, \dots, m + 2h = \rho. \end{aligned} \quad (5)$$

Каноническое рассечение (4), определенное формулами (5), переходит само на себя с изменением ориентации при отображении симметрии  $z \mapsto \bar{z}$ . Дифференциалы  $dw_1(z), \dots, dw_m(z)$  по принципу симметрии аналитически продолжаются до абелевых дифференциалов 1-го рода на  $\mathfrak{R}$ . Таким образом,  $\mathfrak{L} \subset L$ , где  $L$  — линейное пространство абелевых дифференциалов 1-го рода на  $\mathfrak{R}$ . Как известно [2, гл. 10, п. 10], пространство  $L$  имеет размерность  $\rho$  над полем  $\mathbb{C}$ , и у него существует единственный базис

$$d\zeta_1(z), d\zeta_2(z), \dots, d\zeta_\rho(z), \tag{6}$$

$a$ -периоды которого образуют единичную матрицу. Более того, периоды этого базиса удовлетворяют следующим условиям нормировки:

$$\int_{a_\mu} d\zeta_\nu(z) = \delta_{\mu\nu}, \quad \int_{b_\mu} d\zeta_\nu(z) = \Omega_{\mu\nu}, \quad \mu, \nu = 1, \dots, \rho, \tag{7}$$

где  $\delta_{\mu\nu}$  — символ Кронекера, матрица  $(\Omega_{\mu\nu})_{\mu, \nu=1}^\rho$  симметрична, а ее мнимая часть положительно определена. Рассмотрим следующие дифференциалы:

$$-d\overline{\zeta_1(\bar{z})}, -d\overline{\zeta_2(\bar{z})}, \dots, -d\overline{\zeta_\rho(\bar{z})}. \tag{8}$$

Так как отображение симметрии  $z \mapsto \bar{z}$  является конформным гомеоморфизмом 2-го рода поверхности  $\mathfrak{R}$  на себя, дифференциалы (8) всюду на  $\mathfrak{R}$  аналитические и к тому же линейно независимые. Значит, (8) — базис пространства  $L$ , притом комплексно нормированный, поскольку

$$\begin{aligned} \int_{a_\nu} (-d\overline{\zeta_\mu(\bar{z})}) &= - \int_{\overline{a_\nu}} d\overline{\zeta_\mu(z)} = - \int_{\overline{a_\nu^{-1}}} d\zeta_\mu(z) = \delta_{\mu\nu} \quad \text{при } \nu = 1, \dots, m, \\ \int_{a_\nu} (-d\overline{\zeta_\mu(\bar{z})}) &= - \int_{\overline{a_{\nu+h}}} d\overline{\zeta_\mu(z)} = - \int_{\overline{a_{\nu+h}^{-1}}} d\zeta_\mu(z) = \delta_{\mu, \nu+h} \quad \text{при } \nu = m+1, \dots, m+h, \\ \int_{a_\nu} (-d\overline{\zeta_\mu(\bar{z})}) &= - \int_{\overline{a_{\nu-h}}} d\overline{\zeta_\mu(z)} = - \int_{\overline{a_{\nu-h}^{-1}}} d\zeta_\mu(z) = \delta_{\mu, \nu-h} \quad \text{при } \nu = m+h+1, \dots, \rho. \end{aligned}$$

Сравнивая это с первым равенством (7), видим, что  $a$ -периоды базиса (6) и базиса (8) (при надлежащем упорядочении) совпадают. Отсюда в силу единственности нормированного базиса следует совпадение этих базисов, а именно  $d\zeta_\mu(z) \equiv -d\overline{\zeta_\mu(\bar{z})}$  при  $\mu = 1, \dots, m$  и  $d\zeta_\mu(z) \equiv -d\overline{\zeta_{h+\mu}(\bar{z})}$  при  $\mu = m+1, \dots, m+h$ . Значит, общий вид абелева дифференциала 1-го рода на  $\mathfrak{R}$  таков:

$$d\zeta(z) = \sum_{\nu=1}^m A_\nu d\zeta_\nu(z) + \sum_{\nu=m+1}^{m+h} B_\nu d\zeta_\nu(z) - \sum_{\nu=m+1}^{m+h} C_\nu d\overline{\zeta_\nu(\bar{z})}, \tag{9}$$

где  $A_\nu, B_\nu, C_\nu \in \mathbb{C}$  — произвольные постоянные. Заменяя в (9)  $z$  на  $\bar{z}$ , переходя к комплексно сопряженным значениям и меняя знаки, представим общий абелев дифференциал 1-го рода в виде

$$-d\overline{\zeta(\bar{z})} = \sum_{\nu=1}^m \overline{A_\nu} d\zeta_\nu(z) - \sum_{\nu=m+1}^{m+h} \overline{B_\nu} d\overline{\zeta_\nu(\bar{z})} + \sum_{\nu=m+1}^{m+h} \overline{C_\nu} d\zeta_\nu(z). \tag{10}$$

Условие  $d\zeta(z) \equiv -\overline{d\zeta(\bar{z})}$  выражает тот факт, что дифференциал  $d\zeta(z)$  принимает на  $\partial\mathfrak{M}$  чисто мнимые значения, т. е. является дифференциалом на  $\mathfrak{M}$ . Приравняв правые части равенств (9) и (10), получим  $A_\nu = \overline{A_\nu}$ ,  $C_\nu = \overline{B_\nu}$ . Таким образом, общий вид абелевых дифференциалов 1-го рода на  $\mathfrak{M}$  таков:

$$d\zeta(z) = \sum_{\nu=1}^m A_\nu d\zeta_\nu(z) + \sum_{\nu=m+1}^{m+h} (B_\nu d\zeta_\nu(z) - \overline{B_\nu} \overline{d\zeta_\nu(\bar{z})}), \quad (11)$$

где  $A_\nu \in \mathbb{R}$ ,  $B_\nu \in \mathbb{C}$  — произвольные постоянные. Лемма доказана.

Нас интересуют дифференциалы 1-го рода на  $\mathfrak{M}$ , не все отличные от нуля  $a$ -периоды которых чисто мнимые. Чтобы найти размерность и базис этого пространства, положим в (11)

$$A_\nu = 2\alpha_\nu, \quad B_\nu = \beta_\nu + i\gamma_\nu,$$

где  $\alpha_\nu, \beta_\nu, \gamma_\nu \in \mathbb{R}$  — произвольные постоянные. Тогда равенство (11) переписывается в следующем виде:

$$d\zeta(z) = 2 \sum_{\nu=1}^m \alpha_\nu d\zeta_\nu(z) + \sum_{\nu=m+1}^{m+h} \beta_\nu (d\zeta_\nu(z) - \overline{d\zeta_\nu(\bar{z})}) + \sum_{\nu=m+1}^{m+h} i\gamma_\nu (d\zeta_\nu(z) + \overline{d\zeta_\nu(\bar{z})}).$$

В правой части этого равенства только последняя сумма обладает тем свойством, что все ее ненулевые  $a$ -периоды чисто мнимые. Отбрасывая ее, получим общий вид интересующих нас дифференциалов. Таким образом, доказана

**Лемма 2.** *Линейное пространство  $\mathfrak{N}$  абелевых дифференциалов 1-го рода на  $\mathfrak{M}$ , не все ненулевые  $a$ -периоды которых чисто мнимые, имеет размерность  $m+h$  над полем  $\mathbb{R}$ .*

Построим базис  $dw_1(z), \dots, dw_{m+h}(z)$  пространства  $\mathfrak{N}$ , при  $\text{Im } z \geq 0$  полагая

$$\begin{aligned} dw_\mu(z) &:= d\zeta_\mu(z) - \overline{d\zeta_\mu(\bar{z})} \equiv 2d\zeta_\mu(z), \quad \mu = 1, \dots, m; \\ dw_\mu(z) &:= d\zeta_\mu(z) - \overline{d\zeta_\mu(\bar{z})}, \quad \mu = m+1, \dots, m+h. \end{aligned} \quad (12)$$

Исследуем свойства нормированности этого базиса по отношению к каноническому рассечению  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{m+h}, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{m+h}$  поверхности  $\mathfrak{M}$ .

**Лемма 3.** *Имеют место равенства*

$$\text{Re} \int_{\mathbf{a}_\nu} dw_\mu(z) = \delta_{\mu\nu}, \quad \mu, \nu = 1, 2, \dots, m+h,$$

где  $\delta_{\mu\nu}$  — символ Кронекера.

**Доказательство.** При  $\mu = 1, \dots, m, \nu = 1, \dots, m+h$  имеем (см. рис. 3)

$$\text{Re} \int_{\mathbf{a}_\nu} dw_\mu(z) = 2 \text{Re} \int_{\mathbf{a}_\nu} d\zeta_\mu(z) = 2 \text{Re} \zeta_\mu(z)|_{t_{0\nu}}^{t_\nu} = 2 \text{Re} \zeta_\mu(t_\nu) = 2 \cdot \frac{\delta_{\mu\nu}}{2} = \delta_{\mu\nu},$$

поскольку дифференциал  $d\zeta_\mu(z)$  чисто мнимый на  $\partial\mathfrak{M}$ .

При  $\mu = m+1, \dots, m+h, \nu = 1, \dots, m+h$  получим

$$\text{Re} \int_{\mathbf{a}_\nu} dw_\mu(z) = \text{Re} \left( \int_{\mathbf{a}_\nu} d\zeta_\mu(z) - \int_{\mathbf{a}_\nu} \overline{d\zeta_\mu(\bar{z})} \right) = \delta_{\mu\nu} + \text{Re} \int_{\mathbf{a}_\nu} d\zeta_{\mu+h}(z) = \delta_{\mu\nu},$$

так как  $\mu+h > \nu$ , и потому последний интеграл равен нулю. Лемма доказана.

Введем обозначение

$$\int_{\mathbf{b}_\nu} dw_\mu(z) =: A_{\nu\mu} + iB_{\nu\mu}, \quad \text{где } A_{\nu\mu}, B_{\nu\mu} \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

**Лемма 4.** Матрица  $\mathbf{B} := (B_{\mu\nu})_{\mu,\nu=1}^{m+h}$  симметрична и положительно определена.

Доказательство. Обозначим через  $\widehat{\mathfrak{M}} = \widehat{\mathfrak{M}}^\circ \sqcup \partial\widehat{\mathfrak{M}}$  поверхность  $\mathfrak{M}$ , разрезанную линиями канонического рассечения. Ее край  $\partial\widehat{\mathfrak{M}}$  можно представить в виде следующей композиции (последовательного объединения) кривых:

$$\partial\widehat{\mathfrak{M}} = \mathfrak{b}_0 \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_1^{-1} \dots \mathfrak{a}_m \mathfrak{b}_m \mathfrak{a}_m^{-1} \mathfrak{a}_{m+1} \mathfrak{b}_{m+1} \mathfrak{a}_{m+1}^{-1} \mathfrak{b}_{m+1}^{-1} \dots \mathfrak{a}_{m+h} \mathfrak{b}_{m+h} \mathfrak{a}_{m+h}^{-1} \mathfrak{b}_{m+h}^{-1},$$

где «показатель степени»  $(-1)$  означает изменение ориентации. Абелевы дифференциалы и интегралы 1-го рода аналитичны на  $\widehat{\mathfrak{M}}^\circ$  и непрерывно продолжимы на край. Построенные в лемме 2 базисные интегралы удовлетворяют следующим краевым условиям:

$$w_\mu(t) = \delta_{\mu\nu} + iB_{\mu\nu} \text{ при } t \in \mathfrak{b}_\nu, \quad B_{\mu\nu} \in \mathbb{R}, \quad \mu, \nu = 1, \dots, m;$$

$$w_\mu(t^+) - w_\mu(t^-) = \delta_{\mu\nu} \text{ при } t \in \mathfrak{b}_\nu, \quad \mu, \nu = m+1, \dots, m+h;$$

$$w_\mu(t^+) - w_\mu(t^-) = -A_{\mu\nu} - iB_{\mu\nu} \text{ при } t \in \mathfrak{a}_\nu, \quad \mu, \nu = m+1, \dots, m+h.$$

В силу интегральной теоремы Коши имеем  $\int_{\partial\widehat{\mathfrak{M}}} w_\mu(t) dw_\nu(t) = 0$ . Выделив в этом равенстве мнимую часть, преобразуем его:

$$\begin{aligned} 0 &= \operatorname{Im} \int_{\partial\widehat{\mathfrak{M}}} w_\mu(t) dw_\nu(t) = \operatorname{Im} \left( \int_{\mathfrak{b}_0} w_\mu(x) dw_\nu(x) + \sum_{k=1}^m \left( \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) dw_\nu(t) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \int_{\mathfrak{b}_k} w_\mu(t) dw_\nu(t) - \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^-) dw_\nu(t) \right) + \sum_{k=m+1}^{m+h} \left( \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) dw_\nu(t) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \int_{\mathfrak{b}_k} w_\mu(t^+) dw_\nu(t) - \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^-) dw_\nu(t) - \int_{\mathfrak{b}_k} w_\mu(t^-) dw_\nu(t) \right) \right) \\ &= \operatorname{Im} \left( \sum_{k=1}^m \left( -iB_{k\mu} \int_{\mathfrak{a}_k} dw_\nu(t) + \delta_{k\mu} \int_{\mathfrak{b}_k} dw_\nu(t) \right) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=m+1}^{m+h} \left( -iB_{k\mu} \int_{\mathfrak{a}_k} dw_\nu(t) + \delta_{k\mu} \int_{\mathfrak{b}_k} dw_\nu(t) \right) \right) \\ &= \operatorname{Im} \sum_{k=1}^{m+h} (-iB_{k\mu} \delta_{k\nu} + i\delta_{k\mu} B_{k\nu}) = -B_{\nu\mu} + B_{\mu\nu}, \end{aligned}$$

что и означает симметричность матрицы  $\mathbf{B} = (B_{\mu\nu})_{\mu,\nu=1}^{m+h}$ .

Для доказательства положительной определенности этой матрицы обозначим

$$w(z) = u(z) + iv(z) = \sum_{k=1}^{m+h} \xi_k w_k(z) = \sum_{k=1}^{m+h} \xi_k (u_k(z) + iv_k(z)), \quad (14)$$

где  $\xi_k \in \mathbb{R}$ . Положим  $z = x + iy$  и на основании формулы Грина — Стокса будем иметь

$$\int_{\partial\widehat{\mathfrak{M}}} v(z) \cdot du(z) = \iint_{\widehat{\mathfrak{M}}} d(u(z) \cdot dv(z)) = \iint_{\widehat{\mathfrak{M}}} du(z) \wedge dv(z)$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{\widehat{\mathfrak{M}}} \left( \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \wedge \left( \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) \\
&= \iint_{\widehat{\mathfrak{M}}} \left( \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \wedge \left( \frac{\partial v}{\partial y} dx - \frac{\partial v}{\partial x} dy \right) \\
&= - \iint_{\widehat{\mathfrak{M}}} \left( \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 \right) dx \wedge dy < 0,
\end{aligned}$$

поскольку подынтегральная функция положительна. Подставляя в это неравенство выражение из (14), имеем

$$\begin{aligned}
0 &> \int_{\partial \widehat{\mathfrak{M}}} v(z) \cdot du(z) = \sum_{k,j=1}^{m+h} \xi_k \xi_j \int_{\partial \widehat{\mathfrak{M}}} v_k(z) \cdot du_j(z) \\
&= \sum_{k,j=1}^{m+h} \xi_k \xi_j \left( \sum_{\mu=1}^m \left( \int_{a_\mu} v_k(t^+) du_j(t) + \int_{b_\mu} v_k(t) du_j(t) - \int_{a_\mu} v_k(t^-) du_j(t) \right) \right. \\
&+ \left. \sum_{\mu=m+1}^{m+h} \left( \int_{a_\mu} v_k(t^+) du_j(t) + \int_{b_\mu} v_k(t^+) du_j(t) - \int_{a_\mu} v_k(t^-) du_j(t) - \int_{b_\mu} v_k(t^-) du_j(t) \right) \right) \\
&= \sum_{k,j=1}^{m+h} \xi_k \xi_j \left( - \sum_{\mu=1}^m B_{k\mu} \int_{a_\mu} du_j(t) - \sum_{\mu=m+1}^{m+h} B_{k\mu} \int_{a_\mu} du_j(t) \right) = - \sum_{k,j=1}^{m+h} B_{kj} \xi_k \xi_j.
\end{aligned}$$

Таким образом,  $\sum_{k,j=1}^{m+h} B_{kj} \xi_k \xi_j > 0$ , и лемма доказана.

## § 2. Вещественный аналог проблемы обращения Якоби

Так принято называть следующую систему сравнений:

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} w_\mu(z_\nu) \equiv e_\mu - k_\mu \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}), \quad \mu = 1, 2, \dots, m+h, \quad (15)$$

где неизвестными являются точки  $z_1, z_2, \dots, z_{m+h} \in \mathfrak{M}$ , а правые части равенств (15) и нормированные интегралы 1-го рода  $w_\mu(z)$  считаются известными. Константы

$$k_\mu = -\frac{1}{2} B_{\mu\mu} - \sum_{\substack{k=1, \\ k \neq \mu}}^{m+h} \operatorname{Im} \int_{a_k} w_\mu(t^+) dw_k(t), \quad \mu = 1, 2, \dots, m+h, \quad (16)$$

также считаются известными и вводятся для удобства выкладок.

В случае  $h = 0$  система (15) решена в [3, 4]. При  $h \geq 1$  неудачная попытка решить ее содержится в [5].

Удобно записать систему (15) в виде одного векторного сравнения. С этой целью вводим в рассмотрение следующие  $(m+h)$ -мерные векторы-столбцы:

$$\mathbf{w}(z) = \begin{pmatrix} w_1(z) \\ w_2(z) \\ \vdots \\ w_{m+h}(z) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_{m+h} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m+h}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_{m+h} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m+h}. \quad (17)$$

В этих обозначениях система (15) записывается в виде одного векторного сравнения:

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} \mathbf{w}(z_\nu) \equiv \mathbf{e} - \mathbf{k} \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}). \quad (18)$$

Для доказательства существования решений этого сравнения сопоставим ему следующую однородную краевую задачу на римановой поверхности  $\mathfrak{M}$ . Найти все функции  $F(z) \not\equiv 0$ , кусочно аналитические на  $\mathfrak{M}$  с линиями разрыва  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_{m+h}$ , по следующим краевым условиям:

$$\begin{aligned} F(t^+) &= F(t^-) \exp(-\pi B_{\nu\nu} + 2\pi i(w_\nu(t^-) - ie_\nu)), \quad t \in \mathfrak{a}_\nu, \quad \nu = 1, 2, \dots, m+h, \\ \operatorname{Im} F(t) &= 0, \quad t \in \partial\mathfrak{M}. \end{aligned} \quad (19)$$

Желая изучить картину разрешимости этой задачи, сведем ее к задаче линейного сопряжения на дубле [1, гл. 2, § 2]  $\mathfrak{R} = \mathfrak{M} \cup \widetilde{\mathfrak{M}}$  (см. рис. 4). Этот дубль — замкнутая симметричная риманова поверхность, род которой равен  $\rho = m + 2h$ . Введем новую неизвестную функцию, кусочно аналитическую на дубле:

$$\Phi(z) = \begin{cases} F(z), & z \in \mathfrak{M}, \\ \overline{F(\bar{z})}, & z \in \widetilde{\mathfrak{M}}. \end{cases} \quad (20)$$

Эта функция аналитически продолжима через край  $\partial\mathfrak{M}$ . Поэтому, отбрасывая второе краевое условие (19), приводим первое краевое условие к следующему виду:

$$\begin{cases} \Phi(t^+) = \Phi(t^-) \exp(-\pi B_{\nu\nu} + 2\pi i(w_\nu(t^-) - ie_\nu)), & t \in \mathfrak{a}_\nu, \\ \Phi(t^+) = \Phi(t^-) \exp(-\pi B_{\nu\nu} - 2\pi i(w_\nu(t^+) - ie_\nu)), & t \in \bar{\mathfrak{a}}_\nu, \end{cases} \quad (21)$$

$\nu = 1, 2, \dots, m+h,$

Задачи (19) и (21) равносильны, если искать решения задачи (21), вещественные на вещественной оси. Применим к задаче (21) известную [3, 6] теорию задачи линейного сопряжения. Индекс  $\varkappa$  равен сумме приращений  $\frac{1}{2\pi} \operatorname{Re} w_\nu(t)$  вдоль линий  $\mathfrak{a}_\nu$  и  $\bar{\mathfrak{a}}_\nu$ , каждое из которых равно 1. Суммируя их, получаем  $\varkappa = 2m + 2h$ . Род поверхности  $\mathfrak{R}$  равен  $\rho = m + 2h$ . Далее,  $2\rho - 2 = 2m + 4h - 2 \geq 2m + 2h = \varkappa$  при  $h \geq 1$ . В этом случае теория [2, 6] дает для числа  $l$  решений (над полем  $\mathbb{R}$ ) оценку  $m + 1 \leq l \leq \varkappa - \rho + 1 = m + h + 1$ . Таким образом, задача (19) имеет не менее  $m + 1$  линейно независимых решений над полем  $\mathbb{R}$ . При этом число  $l$  устойчиво<sup>2)</sup> только тогда, когда оно минимально, т. е. когда  $l = m + 1$ .

Вычислим число  $N$  нулей (с учетом кратностей) любого нетривиального решения  $F(z)$  задачи (19) в  $\mathfrak{M}$ , применяя к условию сопряжения (19) принцип аргумента:

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{2\pi} \arg F(t)|_{\partial\widehat{\mathfrak{M}}} = \operatorname{Re} \int_{\partial\widehat{\mathfrak{M}}} \frac{1}{2\pi i} d \ln F(t) \\ &= \operatorname{Re} \sum_{k=1}^{m+h} \frac{1}{2\pi i} \left( \int_{\mathfrak{a}_\nu} d \ln F(t^+) - \int_{\mathfrak{a}_\nu} d \ln F(t^-) \right) \\ &= \operatorname{Re} \sum_{k=1}^{m+h} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathfrak{a}_\nu} d \ln \frac{F(t^+)}{F(t^-)} = \operatorname{Re} \sum_{k=1}^{m+h} \int_{\mathfrak{a}_\nu} dw_\nu(t) = \sum_{k=1}^{m+h} 1 = m+h. \end{aligned}$$

<sup>2)</sup>Устойчивость здесь понимается как устойчивость по отношению к малым вариациям вектора  $\mathbf{e}$ .



Пусть  $z_1, z_2, \dots, z_{m+h} \in \mathfrak{M}^\circ$  — нули функции  $F(z)$ . По теореме о логарифмическом вычете имеем

$$\operatorname{Im} \frac{1}{2\pi i} \int_{\widehat{\partial \mathfrak{M}}} w_\mu(t) d \ln F(t) = \sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} w_\mu(z_\nu). \quad (22)$$

Этот же интеграл вычислим иначе:

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \frac{1}{2\pi i} \int_{\widehat{\partial \mathfrak{M}}} w_\mu(t) d \ln F(t) &= \operatorname{Im} \frac{1}{2\pi i} \left( \sum_{k=1}^m \left( \int_{\mathfrak{a}_\nu} w_\mu(t^+) d \ln F(t^+) \right. \right. \\ &+ \int_{\mathfrak{b}_\nu} w_\mu(t) d \ln F(t) - \int_{\mathfrak{a}_\nu} w_\mu(t^-) d \ln F(t^-) \left. \left. + \sum_{k=m+1}^{m+h} \left( \int_{\mathfrak{a}_\nu} w_\mu(t^+) d \ln F(t^+) \right. \right. \right. \\ &+ \left. \left. \int_{\mathfrak{b}_\nu} w_\mu(t^+) d \ln F(t) - \int_{\mathfrak{a}_\nu} w_\mu(t^-) d \ln F(t^-) - \int_{\mathfrak{b}_\nu} w_\mu(t^-) d \ln F(t) \right) \right) \\ &= \operatorname{Im} \frac{1}{2\pi i} \left( \sum_{k=1}^m \left( \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) d \ln \frac{F(t^+)}{F(t^-)} - iB_{k\mu} \int_{\mathfrak{a}_k} d \ln F(t^-) + \delta_{\mu k} \int_{\mathfrak{b}_k} d \ln F(t) \right) \right. \\ &+ \left. \sum_{k=m+1}^{m+h} \left( \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) d \ln \frac{F(t^+)}{F(t^-)} - iB_{k\mu} \int_{\mathfrak{a}_k} d \ln F(t^-) \right. \right. \\ &+ \left. \left. \delta_{\mu k} \int_{\mathfrak{b}_k} d \ln F(t) + \int_{\mathfrak{b}_k} w_\mu(t^-) d \ln \frac{F(t^+)}{F(t^-)} \right) \right) \\ &\equiv \operatorname{Im} \frac{1}{2\pi i} \left( \sum_{k=1}^m \left( 2\pi i \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) dw(t) + \delta_{\mu k} (-\pi B_{kk} + 2\pi i (w_k(t_k^+) - ie_k)) \right) \right. \\ &+ \left. \sum_{k=m+1}^{m+h} \left( 2\pi i \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) dw(t) + \delta_{\mu k} (-\pi B_{kk} + 2\pi i (w_k(t_k^+) - ie_k)) \right) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{m+h} \operatorname{Im} \int_{\mathfrak{a}_k} w_\mu(t^+) dw_k(t) + \frac{1}{2} B_{\mu\mu} - \operatorname{Im} w_\mu(t_\mu^+) + e_\mu. \end{aligned}$$

Чтобы избавиться от неопределенного слагаемого  $\operatorname{Im} w_\mu(t_\mu^+)$ , вычислим тот интеграл в сумме правой части, который соответствует значению  $k = \mu$ . Применив к нему интегрирование по частям, при  $\mu = 1, \dots, m$  получим

$$\begin{aligned} \int_{\mathfrak{a}_\mu} w_\mu(t^+) dw_\mu(t) &= \frac{1}{2} ((w_\mu(t_\mu^+))^2 - (w_\mu(t_{0\mu}^+))^2) \\ &= \frac{1}{2} (w_\mu(t_\mu^+) - w_\mu(t_{0\mu}^+))(w_\mu(t_\mu^+) + w_\mu(t_{0\mu}^+)). \end{aligned}$$

Учитывая, что  $\operatorname{Re} w_\mu(t_\mu^+) = 1$ ,  $w_\mu(t_\mu^+) - w_\mu(t_{0\mu}^+) = 1 + i\lambda_\mu$ , где  $\lambda_\mu \in \mathbb{R}$ , при  $\mu = 1, \dots, m$  имеем

$$\operatorname{Im} \int_{\mathfrak{a}_\mu} w_\mu(t^+) dw_\mu(t) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} ((1 + i\lambda_\mu)(2w_\mu(t_\mu^+) - 1 - i\lambda_\mu)) = \operatorname{Im} w_\mu(t_\mu^+).$$

Если  $\mu = m + 1, \dots, m + h$ , то

$$\int_{\mathfrak{a}_\mu} w_\mu(t^+) dw_\mu(t) = -\frac{1}{2} + w_\mu(t_\mu^+), \quad \text{т. е. } \operatorname{Im} \int_{\mathfrak{a}_\mu} w_\mu(t^+) dw_\mu(t) = \operatorname{Im} w_\mu(t_\mu^+).$$

Таким образом, при  $\mu = 1, \dots, m + h$  получим

$$\operatorname{Im} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \mathfrak{M}} w_\mu(t) d \ln F(t) \equiv e_\mu - k_\mu \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}), \quad (23)$$

где  $k_\mu$  вычисляются по формулам (16). Итак, для нулей любого решения краевой задачи (19) выполняется сравнение (18), что и означает его безусловную разрешимость.

Желая конструктивно построить решение сравнения (18), рассмотрим  $(m + h)$ -кратный тэта-ряд [7]:

$$\theta(\mathbf{u}) := \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^{m+h}} \exp(\pi i \cdot {}^t \mathbf{n} \Omega \mathbf{n} + 2\pi i \cdot {}^t \mathbf{n} \mathbf{u}), \quad \mathbf{u} \in \mathbb{C}^{m+h}, \quad (24)$$

где  $\Omega$  — симметричная матрица порядка  $m + h$ , мнимая часть которой положительно определена, а верхний левый индекс  $t$  у вектора означает его транспонирование. Как известно, при указанных условиях ряд (24) быстро сходится, представляет четную целую функцию от  $\mathbf{u}$  и обладает следующими свойствами квазипериодичности:  $\theta(\mathbf{u} + \mathbf{E}_\nu) = \theta(\mathbf{u})$ ,  $\theta(\mathbf{u} + \Omega_{\nu\nu} \mathbf{E}_\nu) = \theta(\mathbf{u}) \exp(\pi i \Omega_{\nu\nu} + 2\pi i u_\nu)$ . Здесь  $\mathbf{E}_\nu$  —  $\nu$ -й столбец единичной матрицы  $\mathbf{E}$  порядка  $m + h$ , а  $\Omega_{\nu\nu}$  — диагональный элемент матрицы  $\Omega$ .

Для упрощения дальнейших исследований примем следующее ограничение. Именно, будем предполагать, что все  $\mathfrak{b}$ -периоды базиса  $dw_1(z), \dots, dw_{m+h}(z)$  (т. е. интегралы (13)) чисто мнимые. Фактически речь идет только о том, что в равенствах (13)  $A_{\mu\nu} = 0$  при  $\mu, \nu = m + 1, \dots, m + h$ . Это означает, что поверхность  $\mathfrak{M}$  устроена «правильно» в следующем смысле. На  $\mathfrak{M}$  существует такое каноническое рассечение, что для элементов  $dw_{m+1}(z), \dots, dw_{m+h}(z)$  нормированного базиса выполняются равенства  $A_{\mu\nu} = 0$  (для остальных элементов базиса они выполняются автоматически).

Подставим в тэта-ряд (24) вместо  $\mathbf{u}$  вектор  $\mathbf{w}(z) - i\mathbf{e}$  из (17) и положим  $\Omega = i\mathbf{B}$ . Подстановка законна, и в результате получаем следующую функцию от  $z$ :

$$\theta(\mathbf{w}(z) - i\mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^{m+h}} \exp(-\pi \cdot {}^t \mathbf{n} \mathbf{B} \mathbf{n} + 2\pi i \cdot {}^t \mathbf{n} (\mathbf{w}(z) - i\mathbf{e})), \quad (25)$$

называемую *тэта-функцией Римана* [8, ч. I, ст. 2, п. 22]. Она аналитична на поверхности  $\mathfrak{M}$ , разрезанной линиями  $\mathfrak{a}_\nu$ , положительна при  $z \in \partial \mathfrak{M}$  (в частности, отлична от тождественного нуля). Из свойств квазипериодичности вытекает, что она удовлетворяет следующим краевым условиям:

$$\begin{cases} \theta(\mathbf{w}(t^+) - i\mathbf{e}) = \theta(\mathbf{w}(t^-) - i\mathbf{e}) \exp(-\pi B_{\nu\nu} + 2\pi i (w_\nu(t^-) - ie_\nu)), \\ \quad t \in \mathfrak{a}_\nu, \quad \nu = 1, 2, \dots, m + h, \\ \theta(\mathbf{w}(t) - i\mathbf{e}) > 0, \quad t \in \partial \mathfrak{M}. \end{cases} \quad (26)$$

Это означает, что функция (25) является частным решением задачи (19).

Для вычисления нулей функции (25) можно применить теорему о логарифмическом вычете:

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} z_{\nu}^k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} t^k d \ln \theta(\mathbf{w}(t) - i\mathbf{e}), \quad k = 1, 2, \dots, m+h.$$

Вычислив правые части, получим систему алгебраических уравнений для нахождения точек  $z_{\nu}$ .

Как отмечалось выше, размерность пространства решений задачи (19) не меньше  $m+1$ , и это число устойчиво по отношению к малым вариациям вектора  $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{m+h}$ . Выше найдено частное решение (25). Для краткости будем обозначать его через  $\theta_0(z)$ . Желая найти общее решение задачи (19) в устойчивом случае, вводим *эта-функции Римана с полуцелыми характеристиками* [7, гл. II, § 1]:

$$\begin{aligned} \theta_{\nu}(z) &= \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^{m+h}} \exp\left(-\pi \cdot^t \left(\mathbf{n} + \frac{1}{2} \mathbf{E}_{\nu}\right) \mathbf{B} \left(\mathbf{n} + \frac{1}{2} \mathbf{E}_{\nu}\right) + 2\pi i \cdot^t \left(\mathbf{n} + \frac{1}{2} \mathbf{E}_{\nu}\right) (\mathbf{w}(z) - i\mathbf{e})\right) \\ &= \exp\left(-\frac{\pi}{4} \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu} + \pi i \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} (\mathbf{w}(z) - i\mathbf{e})\right) \theta\left(\mathbf{w}(z) - i\mathbf{e} + \frac{i}{2} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu}\right), \quad \nu = 1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (27)$$

Если  $z \in \partial\mathfrak{M}$ , то при  $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{m+h}$  оба последних множителя в (27) вещественные и потому  $\operatorname{Im} \theta_{\nu}(t) = 0$  при  $t \in \partial\mathfrak{M} = \mathfrak{b}_0 \sqcup \mathfrak{b}_1 \sqcup \dots \sqcup \mathfrak{b}_m$ . Более того,  $\theta_{\nu}(t) < 0$  при  $t \in \mathfrak{b}_{\nu}$  и  $\theta_{\nu}(t) > 0$  при  $t \in \partial\mathfrak{M} \setminus \mathfrak{b}_{\nu}$ . Отсюда видно, что функции  $\theta_0(t), \theta_1(t), \dots, \theta_m(t)$  линейно независимы и удовлетворяют второму краевому условию (19). Покажем, что они удовлетворяют и первому краевому условию (19). При  $t \in \mathfrak{a}_{\mu}$  имеем

$$\begin{aligned} \theta_{\nu}(t^{-}) &= \exp\left(-\frac{\pi}{4} \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu} + \pi i \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} (\mathbf{w}(t^{-}) - i\mathbf{e})\right) \theta\left(\mathbf{w}(t^{-}) - i\mathbf{e} + \frac{i}{2} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu}\right) \\ &= \exp\left(-\frac{\pi}{4} \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu} + \pi i \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} (\mathbf{w}(t^{+}) - i\mathbf{e}) - \pi^2 \cdot^t \mathbf{E}_{\nu} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\mu}\right) \\ &\times \exp\left(\pi \cdot^t \mathbf{E}_{\mu} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\mu} - 2\pi i \cdot^t \mathbf{E}_{\mu} \left(\mathbf{w}(t^{-}) - i\mathbf{e} + \frac{i}{2} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu}\right)\right) \theta\left(\mathbf{w}(t^{+}) - i\mathbf{e} + \frac{i}{2} \mathbf{B} \mathbf{E}_{\nu}\right) \\ &= \theta_{\nu}(t^{+}) \exp(\pi B_{\mu\mu} - 2\pi i (w_{\mu}(t^{-}) - i e_{\mu})). \end{aligned}$$

Отсюда, беря начало и конец, получаем

$$\theta_{\nu}(t^{+}) = \theta_{\nu}(t^{-}) \exp(-\pi B_{\mu\mu} + 2\pi i (w_{\mu}(t^{-}) - i e_{\mu}))$$

при  $t \in \mathfrak{a}_{\mu}$ , что и требовалось. Таким образом, общее решение задачи (19) в устойчивом случае имеет вид  $F(z) = \sum_{k=0}^m c_k \theta_k(z)$ , где все  $c_k$  вещественны.

Дивизор его нулей является в этом случае общим решением сравнения (18).

Задавая произвольно  $n \in \mathbb{N}$ , рассмотрим следующее обобщение сравнения (18):

$$\sum_{\nu=1}^n \operatorname{Im} \mathbf{w}(z_{\nu}) \equiv \mathbf{e} - \mathbf{k} \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}), \quad (28)$$

где неизвестными являются точки  $z_1, z_2, \dots, z_n$ . В случае  $n = m+h$  сравнение (28) совпадает со сравнением (18). Если  $n > m+h$ , то, произвольно задавая

точки  $z_{m+1}, \dots, z_n$  (например, полагая  $z_{m+1} = \dots = z_m = \infty$ ), относительно остальных точек получим сравнение (18). В случае  $1 \leq n \leq m+h-1$ , учитывая формулу (2), заключаем, что сравнение (21) равносильно системе

$$\begin{cases} \sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} w(z_\nu) \equiv e - k \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}), \\ z_{m+h+1} = \dots = z_n = \infty. \end{cases} \quad (29)$$

В устойчивом случае эта система равносильна тому, что общее решение краевой задачи (19) равно  $\sum_{\nu=0}^m c_\nu \theta_\nu(z)$ , где все  $c_\nu$  принадлежат  $\mathbb{R}$ , имеет в точке  $z = \infty$  нуль кратности  $n - m - h$ . Переходя в окрестности точки  $z = \infty$  к локальным координатам  $t = \frac{1}{z}$ , запишем это в виде системы линейных уравнений

$$\sum_{\nu=0}^m c_\nu \left(\frac{d}{dt}\right)^k \theta_\nu\left(\frac{1}{t}\right)\Big|_{t=0} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n - m - h - 1,$$

от ранга матрицы которой зависят разрешимость сравнения (28) и произвол в ее решении.

Рассмотрим проблему обращения Якоби на дубле. Дубль  $\mathfrak{R} = \mathfrak{M} \cup \widetilde{\mathfrak{M}}$  — замкнутая риманова поверхность рода  $\rho = m + 2h$ , симметричная относительно отображения  $z \mapsto \bar{z}$ . Присоединив к каноническому рассечению

$$\mathfrak{a}_1 \cup \mathfrak{b}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{a}_{m+h} \cup \mathfrak{b}_{m+h} \subset \mathfrak{M}$$

его образ  $\bar{\mathfrak{a}}_1 \cup \bar{\mathfrak{b}}_1 \cup \dots \cup \bar{\mathfrak{a}}_{m+h} \cup \bar{\mathfrak{b}}_{m+h} \subset \widetilde{\mathfrak{M}}$  при отображении  $z \mapsto \bar{z}$ , получим каноническое рассечение  $a_1, b_1, \dots, a_\rho, b_\rho$  римановой поверхности  $\mathfrak{R}$ . Желая уточнить это рассечение, а также ориентации его кривых, положим

$$\begin{aligned} a_k &:= \mathfrak{a}_k \cup \bar{\mathfrak{a}}_k^{-1}, & b_k &:= \mathfrak{b}_k, & k &= 1, \dots, m, \\ a_k &:= \mathfrak{a}_k, & b_k &:= \mathfrak{b}_k, & k &= m+1, \dots, m+h, \\ a_k &:= \bar{\mathfrak{a}}_k^{-1}, & b_k &:= \bar{\mathfrak{b}}_k, & k &= m+h+1, \dots, m+2h. \end{aligned} \quad (30)$$

Введем базис абелевых дифференциалов 1-го рода:

$$\zeta(z) = {}^t(d\zeta_1(z), d\zeta_2(z), \dots, d\zeta_\rho(z)), \quad z \in \mathfrak{R}, \quad (31)$$

комплексно нормированный относительно канонического рассечения (30). Он связан с существующим в силу леммы 1 базисом

$$dw(z) = {}^t(dw_1(z), dw_2(z), \dots, dw_{m+h}(z)), \quad z \in \mathfrak{M}, \quad (32)$$

равенствами

$$\begin{aligned} d\zeta_\nu(z) &= \begin{cases} \frac{1}{2} dw_\nu(z), & \operatorname{Im} z \geq 0, \\ -\frac{1}{2} \overline{dw_\nu(\bar{z})}, & \operatorname{Im} z \leq 0, \end{cases} & \nu &= 1, 2, \dots, m, \\ d\zeta_\nu(z) &= dw_\nu(z), & \nu &= m+1, \dots, m+h, \\ d\zeta_\nu(z) &= \overline{dw_{\nu-h}(\bar{z})}, & \nu &= m+h+1, \dots, m+2h = \rho. \end{aligned} \quad (33)$$

В силу принятого выше ограничения на риманову поверхность периоды базиса (32) таковы:

$$\int_{a_\mu} d\zeta_\nu(t) = \delta_{\mu\nu}, \quad \int_{b_\mu} d\zeta_\nu(t) = i\Omega_{\mu\nu}, \quad \mu, \nu = 1, 2, \dots, \rho,$$

где  $\delta_{\mu\nu}$  — символ Кронекера,  $\Omega_{\mu\nu} \in \mathbb{R}$ , а матрица  $\mathbf{\Omega} = (\Omega_{\mu\nu})_{\mu,\nu=1}^{\rho}$  симметрична и положительно определена.

Возьмем  $\rho$ -кратный тэта-ряд вида (24), заменим в нем  $\mathbf{\Omega}$  на  $i\mathbf{\Omega}$ , а вместо аргумента подставим в него  $\zeta(z) - ie$ , где  $e \in \mathbb{R}^{\rho}$ . Тогда возникнет тэта-функция Римана, которую будем обозначать немного иначе, чем (25):

$$\vartheta(\zeta(z) - ie) = \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^{\rho}} \exp(-\pi \cdot {}^t \mathbf{n} \mathbf{\Omega} \mathbf{n} + 2\pi i \cdot {}^t \mathbf{n} (\zeta(z) - ie)). \quad (34)$$

Эта функция также положительна на вещественной оси (в частности, нетривиальна, т. е. отлична от тождественного нуля), поэтому ее нули расположены симметрично относительно вещественной оси. Она разрывна вдоль линий  $a_{\nu}$ , где выполняются следующие условия сопряжения, аналогичные условиям (19):

$$\begin{aligned} \vartheta(\zeta(t^+) - ie) &= \vartheta(\zeta(t^-) - ie) \exp(-\pi \Omega_{\nu\nu} + 2\pi i (\zeta_{\nu}(t^-) - ie_{\nu})), \\ t &\in a_{\nu}, \quad \nu = 1, 2, \dots, \rho. \end{aligned} \quad (35)$$

Так как функция (34) нетривиальна, ее нули образуют единственное решение классической проблемы обращения Якоби:

$$\sum_{k=1}^{\rho} \zeta(z_k) \equiv e - \mathbf{k} \quad (\text{по модулю периодов}), \quad (36)$$

где  $\mathbf{k} = {}^t(k_1, k_2, \dots, k_{\rho})$ , а

$$k_{\mu} = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2} \Omega_{\mu\mu} + \zeta_{\mu}(t_{\mu}) - \sum_{k=1}^{\rho} \int_{a_k} \zeta_{\mu}(t^+) d\zeta_k(t), \quad \mu = 1, 2, \dots, \rho. \quad (37)$$

**Лемма 5.** *Справедливы соотношения  $\operatorname{Re} k_{\mu} \equiv \frac{1}{2}$  по модулю  $\mathbb{Z}$ .*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Так как  $\Omega_{\mu\mu} \in \mathbb{R}$ ,  $\operatorname{Re} \zeta_{\mu}(t_{\mu}) = 1$ , достаточно показать, что сумма в (37) чисто мнимая. Имеем

$$\begin{aligned} \overline{\sum_{k=1}^{\rho} \int_{a_k} \zeta_{\mu}(t) d\zeta_k(t)} &= \sum_{k=1}^{\rho} \int_{a_k} \overline{\zeta_{\mu}(t)} \overline{d\zeta_k(t)} \\ &= \sum_{k=1}^{\rho} \int_{\bar{a}_k} \zeta_{\mu}(\bar{t}) d\zeta_k(\bar{t}) = - \sum_{k=1}^{\rho} \int_{a_k} \zeta_{\mu}(t) d\zeta_k(t), \end{aligned}$$

так как множество  $\bigcup_{\mu} a_{\mu}$  переходит само на себя при изменяющем ориентацию отображении  $t \mapsto \bar{t}$ , при этом  $\zeta_{\mu}(t)$ ,  $d\zeta_k(t)$  меняют знаки. Лемма доказана.

### § 3. Некоторые приложения

**1. Функции Шоттки** (см. [9, гл. VI, § 6]). *Функциями Шоттки* на римановой поверхности с краем  $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}^{\circ} \sqcup \partial\mathfrak{M}$  называются мероморфные в  $\mathfrak{M}^{\circ}$  функции, имеющие там конечное число полюсов, непрерывно продолжимые на край  $\partial\mathfrak{M}$  и принимающие на нем чисто вещественные значения.

Ясно, что множество всех функций Шоттки на  $\mathfrak{M}$  является полем, в котором полем констант служит  $\mathbb{R}$ . Применяя к функции Шоттки принцип аргумента, заключаем, что общее число ее нулей равно общему числу ее полюсов (с учетом кратностей). Пусть  $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathfrak{M}^{\circ}$  — произвольно заданные точки. Станем искать функции Шоттки, кратные дивизору  $\Delta^{-1}$ , где  $\Delta = (z_1) \cdot (z_2) \cdot \dots \cdot (z_n)$

— заданный дивизор. Если такая функция существует, то она должна иметь нули, дивизор которых можно записать в виде  $\Delta' = (z'_1) \cdot (z'_2) \cdot \dots \cdot (z'_n)$ , где точки  $z'_1, z'_2, \dots, z'_n \in \mathfrak{M}^\circ$  неизвестные. Рассмотрим вещественный аналог проблемы Якоби

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} \mathbf{w}(z'_\nu) \equiv \operatorname{Im} \mathbf{w}(z) \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}) \quad (38)$$

с известной точкой  $z$  и неизвестными точками  $z'_1, z'_2, \dots, z'_{m+h}$ . Его очевидным решением является дивизор  $\Delta' = (z) \cdot (\infty)^{m+h-1}$ . Соответствующая сравнению (38) тэта-функция Римана  $\theta(\mathbf{w}(z') - i \cdot \operatorname{Im} \mathbf{w}(z) - i\mathbf{k})$  имеет простой нуль при  $z' = z$  и нуль кратности  $m + h - 1$  в точке  $z' = \infty$ . Отсюда очевидно, что функцию Шоттки, кратную дивизору  $\Delta^{-1}$ , следует искать в виде

$$S(z) = C \cdot \frac{\prod_{k=1}^n \theta(\mathbf{w}(z) - i \operatorname{Im} \mathbf{w}(z'_k) - i\mathbf{k})}{\prod_{k=1}^n \theta(\mathbf{w}(z) - i \operatorname{Im} \mathbf{w}(z_k) - i\mathbf{k})}, \quad (39)$$

где  $z'_1, z'_2, \dots, z'_n \in \mathfrak{M}^\circ$  — неизвестные точки, а  $C \in \mathbb{R}$  — постоянная.

**Теорема 1.** *Нетривиальная функция Шоттки, кратная дивизору  $\Delta^{-1}$ , существует и представима в виде (39), если и только если разрешим следующий обобщенный аналог проблемы обращения:*

$$\sum_{\nu=1}^n \operatorname{Im} \mathbf{w}(z'_\nu) \equiv \sum_{\nu=1}^n \operatorname{Im} \mathbf{w}(z_\nu) \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}). \quad (40)$$

**Доказательство.** Очевидно, что при  $z \rightarrow \infty$  числитель и знаменатель в (39) имеют одинаковые порядки, и потому особенности в точке  $z = \infty$  сокращаются. Значит,  $S(\infty) \in \mathbb{R}$ . Все множители числителя и знаменателя в (39) имеют по переменной  $z$  разрывы вдоль линий  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{m+h}$ . Используя формулу (19), найдем соотношение между предельными значениями функции (39) на этих линиях:

$$S(t^+) = S(t^-) \exp \left( 2\pi \sum_{k=1}^n (\operatorname{Im} w_\nu(z'_k) - \operatorname{Im} w_\nu(z_k)) \right), \quad t \in \mathbf{a}_\nu, \nu = 1, 2, \dots, m + h.$$

Отсюда видно, что  $S(z)$  непрерывна, если и только если выполняются равенства

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Im} w_\nu(z'_k) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Im} w_\nu(z_k), \quad \nu = 1, 2, \dots, m + h,$$

равносильные одному векторному равенству

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Im} \mathbf{w}(z'_k) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Im} \mathbf{w}(z_k). \quad (41)$$

Различие между (40) и (41) состоит в том, что первое из них — сравнение, а второе — равенство. Однако они равносильны, так как сравнение можно превратить в равенство, сняв ограничение, согласно которому в абелевых интегралах (2) пути интегрирования не пересекают линий канонического рассечения. Надо разрешить путям интегрирования нужное число раз обходить линии  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ , и тогда сравнения превратятся в равенства. Теорема доказана.

**2. Задачи Шварца и Дирихле.** Рассмотрим следующую задачу Шварца: найти все функции  $F(z)$ , однозначные и аналитические на римановой поверхности  $\mathfrak{M}^\circ$ ,  $H$ -непрерывно (это означает, что функции, о которых идет речь, удовлетворяют условию Гёльдера [11]) продолжимые на край  $\partial\mathfrak{M}$ , по следующему краевому условию:

$$\operatorname{Re} F(t) = c(t), \quad t \in \partial\mathfrak{M}, \quad (42)$$

где  $c(t)$  — заданная  $H$ -непрерывная функция.

Если искать гармоническую на  $\mathfrak{M}^\circ$  функцию по краевому условию (42), то это — хорошо изученная классическая задача Дирихле. Наша цель — найти условия разрешимости задачи Шварца (условия однозначности) и явно выразить решения задач Шварца и Дирихле через тэта-функцию.

С этой целью рассмотрим следующее сравнение:

$$\sum_{\nu=1}^{\rho} \zeta(z_\nu) \equiv \rho \cdot \zeta(z) \quad (\text{по модулю периодов}). \quad (43)$$

Очевидным решением этого сравнения является дивизор  $(z_1)(z_2) \dots (z_\rho) = (z)^\rho$ . Он является дивизором нулей нетривиальной тэта-функции Римана от  $\tau$ :

$$\vartheta(\zeta(\tau) - \rho\zeta(z) - \mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^\rho} \exp(-\pi \cdot {}^t \mathbf{n} \Omega \mathbf{n} + 2\pi i \cdot {}^t \mathbf{n} (\zeta(\tau) - \rho\zeta(z) - \mathbf{k})), \quad (44)$$

где  $\mathbf{k}$  — вектор римановых констант (37). В силу леммы 5 имеем  $\operatorname{Re} k_\mu \equiv 0$  по модулю  $\frac{1}{2}$ . Таким же свойством обладают и  $\zeta_\mu(t)$  при  $t \in \partial\mathfrak{M}$ . Отсюда следует, что функция (44) вещественна при  $z, \tau \in \partial\mathfrak{M}$ . Значит, дифференциал  $d_\tau \ln \vartheta(\zeta(\tau) - \rho\zeta(z) - \mathbf{k})$  имеет при  $\tau = z$  простой полюс с вычетом  $\rho$ , а при  $\tau, z \in \partial\mathfrak{M}$  чисто вещественный. Интеграл

$$F(z) = \frac{1}{\rho\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} c(\tau) d_\tau \ln \vartheta(\zeta(\tau) - \rho\zeta(z) - \mathbf{k}) + i\beta_0, \quad z \in \mathfrak{M}, \quad (45)$$

где  $\beta_0 \in \mathbb{R}$  — произвольная постоянная, можно рассматривать как удвоенный интеграл типа Коши, так как его ядро  $\frac{2}{\rho} d_\tau \ln \vartheta(\zeta(\tau) - \rho\zeta(z) - \mathbf{k})$  имеет при  $\tau = z$  полюс с вычетом 2, а ядро интеграла типа Коши  $\frac{d_\tau}{\tau - z}$  — полюс с вычетом 1. Применив к нему формулу Сохоцкого, в пределе при  $z \rightarrow t$ ,  $z \in \mathfrak{M}$ , будем иметь

$$F(t) = c(t) + \frac{1}{\rho\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} c(\tau) d_\tau \ln \vartheta(\zeta(\tau) - \rho\zeta(t) - \mathbf{k}) + i\beta_0, \quad t \in \partial\mathfrak{M}. \quad (46)$$

Здесь интегральный член чисто мнимый, поскольку ядро и плотность интеграла вещественные. Поэтому, выделив в (46) вещественные части, получим равенство (42). Найдем условия, при которых функция (45) однозначна. Ее многозначность может возникать из-за того, что при обходе точкой  $z$  линии  $b_\mu$  ( $\mu = 1, 2, \dots, m+h$ ) ядро интеграла получает приращение, которое в силу формул (35) отличается лишь постоянным множителем от дифференциала  $d\zeta_\mu(\tau)$ , который, в свою очередь, отличается лишь постоянным множителем от дифференциала  $dw_\mu(\tau)$  в силу формул (33). Значит, необходимые и достаточные условия разрешимости задачи Шварца можно задать в виде

$$\int_{\partial\mathfrak{M}} c(\tau) dw_\mu(\tau) = 0, \quad \mu = 1, 2, \dots, m+h. \quad (47)$$

Так как приращения интеграла (45) чисто мнимые, его вещественная часть однозначна, что дает однозначную и безусловную разрешимость задачи Дирихле. Таким образом, решение задачи Дирихле может быть задано в виде

$$\operatorname{Re} F(z) = \frac{1}{\rho\pi} \int_{\partial\mathfrak{M}} c(\tau) d_\tau \arg \vartheta(\zeta(\tau) - \rho\zeta(z) - \mathbf{k}), \quad z \in \mathfrak{M}.$$

**3. Однородная задача Гильберта.** Рассмотрим краевую задачу

$$\operatorname{Im}(\overline{\lambda(t)}F(t)) = 0, \quad t \in \partial\mathfrak{M}, \tag{48}$$

где  $F : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$  — неизвестная функция, однозначная и аналитическая в  $\mathfrak{M}^\circ$ ,  $H$ -непрерывно продолжимая на  $\partial\mathfrak{M}$ , а  $\lambda(t)$  — заданная  $H$ -непрерывная функция, нигде не обращающаяся в нуль. Поскольку краевое условие (48) не изменяется от умножения или деления его на положительную функцию, будем считать, что уже в (48) выполняется тождество  $|\lambda(t)| \equiv 1$ .

Обозначим через  $\varkappa = \frac{1}{2\pi} \arg \lambda(t)|_{\partial\mathfrak{M}}$  индекс функции  $\lambda(t)$ . Чтобы его вычислить, вспомним, что  $\partial\mathfrak{M} = \mathbf{b}_0 \sqcup \mathbf{b}_1 \sqcup \dots \sqcup \mathbf{b}_m$ , и на каждой кривой  $\mathbf{b}_\nu$  произвольно зафиксируем точку  $t_\nu$ . На разомкнутой кривой  $\mathbf{b}_\nu \setminus t_\nu$  произвольно зафиксируем непрерывную ветвь функции  $\frac{1}{2\pi} \arg \lambda(t)$ . Индекс  $\varkappa$  по определению равен сумме приращений выделенных ветвей функции  $\frac{1}{2\pi} \arg \lambda(t)$  вдоль всех разомкнутых кривых  $\mathbf{b}_\nu \setminus t_\nu$  и не зависит от того, какие именно ветви выбраны.

Так как очевидно, что при  $\varkappa < 0$  задача (48) имеет только тривиальное решение, будем считать, что  $\varkappa \geq 0$ . К задаче (48) будем применять метод регуляризующего множителя. Идея этого метода заключается в том, чтобы, умножив краевое условие (48) на подходящую функцию  $p(t) > 0$ , добиться того, чтобы в новом краевом условии

$$\operatorname{Im}(p(t)\overline{\lambda(t)}F(t)) = 0, \quad t \in \partial\mathfrak{M}, \tag{49}$$

под знаком  $\operatorname{Im}$  оказалось предельное значение некоторой функции Шоттки. Найдя ее, легко найдем и  $F(z)$ .

В случае, когда  $\mathfrak{M}^\circ$  — круг (или область, конформно эквивалентная кругу), эта идея реализована классиками. В случае, когда  $\mathfrak{M}^\circ$  —  $(m + 1)$ -связная область на плоскости ( $h = 0$ ), в [10] было предложено искать регуляризующий множитель  $p(t) > 0$  и точки  $z_1, \dots, z_\varkappa \in \mathfrak{M}^\circ$  так, чтобы выполнялось равенство

$$p(t)\overline{\lambda(t)} = \frac{e^{i(u(t)+iv(t))}}{\prod_{\nu=1}^{\varkappa} (t - z_\nu)}, \quad t \in \partial\mathfrak{M}, \tag{50}$$

где  $u(z) + iv(z)$  — однозначная аналитическая в  $\mathfrak{M}^\circ$  функция. Задача свелась к обобщенному вещественному аналогу проблемы Якоби:

$$\sum_{\nu=1}^{\varkappa} \operatorname{Im} w_\mu(z_\nu) \equiv \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \lambda(t) dw_\mu(t), \quad \mu = 1, \dots, m + h, \tag{51}$$

общее решение которого найдено в [4]. В случае  $h = 0$  задача Гильберта была рассмотрена также в [11, 12] и во многих других источниках.

В случае  $h \geq 1$  искать регуляризующий множитель из равенства (50) не имеет смысла, так как функции  $z - z_\nu$  не являются аналитическими на  $\mathfrak{M}^\circ$  из-за разрывов на линиях  $\mathbf{b}_{m+1}, \dots, \mathbf{b}_{m+h}$ . Поэтому предлагается в равенстве



(50) вместо множителя  $(t - z_\nu)$  подставить некоторую функцию  $f(t, z_\nu)$ , аналитическую и однолиственную по  $t \in \mathfrak{M}^\circ$ , имеющую единственный простой нуль при  $t = z_\nu$ . Эту функцию надо подобрать с таким расчетом, чтобы возникающая система уравнений для нахождения точек  $z_\nu$  оказалась вещественным аналогом проблемы Якоби. Итак, регуляризирующий множитель  $p(t) > 0$  будем искать, исходя из равенства

$$p(t)\overline{\lambda(t)} = \frac{e^{i(u(t)+iv(t))}}{\prod_{\nu=1}^{\infty} f(t, z_\nu)}, \quad t \in \partial\mathfrak{M}, \quad (52)$$

где  $u(z) + iv(z)$  — однозначная аналитическая в  $\mathfrak{M}^\circ$  функция. Выделив в (52) аргументы, получим

$$-\arg \lambda(t) = u(t) - \sum_{\nu=1}^{\infty} \arg f(t, z_\nu), \quad t \in \partial\mathfrak{M}. \quad (53)$$

Строго говоря, это не является равенством, а будет сравнением по модулю  $2\pi\mathbb{Z}$  на каждой связной компоненте края  $\partial\mathfrak{M}$ , но при надлежащей фиксации ветвей его можно сделать равенством. Будем считать, что это сделано. Применяя к функции  $u(z) + iv(z)$  условия однозначности (47), из (53) выводим, что

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \arg \lambda(t) d\zeta_\mu(t) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \arg f(t, z_\nu) d\zeta_\mu(t), \quad \mu = 1, 2, \dots, m+h. \quad (54)$$

Теперь надо подобрать функцию  $f(t, z)$  так, чтобы входящие в правую часть равенства (54) интегралы оказались интегральными представлениями для  $\operatorname{Im} \zeta_\mu(z_\nu)$ . С этой целью введем разрывный аналог ядра Коши [2] на  $\mathfrak{R}$ :

$$\omega_{z_\infty}(t) dt := \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial t} \ln \frac{\vartheta(\zeta(t) - \rho\zeta(z) - \kappa)}{\vartheta(\zeta(t) - \kappa)} dt, \quad (55)$$

имеющий простые полюсы в точках  $t = z$  и  $t = \infty$ , вычеты в которых равны  $+1$  и  $-1$  соответственно. Его можно использовать в качестве ядра Коши в областях, лежащих на  $\mathfrak{R}$ . Единственное неудобство его в том, что оно имеет по переменной  $z$  разрывы на линиях  $a_1, \dots, a_\rho$ . Поэтому преобразуем его в мероморфный аналог ядра Коши [2], не имеющий линий разрыва:

$$A(t, z) dt = \frac{\begin{vmatrix} \omega_{z_\infty}(t) & \zeta'_1(t) & \dots & \zeta'_\rho(t) \\ \omega_{z_\infty}(t_1) & \zeta'_1(t_1) & \dots & \zeta'_\rho(t_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_{z_\infty}^{(\rho)}(t_1) & \zeta_1^{(\rho)}(t_1) & \dots & \zeta_\rho^{(\rho)}(t_1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \zeta'_1(t_1) & \dots & \zeta'_\rho(t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ \zeta_1^{(\rho)}(t_1) & \dots & \zeta_\rho^{(\rho)}(t_1) \end{vmatrix}} dt, \quad (56)$$

где  $t_1 \in \widetilde{\mathfrak{M}}^\circ$  — фиксированная точка, отличная от точек Вейерштрасса поверхности  $\mathfrak{R}$ . Это последнее условие обеспечивает отличие от нуля знаменателя в (56). Ядро (56) пригодно для представления аналитических функций в областях, лежащих на  $\mathfrak{M}$ . В частности, при  $\tau \in \mathfrak{M}^\circ$  имеем

$$\zeta'_\mu(\tau) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \zeta'_\mu(t) A(t, \tau) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \zeta'_\mu(t) A(t, \tau) dt, \quad \mu = 1, 2, \dots, \rho, \quad (57)$$

так как интегралы по линиям  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_\rho, \mathfrak{b}_{m+1}, \dots, \mathfrak{b}_\rho$  взаимно уничтожаются. Интегрируя равенство (57) в пределах от  $\infty$  до  $z$ , получим

$$\zeta_\mu(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\infty}^z d\tau \int_{\partial\mathfrak{M}} \zeta'_\mu(t) A(t, \tau) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} d\zeta_\mu(t) \int_{\infty}^z A(t, \tau) d\tau, \quad \mu = 1, \dots, \rho.$$

Выделив здесь мнимые части, найдем нужное нам интегральное представление

$$\operatorname{Im} \zeta_\mu(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} d\zeta_\mu(t) \cdot \operatorname{Im} \int_{\infty}^z A(t, \tau) d\tau, \quad \mu = 1, \dots, \rho. \quad (58)$$

Отсюда видно, что если в равенствах (54) положить

$$\arg f(t, z_\nu) = \operatorname{Im} \int_{\infty}^{z_\nu} A(t, \tau) d\tau,$$

то они превратятся в обобщение вещественного аналога проблемы Якоби:

$$\sum_{\nu=1}^{\varkappa} \operatorname{Im} \zeta_\mu(z_\nu) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \arg \lambda(t) d\zeta_\mu(t), \quad \mu = 1, \dots, m+h. \quad (59)$$

При  $\varkappa \geq m+h$  эта система безусловно разрешима, и пусть  $z_1, \dots, z_\varkappa$  — какое-нибудь ее решение. Функция, входящая в (52) и (53), такова:

$$f(t, z) = \exp \left( \int_{\infty}^z A(t, \tau) d\tau \right).$$

Уравнение (53) есть задача Шварца относительно неизвестной однозначной аналитической функции  $u(z) + iv(z)$ . Решив ее, получим

$$u(z) + iv(z) = \mathbb{S} \left( \sum_{\nu=1}^{\varkappa} \arg f(t, z_\nu) - \arg \lambda(t) \right) (z),$$

где  $\mathbb{S}$  — оператор Шварца. После этого, выделив модули в (50), найдем регуляризующий множитель  $p(t) = \frac{\exp(-v(t))}{\prod_{\nu=1}^{\varkappa} |f(t, z_\nu)|}$ . Умножив на него краевое условие (48), получим равенство

$$\operatorname{Im} \left( \frac{e^{i(u(t)+iv(t))} F(t)}{\prod_{\nu=1}^{\varkappa} f(t, z_\nu)} \right) = 0, \quad t \in \partial\mathfrak{M}. \quad (60)$$

Здесь под знаком  $\operatorname{Im}$  стоит предельное значение функции Шоттки, кратной дивизору  $(z_1)^{-1}(z_2)^{-1} \dots (z_\varkappa)^{-1}$ . Пусть  $z'_1, z'_2, \dots, z'_\varkappa \in \mathfrak{M}$  — произвольные точки, для которых

$$\sum_{\nu=1}^{\varkappa} \operatorname{Im} \zeta(z'_\nu) \equiv \sum_{\nu=1}^{\varkappa} \operatorname{Im} \zeta(z_\nu) \quad (\text{по модулю периодов}). \quad (61)$$

Используя формулу (39), выпишем общее решение задачи (48):

$$F(z) = C \exp(-i(u(z) + iv(z))) \prod_{k=1}^{\varkappa} \frac{f(z, z_k) \theta(\mathbf{w}(z) - i \cdot \operatorname{Im} \mathbf{w}(z'_k) - i\mathbf{k})}{\theta(\mathbf{w}(z) - i \cdot \operatorname{Im} \mathbf{w}(z_k) - i\mathbf{k})}, \quad z \in \mathfrak{M}, \quad (62)$$

где  $C \in \mathbb{R}$  — произвольная постоянная.

Пусть  $0 \leq \varkappa \leq m+h-1$ . Если система (51) разрешима, то общее решение задачи (48) по-прежнему дается формулой (62). Если система (51) неразрешима, то задача (48) не имеет нетривиальных решений. Чтобы это показать, зададим произвольно точки  $z'_{\varkappa+1}, \dots, z'_{m+h}$  и станем подбирать регуляризующий множитель  $p(t) > 0$  так, чтобы выполнялось равенство

$$p(t) \overline{\lambda(t)} = \frac{e^{i(u(t)+iv(t))} \prod_{\nu=\varkappa+1}^{m+h} f(t, z'_\nu)}{\prod_{\nu=1}^{m+h} f(t, z_\nu)}, \quad t \in \partial\mathfrak{M}, \quad (63)$$

где  $z_1, \dots, z_{m+h}$  — неизвестные точки. Их можно найти из условий однозначности функции  $u(z) + iv(z)$ :

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} \zeta_\mu(z_\nu) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \arg \lambda(t) d\zeta_\mu(t) + \sum_{\nu=\varkappa+1}^{m+h} \operatorname{Im} \zeta_\mu(z'_\nu), \quad \mu = 1, \dots, m+h. \quad (64)$$

Умножив краевое условие (48) на регуляризующий множитель из равенства (63), получим краевое условие в виде

$$\operatorname{Im} \left( \frac{e^{i(u(t)+iv(t))} \prod_{\nu=\varkappa+1}^{m+h} f(t, z'_\nu)}{\prod_{\nu=1}^{m+h} f(t, z_\nu)} F(t) \right) = 0, \quad t \in \mathfrak{M}, \quad (65)$$

где под знаком  $\operatorname{Im}$  стоит предельное значение функции Шоттки с нулями в точках  $z'_{\varkappa+1}, \dots, z'_{\varkappa+m}$ . Обозначив остальные нули этой функции через  $z'_1, \dots, z'_\varkappa$ , на основании теоремы 1 заключаем, что должно выполняться сравнение

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} \zeta(z_\nu) \equiv \sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} \zeta(z'_\nu) \quad (\text{по модулю } B\text{-периодов}). \quad (66)$$

Комбинируя это с равенствами (64), имеем

$$\sum_{\nu=1}^{m+h} \operatorname{Im} \zeta(z'_\nu) \equiv \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathfrak{M}} \arg \lambda(t) d\zeta(t) + \sum_{\nu=\varkappa+1}^{m+h} \operatorname{Im} \zeta(z'_\nu).$$

Уничтожая здесь слева и справа одинаковые суммы, получим неразрешимое сравнение (51). Значит,  $F(z) \equiv 0$ .

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Шиффер М., Спенсер Д. К. Функционалы на конечных римановых поверхностях. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
2. Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.

3. Зверович Э. И. Краевые задачи теории аналитических функций в гёльдеровских классах на римановых поверхностях // Успехи мат. наук. 1971. Т. 26, № 1. С. 113–179.
4. Зверович Э. И. Проблема обращения Якоби, ее аналоги и обобщения // Актуальные проблемы современного анализа. Гродно: Изд-во ГрГУ, 2009. С. 69–83.
5. Мочалов В. В. Аналог проблемы обращения Якоби на конечной римановой поверхности // Теория функций комплексного переменного и краевые задачи. Чебоксары: Изд-во Чувашск. ун-та, 1982. С. 43–54.
6. Zverovich E. I. The problem of linear conjugation on a closed Riemann surface // Complex Analysis Operator Theory. 2008. V. 2, N 4. P. 709–732.
7. Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях. М.: Мир, 1988.
8. Риман Б. Сочинения. М.; Л.: Гостехиздат, 1948.
9. Голузин Г. М. Геометрическая теория функций комплексного переменного. М.: Наука, 1966.
10. Зверович Э. И. О сведении задачи Гильберта для многосвязной области к задаче Гильберта с рациональным коэффициентом // Докл. АН СССР. 1964. Т. 157, № 4. С. 777–780.
11. Гахов Ф. Д. Краевые задачи. М.: Наука, 1977.
12. Салимов Р. Б. Шабалин П. Л. Краевая задача Гильберта теории аналитических функций и ее приложения. Казань: Изд-во Казан. мат. о-ва, 2005.

*Статья поступила 23 декабря 2014 г.*

Зверович Эдмунд Иванович, Долгополова Ольга Борисовна  
Белорусский гос. университет,  
механико-математический факультет, кафедра теории функций,  
пр. Независимости, 4, Минск 220050, Беларусь  
Zverovich@bsu.by, Dolgopolova@tut.by

Крушевский Евгений Александрович  
Белорусский национальный технический университет,  
кафедра высшей математики № 3,  
пр. Независимости, 150, Минск 220014, Беларусь  
geen\_61@mail.ru